






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1788/20/1





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1788/01



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1788/D/1



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
All rights reserved. Images reproduced by permission of The Wellcome Trust, London.
1788/201

Constas 43 80 Anno 1550 18 die septembris

1788⁽¹⁷⁾

Helwig Stiegel

KEIB

450.

No. 9


Hom:

ὅτι περ φύλλων γενεὴ ποιεῖ καὶ αἰδρωῖ
φύλλα τα μέν τ' αἰετὸς ἀφαιρᾷ τὰ δὲ ἀλλὰ δὲ
ἡμετέροισιν φύλλοις ἅμα δ' αἰετὸς αἰετῶν ὡς
ὡς αἰδρωῖ γενεὴ ἡ μερ φύλλοι ἡ δ' ἀφαιρᾷ.

Thomas Digges

1704

... in the ...
... of the ...
... the ...
... the ...
... the ...



58764

PEDANII DIOSCORIDIS ANAZARBEL DE MEDICINALI MATERIA LIBRI SEX, IOANNE RVELLIO SVES-

tionensi interprete. Singulis cum stirpium, tum animantium historijs, ad naturæ æmulationem expressis imaginibus, seu uiuis picturis, ultra millenarium numerum adiectis: non sine multiplici peregrinatione, sumptu maximo, studio atque diligentia singulari, ex diuersis regionibus conquisitis. Additis etiam Annotationibus siue Scholijs breuissimis quidem, quæ tamen de Medicinali materia omnem controuersiam facile tollant. Per Gualtherum Riium, Argentinum, Medicum.

ACCESSERVNT PRIORI EDITIONI,

VALERII CORDI SIMESVSII ANNOTATIONES DOCTISSIMÆ IN DIOSCORIDIS DE MEDICINALI MATERIA LIBROS.

EVRICII CORDI SIMESVSII IVDICIUM DE HERBIS & SIMPLICIBUS MEDICINÆ: AC EORUM QUÆ APUD MEDICOS CONTROUERTUNTUR, EXPLICATIO.

HERBARVM NOMENCLATVRÆ, VARIARVM GENTIVM, DIOSCORIDI ADSCRIPTÆ, SECUNDUM LITERARVM ORDINEM EXPOSITÆ. AUT, CONRADO GEFNERO, MEDICO.

Cum Indice quintuplici copiosissimo: quorum primus omnium fere simplicium, quibus passim utuntur Medici, nomenclaturas Græcas: alter Latinas, Officinis, Herbarijs, & Arabum Familias uulgares: tertius Gallicas: quartus Germaniæ superioris & inferioris, Saxonice item lingus nomina: quintus Curationes & Remedia morborum, miro ordine complectitur.

Primus post Dioscoridem 125 annos uide. Annot.



Cum Gratia & Priuilegio Imperiali.

FRANC. Apud Chr. Eggenolphum.

1610

1. 3

THE FIRST DISCOVERY

OF THE NEW WORLD

BY

CHRISTOPHER COLUMBUS

IN

THE YEAR 1492

AND

THE FIRST VOYAGE

TO

THE WEST INDIES

IN

THE YEAR 1492

AND

THE FIRST VOYAGE

TO

THE WEST INDIES

IN

THE YEAR 1492

AND

THE FIRST VOYAGE

TO

THE WEST INDIES

IN

THE YEAR 1492

AND

THE FIRST VOYAGE

TO

THE WEST INDIES

CLARISSIMO AC PRUDENTISSIMO

SENATVI FRANCOFORDIANO GVALTHERVS

Rivius, Argentinus, Medicus, & Chirurgus,

S. D. P.



VVM SVMMVS RERVVM OPIFEX DEVS, HOMI-
ni nihil præstabilius mente, ratione atq; intelligentia dede-
rit, mirum uideri non debet, si nonnulli & ij quidem sapi-
entissimi uiri, tantū studiū, laboris ac uigiliarum cōtulerint
ad eam partem excolendam & informandam, qua sola & re-
liquis animatibus & ipsis hominibus antecellerent. Quā
Pythagoricus Epicharmus tantopere est admiratus, ut hāc
unam dominam atq; reginam, lucem lumenq; uitæ diceret,
achius solius nobis demandatam curam, quū alia tum stupida tum cæca cēseret;
nōs, inquit, ὁ γὰρ ἡμῶν ἀκρόαται, ἡ δὲ ἄλλα κωφεῖται τοῦ φάος: in hac tamē ipsa ratione uel
animo expoliendo, non eandem uidentur pleriq; propositam habuisse uiam, aut
ad eundem tendisse finem. Nam fuerunt apud præcos philosophos, atq; etiam
num sunt, qui cognitionem contemplationemq; naturæ ita consecrati sunt, ut es-
tiam in ea consensere & iucundum & pulchrum existimauerint: quorum ego
instituta, Clarissimi atq; Amplissimi uiri, etsi improbandum non suscepī (quod
hoc interim agere quā turpi ocio sese dedere maluerint) nunquam tamen tantū
feci, ut non potius mancum quodammodo, atq; uixdum inchoatū iudicauerim,
si nulla rerum actio adiuncta consequutaq; fuisset: & quum sapientiam (nimirū
qua diuinarum humanarumq; continetur scientia) ut rem maximam admirari so-
leo, tum eam partem quæ nobis à communitate dicta, profert officia, longē præ-
stantissimam putauī. Eam, inquam, quæ in hac generis humani domestica consue-
tudine, societati ac hominū tuendis commodis illustrior apparere solet, qua uel
sola agnoscamus necesse est, nos nobis ipsis non tantū natos, sed patriæ, sed a-
micis. Summoq; conatu enitendum nobis, ut è nostris studiis ad proximum q̄
uberrimus redundet fructus. Id cū ita sit, facile in animū induco meū, equiores
rerū æstimatores maximi facere mecum præclarissimum tum artium tum facultas-
tum omniū, quibus mens atq; ipsa ratio expoliuntur, Medicinæ studiū, atq; id fa-
luterum pernecessariumq; præ cæteris humanæ salutis iudicare, maximē cū
cogitauerint, qua parte rerum humanarum medica facultas existat, & quæ neces-
sitas eius disciplinæ sit, atque utilitas, quæ propē id uinculum tenet, quo homo
qua celestis, & qua terrenus est, copulatur. Item qua in usum & commercium
rerum extra se positarum utiliter et salubriter exit. Nec enim (ut corporea taceā)
diutius celestis hic spiritus & consuetudinem sui præbere nobis potest, postq̄
à modulo naturæ discessit corpus, nec afferre præsidij quæ extrā sunt ope Me-
dici salutifera destitutus, quicquam potest. Credo igitur si uel mens rectē sese re-
pūet, uel quæ mente carent consilijs humanis uti possent, nihil tam enixē flagi-
tatura quā eius rei domesticam facultatem, usum atque conditionem, cutus be-
neficio frui omnibus istis naturæ muneribus licet. Quid enim admirabilius q̄
cū morborum & sanitatis uis penitissimē intra ipsa corporis uiscera peragatur,
Medicum ingressum mēte dispicere, decernere, uenientem morbum prælagire,
ingruentem auertere: superantem mitigare, reprimere, tollere: eum qui animam
agebat, quem desperabant amici, uelut ab orco, breui spacio reuocare? Ut mihi
præclarissimē dixisse uidetur sapientissimus Poeta, ἡμετέρας ἀνιερποδῶν ἀνίστατο ἀλ-
λῶν. Et uox diuina unī artium omnium clarissimum testimonium, non abs re ex-
hibuisse uidetur: Honorandum medicum, necessitati hominum creatum. Sed iam
ueram spectemus utilitatem. Primum enim quæ disciplina uel animi tenebras,

EPISTOLA

uel incommoda eius corporis omnia, uel mentis nebulas discutere melius potest.
Deniq, quod uerè præclarum est, quæ disciplina ad mentis incommoda, quæ
omnia à corpore sunt extirpanda, propius unquam penetrauit? Quæ eius do-
micij, in quo animus noster residet, unde sese comparat, unde mores induit, per
quod ueluti portas, omnis notitiarum lux uenit, tanquam ædilis quidam curan-
di potestatem habet summam. Certè iucundissima sanitati si corpus uniuersum,
eadem & nitidissima reginæ menti, & ad omnem usum accommodatissima ue-
luti aulam inhabitandam parabit; aut si id mauis, instructam adesse genus nego-
ciorum officinam menti suppetet, quæ quidem res quos post se fructus trahat,
difficile explicatur. Videre hic mihi uideor uirtutum & philosophiæ totius
partem. Certè enim compositum pulchrè ad naturæ fragilitatem corpus (cuius
rei facultas uel nusquam, uel penus medicum est) mentis tranquillitas consequi-
tur oportet. Quæ quid aliud est, quàm ille quem omnium uirtutum congressu que-
rimus, felix mentis status. Cæterum quæ corpus magis spectare uidentur Me-
dicina uitæ & rerum omnium condimentum præbet, sine quo nihil iucundum,
nec preciosum, nec admirabile, nihil deniq, gratum esse in uita quicquam potest.
Quid magnifica te domus iuuet, quid splendida supellex, quid aureæ uestes, qd
aurum ipsum congestum, si inopem te, egenum miserabiliter destituit? Imò ni-
hil obstat prorsus, quin ista omnia quibus, cum abundè suppetant, frui non potes,
supplicia sint & cruciatus. Quid potentia? quid amplitudo? etiam si suspiciant,
uenerentur omnes? si te morbus sic lecto affixum tenet, sic omnem potentiam im-
potentiam reddit, ut istam autoritatem tuam uniuersam commutare cum uno sa-
nitatis momento ardentissime cupias. Quid animus ipse uirtutibus licet pulcher-
rimis & innumerabilibus præditus intra sædum, morbidum, & pestilens domi-
cilium conclusus, uel sublime conari, uel solati cæterarum spectaculo habere pos-
test? Ergo ueluti nox quædam, & caligo densissima morbus, optima hominis bo-
na obscurat, contegit, & apparere non sinit, quæ reddita sanitas, uelut è magna
tempestate iucundissimus solis aspectus, inenarrabili effectu omnia reducit. Ut
rectè uox illa & sapienter iudicet, ut quæ nullo precio æstimabilem esse sanitatem
dicit: quam tum mortales intelligunt esse ueram, cum morbos experiuntur, dis-
cuntq, in illius sinu bonarum rerum omnium usum & fructum & gratiam con-
frare. Hæc autem omnino se ita habere, nemo est, arbitror, tam planè nullius
iudicij, qui non uideat & agnoscat, & meritò artis huius præstantiam tum mira-
cula necessariò admiretur, uel summa eius beneficia erga mortales unicè comen-
det, ac inde conatum illorum optimum, studium atq, sedulitatem, qui artem hanc
præclarissimam primo diuinitus acceptam ratione atq, ingenio excoluerunt, no-
bisq, quoquomodo absoluendam tradiderunt, magnificat: atque hos deniq, di-
is similes summis laudibus efferendos, & permaximis honoribus dignos esse cen-
seat, qui hanc diuinam artem illustrando, prouehendo, ornando, atque ab omni
iniuria vindicando, omnem, quod aiunt, lapidè mouere tentent. Ceterum cum præ-
clarissimam hanc artem, quam solam libero ingenio excolendo dignam iudica-
mus esse, duarum rerum cognitione potissimum constare in confesso sit, subiecti
scilicet, atque eorum quibus ueluti instrumentis utitur, quorum cognitionem
tam necessariam esse scimus Medico, ut sine hac dextrè medicari, aut medicinæ
fructibus uberrimis frui nemo queat. Sunt autem ea quæ simplicia medica-
menta uocamus, uerbi gratia, quæ terra rerum benigna parens ædit, stirpes, ani-
malia & metallica, harumq, uariæ partes. Cum uero harum rerum exactam at-
que rectam cognitionem Medico adeò necessariam hæcenus turbarint tam in-
serè quorundam tam pertinaces lites, perpetuæq, discordæ, atq, contendendi li-
bido (barbarorum errores crassissimos tacere lubet) ut hinc ipsam demum præcla-
ram medendi artem de incertitudine atq, inconstantia non parum notandam, an-
sam alia

DEDICATORIA.

fam aliquem haud leuem, imprudentiores accipere possent. Hanc fortunam miseri nos, huic tam intolerabili malo, cum latius indies serpere uideremus, resistere putauimus, atque Medicinæ nobilissimæ, alumnæ nostræ charissæ, cui hac parte maxime sunt iniuriæ, suppetias ferre, atque dignis copiis succurrere cum omnino statuissemus, Pedanij Dioscoridis Anazarbei, tanquam Coryphei palmamque ferentis, qui unice huic malo, tamquam alter Aesculapius siue Apollo, mederi posset, de Medicinali materia libros sex in manus sumptimus; hoc enim feliciter medicam materiam nemo tractauit, ut Medicorum princeps Galenus testatur. Quamuis enim de simplicibus medicamentis ab antiquis tum Graecis tum Latinis uaria scripta extent, non infeliciter exarata, tamen *ὅσοι ἀνδρες ἔγραψαν ὅσους δὲ βίβλιν*. Quare hinc tanquam limpidissimum fontem, ex quo harum rerum cognitionem ueram rectamque unice petendam hauriendamque esse censent uno ore omnes docti Medici, præ cæteris omnibus puriorem, magisque fide dignum delegimus, in hunc commentarium siue scholiam aut annotationes breuissimas quidem, quibus tamen omnis de simplici medicina siue medicinali materia, controversia facile tollitur, ut hæc Medicinæ pars pristino suo candori restituatur, cudere institutus, ac locos aliquot repurgare: & quod summè necessarium putauimus, hæcenus uerò nulli tentatum, cum stirpium tum animalium, quorum hic auctor meminit, aut alioquin in re medica usus increbuit, uiuas imagines singulis capitibus adijcere curauimus, ad naturæ æmulationem quam artificiosissime expressas, quibus clarior dilucidiorque fieret Dioscoridis lectio, ut quæ tam diu caligine obducta fuerat, tam diu obscurata aliquid lucis reciperet, atque adeo altius infingeret animo ea quæ nudis uerbis exponit historia, artificiosa pictura. Hanc uerò prouinciam, si rem attentius exactiusque perpendimus, non satis scio an humeris nostris parem assumpserimus, id tamen audendum censuimus, ubi hoc animaduertimus futurum gratum plerisque studiosorum: persuasum enim habebam, si quid lucis huic auctori accederet hoc nostro labore, atque hac parte, scilicet in re herbaria, rectaque, atque exacta Medicinalis materiae cognitione, Medicinæ præclarissimum studium aliquid subsidij caperet, id enim ab omnibus naturæ rerum studiis expeti. Quamuis me non lateret uiros cum singulari tum exactissima doctrina, in hac re summum studium impendisse, in quorum albo Hermolaus Barbarus, Marcellus Virgilius, Leoniceus, Manardus, Ruellius, Iac. Syluius, Anth. Musa, & ex nostris, his nullo modo inferiores, Cornarius, Cordus uterque, pater & filius, Brunsfelsius, mihi olim præceptor charissimus, plurimumque obseruandus, & Hieronymus Tragus, homo in diiudicandis, explorandis, examinandisque simplicium, maxime stirpium differentiis, extra omnem (quod de Cicerone dictum est) ingenij aleam positus, post quorum luculentas conceptiones rem paulò auctiorem facere institui, nec id fore citra communem utilitatem putans. Quamuis sciam non de futuros, qui uel argumentum, uel me hominem naris (ut sic dixerò) obesse incessent: hi profecto sunt qui in omnes sibi iudicium sumunt, qui lingua prurientes nimis quam licenter in alienam irruere famam nulla non hora permittunt sibi, etiam si sæpe uelut alba deprehenduntur linea, Qui uelut scorpionis ictu, optimum quenque lancinarint, ac fistulato uulnere (ut Hieronymi uerbis) uiam aperuerint, mox latius ueneni pestiferam uim fundunt, Attra, ut Plinius inquit, ceu serpentum eorum lingua, uenenum uibrat, tabesque animi cōtrectata omnia adurit, culpārium omnia, ac dirarum alitum modo, tenebris quoque & ipsarum noctium quieti inuidentes, gemitu, quæ sola uox eorū est, ut inspicatorem animantium uice, obuij quoque uertent agere aut prodesse uide, nec ullum tamen abominati spiritus precium nouere quam odisse, culpāre atque capere omnia. Quorum ego uirulentiam, dum pestilenti spiritu optimum quenque afflatum uolunt, impudentior em putauī, quam ut eis respondendum haberem.

D E D I C A T O R I A.

Bonorum tantum ego iudicium reformido, quibus utinam ipsis ita libeat expor-
recta fronte hunc nostrum laborem excipere, ut nullius odio aut offensione ad-
ducti ad scribendum accessimus. Quod uero nostram lucubrationem uestro no-
mini dicendam, nuncupandamque percensui, Clarissimi Prudentissimiq; uiri, in
causa fuit incredibilis uestra uirtus, uitae integritas, & eruditio singularis: summa
denique omnibus in rebus prudentia, unde uestra Respub. uirtute honesta, religio-
ne ac pietate integra, iure ac legibus æqua, opibus firma, copijs locuples, & glo-
ria semper ampla fuerit, nec me parum denique commouit, aduersus bonos, stu-
diosos atque eruditos uiros cum amor tum beneuolentia singularis, ut uestri no-
minis fama atque dignitatis splendoribus hic labor noster illustratus, uestris
auspicijs semper tutus, meæ quoque erga uos obseruantie perenne monumentum,
non longis tantum seculorum spatijs, uerum omnino, si fieri possit, in uersis natu-
ræ legibus, sempiterni & continentis æui diurnitate donatus uiuat, floreat, elu-
cescat. Vos igitur amplissimi prudentissimiq; uiri, pro uestra humanitate, mu-
nusculum huiusmodi benignè (ut soletis) suscipiatis, putetisq; omnem
meam operam, studium, industriam, quicquid est in me uel in-
genij uel uirium, uestre amplitudini esse paratissimum.

Francoforti apud Mœnum, prid. Cal. Sep

ptemb. Anno Domini

M. D. XLIII.

IN COMMENTARIUM VALERII

Cordi, Præfatio.



VM hos Dioscoridis libros de materia Medica penè absoluissè-
mus, amice Lector, fortè fortuna incidimus in Annotationes Va-
lerij Cordi, quas ille iam olim in Academia Vuitembergeni non-
nullis Medicinæ studiosis dictauerat, perlegimus cupide totum li-
bellum, rati uidelicet, id quod res erat, diuinitis nobis oblatam occa-
sionem, qua Dioscorides illustrior exiret, & maiore cum fructu posthac in mani-
bus studiosorum uersaretur. Verum ne nobis nimium fideremus, explorauimus
& aliorum doctorum hominum de libello Cordi iudicia. Visus est omnino di-
gnus, qui in publicum quamprimum emitteretur, indignus qui iam annis alijs
quot intra paucorum serinia delituisset. Etsi autem fata non permiserunt auctori,
ultimam manum huic atq; alijs operibus quæ inchoauerat, imponere, tamen res
ipsa indicat, has Valerij primitias multis magnis ac perfectis (ut uideri uoluit) mo-
numentis aliorum longè præstare: quod nemo non fatebitur, postquam has An-
notationes cum scriptis aliorum contulerit. Fuit enim in hoc Valerio Cordo, (ut
obiter de autore nonnihil dicamus) cum in uniuersa Medicina perdiscenda,
tum uerò præcipuè cognoscendi Simplicia, ut uocant, incredibile studium, ad
quod illum parens Euricius Medicus idemq; poeta clarissimus, & auctoritate &
exemplo inflamauit, qui filium ab incunabulis inter ipsas herbas ac flores educa-
ri uoluit. Accessit ad optimam institutionem, ingenium acre, & rara naturæ feli-
citas, cui nihil arduum aut inaccessum esse posset, ad hæc, mirabilis industria atq;
assiduitas in inquirendis rebus. Insuper & perceptorum fidissima custos, memo-
ria, qua ita excelebat hic Cordus, ut integras descriptiones singularum rerum
ac diuersorum auctorum secum ubiq; animo circumferret, ac expromeret, ubi op-
pus esset. His dotibus breuitempore eò progressus est, ut excellentes Medici ac
senes discendi gratia adolescentem frequentes accederent. Subinde etiam uarias
peregrinationes suscepit, quò certius & exactius omnia suis ipsius oculis subie-
cta cognosceret, ne uè aliorum narrationibus (quod pluribus accidisse uidebat,)
deciperetur. Ac primò quidem perlustrauit omnem ferè Germaniam, ac uicinas
Septen-

P R A E F A T I O.

Septentrionales regiones, Intrauit horrentes saltus, superauit ædificissima monti-
um iuga, demisit se in profundissimos specus, & pleræq; summa diligentia perue-
stigauit, quæ in his partibus gignuntur, paucis huc usq; nota. At quoniam bona
pars medicamentorum exoticis constat, ne illa parùm cognita haberet, conuertit
se ab Aquilone ad alteram mundi plagam, adscitoq; uno atq; altero comite perue-
nit in Italiam, ubi breui nouus ille hospes, propter ingenij præstantiam, multis ad-
mirationi esse cepit. Sed, quæ est humanarum rerum fragilitas, in ipso studiũ
cursu è medio sublatus est, magno cum dolore omnium doctorum, & inæstimabi-
li iactura totius Medicinæ. Non est dubium, quin unus Valerius omnes in hac
parte Medicos longo intervallo post se relinquere potuerit, si diutius superfuisse-
set, & habituri eramus certi aliquid, quod in tantacaligine rerum tutò sequi licuis-
set, qui nunc nouis subinde opinionum præstigijs circumducimur, dum nobis
quilibet suas coniecturas, deum immortalem, quàm friuolas sæpe & inanes, ob-
trudit: nullus non de herbis sua somnia prodit. Lugeat itaq; Germania, lugeat or-
bis, egregij casum iuuenis, & spem Medicinæ reforescentis interceptam, Sed os
mittamus querimoniam, atq; hoc potius agamus: Quoniam fata nobis inuide-
runt speratos fructus, quos dare ingenium Cordi poterat, fruamur interim his
primitijs, easq; grato animo amplectamur, Ac si quid, ut in opere non absoluto, de-
siderari fortè queat, id iniuriæ fortunæ imputemus, quæ non passâ fuit nascen-
tem foetum omnibus numeris absolui, non persequamur neuos, quibus ferè nuls-
lum corpus quantumuis in signe carere potuit. Nec enim inficiamur, etiam Vale-
rium maiore rerum experientia edoctum, quædam mutaturum fuisse, si uita ei tã-
gior contigisset. Verùm certent alij adicere, quod huic deesse iudicauerint. Id erit
multo laudabilius, q̃ si bene meritum de cõmuni hominũ uita, obrectationibus
impugnẽt, Cæterũ ut Medicinæ studiosis etiã amplius gratificaremur, subiun-
ximus huic Commentario Valeriano, Epitomen Botanologici Euricij Cor-
di, propter auctorum & materiæ cognationem, unde & utilitatis plus-
rimum, nec minùs uoluptatis ad amantes Medicinæ redis-
surum esse speramus, Tu fructus lector his o-
mnibus, ac bene uale.

2

Aa 4

GRÆCARVM DI-	αὐτῶν	203 a	Βότρυς	262 a	ἐλιμὸς	127 a	
tionum huius Operis	ἀπαρίνη	247 b	Βεβώνιον	352 a	ἐρείκη	53 b	
INDEX.	ἄπιος	76 a	Βεγγάλωτος	354 b	εἰρηγεῖον	512 d	
A.	ἄπιος	76 a	Βενιάς	335 b	ἐρωπιλον	218 a	
Ἀβρότονον	207 b	ἄπυρον	530 a	Βένιον	139 a, 353 b	ἐρυσθρόνιον	280 a
Ἀγαρίον	190 b	ἀραῖα	169 a	Βεφθαλμός	278 a	ἐρυσμον	169 b, 475 d
ἄγιν	62 b	ἀράχην	108 a	Βραβός	460 a	δύζωμον	158 a
Ἀγρέλα	64 a	ἀργυροῦτης	327 c	Βράβυ	47 a	ἐνωπτοῖριον	307 a
ἄγρωτος	504 a	ἀρεσίον	514 a	Βρύον	16 a	ἐχίνος πελάσσιος	467 d
ἄγχα	300 a	ἀρκευθίς	46 b	Βρύον θαλάσσιον	513 a	ἐχιον	302 a
Ἀδ' ἀρκης	531 b	ἀρκίον	345 b	Βρύον	122 b		
Ἀδιάντος	353 a	ἀρκίον	346 a	Βρύον θαλάσσιον	340 b	Ζεῶς	111 b
Ἀείων τοῦ μέγα	511 d	ἀρενόγλωσσος	147 a	Βεῶμος	124 a	Ζεῶς	474 a
Ἀείδιον μέλιον	336 b	ἄρον	176 b			Ζίον	147 b
αἰγίλιον	124 a, 4360 a	ἀρεσινίκον	529 d	Γαλή	99 b, 470 a		
ἄγχιος	49 b	ἀρεσολογία κλημασίτις	193 b	Γαλιότις	339 a	ἡδύπερον	173 b
ἄρα	128 d	ἀρεσολογία μεκρά	ibid.	Γάλλιον	ibi.	ἡλεκτρον	50 a
ἄκακία	61 a	ἀρεσολογία τρογυλλή	ibid.	Γενίαν	192 b, 484 c	ἡλιοτρόπιον τοῦ μέγα	513 a
ἄκαλήφην	318 d, 512 c	ἄρεσιν	260 b	Γενίαν	171 a	ἡλιοτρόπιον τοῦ μικροῦ	523 c
ἄκανθα	202 a	ἀρεσιν	8 a	γλήχον	211 a	ἡμ'ροκαλῆς	266 b
ἄκανθα λυκή	199 a	ἀρεσιν	531 a	γλοῖον	22 a	ἡμιονιον	275 a
ἄκανθος	220 a	ἀρεσιν	533 d	γλυκεία	194 b	ἡριγρον	340 a
ἄκινος	329 b	ἄσκληπιάς	248 b	γλυκίσκος	194 b	ἡριγρον	204 a
ἄκινυτον	2 b	ἄσκηρον	286 a, 500 b	γναφαλιον	264 a, 496 d		
ἄκινον	380 b, 511 b	ἄσκηρον	286 a	γρογυλλίς	135 a	Θαλασσόμειλι	396 a
ἄκινυ	281 b	ἄσκηρον	146 a	γρογυλλίς ἀγρία	135 a		524 a
ἄλδαλα	509 b	ἄσκηρον	352 a			Θάλικτρον	340 b
ἄλιανκας	55 a	ἄσφοδ'ελος	177 a	Δακτύλος	68 b	Θεῖον	530 a
ἄλιμον	531 b	ἄσφοδ'ελος	495 b	δαφν	48 b	Θερμοῖς δι	134 a
ἄλκυνον	205 a	ἄσφοδ'ελος	495 b	δαφνωειδής	518 c	Θηλυκρανία	77 b
ἄλκον	248 a	ἄσφοδ'ελος	141 a, 476 d	δαφν	48 b	Θηλυκρανία	286 a, 522 b
ἄλκον	218 b	ἄσφοδ'ελος	163 a	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	95 b
ἄλκον	230 b	ἄσφοδ'ελος	2 b	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	64 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	390 a	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	523 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391 b	ἄσφοδ'ελος	530 c	δαφν	523 d	Θηλυκρανία	169 a
ἄλκον	391						

I N D E X.

δοξία	188 b	κίλκινθός	382 a	λοκύνθου	276 b	μορβία	83 d
δοξία	63 a	κίλκινθός	333 b	λοκύνθου	49 b	μουκας	468 e
δοξία	65 d. 246 d. 495 a	κίλκινθός	79 a	λοκύνθου	267 b. 497 a	μυγάλη	472 d
δοξία	188 b	κίλκινθός	478 a	λοκύνθου	185 a	μυκωμάρωδης	508 c
δοξία	17 a	κίλκινθός	22 a	λοκύνθου	37 b	μυκωμάρωδης	ibi. b
δοξία	353 a	κίλκινθός	231 a	λοκύνθου	219 a	μυκωμάρωδης	ibi. a
δοξία	51 b	κίλκινθός	491 d	λοκύνθου	239 b	μυκωμάρωδης	333 d
δοξία	283 a	κίλκινθός	149 a	λοκύνθου	224 a	μυκωμάρωδης	187 b
δοξία	180 a	κίλκινθός	64 d	λοκύνθου	43 b	μυκωμάρωδης	ibi. d
δοξία	347 a. 514 b	κίλκινθός	337 b	λοκύνθου	224 a	μυκωμάρωδης	52 b. 461 b
δοξία	167 b. 479 c	κίλκινθός	142 a. 477 a	λοκύνθου	527 c	μυκωμάρωδης	514 d
δοξία	5 b	κίλκινθός	143 b	λοκύνθου	527 b	μυκωμάρωδης	71 a
δοξία	227 b. 491 b	κίλκινθός	142 a	λοκύνθου	279 b	μυκωμάρωδης	349 b
δοξία	167 b. 479 c	κίλκινθός	77 b	λοκύνθου	298 b	μυκωμάρωδης	71 a
δοξία	81 b	κίλκινθός	268 a	λοκύνθου	110 a	μυκωμάρωδης	518 a
δοξία	10 b	κίλκινθός	111 b	λοκύνθου	522 d	μυκωμάρωδης	524 d.
δοξία	66 b	κίλκινθός	ibi.	λοκύνθου	388 a	μυκωμάρωδης	222 b
δοξία	157 b	κίλκινθός	ibi.	λοκύνθου	130 a	μυκωμάρωδης	328 a
δοξία	126 a	κίλκινθός	148 b	λοκύνθου	66 b	μυκωμάρωδης	N.
δοξία	ibi.	κίλκινθός	253 b	λοκύνθου	291 b	μυκωμάρωδης	494 b
δοξία	47 b	κίλκινθός	130 b	λοκύνθου	252 a	μυκωμάρωδης	6 b
δοξία	7 b	κίλκινθός	198 a	λοκύνθου	348 a	μυκωμάρωδης	332 b
δοξία	195 a	κίλκινθός	374 a	λοκύνθου	77 a	μυκωμάρωδης	274 a
δοξία	ibi. b	κίλκινθός	71 b	λοκύνθου	154 b	μυκωμάρωδης	359 b
δοξία	136 a	κίλκινθός	289 b	λοκύνθου	50 b	μυκωμάρωδης	299 b
δοξία	72 a	κίλκινθός	131 a	λοκύνθου	140 a	μυκωμάρωδης	72 b
δοξία	ibi.	κίλκινθός	517 a	λοκύνθου	ibi.	μυκωμάρωδης	494 d
δοξία	72 b. 465 a	κίλκινθός	173 b	λοκύνθου	327 b	μυκωμάρωδης	300 d.
δοξία	67 a	κίλκινθός	228 b	λοκύνθου	236 a	μυκωμάρωδης	O.
δοξία	284 d. 499 d	κίλκινθός	229 a	λοκύνθου	350 a	μυκωμάρωδης	78 d
δοξία	11 b	κίλκινθός	522 d	λοκύνθου	529 b	μυκωμάρωδης	76 a
δοξία	330 a	κίλκινθός	355 a	λοκύνθου	49 a	μυκωμάρωδης	478 c
δοξία	185 a	κίλκινθός	504 b	λοκύνθου	524 a	μυκωμάρωδης	78 d
δοξία	ibi.	κίλκινθός	45 b	λοκύνθου	254 b	μυκωμάρωδης	515 a
δοξία	ibi. d.	κίλκινθός	4 b	λοκύνθου	76 b	μυκωμάρωδης	390 a
δοξία	150 b	κίλκινθός	ibi. d.	λοκύνθου	ibi. d.	μυκωμάρωδης	523 d
δοξία	ibi.	κίλκινθός	23 a	λοκύνθου	23 a	μυκωμάρωδης	523 d
δοξία	331 a. 510 c	κίλκινθός	162 b	λοκύνθου	162 b	μυκωμάρωδης	112 b
δοξία	293 b	κίλκινθός	110 b	λοκύνθου	110 b	μυκωμάρωδης	150 a
δοξία	ibi.	κίλκινθός	321 b	λοκύνθου	321 b	μυκωμάρωδης	391 b. 523 d
δοξία	249 b	κίλκινθός	320 a	λοκύνθου	320 a	μυκωμάρωδης	265 b
δοξία	387 b	κίλκινθός	508 b	λοκύνθου	508 b	μυκωμάρωδης	515 a
δοξία	338 a. 512 c	κίλκινθός	74 a	λοκύνθου	74 a	μυκωμάρωδης	390 d
δοξία	527 d	κίλκινθός	524 c	λοκύνθου	524 c	μυκωμάρωδης	102 b
δοξία	43 a	κίλκινθός	74 a	λοκύνθου	74 a	μυκωμάρωδης	203 a
δοξία	311 b	κίλκινθός	4 a	λοκύνθου	4 a	μυκωμάρωδης	210 a
δοξία	78 b	κίλκινθός	313 b	λοκύνθου	313 b	μυκωμάρωδης	8 d
δοξία	ibi.	κίλκινθός	526 c	λοκύνθου	526 c	μυκωμάρωδης	273 d
δοξία	494 d	κίλκινθός	82 b	λοκύνθου	82 b	μυκωμάρωδης	478 d
δοξία	152 b	κίλκινθός	203 a	λοκύνθου	203 a	μυκωμάρωδης	160 d
							133 b
							89 d

I N D E X.

ἄρνη	125 a	πύρεθρον	235 a	σάχνος	256 a	ὑδρομυλον	524 c
ἀρχις	497 c	πυρός	120 b.	σίβη	517 b	ὑδροσέλιον	234 a
ἀνυρ	78 a	P.		σίμα	ibidem	ὑδρωπεπτερι	172 a
ἀνυρ	76 a	ῥά	191 b	σοιχάς	208 b	ὑδυσσμος	214 a
ἀξάλις	138 a.	ῥάξ	523 b	στραπιδίως	χιλιόφυλ-	ὑδυσσμος ἄγχιος	ibi.
ἀξάλμυ	524 b	ῥάφανος, ἡ	136 a	λος	342 a	ὑδυσσμος 323 a.	509 a
ἀξο	ibi. a	ῥήον	191 b	σρέδιον	173 a	ὑπεριον	285 b
ἀξυάκανθ	55 b	ῥόδον	60 a	σρέβιον	43 a	ὑπέρσον	508 l
ἀξυμελι	524 b	ροία, ἡ	70 a	σρύχνον μακρόν	509 c	ὑσσωπος	208 d
ἀξυμυρσίον	362 b.	ῥοιάς	319 b	σρύχνος ἀλικαμάχος	Φ.		
Π.		ῥός ἐρυδρος	68 a		325 a	Φακὴ	132 b
Γαλονία	278 b	ῥός μαγειρικός	ibid.	σρύχνος κηπίος	325 a	Φανός	132 b. 336 a.
παλίστρος	55 a	ῥύπον	2 a		509 a		475 b
πανκράτιον	179 b	Σ.		σρύχνος ὑπανώλης	326 a	Φηρός	65 b
παρόαλιανχίς	329 b	Σαγάνων	494 c			Φιλλυρία	57 a
πασάλη	126 a	σάωρα	108 b	συνπύρεα	419 a. 529 d	Φλόμος	342 b. 513 d
πάτ	22 a	σάωρος	471 d	σύνκα	466 d	Φοινίξ	68 b
πελεκίν	273 b	σάμψυχον	218 b	συνέμνον	83 a	Φδ	9 a
πεντάφυλλον	308 a	σέλιον	232 a	συνέμνος, ἡ	ibi.	Φύκος θαλάσσιον	341 a
	505 c	σόντλον λήνιον	144 a	συνή	84 b	Φύλλον	9 b
πέπερι λήνιον	170 a	σόντλον μέλαρ	ibid.	σύνφυτον ἑτερον	296 a	Φύλλον ἰνδον	ibid.
πέπερι μακρόν	ibid.	σέρις	150 b	σύνφυτον πεπταίον	295 b. 501 d	Φύλλον μαλακῶδον	ibidem
πέπερι μέλαρ	ibi.	σέσελι μακροσύνωλον	225 b	χισός	531 d	X.	
πεπλὶς	378 a	σέσημον	127 b	χόνος	13 b. 40 b.	χάλικανθον	526 c
πέπλος	ibi.	σίδον	70 a	311 a. 458 a.	506 d.	χάλκας	ibidem
περδίκιον	334 b	σίδης	303 b	χολιδόβότανον	340 b	χαμαεακτὴ	330 b. 521 b
περικλύμενον	297 a	σίκνον ἡμερον	153 b	σώρυ	529 b.	χαμαίγειρος	496 c
περιστρεφὺς ὑπέρσον	317 a	σίκνος ἄγχιος	366 b. 519 a	T.		χαμαίειρος	251 a. 495 c
πέλασσις	346 b. 514 a	σίλκιον	494 b	τάξος	331 b	χαμαίκοτος	354 a. 515 c
πόδκεδανός	494 b	σίσηκον	166 b	ταυρόκομα	494 d	χαμαίκοτον το μέλαρ	
πόδον	39 a. 457 b	σίσηρον	137 a	τελεσιον	189 b		197 b
πύγανον	221 a	σίσηρον	148 a	τελίνια	468 c	χαμαιδούκη	496 c
πύγανον ἄγχιον	150 b	σίσηρον	223 b	τέριμνος	41 a	χαμαίμυλον	276 b
πικρὶς	81 a	σικάνδης	157 a	τόδον	250 b		498 c
πισακία	126 a	σικίλια, ἡ	179 a. 482 c	τόδον	144 a	χαμαεωδούκη	515 d
πίσος	39 a	σκόλοπενδριον	275 a	τόδον	ibi.	χαμαεωδούκη	287 b
πίτυρ	457 b	σκόλον	200 a	τόδον	129 a	χελιδνιον το μέγα	185 b
πίτυς	48 b	σκόρις	527 a	τόδον	264 b	χελιδνιον το μικρόν	
πλάτανος	294 b	σκόριον	259 a	τόδον	226 b. 491 a		186 b
πολεμώιον	360 b	σκόροδον	165 b. 479 b	τόδον	491 a	χίμας	468 c
πολυαλον	293 a	σκόροδον	165 b	τορδύλιον	210 b	χιλιόφυλλον	394 a
πολυγονάτον	292 a	σκόροδον	479 b	τορδύλιον	160 a	χυσανθεμον	182 a
πολυγονον	102 b	σπλήνιον	275 a	τορδύλιον	124 a. 312 b		276 b. 316 a
πολυπόδες	386 b	σμίλαξ	331 b. 510 d	τορδύλιον	478	χυσίτης	527 c
πολυπόδιον	341 a	σμίλαξ κηπίος	162 a	τορδύλιον	257 a	χυσόγονον	315 a
πόταμωγέτον	523 d	σμίλαξ	150 a	τορδύλιον	359 a	V.	
πότιμος	255 b	σμίλαξ	ibi.	τορδύλιον	469 d	Ψύλλον	324 a. 509 a
πράσιον	479 b	σμίλαξ	ibi.	τορδύλιον	264 b	Ψυχοτροφον	289 b
πράσιον	163 b	σμίλαξ	370 a	τορδύλιον	313 b	Ψυχοτροφον	529 a.
πράσιον κεφαλωτόν	65 b	σμίλαξ	240 a	τορδύλιον	323 a	Ω.	
πρίνος	346 a	σμίλαξ	523 b	τορδύλιον	161 a	Ωκυμοειδής	503 d.
προσώπιον	514 a	σμίλαξ	368 b	τορδύλιον	415 a	LATI-	
προσώπις	51 a	σμίλαξ	390 b. 523 b	τορδύλιον	476 c		
πύλεα	386 a. 522 b	σμίλαξ	225 a	τορδύλιον	395 a		
πύρις		σμίλαξ	ibi.	τορδύλιον			

**LATINARVM NO-
menclationum
Index.**

I N D E X.

Abrotonum 107 b. 487 b	Agrimonia 107 a. 505 b	Anchusa 300 b. 503 b	Aristolochia longa 193 d
Abfinthium 206 a. 487 a	Alaga 207 a	Androfaces 275 a. 498 a	Aristolochia officin. ibi b
Abfinthium marinū 207 a	Alizon minus 511 d	Androsemmon 285 b. 286 b	Aristolochia rotunda vera ibidem
487 b	Alabastrites 512 a	500 a	
Acacalis 53 b. 461 c	Alabastrum 517 b	Anemone 183 a. 482 d	Armala 222 a
Acacia 61 b. 463 a	Alaude 106 a. 471 b	Anesum 227 a	Armenius lapis 527 d
Acantha 202 d	Albucum 177 a	Anethum 228 a. 491 c	Arnoglossa 147 a
Acanthium 201 b. 486 c	Alga 513 a	Anethum sylvestre 4 a	Arnoglossum. ibidem
Acanthus 201 a. 486 c	Alga 185 b. 474 b	342 a	Aroma 76 b
Acathus Germanicus 202 a	Alisma 284 b. 499 d	Angelica 235 a	Artemisia 260 b. 496 c
Acanthus sylvestris 202 a	Alkali 498 c	Anisum 227 a. 491 b	Artemisia tenuifolia 496 c
496 d	Alkekeng 409 b	Aniuden 494 b	Arthanita 173 b
Acetabulum 512 b	Alkanna 505 c	Anonis 203 d	Arum 176 b. 482 b
Acetofella 138 d	Alkaria 259 b	Anthemis 276 b. 498 c	Arundo 51 b
Acetum 396 b. 524 a	Alleluia 258 a	Anthura 60 d	Asa foetida 494 b
Acetum mulsam 397 a	Allium 165 b. 479 b	Anthyllis 276 a. 498 c	Asarum 8 a
514 b	Allium porrum 165 b	Antimalum 327 b	Asclepias 248 b. 495 b
Acetum scallinum 398 a	Allium sylvestre ibidem	Antimonium 411 d. 527 b	Ascyroides 286 a. 500 a
Acetum Scylliticum 524 b	Allium urinum ibid.	Antirrhinum 337 a. 516 d	Ascyron ibidem
Achillea 304 b	Alme 530 b	Aparine 247 b. 495 a	Asia lapis 415 b
Achillea 504 b	Almea 499 d	Aphaca 263 a	Aspalathum acre 15 b
Achras 76 d	Alod 205 d. 487 a	Aphace 163 d. 479 a	rum 15 b
Acida muria 397 b	Alpine 187 b. 335 a	Aphroditi 177 d	Aspalathus 15 b
Acinos 230 a. 489 c	Altercum 323 a. 509 d	Aphroscelinus 532 b	Asparag 146 a
Accipitrina 207 a	Alibea 281 b. 499 c	Apiastrum 254 b. 495 d	Asparagus 477 b
Aconitum 319 b. 434 a	Alumen 419 a. 529 d	Apios 381 b. 521 c	Aspergula 247 b
Aconitum Pardalanchae	Alua 295 b	Apium 232 a. 492 b	Asphalatus 452 b
510 b	Alypum 583 a. 522 a	Apium montanum 492 b	Asphalton 257 d
Acorum 2 b	Alyssum 248 d. 493 b	Apium palustre ibi.	Asphaltos 44 b
Acorus 449 b	Amaracus 218 b. 277 b	Apium rufum 181 a	Asparagus 146 a
Acus pastoris 263 d	498 c	Apium rusticum 234 a	Asphodelus 177 a. 266 b
Acuta spisa 55 b	Amaranthus 315 b	Apium vulgare 233 a	482 b
Adarces 414 a. 531 b	Amaranthus purpureus ibidem	Apocyma 44 d	Asplenium 275 d. 498 a
Adeps 113 b. 472 c	Ambrosia 212 b. 261 b.	Apocynum 332 a. 510 d	Aster Atricus 352 a. 515 b
Adiantum 358 a. 517 a	496 c	Apollinaris 323 a. 509 d	Astragalus 318 a. 507 d
Adonium 46 d	Ameos 230 b	Aqua 395 b. 524 a	Astrens 240 d
Aeglops 124 d. 360 d.	Amiantus lapis 532 b	Aquamarina 524 a	Athars 474 d
517 c	Amidum 828 b	Aqua mulsā 395 a. 524 a	Athera 123 b
Aeris flos 526 c	Ammi 230 b. 491 d	Araba 479 d	Atrachylis 249 d. 522 c
Aeris squama ibidem	Ammoniacum 244 b	Arabicus 532 a	Atramentum librarium
Aerugo ibi. d	Amomū 12 a. 451 d. 495 d	Arabis 169 d	429 b. 533 d
Aerugo rasilis 408 b	Amoracia 136 a	Araneus 108 d. 471 d	Atramentum metallicum
Aes crenatum 526 b	Ampeloprasen 164 a	Arbutus 79 a. 466 b	529 b
Aes ustum 407 b. 526 c	497 b	Arcion 514 d	Atramentum rubrum
Aethiopsis 345 b. 513 d	Amurca 64 b. 463 b	Arction 347 b. 513 d	417 b
Aëtites 532 c	Amygdale 80 a. 466 b	Arcturus 345 b	Atramentum sutorii 416 a
Affodillus 177 a	Amylum 128 b. 474 d	Arenalittoralis 533 a	528 c
Agallochum 16 b. 452 c	Anagallis 184 b. 483 a	Argemone 183 b. 482 d	Atriplex 141 a. 476 d
Agaricum 190 b. 484 a	Anagallis aquatica 184 b	Argentirecrementū 411 b	Atriplexum 141 d
Ageratum 317 a. 507 c	Anagyris 283 b. 499 d	527 c	Aucua 114 a. b
Agnus castus 62 b	Anarbinum 516 d	Argenti spuma 411 b.	Auirantia 75 b
Agrestis 391 b. 533 d		437 b. 527 c	Aurelia 507 b
		Argentum ulium 415 a	Auricula muris 187 b
		437 b. 528 b	483 c
		Arisarum 177 a. 482 b	Auripigmentum 413 b
		Aristolochia 193 a. 484 d	437 b. 529 d
			Azurum

INDEX.

Azaron	451 a.	Britannica	291 a. 501 a	Caprifolium	297 a. 502 b	Cepa capitata	164 b
B.		Bromos	124 d. 517 c	Capreola	149 a	Cepaea	284 a. 499 d
Baccharis	220 b. 489 c	Bruscus	362 b	Capniū phragmites	514 b	Cera	119 b. 473 c
Bacille	148 b	Bryon	16 a. 313 b	Capnos	347 a. 514 b	Cerastia	72 a. 464 d
Balaustie	70 b	Bryonia	384 b. 522 b	Capnos chelidonia	514 b	Cerasum	72 a
Balaustium	70 a. 464 c	Bubonium	352 a	Capfella	169 a	Cerasus	ibid.
Ballote	254 a. 495 d	Buccina	89 b	Capus	104 h	Cerefolium	156 b
Balsamine	362 a	Buccinaria	237 b	Cardon	227 b	Cerres	101 a
Balsamita	214 b	Bucranion	516 d	Cardamantica	87 a	Cervi boleti	161 a
Balsamum	14 b. 452 d	Buso	100 b	Cardamina	148 a	Cervinum cornu	107 a
Barba louis	511 d	Bugna	55 b	Cardanum	5 b. 449 d		471 c
Barbula hirci	160 a	Buglossa	350 b. 503 c	Cardopatium	197 h	Cervi genitale	470 d
Barbula hircina	ibi.	Buglossa rubra	300 b	Carduus	200 a	Cerusa	413 a. 436 b
Barbafyluana	285 a	Buglossa vulgaris	302 a	Carduus benedictus	201 b	Cerussa	517 c
Bardana	514 a	Buglossum	354 b. 515 d		249 a. 512 d	Ceryx	89 b
Bardana maior	345 b	Bulbus esculentus	177 b	Carduus fullonum	198 b	Cetrach	275 a. 498 a
Basilicon sylvestre	302 a		482 c	Carduus Mariæ	199 a	Chalcitis	416 b. 528 d
Bathypicron	206 a	Bulbus uomitorius	178 b	Carduus pratensis	202 a	Chalybs	526 c
Batis	477 c		482 c	Carduus suarius	197 b	Chame	90 b
Batrachium	482 d	Bunium	139 a. 355 b. 515 c	Carduus lignorum	461 a	Chamecyssus	306 b
Bdellium	36 b. 456 d	Buphthalmū	278 a. 498 d	Cariac	227 b	Chamecissus	354 a
Bechium	260 a	Buphthalmus	278 a	Carium	227 b	Chamedaphne	864 a
Bedeguar	199 a	Buprestes	107 b. 433 b	Carnabadium	ibid.		518 c
Behen album	294 b		471 c	Caros	ibidem	Chamedrops	251 a
Behenrubrū	262 b. 294 b	Butyrum	111 b. 472 b.	Carpasi succus	435 a	Chamedrys	ibidem
Bellirica	371 b	C.		Carthamus	387 b. 521 c	Chameleon albus	196 b.
Berberis	55 b	Caecalia	353 a. 515 c	Carum	227 b. 491 b	Chameleon niger	197 b
Berula	147 b	Cacca	17 a	Cassia	10 a. 451 b		483 c
Besatum	222 a	Cacubalum	509 a	Cassia lignea et Aromati-		Chameleone uerum	196 b
Besasa	ibid.	Cadmia	404 b. 525 c	ca	10 a	Chameleuce	354 a
Beta	144 a. 477 a	Calamagrostis	265 a	Castanea	66 b. 464 a	Chamepeuce	515 d
Beta nigra	144 a	Calamentum	216 a	Castia herba	278 b	Chamepeuce	500 c
Beta sylvestris	185 b	Calamintha	215 a	Castorium	99 a	Chamepitrys	46 a. 287 a
Betonica	289 b. 500 b	Calamus aromaticus	14 a	Castrangula	319 a		500 c
Betonica coronaria	252 a		449 b. 452 a.	Catanance	357 b. 516 d	Chamerops	251 a
Bismalua	281 b. 499 c	Calamus odoratus	14 a	Cataputia maior	374 a	Chamefice	378 b. 521 a
Bistorta	175 a. 291 a. 501 a	Calcifraga	381 b	Cataputia minor	377 b	Chamelea	379 b. 521 a
Bitumen	44 b. 459 a	Calca	327 a		526 d	Chamomilla sativa	276 b
Blatte	470 c	Calx	437 b. 531 a	Cattus	100 a	Chamomilla vulgaris	
Blatte Byfantæ	91 a	Calx uina	423 a	Caucalis	157 b. 478 c		276 c
Blattaria	345 a	Calyx	300 b	Cauchamum	452 d	Characias	519 d
Blatta pistrinaria	103 a	Camomilla	276 b. 498 c	Canda equina	310 b. 506 a	Chariophyllata	315 a
Blitum	139 b. 476 d	Cancanum	17 a	Cedrides	47 b	Cheiri	497 a
Bolchon	36 b	Cancer marinus	93 a	Cedrus	47 b. 460 a	Chelidonia	185 b
Borago	354 b. 515 d	Cancro	ibid.	Centaurium magnū	195 a	Chelidonium	ibidem
Botrys	262 a. 496 d	Cancro flumiatiles	469 a	Centaurium maius	485 b	Chelidonium minus	186 b
Brancaurina	202 a	Candelaria	342 b	Centaurium minus	195 b		483 b
Brasica	141 b. 477 a	Candela regis	ibid.	Centipeda	102 b	Chrysanthemum	276 b
Brasica canina	332 a	Cannabis	283 a	Centrum galli	497 d		315 a. 316 a. 498 d. 507 c
	522 d	Cannabis sativa	499 c	Centumnodia	292 a	Chrysocolla	433 b. 527 d
Brasica crispa	142 a	Cannabis sylvestris	ibi.	Centuncularis herba	204 a	Chrysocome	314 b. 507 a
Brasica lacuturris	ibid.	Cantharides	107 b. 432 b		496 a	Chrysogonum	210 b. 115 a
Brasica marina	143 b		471 c	Cepa	164 b. 479 b		707 b
Brasica pratensis	202 a	Capillus Veneris	517 a			Chrysosolas	
Brasica scesilis	141 b	Capparis	180 a. 482 c				
Brasica sylvestris	143 a						

INDEX.

Chrysolachanon 141 d	Colocasia 132 d	Crocodylus 198 d	Cytisus 70 d. 464 b
Chrysitis 314 b	Colocynthis 382 d. 521 d	Crocodylium 198 d. 485 d	Cytisus 348 b
Cicade 105 b. 471 d	Coloquintida 382 d. 521 d	Crocodylla 175 d	D.
Cicer 130 b. 475 d	Colubrina 175 d. 291 d	Crocodylus terrestris 109 d	Dactyli 68 b
Cicer montanum 318 d	Colus rustica 495 b	Crocomagma 453 d	Damasconi 284 b. 499 d
Cicer rusticum 318 d	Come 160 d	Crocum 186 d. 452 d	Daphnoides 364 d. 518 c
Cicera 130 b	Cochlearis margaritifera 91 b	Crocus 18 b	Daucium 237 b
Cicerbita 156 d	Conchula Indica 468 d	Crocus hortensis 587 b	Daucum 237 b. 493 b
Cicerula 130 b	Condrilla 152 d. 478 d	Crocon 519 d	Daucum sylvestre 157 b
Cichorea hortensis 150 b	Conion 331 d	Cucumer anguinus 367 b	Daucus 237 b
Cichorea sativa ibi.	Consolida maior 296 d	Cucumer aspinus ibid.	Delphinium 237 b. 493 c
Cichorea sylvestris ibi.	Consolida media 317 b	Cucumer erraticus 367 b	Dendroides 375 d
Cichorion 150 b. 152 d	Consolida minor 502 d	Cucumer sati. 153 b. 478 d	Dens leonis 231 b
Cichorium latifolium sativum 150 b	Consolida petraea 502 d	Cucumis marinus 153 b	Dentale 89 b
Cici 374 d. 519 d	Consolida regalis 229 d. 4 b	Cucurbita 152 b. 478 d	Dictamnus 211 b. 488 d
Cicuta 331 d. 435 d. 510 c	Conium 43 d	Cucurbita deserti 521 d	Dicta. Cretensis 211 b. 488 c
Cicutaria 349 b	Conyza 266 d. 497 d	Cucurbita sylvestris 382 d	Dicocon 122 b
Cimbalion 512 b	Corago 354 b	Cuminum alexand. 230 b	Digitalis lutea 342 b
Cinices lectularij 102 b	Corallina 340 b	Cuminum sativum 228 b	Digitalis purpurea ibi.
470 c	Coria ueteramentaria 104 b	Cuminum sylvestre 169 d	Diphryges 418 d. 529 c
Cinara 200 d	Corium 231 d	Cuminum sylvestre 229 d. 434 d	Dipacum 198 b
Cinabaris 414 b. 528 d	Coriandrum 231 d. 414 b	Cuniculus 96 d	Direca 265 b
Cinnamomum 11 b. 451 c	Coriaria 491 d	Cunila 210 d	Dolichum 302 d
Cionia 89 b	Coriatum 231 d	Cupressus 456 d. 459 d	Dolichus 517 d
Cireea 265 b. 327 b. 496 d	Corion 285 b	Cuprum 526 c	Domestica nobis remedia 433 b
Cirsium 550 b. 515 d	Coris 287 d. 500 c	Curatio communis in omnes 445 b	Donax 51 b
Cirsium italicum 351 d	Corma 122 b	Curcuma 5 d	Dorycnis 327 d. 434 d.
Cirsium sylvestre ibid.	Corneola 501 d	Curmi 122 b. 474 d	Draba 169 d. b
Cissampelos 306 d	Cornus 77 b. 485 d	Cuscuta 498 d	Dracanis 94 b
Cissanthemon 174 d	Cornus sylvestris 77 b	Cyanus 414 d	Draco marin. 94 b. 469 b
Cissaron 57 b	Corona terra 354 d	Cyclamen 173 b	Dracunculus maior 482 d
Cissophyllon 174 d	Coronopus 149 d. 477 d	Cyclaminus 173 b. 481 d	Dracunculus minor ibi.
Cistus 57 b. 462 c	Corrago 515 d	Cyclaminus altera 174 d	Dracunculus palust. 175 d
Citharon 57 b	Corrigola 292 d. 501 b	Cyclamen 488 d	Dragnetum 203 b
Citrage 254 b	Cos Naxia 533 d	Cymbalaria 337 b	Draguncula 175 d
Citromala 75 d	Cotula 12 b. 451 d	Cymnium sativum 491 c	Dryopteris 387 d. 522 c
Citrullus 153 b	Cotula foetida 498 d.	Cymnium sylvestre ibi.	Dulcis radix 194 b
Citrium 75 d	Cotula foetida 340 b	Cynocephala 516 d	E.
Claretum 394 b	Cotula non foetida 278 d	Cynocrambe 332 d. 438 d	Ebenus 59 d. 462 d
Clematis 293 b. 501 c	Cotyledon 337 b	Cynodon 522 d	Ebulus 380 b. 521 b
Clematis daphnoides 293 b	Crambe 142 d	Cynoglosson 510 c	Ebur 106 d. 411 b
Clinopodium 249 b. 495 b	Crasula maior 512 b	Cynoglossa 515 d	Echinus 88 b
Clymenum 295 b. 502 d	Crataegon 168 d. 497 b	Cynoglossa uera 355 d	Echium 302 d. 503 c
Cuculus 387 b. 522 c	Crataeonon 268 d	Cynoglossum ibid.	Elecomeli 22 b
Cnicus ibidem	Cresio 148 d	Cynoglossum officina. ibi.	Eleophyllon 269 d
Coagulum 113 d	Cresio hortensis 167 b	Cynorhodos 462 d	Elaphoboscia 335 b. 493 b
Coagulum animalu 472 c	Creta 533 d	Cynosbatus ibidem	Elate 69 b
Coccum gnidium 379 b	Creta marina 148 b	Cynosforchis 269 b	Elaterium 519 d
Coccum insectarium 311 b	Cribrum 123 d	Cyparissias 375 d	Elatine 306 b. 505 b
Coccus baphica ibi.	Crimmon 123 d	Cyperus Babylonicus 5 d	Eleliphaccon 212 b
Cochlee 91 b	Crimmus 474 d	Cypbi 17 b. 452 d	Elleborus albus 364 b
Cochlee marinae ibi.	Cristion 515 d	Cyphoida 18 d	Elleborus niger 365 b
Cochlee terrestres ibi.	Criothamon 148 b	Cyperus 4 b. 449 d	Elemi 64 b
Ceruleus 414 d. 527 d	Criothamus ibidem	Cypirus ibid.	Elenium 19 b
Colechicum 333 b. 511 c	Criothum ibidem	Cythum 474 d	Eleoselinum 233 d
Colla Morus 246 d			Elichrysma 315 d

INDEX.

Elephantraxon	100 b	Ferula	240 b. 494 b	Gallus	104 b	Halicastrum	825 b
Embliti	371 b	Festuca	360 a	Garum	101 b. 470 c	Halimus	55 d. 461 d
Empetrum	383 b. 522 a	Fiber	98 b	Geminalis	273 a	Halme	102 d
Endivia	156 a	Fibrorum testiculi	470 a	Genista	370 a. 519 b	Hammoniacum	244 b
Entale	89 b	Ficaria	339 a	Genistella	370 a	Hammoniacum Thymia	-
Epatica	507 a	Ficus	84 b. 466 d	Genitale cerui	103 b	ma	494 d
Ephemerum	334 a. 433 b	Ficus Aegyptia	83 b	Gentiana	192 b. 484 c	Harmela	222 a
Epimedium	299 b. 503 a	Ficus Mariscæ	84 b	Geodes lapis	533 a	Harundo	51 b
Epimelis	76 b	Ficus Cypria	83 b	Geranium	262 b. 496 b	Hastula regia	177 a
Epipactis	347 a. 514 a	Fidicula	359 a. 522 b	Gethyon	164 b	Haucna	474 a
Epithymum	382 b. 521 d	Filicula	386 b	Gerres	101 d	Haxe Alsfacher	407 a
Equisetum	310 b. 505 a	Filicularis	522 b	Gluten piscium	495 a	Hedera	185 a. 483 a
Erica	53 b. 461 c	Filipendula	265 b	Gingiberis	171 d	Hedera Cilicia	174 a
Erigeron	512 d	Filius ante patrem	237 b	Gingidium	156 b. 478 b	Hedera Cylissa	517 d
Erinaceus	88 b	Filix	386 a. 522 b	Gith	241 b	Hedera pluvistica	354 a
Erinaceus mar.	88 b. 467 d	Finum	117 b	Gladiolus	299 b. 503 a	Hedera terrestris	306 b
Erinaceus terr.	88 b. 468 a	Finum animalium	472 d	Glans	65 b		354 a. 515 c
Erinei	85 a	Fistici	81 a	Glans Iouis	66 b	Hedysaron	273 b. 497 d
Erinus	302 b. 503 d	fistula pastoris	285 a. 198 b	Glans Sardiaria	ibi.	Helenium	19 b. 453 a
Eruca	107 a. 158 a. 471 c	Flos aris	407 b	Glans unguentaria	23 b	Heliochrysum	507 b
Eruca nobilis	158 a	Flos amoris	315 b		370 b. 519 c	Heliochrysum	361 a
Eruca sativa	ibidem	Flos salis	422 a	Glastum	188 b	Helioscopius	375 a
Eruum	133 b. 475 d	Foeniculum	236 a. 493 b	Glaucium	245 b. 494 d	Heliotropium	389 a
Eryngium	204 a. 487 a	Foeniculū erraticū	236 b	Glaux	360 b. 517 c	Heliotropium maius	523 a
Erysimon	169 b	Foeniculū Romanū	217 a	Gluten	245 b. 494 d	Helix	185 a
Erythraeum	4 b	Foeniculū sylvestre	236 b	Gluten librarium	246 a	Helleborus albus	518 c
Erythrodanum	280 a	Foenū Burgundense	162 b	Glutinium	245 b. 494 d	Helxine	306 a. 334 b.
Erythron	270 b	Foenogracū sylvest.	129 a	Glutinium piscium	246 a		504 d
Erythronium	280 a	Folium indum	9 b	Glycymela	465 a	Hemeris	65 b
Efula rotunda	378 a	Folium Malabathri	ibi.	Glycyrrhiza	194 b. 485 a	Hemerocallis	266 b. 497 a
Eufscus	281 b	Fontalis	341 a	Glycyfide	498 d	Hemionitis	276 a. 498 b
Eupatorium	307 a. 505 b	Fraxinus	49 a. 460 b	Gnaphalium	264 a	Hemionium	275 a
Eupatorium adulteri.	307 a	Fucus marinus	341 a	Goatæ	101 b	Hepatitis	307 a
Eupatorium Mesue	ibi.	Fuligo	43 b. 533 d	Gobius	101 b. 470 b	Hepatica	313 b
Euphorbium	243 b. 494 c	Fuligo liquida picis	43 b	Gordylion	226 b	Hepatorium	307 a
Eurios	532 a	Fuligo pictoria	429 b	Gramen	265 a. 303 a. 504 a	Heptaphylon	308 a
	F.	Fumaria	347 a. 514 b	Gramen parnassi	303 a	Herba benedicta	315 a
Faba	131 a. 475 b	Fumus terræ	ibi.	Grana tinctorum	311 b	Herba fullonum	173 a
Fabalia	131 a	Fungi	333 a. 436 b. 511 b	Granum gnidium	379 b	Herba lactis	302 b
Faba Aegypt.	132 a. 475 b		G.	Grana Myrti	71 a	Herba orbiculata	249 b
Faba Greca	77 a	Gagates	426 b. 531 d	Graxata	70 a	Herba parali	342 b. 501 a
Faba inuersa	111 a	Galastites	532 a	Gratia Dei	235 b	Herba Roberti	263 a
Faba porcina	323 a	Galanga maior	3a	Grossi	86 a	Herba S. Barbara	166 b
Faba Syriaca	77 a	Galation	339 b	Gruina	496 d	Herba Simeonis	282 b
Fabrilis Rubrica	518 c	Galbanum	244 b. 494 d	Guadum	188 b	Herba tunica	252 a
Fex	422 b. 531 a	Galeopsis	339 a	Guaiacum	59 a	Herba Veneta	281 b
Falco marinus	98 a	Galerion	ibi. b	Gummi	463 b	Herba uenti	185 a
Fagus	65 b. 464 a	Gallium	ibi.	Gutta Ammoniaca	494 d	Herba Vngarica	282 b
Farsarugo	496 c	Gallion	ibi.	Gypsum	423 b. 437 a.	Hermodactylus	333 b
Farsar. II.	ibidem	Galcrita	106 a. 471 b		531 a.	Hermodact. Officin.	334 a
Farrago	121 b	Galion	512 c	H.		Hiatuli	468 d
Febriifuga	195 b. 277 b	Galiopsis	ibi.	Hacub Alkandec	519 c	Hiberis	87 a
Fel	116 a. 472 d	Galla	67 a. 464 a	Hematites	426 a. 531 c	Hibiscum	499 c
Felis	100 a	Gallinacci	471 a	Halcyonium	531 b	Hieracium	231 b
Fel terra	195 b	Gallina	104 b	Halica	125 b	Hieracea parua	492 a
Ferricrecrementum	527 a	Gallitrichum	497 d. 273 a	Halicacabus	325 a	Hieraceum maius	ibid.
Ferrugo	ibid.			Halicacabus peregr.	327 a	Hipocistis	462 c
						Hippoc	

INDEX.

Hippocypselus 89 a. 468 b	locinera 104 a	Lane 472 c	Ligusticum marcor 55 b
Hippoglossum 336 b	louis faba 323 a	Lanaria herba 173 a. 481 d	Ligusticum 224 a. 490 d
Hippoglossum 516 a	lrio 169 b. 479 d	Lapathum 137 b. 476 c	Ligustrum 56 b. 57 a. 462 b
Hippolapathum 138 a	liron 158 a	Lapis Armenius 413 b	Lilium 253 b. 495 d
Hippomarathrum 236 b	lris 14. 449 a	Lapis Apsius 531 c	Lilium album 253 b
	lris agrestis 511 c	Lapis calaminaris 525 c	Lilium conuallium 353 a
Hippophaea 373 b. 519 d	lris florentina 1 a	Lapis lazuli 527 d	Lilium rubens 253 b
Hippophaea ibidem	lris germanica ibid.	Lapis plumbarius 527 b	Lilium sylvestre 266 b
Hippophyes 373 b	lstatia 188 b	Lappa 345 b. 359 b. 495 a	Limnion 195 b
Hippopotamus 98 b	lstatia agrestis 483 d	Lappa grandis 514 a	Limones 75 b
Hippopot. testiculi 470 a	lstatia sativa ibi. c	Lappago 373 b	Limonium 298 b. 502 d
Hippocleion 234 a	lsthias 521 c	Lapsana 476 d	Lingua bubula 354 b
Hippuris 192 b. 506 a	lspyrum 352 a. 515 b	Larbasum 517 b	Lingua canina 355 a
Hirci barba 478 c	luglandes 466 c	Larix 42 a	Lingua canis 301 a
Hirudo 438 b	luube 247 a	Laser 242 b	Lingua ceruina 256 b.
Hirundinaria 185 b. 248 b	luncus 213 a. 506 d	Laserpitium 242 b. 494 b	Lingua passerina 275 a. 496 a
Hirundo 471 b	luncus odoratus 13 b. 452 a	Lathyrus 377 b. 520 d	Lingua passerina 501 b
Hirundines 106 b	luncus odoratus & rotundus 147 a	Latifolia 147 a	Linum 130 a. 475 a
Histris 88 b	lus 13 b	Lauendula 209 a	Linum pratense 264 a
Holostium 296 a. 502 a	luta arthetica 287 b	Lauer 147 b	Linum sylvestre 379 b
Hordeum 121 b. 473 d	ludicus lapis 532 a	Laureola 314 a. 518 c	Liquiritia 194 b
Hordeum cereale 121 b	luniperus 46 b. 459 d	Laurus 48 b. 460 b	Lithacia 81 a
Hordeum distichum ibi.	lunonis rosa 253 b	Laurus Alexandrina 263 b	Lithargyrium 517 c
Hordeum trimestre. ibi.	lusquianum 323 a	356 b. 516 b. 518 b	Lithargyrium argenti ibi.
Horminum 273 a	lus piscium 102 b	Ledon 58 a	Lithargyrium auri ibi.
Hyacinthus 266 b. 318 b	lxia 196 b. 436 b	Lemniaterra 416 a. 528 c	Lithargyros 411 b
	K.	Lens 132 b. 475 b	Lithocolla 532 d
Hyberis 180 b	Kebuli 371 b	Lens palustris 336 a. 511 d	Lithospermum 279 b. 499 a
Hydromalum 524 c	Kiri 267 a	Lens aquatica 336 a	Locusta marina 93 a
Hydromelum 399 b	Kermes 311 b	Lenticula 132 b	Locustae 105 b. 471 b
Hydropiper 172 a. 480 a	Kerina 374 a	Lentiscus 40 b. 458 a	Lolium 309 b
Hyoscyamus 323 a. 435 b.	Kokion 18 a	Lcontopetalum 250 a	Lolium 128 a. 309 b. 474 d
	L.	Lcontopodium 356 a	Lonchitis 281 a. 499 b
Hypocoum 322 b. 508 d	Labru Vene. 198 b. 485 d	495 c. 516 a	Lopina 66 b
Hypericum 285 b. 500 a	Labrusca 390 a. 523 b	Leo terre 379 b	Lora 533 d
Hypophaea 322 b	Labrusca flos 523 b	Lepidion 156 b	Lotus Aegyptia 349 a
Hypnon 16 a	Lac 110 a. 472 b	Lepidium 180 b. 482 d	Lotus arbor 77 a. 465 d
Hyslopum 208 a	Lac coagulatum 457 b	Leporina herba 299 a	Lotus sativa 514 b
Hyslopum 208 a. 487 b	Lacerta 108 b. 471 d	Leporinus pes 502 d	Lotus sylvestris 129 b
	I.	Leplocarya 82 b	348 a. 514 c
Iacea alba 503 d	Lachan 17 a	Lepus 96 a. 469 c	Lotus urbana 347 b
Iarvis 176 b	Lachryma Aethiopica 60	Lepus marinus 438 a	Luccula 352 a
Iaspis 532 c	le 64 b	Leucacantha 203 a. 486 d	Lunaria Italica 314 b
Iberis 87 a	Lactaria herba 519 d	Leucas 251 b. 495 c	Luparia 310 a
Ibiscus 281 b	Lactaris 302 b	Leucoium 267 a	Lupha 176 b
Ichthyocolla 246 a. 495 a	Lactuca 154 b. 478 b	Leucoium album ibi.	Lupini 134 a
Idea herba 310 a	Lactuca latecaulis 155 a	Leucoium luteum ibi.	Lupinus 475 d
Idea radix 310 a. 505 c	Lactuca leporina 150 a	Leucoium purpureum ibi.	Lutra 98 b
Iesse 130 b	Lactuca scariola 154 b	Leucotia Theophrasti. ibi. b	Lychmis 252 a
Ilex 65 b. 464 a	Lactuca sylvestris 156 a	Leuisticum 224 a	Lychmis agrestis 495 d
Indicu 188 b. 414 a. 528 a	Lactucella ibidem	Libanotis 493 d	Lychmis coronaria 252 a
Indicum lignum 59 a	Lada 58 a	Libanotis coronaria 239 b	495 d
Inguinalis 352 a	Ladnum 58 a. 462 c	Libyaticum 494 a	Lychmitis 344 b
Inuris 180 a	Lagopus 299 a	Lichen 16 a. 313 b. 507 a	Lycium 60 b. 463 a
Intybum 150 b	Lagopyros ibidem	Lichenes eorum 104 a	Lycostemon 330 a. 510 c
Intybus 150 b. 477 d	Lampreda 99 b	Lichenes eorum 470 d	Lycopis 301 a. 503 c
Intybus 196 b. 180 a. 498 b	Lampfana 138 b		Lygos 62 b

I N D E X.

<i>Xymachia</i> 291 b. 501 a	<i>Melilotus</i> 219 a. 489 b	<i>Mustela domestica</i> 470 a	<i>Nux Pontica</i> 466 c
<i>Xymachium</i> 291 b	<i>Melomela</i> 74 a. 465 a	<i>Myagrism</i> 350 a. 514 d	<i>Nux uonica</i> 376 a
<i>Lytron</i> ibid. m	<i>Melissa</i> 254 b. 495 d	<i>N yes</i> 90 a	<i>Nymphaea</i> 274 a. 498 a
M.	<i>Melissophylla</i> 254 b. 495 d	<i>Mylocion</i> 103 a	O.
<i>Macer</i> 50 b. 460 d	<i>Meliutes</i> 532 a	<i>Myo'ota</i> 187 b	<i>O. bra</i> 414 b. 528 a
<i>Madelcon</i> 36 b	<i>Melomeli</i> 524 c	<i>Myrabolanus</i> 23 b. 55 a	<i>Ocinastrium</i> 302 a. 503 d
<i>Mense</i> 101 a. 470 b	<i>Melopoepo</i> 154 a	<i>Myrica</i> 52 b	<i>Ocinoides</i> 302 a
<i>Magistratia</i> 240 a. 481 d	<i>Memecylon</i> 79 a	<i>Myri. phytum</i> 349 a	<i>Ocinum</i> 159 a
<i>Magnes lapis</i> 531 d	<i>Memthe</i> 494 d	<i>Myrrha</i> 35 a. 436 a	<i>Ocinum aquaticum</i> 302 b
<i>Maiores</i> 218 b	<i>Memphites</i> 532 b	<i>Myrrha Ecotica</i> 450 c	<i>Oculi populi</i> 49 b
<i>Maioresana sylvestris</i> 218 b	<i>Menianthes</i> 257 a	<i>Myrrhis</i> 349 b. 514 d	<i>Oenagra</i> 515 a
<i>Mala</i> 74 a. 465 a	<i>Mentha</i> 213 a. 488 c	<i>Myrti</i> 71 b	<i>Oenanthe</i> 265 b. 391 b
<i>Mala agrestia</i> 465 a	<i>Menthastrum</i> 214 a. 488 d	<i>Myrthidunum</i> 464 d	497 a
<i>Mala Armeniaca</i> ibid.	<i>Mentha lutea</i> 215 a	<i>Myrtilli</i> 71 a	<i>Oenochora</i> 350 b
<i>Malabathrum</i> 9 b	<i>Mentha rubra</i> 148 a. 213 a	<i>Myrtus</i> 71 a. 464 d	<i>Oesopum</i> 112 b. 472 c
<i>Mala Citra</i> 73 a	<i>Mentha sylvestris</i> 214 a	N.	<i>Olander</i> 332 b
<i>Mala Cydonia</i> 74 a	<i>Mcon</i> 4 a	<i>Nabach</i> 10 b	<i>Oleaster</i> 64 a
<i>Mala cypriota</i> 74 a	<i>Mercurialis</i> 388 a. 522 d	<i>Narcissus</i> 372 a. 519 c	<i>Olea Aethiopica</i> ibid.
465 a	<i>Mercurius</i> 528 b	<i>Narcaphitum</i> 16 b	<i>Olea Aethiopica lachry</i>
<i>Mala insana</i> 329 a	<i>Messila</i> 705 b. 465 c	<i>Nardum</i> 6 b. 450 a	<i>ma</i> 413 d
<i>Mala punica</i> 70 a. 464 b	<i>Metallica omnia</i> 404 b	<i>Nardum Celticum</i> 7 b	<i>Olea sylvestr.</i> 64 a. 463 c
<i>Malicorium</i> 70 a. 464 c	<i>Mcu</i> 4 a	<i>Nardum Gallicum</i> ibi.	<i>Oleomel</i> 22 b. 453 b
<i>Malobathrum</i> 451 b	<i>Mcum</i> 4 a. 449 c	<i>Nardum monanum</i> ibi.	<i>Oleum</i> 453 a
<i>Malua</i> 140 a. 476 d	<i>Milax</i> 174 a	<i>Nardum sylvestre</i> 8 a	<i>Oleum amygdalinu</i> 23 a
<i>Malua arborefcens</i> 140 a	<i>Milium</i> 126 a. 474 c	<i>Nardus</i> 6 b	45 c
<i>Malua minor</i> ibi.	<i>Milium Indicum</i> 126 a	<i>Nardus Celtica</i> 450 b	<i>Oleum balaninu</i> 23 b. 453 c
<i>Malua sativa</i> ibi.	<i>Milium solis</i> 279 b. 499 a	<i>Nardus Moiana</i> ibi. d	<i>Oleum candidum</i> 454 b
<i>Maluanus</i> 281 b	<i>Millefolia</i> 349 a	<i>Nardus Syriaca</i> ibi. b	<i>Oleum Cicinum</i> 22 b
<i>Malua vulgaris</i> 140 a	<i>Millefolium</i> 304 b. 342 a	<i>Naphtha</i> 45 a. 459 c	<i>Oleum Cnicu</i> 24 a. 453 d
<i>Malum Medicum</i> 465 b	349 a. 504 b. 513 c. 514 d	<i>Nap</i> 160 b	<i>Oleum Cnidium</i> 453 d
<i>Malum terre</i> 173 b. 193 b	<i>Millehorbia</i> 339 a	<i>Napum</i> 135 b	<i>Oleu e grano gnidio</i> 24 a
<i>Mandragora</i> 327 b. 435 b	<i>Millepeda</i> 102 b	<i>Napus</i> 476 a	<i>Oleum Hyosc.</i> 24 a. 453 c
509 d	<i>Minium</i> 528 a	<i>Napus bumas</i> 135 b	<i>Oleu Laminu</i> 25 a. 454 a
<i>Manus Christi</i> 374 a	<i>Misy</i> 417 b. 529 a	<i>Nasaphitum</i> 16 b. 452 d	<i>Oleu Lentice.</i> 25 b. 454 a
<i>Marabrum</i> 236 a. 493 b	<i>Muuli</i> 468 c. 529 a	<i>Nasturtium</i> 167 b. 479 c	<i>Oleu Mastichinum</i> 454 b
<i>Marchasita</i> 531 c	<i>Moly</i> 222 a	<i>Nasturtium agreste</i> 87 a	<i>Oleu Melanthinum</i> 24 b
<i>Mariscus</i> 506 d	<i>Molybdena</i> 411 a	<i>Nasturtiu aquaticu</i> 148 a	<i>Oleu Myrtu</i> 24 b. 454 a
<i>Marochtus</i> 532 a	<i>Morion Theophrasti</i> 325 a	512 d	<i>Oleu Nigellinum</i> 453 d
<i>Marum</i> 219 b. 489 c	<i>Morsus gallinae</i> 184 b	<i>Nasturtium hortulanum</i>	<i>Oleum Oleastri</i> 463 d
<i>Marrubiastrum</i> 234 a	<i>Morum</i> 83 a	167 b	<i>Oleum picinum</i> 458 d
<i>Marrubium</i> 495 d	<i>Morus</i> 83 a. 466 d	<i>Nasturtium sylvestre</i> ibi.	<i>Oleu Raphan.</i> 24 b. 453 d
<i>Marrubium album</i> 255 b	<i>Mullus piscis</i> 98 a. 469 d	<i>Nasturtium tectoru</i> 169 a	<i>Oleum Ricinum</i> 453 c
<i>Marrubium nigrum</i> 254 a	<i>Mulsum</i> 394 b. 523 d	<i>Nenuphar</i> 274 a. 498 a	<i>Oleum Sicyonium</i> ibi. b
495 d	<i>Multipeda</i> 102 b	<i>Nepeta</i> 216 a. 488 d	<i>Oleu Sirapinu</i> 454 a. 24 b
<i>Materfylus</i> 248 a. 297 a	<i>Mumia</i> 44 b	<i>Nerium</i> 332 b. 511 a	<i>Oleu Sylu. oliuæ</i> 20 b. 453 a
<i>Matricaria</i> 277 b. 493 c	<i>Mura's herba</i> 334 b	<i>Nigella</i> 241 b. 494 b	<i>Oleu Mastichinum</i> 25 b
<i>Matrisfylus</i> 502 b	<i>Murca</i> 71 b	<i>Niris</i> 7 b. 450 d	<i>Oliuæ Colymbades</i> 463 d
<i>Meconium</i> 435 b	<i>Multipes</i> 470 c	<i>Nitrum</i> 422 a. 530 c	<i>Oluella</i> 379 b
<i>Medica</i> 162 b. 479 a	<i>Mures</i> 109 b. 472 b	<i>Nuri spuma</i> 530 c	<i>Olusatrum</i> 492 d
<i>Medicinalinarum</i> 112 a	<i>Murcx</i> 89 b	<i>Notæ eorum, qui à uenena</i>	<i>Olyra</i> 123 b. 474 a
<i>Medium</i> 259 a. 503 a	<i>Muria</i> 421 b. 530 b	<i>is demorsum</i> 444 a	<i>Omphacitis</i> 67 a
<i>Medulla</i> 113 b. 472 d	<i>Mus araneus</i> 109 b. 472 a	<i>Nuces auellane</i> 82 b	<i>Omphacinum</i> 20 a
<i>Med</i> 113 b. 473 c	<i>Muscus</i> 15 b. 452 c	<i>Nux auellana</i> 466 c	<i>Omphacium</i> 391 b. 523 d
<i>Melampyrum</i> 350 a	<i>Muscus arborum</i> 16 a	<i>Nux baslica, Persica</i> 81 b	<i>Omphacomelites</i> 399 b
<i>Melaneria</i> 417 b	<i>Muscus marinus</i> 340 b	<i>Nux Indica</i> 82 a	544 c
<i>Molanbium</i> 241 b	512 d	<i>Nux iuglans</i> 81 b	350 b
<i>Mel Heracius</i> 434 b	<i>Muscula</i> 99 b	<i>Nux pini</i> 39 a	<i>Omy. us</i> 102 b

Onobrychis

INDEX.

Onobrychis 285 b	Papaver corniculatum 321 b. 436 a	Phragmites 51 b	Porrum capitatum 163 b
Onoclea 503 b	Papa. cornuti 321 b. 508 b	Phryganeus lapis 425 b. 531 b	Porrum foliatum 164 a
Onoclea 900 b	Papa. erraticum 319 b. 508 a	Phu 9 a. 451 a	Porrum lineale ibidem
Ononis 203 d. 486 d	Papa. rubrum 319 b. 408 a	Phycus marinus 513 a	Porrum 479 b
Onosma 203 a. 273 b. 497 d	Papa. sativum 320 a. 508 b	Phyllitis 256 b. 496 a	Portus 161 b
Onothera 350 b	Papaver spum. 322 a. 508 c	Phyllon 259 a. 497 b	Portulaca 145 d. 477 b
Onuris ibid.	Papyrus 52 a. 461 b	Phytocoma 356 a. 516 a	Portulaca sylvestris 378 b
Onyx 90 b	Pardalanchus 329 b	Picea 39 a. 457 b	Potamogeton 341 a. 513 a
Ophioglossum 175 a	Parietaria 334 b	Picinum oleum 43 b	Poterium 200 b. 286 b
Ophites 532 c	Paronychia 314 a. 507 a	Picis fuligo 458 d	Prasium 495 d
Oppopanax 223 a	Parthenium 277 b. 498 c	Pienocomum 381 a. 521 b	Prasium album 254 b
Orechis 269 b	Pastinaca 224 b	Pieris 150 b	Primulaevis 343 a
Origani 210 a. 487 d	Pastinaca erratica 490 d	Pilosella 187 b	Propolis 120 b. 473 d
Orminum 273 a	Pastinaca Gallica 224 b	Pimpinella 233 b	Proserpinaca 501 b
Orminum sativum 497 d	Pasti. marina 97 a. 460 d	Pimpinella hirsuta 157 b	Prosepio matius 345 b
Ornithogalum 160 b. 478 c	Pastinaca vulgaris 225 a	Pinorum cruce 107 b	Protentilla 185 b
Orobancha 160 a. 478 c	Pata leons 250 a	Pinus 39 a. 457 b	Pruna sylvestris 61 b
Orobancha 475 d	Peculiaris remedia utriusque 446 b	Pinus parva 287 b	Prunella 205 b
Oryza 125 a. 474 b	Pedicularis herba 519 b	Piper 170 a. 479 b	Prunum 78 b
Oryza minor 125 a	Pelecynus 273 b. 497 d	Pissaspalum 44 b. 459 b	Pseud. humum 585 c
Ostracites 532 d	Pentaphylon 308 a	Pissaleon 43 b	Pseudodictamnus 438 c
Ostrutium 233 a. 240 a. 481 d	Peplion 378 b	Pissanthos ibidem	Pseudomelanthium 242 a
Ostrya 360 b. 517 c	Peplis 378 b. 521 a	Pistacia 81 d. 466 c	Psidia 404 c
Othana 186 b. 493 b	Peplus 178 a. 520 d	Pistacia Germanica 81 a	Pstittacia 81 a
Ouum 471 a	Pepo 153 b	Pityides 457 d	Pstortum 529 a
Ouorum natura 105 a	Perdicia 334 b	Pityusa 377 a. 520 d	Pstylli 324 a. 434 b. 509 a
Oxalis 137 b	Perforata 285 b. 500 b	Pix arida 44 a	Pstarmica 172 a. 481 d
Oxalme 397 b. 524 b	Periclymenum 297 a. 502 b	Pix liquida 43 a. 458 d	Pstegum 111 a. 438 d
Oxyacantha 462 a	Peristecron 317 a	Pix sicca, sicc. sissa 458 d	Pstegum montanum 249 b
Oxylapathon 37 b	Persea 86 b. 467 a	Plantago 147 a. 477 b	Pule. sylvestre 211 b. 216 a
Oxymel 397 a. 525 b	Perfica 75 a	Plantago aquatica 285 a	Pulicaria 509 a
Oxyphoenix 69 a	Perfica mala 465 b	Plantago Italica 284 b	Pulmonaria 314 a
Oxytriphylon 257 a	Perficaria 172 a. 268 a	Platanus 48 b. 460 b	Pulmo marinus 470 d
Oxymum 478 c	Perfonata 346 a	Platophyllos 375 a	Pulmones 103 b
P. 278 b. 498 d	Personata 346 a. 514 a	Plumbago 411 a. 527 b	Pumex 420 b. 505 a
Palestratum & Gymna- 453 b	Pes columbinus 182 a	Plumbi recrementum 527 b	Purpura 85 b. 90 b
siorum sordes 453 b	Pes corui 181 a	Plumbi cloii 410 a. 527 a	Purpure 468 b
Palamites 532 a	Pes cornutus 262 b	Plumbi usui 410 b. 527 b	Pyra 76 a. 465 c
Palm. pissa 44 a	Pes leporis 299 a	Polemonia 294 b. 501 d	Pyrethrum 238 a. 493 d
Paliurus 55 a. 462 a	Pes utuli 432 b	Polium 258 b. 496 b	Pyritis 450 d
Palma 68 b. 464 b	Petastites 346 b. 514 a	Polycarpon 268 a	Pyrites 426 a. 531 c
Palma Christi 271 a. 437 a	Petroelinum 492 c	Polycnemum 249 b. 495 b	Pyrola 298 b
Palmula 68 b	Peucedanum 240 b. 494 b	Polycriton 268 a	Pyrum 76 a
Paludapium 234 a	Phalangites 256 b	Polygala 160 b. 517 c	Pyrus ibid.
Panaces 222 b	Phalangium 256 b. 496 a	Polygonatum 293 a. 501 b	Pythionion 323 a
Panaces Ascl. 223 b. 490 c	Pharicam 436 a	Polygonum 292 a	Pyxantha 60 b
Panaces Chironium 223 b	Phalaris 279 b. 499 a	Polypodium 386 b. 522 b	Quercula 251 a
490 d	Phafelos 475 b	Polypodium quercinum 387 a	Quercus 65 b. 463 d
Panaces Herculei 490 c	Phafolus 162 a	Polytrichon 358 b. 517 a	Quing. folium 308 a. 505 c
Panacratium 179 b. 482 c	Phafoli 133 a	Pompilius 101 b	Quinqueneruia 147 a
Panicum 127 a. 474 c	Philyra 57 b	Pompholyx 406 a. 526 a	R. 173 a. 481 d
Panis cuculi 258 a	Philyrea ibidem a	Populago 260 a	Radix 130 c
Panis porcini 173 b	Phoenicites 532 a	Populus 49 b	Radix 130 c
Pantolimon 63 a	Phoenicobalanus 69 a	Populus alba 49 b. 460 c	Radix dulcis 471 a
Papaneris 508 a	Phoenix 109 a. 505 c	Populus nigra 49 b. 460 c	Radix nautica 118
		Porphyra 89 b	

INDEX.

Radix S. spiritus 235 d	Rubus canis 56 b	Scandix 157 d. 478 b	Sesamoides minus 319 d
Rana 100 b. 470 b	Rubus idaeus 305 b. 504 c	Scandulaceum 169 a	Seseli 225 b. 490 d
Rana palustris 438 d	Ruella 247 b	Scarlea 497 d	Seseli Aethiopicum 225 b
Ranunculum 181 d	Rumex 137 b. 476 c	Scelerata 181 a	Seseli Creticum 44. 226 b
Ranunculus 482 d	Ruscus 518 a	Schistus 426 b. 531 d	Seseli Peloponnes. 225 b
Rapum 135 d. 476 d	Ruta 221 d. 489 c	Schimides 40 b	Sicyonium 21 d
Raphanus 136 d	Ruta sylvest. 222 d. 489 d	Schoenus 452 d	Sideritis 303 b. 504 d
Raphanus sylvestris 521 c	S. 47 d. 460 d	Scilla 179 ab. 482 c	Sidium 464 c
Ratio uictus in morsura	Sabina 47 d. 460 d	Scilla minor 179 b	Sigillum Marie 174 d
bioficanus 443 b	Sacchar 119 b	Scincus 109 d. 472 a	Sigillum Salo. 293 b. 501 b
Remedia demorsorum d	Sacerdotis uirile 176 b	Scirpus 313 a	Signa rabiosi canis, & de-
case rabioso 442 b	Sacra herba 317 b. 507 c	Scitallion 512 b	morsorum ab eo 442 d
Remora aratri 203 d	Sagapenum 243 b	Scobs loti 77 d	Siler montanum 225 b
Resina lentiscina 458 d	Sagapenum 494 c. 530 b	Scolopendra 95 a	Siligo 123 b
Resina 42 d. 458 b	Sal 420 b	Scolopendra marina 469 b	Siliqua 72 b. 465 d
Resina terchinthina 42 d	Salamandra 108 d. 433 b	Scolopendron 275 d. 498 d	Silurus 100 b. 470 b
Resina bouis 203 d	Sal 471 d	Scolymos 200 d. 436 a	Silybum 370 b. 519 c
Rha 191 b	Sal armoniacum 421 b	Scordium 259 d. 496 b	Sinapi 166 b
Rhabarbara monachorum	Sal gemme 530 b	Scoria 411 b	Sinapi aquaticum, album,
138 d	Salicaria 291 b	Scorodoprasum 165 b.	minus 158 d
Rha Germanicum 191 b	Salis flos 530 b	Scorpena 94 d	Sinapi aquaticum, luteum,
Rhamnus 54 b. 461 c	Salis spuma, aut lanugo	Scorpio 90 d. 469 b	maius. ibidem
Rhaon 191 b	ibid.	Scorpio mari. 90 d. 469 b	Sinapi hortense 479 c
Rhabbanus 476 b	Saluaria 238 a	Scorpio terre. 94 d. 469 a	Sinapi Persicum 169 a
Rhaponticum 191 b. 195 a	Saluaria 493 d	Scorpioides 523 c	Sinapi rusticum ibi.
484 d	Saluaria 450 b	Scorpium 329 b	Sion 148 d
Rheon 191 b	Salix 63 d. 463 c	Scrophularia 186 b	Sisaron 137 d
Rhion ibidem	Salvia 412 b. 488 c	Scrophularia maior 339 d	Sifer 137 d. 476 b
Rhodia radix 310 d. 505 c	Salvia agrestis 273 a	Scutum coeli 340 d	Sisyrinchion 178 b
Rhododaphne 332 b. 511 d	Sambucus 50 b	Sebeste 247 d	Sison 226 b. 491 b
Rhododendrum 332 b	Sampfucbus 218 b. 380 b	Secale 123 b	Sisymbrium 148 d. 477 c
Rhodes 60 b	489 b	Securidaca 273 b. 497 d	Sium 147 b. 477 b
Rhocas 319 b	Sandaracha 418 b. 437 b	Sedimentum olci 64 b	Smarides 101 d
Rhu 464 d	529 d	Sedum 336 b	Smilax 331 b
Rhus 68 d	Sanguinalis 501 b	Sedum maius 511 d	Smilax aspera 361 b. 517 d
Rhus erythros ibid.	Sanguinaria 149 d. 291 b	Sedum minus 189 b	Smilax horte. 161 b. 479 d
Rhus Magricus ibid.	Sanguis 116 b	Selenites 532 b	Smilax leuis 362 d. 517 d
Ribes 56 d. 201 d	Sanguis animalium 472 d	Semperuium 336 b	Smoris 470 b
Ricinus 374 d. 519 d	Sanguis Draconis 528 d	Semperuiua 511 d	Smyris lapis 533 a
Risum 125 d	Sanguis taurinus 437 a	Semperuiua marinū 205 a	Smyrnum 234 b. 493 d
Rosa 60 d	Saponalis 296 b	Senecio 340 d. 512 d	Solanum hortense 325 d
Rosaceum uinum 524 d	Saponaria 173 a	Senecta anguiū 96 d. 469 c	Sola. manicū 326 b. 509 c
Rose 462 d	Sapphirus 532 b	Sepia 97 b. 469 d	Solanum somniferū 326 d
Rosa Græca 252 d	Sarcocolla 245 a	Seps 108 b	509 b
Rosci pastilli 60 b. 463 d	Sardonia herba 435 a	Septineruia 147 d	Solatrum 325 d. 509 d
Rosmarinus 239 a b. 494 a	Sarmentitius cinis 423 b	Serapinum 494 c	Solanum quod edendo est
Rosmarinum coronarium	Sarxifagon 502 c	Seriphium 207 d	509 d
239 b	Saturcia 217 b	Seris 150 b. 152 a	Soldanella 143 b
Rubca 280 d	Satyrion 270 b. 497 d	Serpentaria maior 175 a	Sonchus 150 d. 477 d
Rubeta 438 d	Satyrion erythron 497 d	Serpentaria minor 176 b	Sorba 78 d. 466 d
Rubeta tinctorum	Sauina 47 d	Serpyllum 218 d. 485 d	Sorbus 78 d
499 b	Saxifraga alba 384 d	Serratula 251 d	Sordes, siue strigmenta bal-
Rubia ibidem	Saxifraga maior 225 b	Sertula campana 219 a	neorum 453 b
Rubigo ferri 409 b	Saxifraga rubca 265 b	Sesama 127 b	Sorge 126 d
Rubrica fabrilis 415 b	Saxifraga 502 c. 517 b	Sesamum 127 b. 474 c	Sory 417 b
Rubr. sinopica 415 b. 528 c	Scabiosa 502 a	Sesamoides magnū 366 b	Sparagus 146 d
Rubus 305 d. 504 b	Scammonia 521 d. 378 b	519 d	Sparagion 265 d

Sparganium

I N D E X.

<i>Sparganium</i> 300 d. 503 b	<i>T.</i>	<i>Toxicum</i> 439 d	<i>Vicia</i> 163 d
<i>Spartium</i> 370 d	<i>Tagetes</i> 260 b	<i>Tragacantha</i> 203 b. 486 d	<i>Vina de multis alijs plantis</i>
<i>Spartos</i> 370 d	<i>Talictum</i> 512 d	<i>Tragina</i> 94 b	<i>condita</i> 525 b
<i>Spatha</i> 69 b	<i>Tamar Indus</i> 69 d	<i>Tragum</i> 312 d. 506 b	<i>Vina de pluribus diuersisq;</i>
<i>Spaula foetida</i> 300 d	<i>Tamariscus</i> 52 b. 461 b	<i>Tragocorum</i> 312 d	<i>odoramentis condita</i> 525 b
<i>Sphagnum</i> 16 d	<i>Tamarix</i> 52 b. 461 b	<i>Tragoriganum</i> 210 b	<i>Vina ex diuersis herbis fa</i>
<i>Spica</i> 209 d	<i>Tanacetum</i> 260 b. 496 c	<i>Tragum</i> 312 b. 506 b	<i>cta</i> 403 b
<i>Spica Celtica</i> 7 b	<i>Tapsum barbatus</i> 513 d	<i>Tragus</i> 124 d. 312 b. 474 d	<i>Vina ex diuersis odorame</i>
<i>Spica Nardi</i> 6 b	<i>Tapsum barbatus</i> 342 b	<i>Tragus cercalis</i> 124 d	<i>tis factis</i> 403 d
<i>Spica Romana</i> 450 b	<i>Taurocolla</i> 245 b	<i>Trias</i> 503 d	<i>Vina ex diuersis plantis fa</i>
<i>Spina alba</i> 199 d. 436 d	<i>Taxus</i> 331 b. 435 d. 510 d	<i>Tribulus</i> 208 d. 502 b	<i>cta</i> 402 b
<i>Spina Arabi</i> 199 b. 436 d	<i>Telephium</i> 189 b. 483 d	<i>Tribulus marinus</i> 293 d	<i>Vina marina</i> 399 d. 524 c
<i>Splachnum</i> 16 d	<i>Tellina</i> 90 d. 463 c	<i>Trichomanes</i> 359 d. 517 b	<i>Vina de pluribus herbis co</i>
<i>Splenion</i> 275 d. 276 d	<i>Terebinthus</i> 41 d. 458 d	<i>Trifolium</i> 257 d. 279 b.	<i>dicta</i> 525 c
<i>Spodium</i> 413 b. 526 d	<i>Terra</i> 428 b. 533 d		<i>Vina peruviana</i> 203 b
<i>Spondylium</i> 240 d. 494 d	<i>Terra ampelitis</i> 535 c	<i>Trifolium magnum</i> 348 b	<i>Vinctoricu</i> 248 b. 495 b
<i>Sponge</i> 424 b. 531 b	<i>Terra ex fornacibus</i> 533 b	<i>Trifolium minus</i> 129 b	<i>Vini natura</i> 392 b
<i>Spong. lapides</i> 532 d. 532 b	<i>Terra Nelia</i> 533 c	<i>Trifolium odoratum</i> 347 b	<i>Vinum</i> 523 d
<i>Spuma maris</i> 423 b	<i>Terra sigillata</i> 528 c	<i>Triglen</i> 98 d	<i>Vinum Absinthie</i> 402 d.
<i>Squama aris</i> 403 d	<i>Terreni uermes</i> 109 b	<i>Trinitas</i> 503 d	<i>Vinum</i> 525 b
<i>Squilla</i> 432 c	<i>Tesla marina</i> 533 b	<i>Triphyllon</i> 257 d	<i>Vinum Apijte</i> 399 b
<i>Squinantam</i> 13 b	<i>Testiculus</i> 239 b. 497 c	<i>Tripolion</i> 357 b	<i>Vinum aromatite</i> 403 d
<i>Stachys</i> 256 d. 496 d	<i>Testiculus canis</i> 497 c	<i>Tripolium</i> 517 d	<i>Vinum</i> 525 b
<i>Stacte</i> 33 b. 455 c	<i>Tenurum</i> 252 b. 495 c	<i>Trisago</i> 251 d	<i>Vinum eatorchite</i> 401 d
<i>Staphis agria</i> 363 b. 519 b	<i>Tenuris</i> 250 b	<i>Triticum</i> 120 b. 473 d	<i>Vini cedruu</i> 401 b. 525 d
<i>Stibium</i> 419 b. 527 b	<i>Tenthron</i> 258 b	<i>Triticum Gallicum</i> 120 b	<i>Vinum Cydonite</i> 399 d
<i>Stychas</i> 487 c	<i>Thalassomeli</i> 396 d. 534 d	<i>Triticum Syluestre</i> 186 b	<i>Vinum e labrusca florib.</i>
<i>Stichas citrina</i> 315 b	<i>Thalictrum</i> 340 b	<i>Trixago</i> 251 d. 495 c	<i>confectum</i> 524 d
<i>Stimui</i> 410 b	<i>Thapfia</i> 369 b. 519 b	<i>Trixago palustris</i> 259 d	<i>Vinum e pincis nucleis con</i>
<i>Stimul. officinarum</i> 109 d	<i>Thelipteris</i> 522 b.		<i>ditum</i> 525 d
<i>Storbe</i> 296 b. 502 d	<i>Thilacitis</i> 450 d	<i>Tubera</i> 161 d. 478 c	<i>Vinum ex cotoneis malis</i>
<i>Storches</i> 208 b	<i>Thlaspi</i> 169 d. 479 c	<i>Tunica</i> 290 d	<i>confectum</i> 524 c
<i>Stramonia</i> 327 d	<i>Thlaspidium</i> 169 d	<i>Turbith</i> 517 d	<i>Vini ex Myrti baceis co</i>
<i>Stratotes</i> 341 b	<i>Thocodites</i> 532 d	<i>Turbith officinaru</i> 377 d	<i>fectum</i> 524 d
<i>Stratotes aquaticus</i> 513 b	<i>Thracius lapis</i> 531 d	<i>Tusilago</i> 260 d. 496 c	<i>Vinum ex punicis</i> 524 d
<i>Strati. chelidophyllis</i> 342 d	<i>Thucia</i> 525 c	<i>Typha</i> 264 b. 496 d	<i>Vini ex pyris confectum</i>
<i>Stratotes millefolliu</i> 342 d	<i>Thunmus</i> 101 b		<i>Vinum</i> 524 c
	<i>Thus</i> 37 b. 456 d	<i>Vaccinium</i> 318 b	<i>Vinum ficatum</i> 525 d
<i>Strigment. a balnearu</i> 22 b	<i>Thuris cortex</i> 38 d. 456 d	<i>Valeriana</i> 94 d. 451 d	<i>Vini hyssop.</i> 402 d. 525 b
<i>Stridui</i> 457 d.	<i>Thuris fuligo</i> 38 b. 457 d	<i>Venaena</i> 439 d	<i>Vinum lentiscinum et te</i>
<i>Strobilus</i> 200 d	<i>Thuris Manna</i> 38 b. 457 d	<i>Veratru albu</i> 364 b. 518 c	<i>rebenthinu</i> 400 b. 525 d
<i>Strobelina</i> 42 d	<i>Thyites</i> 532 d	<i>Veratrum nigru</i> 365 b. 518 d	<i>Vinum melittites</i> 523 d
<i>Struthium</i> 173 d	<i>Thymbra</i> 489 d	<i>Verbasum</i> 342 b. 513 d	<i>Vinum myrsinice</i> 400 b
<i>Struxio</i> 100 b	<i>Thymbrea</i> 148 d	<i>Verbasculum</i> 344 b	<i>Vinum myrtite</i> 400 d. 524 d
<i>Styrex</i> 456 b	<i>Thymelea</i> 379 b. 521 b	<i>Verbena</i> 317 d	<i>Vinum oenanthinu</i> 400 d
<i>Succinum</i> 50 d	<i>Thymoxalme</i> 524 b	<i>Verbenaca</i> 317 d	<i>Vini palmeu</i> 400 b. 525 d
<i>Sallus talus</i> 106 b	<i>Thymum</i> 216 b. 483 d	<i>Verbenaca recta</i> 507 c	<i>Vini picatum</i> 401 b. 525 b
<i>Suis talus</i> 471 c	<i>Thymus</i> 216 b	<i>Verbena. sup.</i> 317 b. 507 c	<i>Vini refinatu</i> 401 d. 525 d
<i>Sulphur</i> 420 d. 530 d	<i>Tilia</i> 57 b. 462 b	<i>Vermes terre</i> 472 d	<i>Vinum Rhodite</i> 400 d
<i>Sumach</i> 464 d	<i>Typha</i> 123 b	<i>Vermicularis</i> 312 b	<i>Vini scillitici</i> 398 b. 524 b
<i>Superbia</i> 253 d	<i>Tithymali</i> 374 b. 519 d	<i>Vermicularis minor</i> 199 b	<i>Vinum strobilite</i> 401 d
<i>Sycaminum</i> 83 b	<i>Tomentum</i> 14 d. 496 d	<i>Vernatio</i> 96 d	<i>Viola alba</i> 267 d
<i>Sycomoros</i> 83 b. 466 d	<i>Tordylium</i> 226 b	<i>Verticillaris</i> 494 d	<i>Viola</i> 497 d
<i>Symphoniac</i> 509 d	<i>Tordilo</i> 4 d. 226 b. 491 d	<i>Uscitaria</i> 325 d. 182 d. 509 b	<i>Viola matronales</i> 267 b
<i>Symphytum</i> 294 b	<i>Tormentilla</i> 308 d. 505 c	<i>Vesciarum</i> 325 d	<i>Viola nigra</i> 515 c
<i>Symphytum maius</i> 296 d	<i>Torpedo</i> 469 b	<i>Vetonica</i> 500 b	<i>Viola purpurea</i> 522 b
<i>Symphytum petr. u</i> 501 d	<i>Torpedo piscis</i> 95 b	<i>Vetonica altitlis</i> 290 d	<i>Violaria</i> 515 c

INDEX.

Vipera 95 b. 469 c	Vnguis odoratus 90 b	Aul 165 b.	Cassonade 119 b.
Viperina 175 d	Vnguis asini 103 b	Aulx 165 b.	Cedre 47 b.
Virga pastoralis 198 b	Vngula caballina 260 d.	Aurenges 75 b.	Cerise 72 d.
Viride aris 526 d	496 c	Auronne 207 b.	Cerisier 72 d.
Viscu 65 b. 246 d. 495 d	Volubilis 306 a	Auronum 207 b.	Cerre 130 b
Viscum quercinum 65 b	Voluta 89 b	Austruce 240 d	Ceruse 413 d
Vitex 62 b. 463 c	Vreolaris 334 b	B.	Chamaraz 259 d
Vitis alba 384 b. 521 b	Vrina 118 d. 472 d	Bachar 8 d.	Champagne 19 b
Vitis nigra 385 b. 522 b.	Vrinalis 203 a	Bacille 148 b.	Chapou 104 b
Vitis uinifera 390 d. 523 b	Vrinaria 203 a	Bacins 181 d.	Chardon à cardir 198 b
Vitis sylvestr. 384 d. 522 d	Vrtica 338 d. 512 c	Barbotine 207 d.	Chardon benoyt 249 d
Vitiu sarmetoru cini 521 d	Vsnea 16 d	Bardane 346 d.	Chastaignes 66 b
Vitriolum 416 b. 528 c	Vshago 309 b	Basilic menu 220 d.	Cherfueil 156 b
Vlceraria 161 d. 495 d	Vua 390 b. 523 b.	Basilic sauvage 220 d.	Chelidoine 185 b
Vlmus 51 d. 451 c	Vua crispa 54. b	Berium 122 b.	Chanure 283 d
Vmbilicimarini 92 b	Vua passa 391. d	Berle 147 b.	Cheruy 137 d
Vmbilic. Ven. 337 b. 512 b	Vua uersa 329 b	Betoesne 289 b.	Championn 333 d
Vnguetori cõpositio 26 d	Vua uulpina 329 b	Beuernelle 157 b.	Chauls 142 d
Vng. abrotoninum 29 d.	Vuularia 356 b.	Bimaue 282 b.	Cices sauvages 318 d
454 d	X.	Biure 98 b.	Ciche 130 b
Vng. amaracinum 32 b.	Xanthium 359. b. 517 c	Blanche 166 b.	Cichorea 150 b
455 b	Xylocerata 72 b.	Blancputa 55 d.	Cichorea sauvage 150 b
Vng. Anethinum 29 d.	Xylocolla 245 b.	Ble 120 b.	Cigue 331 d
454 d	Xyris 300 d. 503. b	Ble frime 350 d.	Cire 119 b
Vng. Cinnamomum 33 b	Z.	Bleturguet 124 d.	Citron 75 d
48 c	Zea 122 b. 474 d	Blit 139 b.	Ciucta 164 b
Vng. Cyprinum 31 d	Zinziber 480 d. 171 d	Bõnes dames arroches 141	Cocombre sauvage 367 b
Vng. Crocinu 30 b. 435 d	Zopissa 44 d. 458 d.	Bonnes femmes 141 d.	Colle 245 b
Vng. elatinu 27 b. 454 b	Zythum 122 b.	Borache 354 b.	Colle d' la touche 246 d
Vng. fenugrec. 454 c	Zizypha 247 d.	Boscifalua 501 d.	Colubrine 385 d
Vng. gleumitu 31 b. 455 a	GALLICARVM	Bouillon 342 b.	Comin 228 b
Vng. Hedichron 32 b.	uocum Index.	Bouillon sauvage 342 b.	Concret 325 d
455 b	A.	Boys gentil 379 b.	Console 317 b
Vng. Isfninu 24 b. 455 d	Abricot 75 d	Brachaculi 343 d.	Coperose 416 b
Vng. Iritum 31 b. 455 d	Absince 206 d.	Branche ursine 202 d.	Coq 104 b
Vng. Ligustrinu 45 d	Agaric 190 b.	Breyon 139 b.	Coq lourdes 183 d. 319 b
Vng. Lilium 454 d	Aigremoine 307 d.	Brodon 273 d.	Coralline 340 b
Vng. malobathrinu 33 b	Alenois 167 b.	Bruyere 53 b.	Coriandre 231 d
Vng. megalinu 32 b. 455 b	Aloës 205 d.	Buglosse sauvage 302 d.	Corles 183 d
Vng. melinu 27 b. 454 c	Aluyme 206 d.	Bugrandes 203 d.	Corona regia 219 d
Vng. mendesiu 33 d. 455 c	Alyser 77 d.	Bugraues 203 d.	Corix 39 d
Vng. Metopio 32 b. 455 b	Alysum 77 d.	Burga spina 54 b.	Corma 78 d
Vng. narcissinum 30 b.	Amandes 80 d.	Buyre 111 b.	Corme 77 b
454 d.	Ambre 50 d.	C.	Cornier 77 b. 78 d
Vng. nardinu 33 b 455 d	Amydum 128 b.	Cabayet 8 d.	Corne 77 b
Vng. ociminu 29 b. 454 d	Anethe 228 d.	Cabuti coles 142 d.	Corne de cerf 107 d
Vng. oxanthinum 28 d.	Ans 227 d.	Camomille 276 b.	Cornes 78 d
454 c	Arbouces 79 d.	Canineca 333 b.	Cornueta 229 d b
Vng. Rosaccum 26 b	Arbre de dattes 68 b.	Canelle 11 b.	Corrigiole 292 d
454 b	Arbre de encens 37 b.	Cappres 180 d.	Coucumbre 153 b
Vng. Samfuchinum 28 b.	Armoise 260 b.	Capuci 142 d.	Couillõs des prestres 186 b
454 c	Artichault 200 d.	Caresme 352 b.	Couluree 385 d
Vng. susinum 29 b	Aspergoutte mineur 352 d	Carmeline 350 d.	Courge 152 b
Vng. styracinum 36 d	Aphodiles 177 d.	Carouge 72 b.	Courge sauvage 382 d
Vng. Telinum 28 d	Aspicq 208 b.	Carpentaria 304 b.	Cresson 148 d
Vng. uinalis herba 314 b	Aubepin 55 d.	Carni 227 b.	Cresson de iardin 167 b
			Croisier

I N D E X.

Croisser	800 b	Fume terre	347 a	Hous	65 b	Milium sylvestre	499 a
Cuirs	268 a	G.		Houffon	61 b, 362 b	Millefeuille	342 a
Carmier	77 b	Galange grosse	3 a	Huyte d'olive	20 a	Millefeuille grande	304 b
Cymbalaria herba	337 b	Galange sauvage	4 b	Hyssope	208 a	Mille pertuis	285 b
Cypres	45 b.	Galle de romaine	67 a	I.		Millet	126 a
D.		Galle legere	ibi.	Inde	188 b	Mocle	115 b
Dadens de chien	149 a	Galle periate	ibid.	Iomarinus	61 b	Monpeffuli	40 b
Dates	68 b	Garence	280 a	lone	313 a	Moustarde	166 b
De la nefse	163 a	Gariopot	39 a	loubarbe	336 b	Morella	315 a
Des guimaues	281 b	Gasse	128 a	lua non muscate	276 a	Morgelina	184 b
Dionysia	185 a	Gelimandre	251 a	luc arthetices	287 b	Moronuiolat	357 a
Draua	169 a	Geline	104 b	luggoline	127 b	Mourone	315 a
Draue	ibidem	Genefre	46 b	lurua	128 a.	Muguet	353 a
E.		Geneculiere	293 a	L.		Muschetum maius	353 a
Endine	150 b, 156 a	Gentienne	192 b	Laceron	150 a	Myel	118 b
Encens	37 b.	Gigembre	171 a	Lacterones	150 a	N.	
Engletier	56 b	Signon	164 b	Laitues	154 b	Nauet	115 a
Engletier sans odeur	305 a	Girophiles	290 a	Lampe	137 b	Neprus	54 b
Ers	133 b	Giroffiles fauuaes	252 a	Lasserones	150 a	Nesplier	76 b
Esgrur persil	233 a	Glaucul	51 a	Lanceola	147 a	Nille	241 b
Esfragoz	91 b	Glaiz	299 b	Laurier	48 b	Nigelle poiurette	241 b
Esler	185 b	Glaizet	1 a	Lentile	132 b	Nenufar laline & blanc	
Esberge	146 a	Glatel	299 b	Lentille de mer	316 a		27. a
Eschaute	122 b	Gloteron	345 b, 359 b	Lentisque	40 a	Noire	166 b
Esclera	ibid.	Grain de Meurte	71 a	Leueche	493 a	Noifette au auline	82 b
Esane blanche	199 a	Grains de Paradis	5 b	Leuechia	ibidem	Noix	81 b
Esponge	424 b	Grain de grefre	46 b	Leuesche	ibi.	Noix de Cypres	45 b
Esurge	377 b	Grappe de uigne sauvage		Leuille	128 a	Noix d'galle	67 a
Estaphisagrie	358 b			Leuistiq	224 a	O.	
F.		Grateron	247 b	Lierre blanche	185 a	Ocuf	105 a
Fabalupina	273 b	Gruua	273 b	Lierre noire	ibidem	Oculus cati	357 a
Fascoles	102 a	Grenouille	100 b	Lierre terrestre	354 a	Olluiet sauvage	64 a
Faus	65 b	Gresse	113 b	Limous	75 b	Orchamette	300 b
Febes primetes	162 a	Gruffelles	54 b	Lin	130 a	Oreylie d'afne	296 a
Febue	131 a	Guaiac	59 a	Lingua pagana	256 b	Orge	121 b
Fenacia	162 b	Guefde	188 b	Lifron	293 b	Origan	210 a
Fenouil	236 a	Guimaues sauvage	282 b	Litharge	411 b	Orme	51 a
Fenoil bastard	ibi. b	Guey	65 b, 246 b	Lupin	134 a	Ortie griesche	338 a
Fenoil marin	148 b	H.		Lys	253 b	Orties mortes	339 a
Fenchiere	386 a	Hane bane	323 a	M.		Oruale	273 a
Fenlet d'Inde	9 b	Hardea	384 a	Mache	264 b	Osmunda regalis	386 a
Fenlet de Malabathre	ibi.	Hederalis	248 b	Macres	293 a	Oycelles	290 a.
Fenlet de mer	341 a	Hepatiq	311 b	Maiorana Anglica	216 b	P.	
Fiel d'erre	195 b	Herbamastichina	210 b	Mandegloyre	327 b	Pasture de chameaux	13 b
Figuerovalle	68 b	Herbe appelee argentine		Mariolayne	218 b	Palma Christi	374 a
Figuier	84 b	Herbe a pulce	324 a	Marrons	66 b	Panicault	204 a
Flambes	1 a	Herbe a fullon	173 a	Masse	204 b	Pani de porcean	172 b
Fleur d'lyf	253 b	Herbe au chat	216 a	Masticq	219 b	Panix	127 a
Fleur de pome grana.	73 b	Herbe au charpetier	139 a	Maulc	140 a	Parietoire	34 b
Foin de Bourguigne	162 b			Meicherō Alexand.	234 a	Pas d'afne	200 a
Follete	141 a	Herbe au chat	216 a	Melcette	5 b	Pate de yon	250 a
Fourment	120 b	Herbeau chancre	262 b	Melisse	254 b	Pate louine	332 a
Fraifue	49 a	Herbe au chien	355 a	Menthe	214 a	Pauot	320 a
Framboficia	504 c	Herbe aux poulx	368 b	Menthe sauvage	ibi.	Pelliboffa	301 a
Frambofice	305 b	Herbe aux teigneux	137 b	Mestier	76 b	Penocfne	275 b
Fruict d'laurier	43 b	Herbe de la truite	295 a	Meure	83 a	Perce pierre	332 b
Fuger	386 a	Hicble	389 b	Meurier	ibi.	Petroquet	295 a
							297 a

I N D E X.

Persil	232 a. 349 b	Reclisse	ibidem	Trefle incarnat	258 a	sanf Ampffer	161.
Pervincia	293 b	Refort	136 a	Trefle odoriferant	347 b	spieß Ampffer	138 a
Pes Alexandrinus	238 a	Ris	125 a	Truffe	161 a	spiz Ampffer	476 c
Peschcs	75 a	Restringe	40 b	V.		wasser Ampffer	ibi.
Peuplier	49 b	Reapontic	195 a	Vacictum	318 b	Äncken	111 b
Piatamana	291 a	Roisin	350 b	Verarum	364 b	Andorn	255 b. 495 b
Picquance	338 a	Roisins en capatz	391 a	Veriust	391 b	riechender / stinckender	
Pied de lieure	299 a	Rondela	337 b	Vermillen	311 b	Andorn	256 a
Pillolet	218 a	Roquette	158 a	Vcrudine	317 a	stein Andorn	496 a
Pin	39 a	Rosagne	332 b	Vesse sauvage	163 a	schwarz Andorn	254 a
arbre du genre du Pin ibi.		Roseaul	51 b	Vid de chien	176 b		495 d
Pisa cerra	130 b	Roses d' ultre mer	140 a	Vigne	390 a	weisser Andorn	496 a
Plaine	48 b	Roses d' Damas	305 a	Vigne sauvage	390 a	Angelic	235 a. 493 d
Plantain	147 a	Rosmarin	219 b	Vineale reuelium	378 a	wild Angelic	235 a
Plomb	410 a	Rotundata	337 b	Viniboscum	297 a	zam Angelic	ibid.
Pois cices	130 b	Rouce	305 a	Violes d' Martz	352 b	Änß	227 a. 491 b
Poiurette	241 b	Ruc	221 a	Violettes	ibidem	Äntuffien	156 a
Polypode	386 b	Rue sauvage	222 a	Violettes sauvages	ibid.	Äpfel	74 a. 465 a
Poire	74 a	Ruileure de fer	409 b	Violettes grosses	267 b	Äpfelbaum	74 a
Pomme de grenade	70 a	S.		Viorna	384 a. 293 b	Ärben	39 a
Pommes de pin	39 a	Saffran	18 b	Viraire	364 b	Ärles beer	78 a
Pomier	74 a	Saffran bastart	387 b	Vne chesne	65 b	Ärmenellen	465 b
Pömier des grenades	70 a	Saiunca	7 b	Vne Rose	60 a.	Äron	482 b
Porcelles	145 a	Sanues blanches	138 b	Y.		Äschbaum	49 a
Poire	76 a	Sarricta	217 b	Yuroie	128 a	Äschen	423 b
Poirier	ibid.	Sauge sauvage	294 b	GERMANICARVM		stein Äschen	460 b
Poiure plane	170 a	Saulge	212 b	uocum Index.		Äschrüßlin	78 a
Pourpier	145 a	Sauiniara	47 a	Ä.		Äspen	460 c
Poiure legier	170 a	Saulterelles	105 b	Äbrachams baum	62 b	Ästrenz	481 d
Poiure long.	ibi.	Seille bastarde	179 b	Äckerwurzel	3 a	Ätrich	380 b. 521 b
Poiure noir	ibid.	Securgon	121 b	Ädlerstein	532 c	Ätrament	529 b
Porreau	163 b	Seau nostre dame	174 a	Äffolter	65 b. 246 b	blær Äugentrost	356 a
Porreta	164 b	Securgon	121 b	Ägrest	391 b	graw Äugstein	404 b
Porrete rouge	139 b	Senegrec	129 a	Ägrimonien	307 a	schwarzer Äugsteyn	
Potiron	333 a	Segrie	331 a	Ägstein/weiß/gelb so a			426 b. 531 a
Pouliot	211 a	Seneccon	340 a	Ähorn	48 b. 460 b	Äurin	195 b. 485 b
Pouliot sauvage	216 a	Senegrene	129 a	Älant	453 a	Äuripigment	529 d.
Pourcorau	311 b	Senene	166 b	Älantwein	525 c	B.	
Pourree de chien	164 a	Ser montain	215 b	Älantwurzel	19 b	Bacillen	148 b
Prcla	380 b	Serpentine	175 a	Älaun	419 a. 529 d	Badschwamm	424 b
Pryne	78 b	Serpoulliet	218 a	Älberbaum	49 b	gemeyn Bappel	140 a
Prunier	ibid.	Seu	380 b	weiß Älberbaum	460 c	römisch Bappel	140 a
Pudis	41 a	Sisame	127 b	Älber sproß	49 b		476 d
Punaises	102 b	Soldane	143 b	Älepatie	205 a	roß Bappel	140 a
Pymen	262 a	Sonchet	4 b	Älbern	521 b	Wachpung 184 b. 284 a	
		Spini uineta	55 b	bitter Äloes	205 a	Wackofen leyden	533 b
Q.		Squilla	179 a	Älaun	327 b	Waldgreife	512 d
Queue d' cheval	310 b	Suseau	380 b	Ämarzellen	465 b	groß Waldrian	9 a
Quinte feule	308 a.	T.		Ämlung	128 b	Frauß Balsam	214 a
R.		Tamariscq	52 b	Ämmey samen	230 b	spitzer Balsam	ibi. b
Raine	100 b	Termentine	41 a	Ämmelkorn	120 b	Balsamkren 148 a. 214 a	
Rapocen	135 a	Thym	216 b	Ampffer	476 c	edel Balsamkren	216 b
Rassle	169 a	Tigne	160 a	butter Ampffer	ibi.	brun gisß Bappel	140 a
Rassl	268 a	Tora	330 a	garten Ampffer	ibi.	flam Basilien	220 a
Raue de Limosin	135 b	Tortelle	308 a	hasen Ampffer	ibi.	Frauß Basilicon	478 c
Raue de Sauoye	ibi.	Trefle iaulne	169 b	roß Ampffer	ibi.	Frauß Basilien	439 c
Raue sauvage	306 b		258 a			wasser Waring	259 a
Raygallise	194 b					groß	

Register.

groß Bathengel 250 b	Bitterwurz 192 b.	Büchampffer 258 a	B.
klein Bathengel/ weibe le 303 b	Blasenbeer 484 c	Büchbaum 65 b	Damastien rosen 58 d
Baumöl 20 a	Blasfisch 97 b. 469 d	Büchbinder bap 246 a	rot Dannen 39 a
Bech 458 d	Blamander 251 a	rot/ weiß Buch 260 b	Dannenschwaff 190 d
erd Bech 459 a	Blasentuffen 509 b	Büchholzer 346 a	484 a
Beerwurz 4 a	Blarerholz 59 a	buglossen 254 b	Das ewig liecht 532 b
Beisfisch 260 b. 496 c	Blatlose 189 b	C.	Dascheltkraut 479 c
Benedictenkraut 220 b	Blei 410 a. 527 a	Calmus wurzel 14 a	Dartlen 68 b. 464 b
Benedicten rosen 278 b	Bleweiß 413 a. 527 c	wild Calmus 9 a	Dattelbaum 68 b
Benedicten wurzel 315 a	Bleischlacken ibi. b	Camelschew 13 a	saur Dartlen ibi.
Bengelkraut 388 a	Blaschweyff ibi.	Camelstro 452 a	Bech 411 a
Benningen rosen 278 b	Blacken 123 a	Camillen 216 b. 498 c	Degenkraut 503 b
Becklat 510 b	Blämlin von der lieb stündend Camillen 340 b	gelb Camillen 276 b	Deutelsolben 204 b
Beerenfla 202 a	Blästein 426 a. 531 c	stündend Camillen 340 b	Denngraß 192 a. 501 b
Beeren tapen ibi.	Blätröpfelin 252 a.	Campelosen 513 d	klein Denmmarch 9 a
weiß Beerenflaw ibi.	491 c	Capaum 104 b	Deyment 214 a
Beerwurz 226 b. 491 a	Blätwurz 175 a. 263 a	Cappis kraut 142 a	frucht Deyment ibid.
Bergblo 414 a	303 a	477 a	Dill 228 a
Berggel ibi. b	Boherellen 325 a	Cardamomlin 5 b	feorten Dill 340 b
Bergwachs 459 b	Bockabart 160 a. 478 d	Carden benedict 201 b	fä Dill 278 a
Bertram 218 a. 491 d	Bockshorn 129 a	240 a. 486 c	weiß Diptam ibid b
wild Bertram 174 a	Bollen 164 b	Casskraut 500 c	Ditlen 465 d
Bestemkraut 169 a	Bolge 511 b	groß Chamedrien 250 b	groß/weiß Distel 199 a
Detonien 289 b. 500 b	Bon 131 a. 475 b	wasser Chamedrien 259 a	Dollkraut 328 a. 510 a
klein Detonien 251 a	Bon Honen 331 a	Christianwurz 318 a	Dollwurz 329 b
weiß Detonien 289 b	gewandt Bonen ibi.	507 d	Donderblumen 336 b
Det 120 a	bunde Türkisch Bonel 162 a	Christwurz 365 b. 518 d	Dondernägeln 252 a
Deterselen 59 b. 517 c	spendel Bonen 479 a	klein Christwurz 519 a	Donnerbonen 512 b
braun Detonien 289 b	162 a.	Curtmat 75 a	groß Donnerkraut 511 d
Deinholdlin 57 a	welch Bonen 162 a.	533 a	klein Donnerkraut ibidem
Deinacell 296 a. 502 a	479 a	Coleander 231 a	Dör 43 a
Deysföl 477 a	479 a	Coloquint 382 a	Dort 309 b
Deinzel 233 b. 493 c	413 b	Consolen 317 b	rot Dosten 210 a
klein Deibel 360 b	Borretsch 254 b	Coriander 251 a. 491 d	wasser Dost 307 a
tauber Deibel 357 b	Borrich 161.	Corallen 531 b	Dorterbäumen 316 a
478 c	Borrich 161.	Comen 465 d	Drachenwurz 3 a
Diber 98 b	wilde Borrich 499 d	Cornelbaum 77 b.	Dratblüm 316 a
Dibergeylin 470 a	Brachendistel 204 a	466 a	Drüfwurz 339 a
Diberhödelin 186 b	Brachensap 516 d	schwarz Römisch wol riechend Cor. nder 211 b	Düffel 474 a
Dierflee 502 d	Brambeer 504 b	wild schwarzer Co. n der 219 a b	Düfwurz 266 b
Dier 122 b	Braunen 161 d.	Costenz 210 a	
Dissenkraut 323 a. 509 a	Brande 309 b	Creuzbaum 374 a	Eberwurz 197 b. 570 b
Dissenf 453 c	Brandelattich 496 c	34 b	485 c
weiß Dissen 323 a	Braunwurz 339 a	Creuzbeer 54 b	klein Eberwurz 190 b
welch Dimpfenflin 50 a	Breistein 50 a	Creuzkraut 512 d. 478 b	wild Eberwurz 485 d
81 a	Breunling 507 d	Creuzwurz 192 b.	Ebreys 487 b
Binenkraut 495 d	Bromberstand 305 a	340 a	Ehrenpreis 290 a
Bingelkraut 388 a	Buchkraut 352 a	353 b	Eibenbaum 331 b
522 d	Bunellen 295 b	Cucumeren 153 b	Eibisch 499 c
wild Bingelkraut 522 d	Bunnkreß 477 c	Curberbaum 77 b	Eimbeer 510 d
Bimbs 530 a	Büsch 363 a	Cypressen 459 d	Eim 161 b
Bingen 313 a. 506 d	rot Brustbeere 247 a	45 b	Einkorn 123 a
Binsaug 512 c	schwarz Brustbeere ibidem 235 a. 493 a	feld Cypressen 287 b	Eisenkraut 511 d
roß Bingen 506 d	Büsch 464 a	wilde Cypress 207 b	Eisenhart 507 c
Die 76 a. 466 c			blaw Eisenhütlin 330 b
Durbaum 76 b			Eisenkraut

Register.

Eisenkraut 317 a. 507 c	Eisig 524 a	nabel flachs 1bid.	Genßampffer 291 a
Eisenkraut weiblin 158 a. 169 b	Eisbeer 76 b	wild flachs 1bid.	Genßdistel 150 a. 478 b
Eisenerost 409 b. 527 a	Ey 105 a	flader 1bidem	Genßian 478 b
Eisenschlacken 527 a	Eychbaum 65 b	braun fleyschblumen 258 a	Genßung 156 a. 231 b
Eisenhart 317 a	Eychel 1bi.	fliegenfchwemme 511 b	Genäst 370 a
Elend 204 a	Eychöpfel 464 a	flöhkraut 172 a. 268 a	Gerwel 342 a. 304 b
Elfen 487 a	Eychdeys 108 b	flöhseamen 324 a	fütter Gerst 121 b
Elz 206 a	f. 522 b	welscher flöhseame 1bi.	Gersten 121 b. 473 d
Entian 192 b. 484 c	Saren 1bi.	flor 387 b	groß Gerst 121 b
Endich 188 b	Sarenkraut 1bi. c	florantor 315 b	klein Gerst 1bi.
Endunten 156 a	baum Saren 1bi.	forchen 39 a	sommer Gerst 1bi.
Engelsfuß 386 b. 522 b	eych Saren 387 a. 522 c	frangosen holz 59 a	meuß Gerst 309 a. 505 c
Eniß 227 a. 491 b	hohe Sarn 386 a	frawenhar 359 a	Gerzwurz 207 b
bauren Epff 234 a	nider Sarn 1bi.	frawendistel 199 a	Geyferwurz 493 d
groß Epff 1bi.	roß Sarn 522 b	frawerßpflin 253 a. 344 b	Geylwurz 497 c
wasser Epff 233 a	stein Sarn 1bi.	frey sam rosen 498 d	Geyßlat 502 b
Epffich 233 a	süß Sarn 1bidem	frösch 100 b	Gichttraben 522 b
Eph 233 a	windt Saren 1bi. c	fröschpfeffer 181 a. 482 d	Gichttannen 515 d
Eppen 492 b	Säselen 162 a	fuchsmilch 520 d	Gichtwurz 278 b. 522 b
Eppe 185 a. 483 a	Saterbaum 460 a	fuchschwanz 127 a	Gilbekraut 501 a
baum Ephew 185 a	Saulbeer 77 b	fänffblat 505 c	Gilgen 253 b
klein Ephew 1bi.	Saulholz 1bi.	fänfffingerkraut 308 a	Ginst 370 a
Ephew on frucht 1bi.	Sederweiß 332 b	G. 505 c	stehend Ginst 1bi.
maur Ephew 1bi.	Seigbonen 134 a	Seldkircher Galgät 4 b	Gips 531 a
weisser Ephew 1bi.	Seigen 466 d	wild Galgan 4 b	Girgelin 137 a
Epptich 234 a	Seigenbaum 84 b	groß Galganwurz 34	Glanz 527 b
groß Epptich 55 b	Marsilich Seige 466 d	Gallspffel 67 a. 464 a	Glastkraut 334 b
Erbselen 173 b	Seigwarzenkraut 186 b	Galmei 525 c	Glasen 319 b
Erdrappfel 354 a	groß Seigwarzenkraut 339 a	Gamander 351 a	Gleißblumen 181 a
Erderenglin 495 c	Forb Seigen 466 d	Garb 349 a	gehöflete Gleißblume 182 a
Erdeyche 497 a	laub Seigen 1bi.	Garben 342 a. 313 c	Glett 411 b. 527 c
Erdeycheln 497 a	vinetig Seigen 86 a	feldt Garbe 504 b	Gleidkraut 303 b
Erdfegen 381 b	Seldkirgen 513 d	groß Garbekraut 304 b	Goldblüm 276 b. 498 d
Erdfallen 195 b	Fenchel 236 a. 493 b	weiß od schwarz Gar 198 a	Goldbleit 527 c
Erdfeylin 497 c	roß Fenchel 236 b	ten distel 198 a	Goldgrundt 246 a
Erdfglass 500 e	wasser Fenchel 514 d	Gartenkraut 1bi. b	Goldkese 471 c
Erdfmer 381 b	wilder Fenchel 236 b	Garthagen 207 b	Goldknapfflin 345 a
Erdrmandeln 318 a	Fenigrec 129 a	Gartheyl 1bidem	Goldpoln 497 a
Erdrnuß 160 b. 381 b	Ferbbeer 54 b	Gartheim 487 b	Goldwärmchen 471 c
klein Erdrnuß 478 d	Ferbkötner 1bi.	Gassenwurz 476 c	Goldwurz 266 b. 482 b
Erdrnach 347 a. 514 b	Ferber rot 280 a	Gauchblüm 87 a. 167 b	Gorden 153 b
Erdrstein 533 a	Fertigkeyt 113 b	482 d	Gorsgnad 263 a
Erdrniolen 354 a	Feyste 1bi.	Gauchbrot 160 a. 258 a	Gorsvergeß 255 b. 495 d
Erdrwachs 459 b	Fiberkraut 485 b	Gauchhabern 309 b	Granatbaum 70 a
Erdrwärm 472 a	Sicht dannen 39 a	Gauchheyl 184 b	Granatblat 1bi. b
Errosen 140 a	brauner Fingerhut 342 b	Gauchilee 258 a	granatöpfel 70 a. 464 a
Erz 426 a	gelber Fingerhut 1bi.	Gebant Erz 407 b	Grass 265 a. 504 a
Erzstuf 160 a	Fischbeyn 469 d	Geigenhaz 44 a	klein ried Grass 265 a
Erzen würger 466 a	Fischminz 477 c	Geilun 137 a. 227 b	Grassblüm 290 a. 252 a
Erzschöflen 162 b	flachs 130 a. 475 a	Gelendwurz 501 b	Griechisch bech 44 a
Erzel 470 c	flachskraut 360 b	Gemeurwurz 493 d	Grief 123 a. 474 a
Erzfeldlin 517 a	Erorten flachs 1bi.	Gemöß vö blumen 16 a	Griemelören 476 b
Erzshyb 260 a		Gensferch 183 b	Gronfel 145 a
			Grundkrebe 306 b
			Grundtheyl

Register.

Grundtheil 290 a. 483 a	Hauchblatt 363 b	Hochmilt 252 a	Jugherkraut 482 d
Granspan 526 d	Hausenblasen 246 a.	Holder 380 b	Jochbeyl 483 a
Grüg 159 a	491 a	Holstraubenblüt 291 b	Josephs lab 519 c
Gryllen 103 a. 470 c	Hausflauch 511 d	Holzbaum 107 a	Jsp 487 b
Gulden gunfel 517 b	Hauswurz 336 b	Holunder 521 b	Juden Zpfel 75 a
Gundelreben 306 b	groß Hauswurz 511 d	Holwurz 484 d. 514 b	Juden d. fle 325 a
Günster 519 b	Klein Hauswurz ibi.	lang Holwurz 193 b	Juden f. 325 a. 509 b
Gurken 153 b. 478 a	Kawhechel 203 a. 486 d	Honig 118 b	Juncfern grägle 303 a
Gür Heinrich 143 a	Heckrosen on geruch 305 a	Honigschrauff 524 a	Juncfer lilien 266 b
Gyps 423 b	305 a	Honigwasser 395 a	Jungfrawhaar 309 b
	wolrched Heckrosen ibi 136 a	Honterschen 465 d	Jungling 507 b
Habern 474 b	Hederich 531 a	weiß Hornungablän 267 b	
Klein Habern 124 a	Hefen 531 a	Höfflarrich 260 a.	B. 531 a
Hiderländisch Habern ibi.	H. Geysts wurz 235 a.	493 a	ungleschter Falck 423 a
Schwarz Habern ibi.	Heimichen 103 a	Hundsaugen 497 a	Ramp 103 b
weiß Habern ibi.	Hellfant bey 106 b	Hundstblämen 498 d	Rantenkraut 292 b
Haber bei ibi.	Hellfentbey 471 b	hundts hoden 333 b	310 b 506 a
Habermäß ibi.	Hellfentzan ibi.	Klein hundtsmilt 520 d	Rappren 180 a. 482 c
Habermelch 160 a	Hennen 104 b	hundtareben 522 b	Rarten distel 198 b
Habichkraut 231 b	Heerbstbläm 333 b. 511 c	hundtsall 498 d	Rastan 66 b
Hackekraut 183 a	Heerbstrosen 140 a	hundtsan 149 a	Rastanien 464 a
Hagendorn 465 d	Heiligen 465 d	hundtszung 355 a. 515 d	Raz 100 a
Hamelkorn 224 a	Hermelen 498 c	gemeyn hundtszung 355 a	Razgerbel 347 a
Hammerschlag 408 a	Hernkraut 214 a	355 a	Razenfle 299 a. 502 d
Han 104 b	Hewschreckenn 105 b.	hind hundtszung 301 a. 355 a	Razenkraut 9 a. 214 a
Hanbutten 56 b	Heyd 53 b	hänerbeer 506 b	Razensper 203 a
Hanenfüß 181 a. 482 d	Heydelbeer 464 d	hänertöl 218 a	Razentreublin 189 b
bräunender Hanenfüß 181 a	welch oder freibd Heydelbeer 71 a b	hänertrauben 312 b	312 b 506 b
gefälder Hanenfüß 182 a	Heydtkorn 159 a. 474 c	hyndtskraut 174 a	Fleim Razenwadel 292 b
geel Hanenfüß 316 a	weiß Heyderich 138 b	closter hyssop 208 a	310 b
kleiner Hanenfüß 182 a	143 a	garten hyssop 217 b	Belber 514 d
merg Hanenfüß 316 a	Heyderen 471 d	heyden hyssop 208 a	Belcken 513 c
süß Hanenfüß ibi.	Heydtschbläm 266 b	kirch hyssop 217 b	Belckraut 363 b
Hanenkamp 507 c	Heyleblat 512 d	zwibel hyssop 217 b	Kellershalß 379 b
Hanensporn 514 b	Heylwurz 281 b	J. 381 b	521 b
Hanff 283 a	Heymchen 470 c	Jelenger te lieber 174 a. 257 b. 358 b	Belberken 186 b. 514 d
admsch Hanff 519 d	Himelbrot 225 a	Jgel 88 b	Terbellkraut 156 b
wild Hanff 283 a	Himelbrot 225 a	hundts Jgel 468 a	wilder Berffel 349 b
Harenkraut 360 b. 517 c	Himelbrot 225 a	meer Jgel 467 d	Beerger 57 a
Hartstrand 494 b	Himelbrot 225 a	schwein Jgel 468 a	Bergenkraut 342 b
Hartheu 286 a. 500 b	Himelbrot 225 a	Jgellerten 517 c	Besseldraun 526 c
rot Hartheu ibi.	Hindtberen 305 b	Ilmen 461 a	Besten 66 b. 464 a
Hartigel 57 a	Hindtleuffe 477 d	Ilriff 99 b. 470 a	Bestenbaum 464 a
Harwurz 274 a	Hirsen 126 a. 474 c	Jmenkraut 216 b	Bestenwurz 498 a
Gefotten Harz 44 a	Hirten pfeiff 285 a	groß Jmergrün 511 d	Reuschbaum 62 b
Harz von sorhen 42 a	Hirtzbrunn 161 a	Klein Jmergrün ibi.	Recherbs 130 b
Haselnuß 82 b. 466 c	Hirtzhorn 107 a	Indich 188 b. 328 a	Richen 130 b. 475 a
Haselwurz 8 a. 451 a	Hirtzlee 307 a	Indichblo 414 a	Rienbaum 457 c
Hesensampfer 258 a	Hirtzwurz 225 b	Indisch Korn 126 a	Riser 181 b
Hesenbrot 309 b	275 a. 496 c	Jngber 171 a. 480 a	Runderbapp 123 b
Hesensöl 187 b.	schwarz Hirtzwurz 225 b. 239 a	teutscher Jngber 482 b	Rusen 72 a
Hesenspfölin 187 b.	225 b. 239 a	Jnggrün 293 b	weisch Rusen 77 b
Hesentöl 150 a. 477 b	Hochkraut 228 a		Ruschbaum 464 d
wilder Hesentöl 150 a	Hochleuch 182 b. 499 c		Ruß 531 c

Register.

brauner wifen Blee	258 a	busch kressig	148 a	pyß Lauch	164 b	wild Nahn	101
garten Blee	514 c	gartenkressen	167 b	schnit Lauch	163 b	Maiozan	218 b
großer geysß Blee	348 b	steyn kressen	479 c	wild Lauch	164 a	Maletun	465 b
gülden Blee	181 a	wasser kressig	87 a	Lauender	209 a	Mandeln	466 b
saur Blee	258 a	wild kressen	148 a	Laur	523 d	Mädelbaß	80 a
steyn Blee	348 a	Kreusel	87 a	Lautertrank	525 b	Mandelkern	80 a
edler steyn Blee	219 a	Kreuselbeer	461 c	Leber distel	156 a	Mangolt	477 a
weiß wifen Blee	258 a	Kreusel	54 b	Leberfletten	307 a	roter Mangolt	144 a
weiß/geel wifen Blee	258 a	Kreisel	78 b	Leberkraut	505 b	wald Mangolt	187 b
ibid		Kreisel	123 a	steyn/brun Leberkraut	313 b	weiß Mangolt	144 a
wolreichender Blee	258 a	Kreisel	120 b	ibid		wifen Mangolt	502 d
258 a	347 b	Kreisel	517 c	Leckritz	194 b	Manstrew	204 a
groß Blette kren	346 a	Kreisel	261 a	Leim	245 b	Marck	115 b
klein Blette	346 b	Kreisel	278 a	mund Leim	246 a	Marder	99 b
spitz Blette	359 b	Kreisel	183 a	Leim	130 a	Marien distel	199 a
Klingelblumen	476 b	Kreisel	491 b	Leindotter	127 b	Marien Magdalenen	450 b
Kirschen	508 a	Kreisel	227 b	Leinfraut	360 b	Marien Magdalenen	464 b
rot Knabekraut	497 d	Kreisel	491 c	Leinsamen	130 a	Marien rosen	513 d
Knawel	292 b	Kreisel	227 b	zam Lendeckraut	137 b	Marien rößlin	544 b
Knoblauch	165 b	Kreisel	228 b	Lendewurz	106 a	Mattendblumen	315 b
Knoblauchkraut	259 a	Kreisel	494 b	Lersch	471 b	Mattensack	316 a
aber Knoblauch	165 b	Kreisel	227 b	wald Lersch	106 a	Mattensack	316 a
feld Knoblauch	479 b	Kreisel	491 b	Lerchenharz	458 b	Mattensack	316 a
klein hundert Knob-		Kreisel	491 b	Leuskraut	366 b	Mattensack	316 a
lauch	164 a	Kreisel	491 c	Leusamen	368 b	Mattensack	316 a
wild Knoblauch	165 b	Kreisel	491 c	Lewentapp	250 a	Mattensack	316 a
Knollenkraut	507 d	Kreisel	491 c	Lewentatz	282 b	Mattensack	316 a
Knöllster	107 b	Kreisel	342 b	Lewenzan	247 b	Mattensack	316 a
Rockelkom	160 b	Kreisel	286 b	Liddegeng	294 b	Mattensack	316 a
Röl	477 a	Kreisel	526 c	Lidwey	302 a	Mattensack	316 a
blaweröl	142 a	Kreisel	108 a	Liebäuglin	490 d	Mattensack	316 a
breyeröl	142 a	Kreisel	506 c	Liebäuglin	490 d	Mattensack	316 a
freyeröl	142 a	Kreisel	407 b	Lieben	384 a	Mattensack	316 a
Krauseröl	142 a	Kreisel	416 b	Liesen	384 a	Mattensack	316 a
meeröl	143 b	Kreisel	528 c	Lies Knospen	264 b	Mattensack	316 a
römischöl	477 a	Kreisel	152 b	Lilgen	253 b	Mattensack	316 a
wildöl	142 a	Kreisel	478 a	rot Lilgen	101	Mattensack	316 a
Kolben	496 d	Kreisel	367 b	Lilien	495 d	Mattensack	316 a
Kornetrost	250 b	Kreisel	498 d	blaw Lilien	3 a	Mattensack	316 a
Kornkatergen	153 d	Kreisel	465 a	geel wasser Lilien	3 a	Mattensack	316 a
Körffel	156 b	Kreisel	118 a	heydmisch Lilien	266 b	Mattensack	316 a
wild Kornblum	344 b	Kreisel	213 a	Limonen	75 b	Mattensack	316 a
Kornrosen	319 b	Kreisel	472 c	Lindbass	51 a	Mattensack	316 a
Kornwinden	504 d	Kreisel	512 c	Linde	57 b	Mattensack	316 a
Brablen	469 a	Kreisel	470 c	Linsen	132 b	Mattensack	316 a
Braen äuglin	376 a	Kreisel	414 a	Lorbeer	460 b	Mattensack	316 a
Braen süß	149 a	Kreisel	154 b	Lorbeerbaß	48 b	Mattensack	316 a
Brastimel	128 b	Kreisel	260 a	Lorbeeren	48 b	Mattensack	316 a
Brauerbeer	46 b	Kreisel	154 b	Loren	460 b	Mattensack	316 a
Brauchhals	263 a	Kreisel	100 b	Lülch	128 a	Mattensack	316 a
Brauchschabel	496 d	Kreisel	100 b	Lügenkraut	255 b	Mattensack	316 a
Brauchbeer	305 a	Kreisel	100 b	Lypp	113 a	Mattensack	316 a
Braugen	504 b	Kreisel	100 b	läp Lypp	101	Mattensack	316 a
Brebs	409 a	Kreisel	100 b	Magen	508 b	Mattensack	316 a
Breiden	533 a	Kreisel	100 b	Magnet	428 b	Mattensack	316 a
schwarze Breide	101 c	Kreisel	100 b	Magsamen	320 a	Mattensack	316 a
Bressen	167 b	Kreisel	100 b	geel Magsamen	321 b	Mattensack	316 a
brun Bressen	167 b	Kreisel	100 b	Mahn	508 b	Mattensack	316 a
		Kreisel	100 b	felde Mahn	101 a	Mattensack	316 a
		Kreisel	100 b	horn Mahn	101 b	Mattensack	316 a
		Kreisel	100 b	form Mahn	101 a	Mattensack	316 a
		Kreisel	100 b			Mattensack	316 a

Register.

Neßpeln	465 c	ros münz	214 a	Kuß	466 c	maur Pfeffer	512 b
Nertram	377 b	rot münz	215 a	baum Kuß	81 b	steyn Pfeffer	ibi
Nessdich	99 b	spiz münz	214 a	Lampertische Kuß		schwarz Pfeffer	170 a
Neuser	100 a	unser frauenmünz	ibi			raub Pfeffer	ibi
Neußhabern	309 b	wasser münz	148 a	welsch Kuß	81 b	wasser Pfeffer	172 a
Neußhoy	309 a, 505 c	wild münz	214 a	Nyelen	293 b	weiß Pfeffer	170 a
Neußhölz	483 c	münzen salbey	213 a	O.		Pfench	127 a
Neußhoh	187 b	müscheln	468 b	Oherguel	518 a	Pferds bingen	106 d
Neußpohz	ibi.	müschelraut	172 a	Ochsenbicz	203 a	Pfersch	75 a
Neußpohz	ibi.		254 b	Ochsenzung	254 b.	Pferschraut	172 a
Neußwibel	179 a	müerwillen	252 a		350 b, 503 c	Pfisterling	333 a, 511 b
Neußwibel ib.	ibi	nißel	65 b, 246 b	gemeyn Ochsenzung		Pfingstweurz	278 b
Neußblumen	533 a	eychen nißel	246 b		302 a	Pfirschen	465 b
Neußblumen	498 c	N.		rot Ochsenzung	300 b	gold Pfirschen	ibi
Neußröslin	353 a	Nabelkraut	337 b	scharpff Ochsenzung		Pflaumen	78 b, 466 a
Neyer	139 a	Nachschade	315 a		503 c	Pfirschen	370 a
Neyeran	489 b	Nagelkraut	509 a	welsch Ochsenzung		erd Pfirschen	ibi
Neykraut	186 b	Nagelkraut	187 c		351 a	Pincen Keenen	39 a
Neyserwurz	233 a		314 b, 360 b, 483 c	wild Ochsenzung	ibi	Pippatt	491 a
	240 a, 481 d	Napen	476 a	Ofenung	307 a, 503 b	Poggs	100 b
niß Niten	141 a	Narissenröslin	173 a	Ofenleimen	933 b	Poggenstül	511 b
schiß Niten	389 a	Nardes	514 c	Ogel	414 b	Poley	211 a, 488 a
wild Niten	ibi.	Narren kelben	264 b	Olander	332 b	berg Poley	211 a
zam Niten	141 a		498 d	Olbaum	465 c	wilder Poley	216 a
Nißel	493 a	Naterwurz	175 a	wilder Olbaum	64 a	Pomeranzen	75 b
Nolch	471 d		291 a, 482 a	Olbeffen	ibi		465 b
Noll	108 a	groß Naterwurz	175 a	Olucen	463 d	Pompen	510 a
Nönn	320 a	Narcszünglin	ibi.	erub Ol	64 b	Poppelweiden	460 c
wild Nönn	319 b	Negelbletter	9 b	Omag	329 a	weiß Poppelweiden	ibi
Nündes Fappen	330 b	Negelblumen	290 a	geel Omagen	321 b		
Noren	214 b	Negelblümlin	267 a	Olm	108 a	Doplen baum	49 b
feld Noren	237 b	Straßburger Negel	ibi	Oppernent	539 d	Doizel	477 b
nadel Noren	478 b	blümlin	ibi b	honn Oppfel	465 a	Draumen	466 a
wild Noren	157 a	braun/weiß/rot/leibz	ibi	Orant	357 a, 516 d	Dymfensien	420 b
	218 b, 490 d	farb Neglin	ibi	Ostfel	469 b	O.	
zam Noren	224 b	feld Negelin	252 a	Ostlucet	193 b, 484 d	Qualiter	471 c
Nos	350 a	graß Negelin	290 a	Ostern	468 b	Quecken	504 a
Nosblümlin	316 a	wild Neglin	252 a	P.		Queckgras	ibi
Nosmoß	340 b	Nest	216 a	Palmbaum	47 a	Quecksilber	415 a
Nosflecken	507 a	Nessel	ibi	stehend Palmen	363 a		518 b
Nosfolben	264 b	Nesselbaum	ibi		63 b	Quendel	218 a, 489 a
Nosken Fraut	172 a	Nessel	318 a, 512 c	Pappeln	476 d	welsch Quendel	216 b
Nuggart	496 c	brennend Nessel	318 a	Paris Föner	5 b	Quitten	465 a
munorholz	57 a	heyter Nessel	ibi	Pasieney	224 b	R.	
mundelem	495 a	römischer oder welsch	ibi	wild Pasieney	ibi	Koden	474 d
mundelediden	462 b	Nessel	ibi	Deonen	498 d	Kaden distel	204 a
Münz	214 a	raub Nessel	339 a, 512 c	Pasilenzwurz	346 b	Ragwurz	269 b
aßer Münz	213 a	roß Nessel	511 c	Pasilenz heublin	514 a		170 b, 497 c
bach münz	144 a, 477 c	weiß Nessel	339 a	Peterlin	232 a	Ramp	470 c
rot bach münz	148 a	graw Nide	526 b	Peterfilen	232 a, 492 c	Rampch	479 b
balsam münz	213 a	weiß Nide	ibi	fremdder Peterfilen	226 b	Rampfere	ibi
berg münz	214 a	Kinder distel	196 b		331 a	Ränge	361 b
feld münz	213 a	Nielen	384 a	wilde Peterfilge	482 b	Rapungeln	335 a
fisch münz	214 a	Nieskraut	172 a	Paffenbind	186 b	Rappensfuß	149 a
graw münz	ibi.	weiß Nieskraut	164 b	Paffenhödin	231 b	Rassel	172 a
heil münz	216 a, 266 b	schwarz Nieswurz	ibi	Paffenplatt	492 a	Ratten	472 a

Register.

Reynigen 512 c	Sadancy 217 b	Schaffthew 310 b	snb. 531 b
wilde/vngepflanzte 390 a	Saffran 18 b. 422 d	Scharlach 501 b. 506 a	Schwertel 503 a
Reben 501 c	distel Saffran 512 c	Scharlach beer 311 b	blaw Schwertel 449 a
Rechgras 303 a	felde Saffran 387 b	Scharlach kraut 186 b	geel Schwertel 3 a.
Regenwurm 109 b.	ort Saffran 18 b	Scarley 497 d	449 b
472 a	wilder Saffran 387 b	Scharley 273 a	klein/bla Schwertel 299 b
315 b	wild Saffranblum 333 b	Scharte blumen 276 b	Seckelkraut 312 a
507 b	wissen Saffran 512 c	Scharten kraut 260 b	Seckblumen 498 a
Reinfaren 260 b. 496 c	zamer Saffran 18 b	Scheißkraut 360 b.	gelb, weiß Seckblum. n
Reinföl 476 d	zument Saffran ibi	a	274 a
Reinwinden 57 a	Sahl 530 b	Scheißmalten 141 a	Seisalek 98 a
462 b	Salbey 21 b. 488 c	Schellkraut 483 a	S. gulteyn 428 b.
Reiß 115 a. 474 b	bauren Salbey 213 b	Schellwurz 185 b	531 d
Reißen 333 a	breyt Saurampffer 137 b	Schiffbeck 43 a	Seehaiden 341 a
Reipfen 479 b	edel Salbey 112 b	Schifergrün 413 b.	Seiunck 450 b.
Reitich 136 a. 476 b	drecht Salbey ibi	527 d	garten Seiunck 451 a
Rheupontic 195 a	wilde Salbey 212 b	Schirling 331 a	Sempton 506 d
Rhörfraut 496 d	273 a	Schlaken 409 b. 527 a	Senff 166 b. 478 c
Ried 265 a	Salmar 421 b	Schlaffbeerlin 326 a	geel/greß wasser
Rindtsaug 278 a	Salperer 422 a	Schlaffkraut 328 a	Senff 158 a
Ritterspoun 229 a b	Saluter 422 a	Schlangen balg 96 a	weiß/klein wasser
Roch 97 a. 469 d	Salomons sigel 293 a	Schlangenstein 532 c	Senff ibi
Rocken 123 b. 474 a	Salzbaum 421 b	Schlangenvurz 175 a	wild Senffkraut 138 b
Rodel 363 b	Salzfrut 498 c	brant Schlangen 95 b	weisser Senff samen
Roggen 474 a	Salzlaeken 530 b	Schlehen 200 b. 463 a	158 a
Romgras 477 a	Samet happeln 499 c	Schlehen doem 200 b	Seuenbaum 47 a
Ros 51 b	Samet fölbie 315 b	486 b	Seuen palmen 47 a
Rösafrut 231 b	Samet rosen 513 d	Schlüsselblumen 343 a	Seu bract 173 b
Rosen 60 a	S. Barbaren kraut 139 c. 304 b. 353 b	Schluten 325 a. 509 b	Sewdistel 478 a
erde Rosen 462 a	S. Johans brot 72 b	welsch Schluten 327 a	wild Sewdistel 492 a
felde Rosen ibi	467 a	Schmalz 113 b	Sewmelle 477 d
Rosen vonn Samasco 395 a	S. Johans gürtel 260 b	Schmalzblum 316 a	Sewtrahnen 515 d
Rosenwurz 310 a	S. Johans kraut 285 b	Schmalzkrut 478 b	Seyffentkraut 173 a
505 c	500 b	Schmelen 313 a	Siben gezeit 357 a.
Rosin 391 a. 523 b	S. Johans Pfersich 502 a. 395 a	Schmerwurz 296 a	347 b. 475 a
klein Rosin 513 d	S. Johans treublin 75 a	Schmirgel 533 a	Sigmarswurz 499 c
Rosküb 260 a	56 a	Schmiril ibi	Silberglett 527 c
Roskletten 514 a	Saphir 532 b	Schmirge ibi d	Silberschaum 181
Rosmarin 239 b	Sauffen 474 a	Schnecken 91 b. 468 d	Silberschlacken ibi
494 a	Sarbachbaum 49 b	Schnegel 469 a	Simonswurz 281 b
wilder Rosmarin 496 b	Sarnvey 217 b. 489 d	Schoßwurz 107 b	wild Singrün 501 c
Roschwanz 30 b	Sauenbaum 460 a	Schwaden 115 a. 474 b	Sommerdohr 492 b
Roszagel 501 b. 506 a	Saurauch 55 b	Schwalb 106 b. 471 b	Sommerwurz 478 d
Röte 499 b	Saurdom 462 a	Schwalbenwurz 248 b. 495 b	Sonnenwirbel 477 d
Rödel 528 c	Saurich 462 a	Schwartzkappen 281 a	klein Sonnenwirbel 478 a
Rödeisteyn ibi	Sawwurz 339 a	Schwartzwurz 296 a	S. Peters Korn 123 a
Rüben 135 b. 476 a	S. Kathermen blü. 229 a b. 361 a	502 a	S. Peters kraut 334 b
rot Rüben 144 a	Scaphom 377 a	Schwefel 420 a. 520 a	Spangrün 526 d
rot. gelb Rüben 224 b	Schabab 241 b	gelberberg Schwefel 417 b.	Spargen 146 a
steck Rüben 135 b	Schabrauß 501 b	lebendiger Schwefel 420 a	Spargen wurz 173 a
naßsteck Rüben ibi	Schaffgarben 342 a.	rotter berg Schwefel 349 a	Speckfugen 297 a.
trucken steck Rüben ibi	Schaffinüle 62 b	Schwein brot 173 b	552 a
Ruprechts kraut 261 b	Schaffinipp 304 b	Schwem 333 a.	Speckfren 522 a
Rürkraut 264 a	342 a		Speierling 78 a
Rüs 43 b. 112 c. 533 d			Speiseyn 453 b
Rüsbaum 51 a			Spelz 123 a
Rüstern 461 a			Speyfelwurz 173 a
Rystenbaum 51 a			238 a
S.			Spica

Register.

[illegible]

Register.

Werderblee	474 a	Wätscherling	510 c	Cliffen	359 b	Meercruyt	280 a
wild Weyd	483 d	Wüterich	331 a, 510 c	groot Cliffen	346 a	Mollencruyt	374 a
Weydeblum	528 a	Z.		Clopfen cruyt	306 a	Mofiarde	166 b
Weyffen	120 b	Zapffenfraut	363 b	Conijn	227 b	Mofiaercruyt	158 a
Weyffen Kolb	ibi	Zäpfunfraut	516 b	Concommeren	153 b	Münfte	214 a
welfcher Weyffen	ibi	Zaunglocken	306 a	wild Edcommeren	367 b	Muyfen met fleertē	381 b
Weyzen	473 d	Zannreben	522 b	Cozael cruyt	146 a		
bauch Weyzen	159 a	Zaunrüben	385 a	Cracynen	149 a		
Wickbonen	134 a	Zaunwinden	504 d	Creecken van ouer zee	35 a		
Wick doon	56 b	Zebast	521 b		327 a		
Wicken 163 a.	475 d	Zeeffe	519 d	roomsche Creecken ouer	327 a		
wild Wicken	479 a	Zeeckenfomer	374 a		269 b		
Wicken	129 b	Zederbaum	47 b	Tullekenscruyt	204 a		
wifraut d'Wicke	160 a	Zehr	419 a	Cruydsifeln	204 a		
wogels Wicken	163 a	Zeiffkraut	303 b, 504 a				
wild Wicken	ibi	Zeeheyde	500 c, 513 d	Donderbaert	336 b		
Widerftoff	294 b	Zeeleß	333 b, 511 c	E.			
Widerthon	358 b	Zeunling	397 a	Eyloof	185 a		
gilden Widertod	ibi	Zidern	309 b	Fontein cruyt	341 a		
Winden	306 a, 504 d	Zigenhorn	475 a	Fyer cruyt	207 a		
erd Winden	505 b	Zinnetinden	451 c				
ftehend, fchappf Win		Ziment Echin	11 b	G.			
de	361 b	berg Zinober	518 b	Gansen diftel	150 a		
wild Wuranken	501 c	Zippeln	470 b	Geel plomben	274 a		
Winterblum	507 b	Zirbel	457 c	Geneuer boom	46 b		
Wintergrün 203 b, 502 d		Zirbelnuß	ibi	Ginoffelfens	290 a		
blae Wintergrün	187 a	Zifer erbs	130 b	Gourue	185 b		
Wurdeloft	249 b	wilder Zitron	385 a	Grifecorn	347 a		
Wifel	99 b, 470 a	zerfellen Zucker	119 b				
Wifenblum	316 a	Zungen blat	516 b	B.			
geel Wifblumen	ibi	Zwerfcheen	466 a	Hasen larcouwe	150 a		
Wifenfel	202 a	Zwibel 164 b.	479 b	Herte cruyt	214 a		
Wolfsbeer	329 b	Zwyeter	411 a	Hertshoren	149 a		
Wolfsmilch	510 c, 519 d	Zybolten	164 b	Hertworel	225 b		
breyt bletteerte Wolffa		Zygerfraut	331 a	witte Hoemft	231 b		
milch	376 a	Zylandt	379 b	Kaffee	167 b		
cypreffene Wolffa		Zyn	527 a	Hondsbribbe	147 a		
milch	ibi	Zyffmaug	109 b	Suelfact	320 a		
rüd Wolffsmilch	378 a			J.			
fonnen wendende		INDEX DICTIO-		Joffromerck	233 a		
Wolffsmilch	375 a	num Linguae Brabantiae					
faß Wolffsmilch	376 a	et Saxonica.		B.			
wald Wolffsmilch	ibi	A.		Reckelcruyt	203 a		
Wolffs fchotten	130 a	Andick	380 b	Bemp	283 a		
Wolffs ftrahl	483 d	Zelbefien	56 b	wilde Berffe	169 a		
Wolffswurz	330 a	Ziften	206 a	Berfcruyt	365 b		
Wolfgemüt	210 a	Zuerzoone	207 b	L.			
rohe vingewafchen		Zyguin	164 b	Lacterowen	150 a		
Wollen	112 a			Lattow	154 b		
fchmutzig Wollen	ibi	B.		Leuflack	224 a		
wiften Wollen	264 a	Berenpos	102 a	Lydoodden	264 b		
Wullfraut	342 b	Eleen Beuerhelle	360 b	Lis ouer zee	1 a		
Wullenfraut	513 d	roomsche Boonen	162 a	Loock	165 b		
Wunderbaum	374 a	Braembefien	305 a	M.			
	519 d	Beem	370 a	Mageleyn	218 b		
Wüdfreut weible	337 b			Maltrou	355 b		
heydnifch Wunderfraut		C.		ftinckend Maltrou			
	187 b	widde Camillen	277 b				
Wurm fraut	487 b	Canwoorde	152 b				
Wurmeel	51 b, 461 a	Caroten	215 a				
Wurmfame	207 a, 467 b	Carotekaeßfens	282 b				
Wurm d'fichten	107 b	Centone	195 b				
		Claueren	219 a, 257 a				
		fteen Clauer	348 a				

PEDANII DIOSCORI

DIS ANAZARBEI, IN DE MEDICINALI MATERIA LIBRVM PRIMVM
Præfatio Ioanne Ruellio Sueffionensi interprete,



VANQVAM amicissime Aree, complures non ueterum modò, sed recentiorum quoq; de medicamentorum compositione, uiribus atq; probatione cõmentati sunt: nobis tamen nec uanum, nec à ratione abhorrentem impetum animi ad hoc opus incessisse, tibi ostendere tentabimus: quòd eorum nonnulli absolutum nihil ædiderunt, alij quàm plurima, quæ auditu percunctando didicerant, scriptis tradiderunt. Siquidem Bithynus Iolas & Heracles Tarentinus, omisâ prorsus herbarum tractatione, rem sanè quàm paucis perstrinxerunt. Neq; uerò omnes illi de metallicis quicquam rebus aut odoramentis memoriæ prodiderunt. Crateuas autem herbarius, & Andreas medicus, qui cæteris diligentius hac in parte uersati uidentur, radices multas apprime utilis, herbasq; haudquaquam adnotatas, reliquerunt. Veruntamen prætorum subscribere oportet sententijs: quos, etsi pauca ipsi referantur accepta, magnam tamen impendisse diligentiam constat. Iunioribus minus assentiendum: è quibus Iulius Cassus, & Niceratus, & Petronius Niger, & Diodorus, Aesclepiadæ omnes, medicinalem materiam uernaculam cognitamq; uulgo, dignam censuerunt: quæ ab ipsis literis exactè mandaretur: & medicamentorum uires probatio nesci cursum complexi, sic nullo experimento eorum effectus colligentes, inani uerò reddendarum causarum studio uerba fundentes, alia pro alijs scriptitando, rem in aceruum congeriemq; controuersiarum extulerunt. Siquidem qui inter eos egregius habetur Niger, euphorbium, nascentis in Italia, chamelææ succum esse contendit: androsæmonq; eandem herbam cum hyperico esse: quænam ad locum in iudæa fossilem nasci, & pleraq; his similia exponit, reclamante euidentiâ, quæ prorsus ueritati refragantur. Quibus coniectura colligi potest, ea non exculata fide, sed narratione potius ab alijs accepisse. In ordine ipsi aberrarunt, partim eorum discrepanteis nullaq; cognatione coniunctas uires collidentes: partim per elementa literarum scripta in ordinem digerentes, quò facilius memoriæ mandarentur, genera & eorum effectus à sua cognitione disiungentes. Nos uerò ab ineunte, ut ita dicam, iuuenta, iugi desiderio cognoscendæ materię allecti, per multis regionibus peragratî (nec enim nescis nos militarem uitam exegisse) tuo hortatu commentationem in sex libros contulimus, quod opus tibi dicamus, Aree, animi gratitudine obsequentes, ob eum quo nos prosequeris affectum. Etenim natura cum in omneis eruditione excultos, tum uerò in eos quibus cum tibi eiusdem artis necessitudo intercedit, pronus ad amicitiam esse soles: in nos etiam aliquanto peculiarius. Enim uero non paruum præbet utq; probatis argumentum, optimi uiri Licinij Bassi singularis erga te amicitia: quam unâ nobiscum degentes nouimus: cum mutuam inter uos bene uolentiam æmulatione dignam intueremur. Admonitum autem te uelim, eosq; qui in hoc sæce commentarios incident, ne in uerbis facultatem nostram æstimetis, sed potius adhibitam rebus cum peritiâ curam. Etenim plurima uisui ipsi exactissimè cognouimus: quædam etiam ex ea, de qua inter omnes conuenit, historia, percunctationeq; rerum apud singulos uernacularum diligenter accepimus. Dabimus igitur operam, ut differenti ab alijs ordine tradito, genera medicinarum uiresq; describantur. Quòd autem necessaria sit medicamentorum ratio, nemo efformè qui ignoret, quòd ea & toti coniuncta sit, uniuersisq; eius partibus efficacè admini-

P R A E F A T I O.

administret auxilium. Quare per medicamentorum compositiones atque mixtu-
ras, & facta in morbis pericula extendi, & incrementum capeffere potest, quam
plurimum conferente singulorum medicaminum cognitione. Quinetiam uero
naculam familiaremque materiam complectemur, ut perfecta sit quae a nobis res
linquetur doctrina. Verum imprimis curam impendere oportet, ut suis tempo-
ribus singula & demetantur & recondantur, certe pro horum ratione aut ualent
uiribus, aut euanido nulloque munere funguntur. Serena igitur coeli constitutio
ne demetenda sunt. Magni siquidem refert inter colligendum, si uel squalores
uel imbres infesti sint: quemadmodum si loca, in quibus prodeunt, cliuosa, &
uentis exposita sint & perflata, frigidaque & aquis carentia: in his enim locis uitres
eorum longe ualidiores intelliguntur. Contra, quae in campestribus, riguis, &
opacis, caeterisque locis a uento silentibus enascuntur, plerumque degenerant, & mi-
nus uiribus ualent: multoque magis, si non suo tempore nec oportunè colligan-
tur, aut si per imbecillitatem intabuerint. Neque ignorandum, saepe pro peculiari
loci natura, aut anni clementia, maturius aut serius adulescere. Nonnulla propria
ui, hyeme florent & folia pariunt: quaedam bis anno florifera. Quare cui in anti-
mo est horum peritiam assequi, necesse est eum prima germinatione solo emer-
gentibus, adultis & senescentibus, adesse. Nam qui pullulanti herbae duntaxat
adstiterit, adultam cognoscere non potest, neque qui adultam tantum inspexerit,
nuper erumpentem noscet. Quo fit, ut propter mutatam foliorum faciem, cauli-
um proceritates, florum seminisque magnitudinem, & id genus alias peculiares
notas, nonnulli qui olim has rerum uarietates non perspexerunt, magno in er-
rore uersentur. Quae causa etiam nonnullis scriptoribus imposuit, qui herbas
quasdam, uerbi gratia, gramen, quinquefolium, & tussilaginem emittere florem,
fructum & caulem, negant. Ergo qui saepius ad uisendas herbas & earum nata-
les se contulerit, earum cognitionem maximè consequetur. Scire etiam num con-
uenit, sola ex herbaceis medicaminibus uera tri genera, nigrum, inquam, & can-
didum multis edurare annis: reliqua à trimatu inutilia. Quae uero fruticosa sunt,
sicut stoechas, trixago, polium, abrotonum, seriphium, absinthium, hyssopum, &
alia id genus semine praegnantia, demetantur, flores quoque antea, quam sponte
sua decidant: fructus autem, ut maturi decerpantur necesse est: & semina, ubi
siccari coeperint, priusquam defluant. Herbarum succus & foliorum elici de-
bet, germinantibus tum primum cauliculis. Lac & Lachryma excipiantur, in-
ciso per summum adolescentiae uigorem caule. Radices, & liquamenta, cortices
ut recondantur, eximere conuenit, cum herbae suis folijs extuantur. Siccantur
etiam expurgatae inibi, locis asperginem non redolentibus: sed quae luto aut
pulvere sunt oblitae, aqua elui debent. Flores & omnia quae iucundum odorem
efflant, arculis tiliaceis, nullo situ obductis, reponantur. Nonnunquam charta
aut folijs semina, ut perennent, aptè inuoluuntur. Liquidis medicaminibus
densior materia, argentea, uitrea, aut cornea conuenit. Fidalis etiam,
si modò rara non sit, accommodatur: & lignea, praesertim è
buxo: sed aenea uasa ocularijs medicamentis liquidisque,
& omnibus istis quae aceto, pice liquida, aut cedria
componuntur. Adipem autem & medullas
stagneis uasis recondi con-
uenit.

PEDANII

CVRATIONVM MORBO.

RVM, HOC DIOSCORIDIS OPERE
contentarum, Index.

A.

Abscessuū remedia. 28 a 82 a 152 b 238 b
181 b 308 b 354 b 373 a 385 a 386 a.
Abortum facere. 173 b 174 b 260 a 273 b
404 b.
Abortus remedia. 110 b.
Aconiti remedia. 15 a 83 a 113 a 409 b.
Aculeos extrahere. 52 a 55 b 92 a 100 b
108 b 120 a 184 b 193 a 211 b 273 a 299 b 300 a
381 b.
Aegilope remedia. 24 a 70 b 82 a 125 b
139 b 147 a 188 a 220 b 325 b 391 b.
Alarum uirus extinguere. 35 b 71 a.
Algoris remedia. 25 a.
Alopecie morbi remedia. 25 a 43 a
52 a 82 a b 89 b 89 a 96 a 100 a 103 b 115 a 117 b
136 a 143 b 165 a b 167 a 173 b 177 b 181 b
142 b 273 b 355 b 369 b 409 b 424 a.
Aluum conturbare. 179 b.
Aluum solvere & purgare. 123 b 24 a b
27 a 31 b 36 a 41 a 72 b 83 a 84 a 85 a 111 a
133 a 172 b 177 b 190 b 205 a 245 a 289 b 321 b
364 a 366 a 371 a 378 a b 379 a 381 b 387 a
404 b.
Aluum sistere. 61 b 73 b 39 a 50 b 55 a 56 b
58 a 60 a 61 b 70 a 71 b 73 b 76 a 77 a 78 a
96 a 103 a 117 b 111 a b 124 a 125 b 132 b 141 b
147 b 150 b 152 a 162 b 165 a 220 a 221 a 228 a
234 b 249 b 270 a 279 a 284 b 294 a 299 a
300 b 302 b 304 b 313 a 318 a 319 a 320 a 350 a
390 b 391 b.
Ambustorum igni remedia. 24 b 28 b
97 b 192 a 48 b 57 a b 71 a 83 a 89 b 104 b 113 a
117 b 139 b 141 b 147 a 177 b 185 a 202 b 245 b
253 a 264 b 266 b 282 a 285 b 286 a 300 b 336 b
339 b 345 a 355 b 373 a 381 a 414 b 419 b 421 a
425 b 429 a b.
Angina remedia. 31 a b 43 a 47 b 106 b
117 b 138 b 164 b 170 a 208 a 242 b 332 a
368 a 370 a 396 b 397 a 421 a.
Anhelitus difficultatis remedia. 45 a 84 a.
Animalium feritatem mitigare. 350 b.
Animalia uentris expellere. 20 a 22 b 134 a
Animi defectus remedia. 133 b 211 a.
Animi uoluptates augere. 354 b.
Anodyma. 134 b.
Apium ictus remedia. 48 a 139 b 148 a
282 a.
Appetitum generare. 25 b 71 a 137 a
170 b 393 a.
Aquæ inter cutem remedia. 4 b 11 a 14 a
62 b 88 b 92 a 107 b 117 a 118 a 147 a 206 a

208 a 211 a 225 a 227 a 243 a 257 a 289 b 396 b
399 a 424 a.

Aranei ictus remedia. 582.

Argematum morbi remedia. 118 a 156 a
164 b 184 a b 273 a 347 b.Arquatorum remedia. 190 b 205 b 266 a
360 b.Articulorum morbi remedia. 3 b 21 b
24 b 25 a 29 a 45 a 65 a 121 b 141 b 177 b 190 b
221 a 245 a 255 a 308 a 324 a 328 b 366 a 369 b
373 a 397 a 423 b.Arteria remedia. 31 b 35 a 37 b 84 a 100 b
163 b 166 b 194 a 302 a 320 a 345 b 353 a 400 a.Aspidum morsus remedia. 11 b 294 a
395 b.Astrictoria medicina. 102 a 12 a 15 a 20 a b
24 b 25 b 27 a b 28 a 35 a 27 b 38 a 39 b 40 b43 b 50 b 55 a 56 b 57 a 60 a 61 a 62 a b
66 b 68 a b 69 a 70 b 76 a b 77 b 80 a 106 b111 b 115 a 132 a b 144 b 150 b 162 b 163 b 190 b
191 b 192 b 206 b 213 b 219 a 220 b 228 b 291 a296 a 300 b 304 b 310 a 314 b 333 b 336 b
343 a 347 b 371 a 390 a 391 b 392 b 393 b396 b 399 b 400 a 406 b 407 b 408 a 409 a
410 a b 411 b 413 b 414 b 415 b 418 a 420 b

425 b 428 b 429 a b.

Auditus grauitatis remedia. 23 a 48 b
177 b 366 a 396 a 420 a.Auricularum remedia. 178 a.
Aurium doloris medicina. 23 b 2425 a 35 b 37 b 41 a 43 a 48 b 49 b 58 a 60 a
61 a 63 a b 68 a 70 a 71 a 96 a 103 a b 108 a115 a b 116 a 118 a b 127 b 132 a 138 a 143 a 147 a
152 b 163 b 174 b 177 b 185 a 206 a 209 b213 b 219 b 221 b 227 a 240 a 241 a 248 a
255 b 296 b 302 a 320 b 323 a 325 b 334 b 335 b

367 a 401 b 421 a.

Aurium tinnitus. 23 b 31 b 47 b 163 b 165 a
167 a.

B.

Bestias fugare. 211 b.

Bestiarum uenenatarum remedia.

116 b 225 b.

Bestiarum morsus remedia. 163 b 223 a
242 b 421 a.

Bilem generare. 73 a.

Bilem purgare. 2 a 22 b 30 a 104 b 169 a
195 b 205 b 211 a 252 b 277 a 294 a 300 b

328 a 366 a 381 b.

Buprestis ueneni remedia. 27 b 421 b
433 b.

C.

Cacoëthes remedia. 27 a 30 b 37 b 65 b
130 b 176 a 246 b 324 b 338 a 348 b 405 a.

Calculi remedia. 4 b 5 b 23 a 37 a 48 b

*

I N D E X.

- 712 78b 802 105a 117b 118a 138a 147b 148a
172b 103a 230a 261a 275a 279ab 297b 312a
337b 358a 390b 427b.
- Calefactorię medicinz.** 4b 52b 66b 82
10a 12a 15b 19a 21ab 25a 28b 29a 30ab
31ab 32a 33ab 34a 35a 36a 37b 41a 44a
47b 48a 57a 58a 62b 80a 84a 87a 91b 98b
108a 112b 110a 121a 136ab 139a 148a 165b 166b
167b 169a 170a 171a 174b 177b 190b 192b
204a 205b 207b 209b 210ab 211b 213b 218b
221a 223a 224a 225a 227a 228b 230a 234b
237a 239ab 245a 251b 256a 258b 261a 277a
314b 337a 347b 401b 402b 409a 413b.
- Canis rabiem fanare.** 48a.
- Canis rabiosi morsus remedia.** 61a 82a
93a 118b 165b 443b.
- Canum morsus remedia.** 80a 82a 86a
90a 101ab 118a 110b 134a 147a 154a 164b
178a 213b 216a 234a 255a 338a 355b 381a
397b 422b 423b.
- Canum scabiem emendare.** 25b 47b.
- Cantharidum ueneni remedia.** 27b.
- Capillorum defluuium reprimere.** 10b
35b 58a 142a 168a 358a.
- Capillum denigrare.** 61b 66a 67a 68a
69b 71a 185a 212b 381a 406b 418a.
- Capillum ruffare.** 57a 77a 423a.
- Capillum flauum reddere.** 61a 352b.
- Capillos tingere.** 70b 83a 304b 343a 429b
- Capillum purgare.** 119a.
- Capillos nutrire.** 81a.
- Capitis ulcerum remedia.** 20b 22b 23a
24b 27a 28b 30a 37b 71a 85ab 118a 129a
130b 134a 139b 166a 173b 178a 219a 221b 255b
304b 338a 397b 400b.
- Capitis doloris remedia.** 12b 23a 27a 457a
60a 62b 80a 95a 127b 144b 148a 185a 213b
218a 219b 220b 221a 227a 240a 241a 242a
266a 283b 310a 320a 324a 325b 356a 364a 368a
379a 390a 391b 396a 428a.
- Caput purgare.** 143b 170b 173b 180a 183a
184b 186b 391a 416b.
- Carbunculorum medicinz.** 24a 33b 43a
45b 47a 56b 63b 54a 82a 117b 133b 134a 142a
147a 168a 223a 230b 242b 375b 391a.
- Cardiacorum remedia.** 71a 150b 304b.
- Carnem coalescere facere.** 155a 295b
- Carnes superuacuas compescere.** 88a.
- Carcinomatum remedia.** 39a 107b 130b
169b 174b 338ab.
- Caua implere.** 37b 39a 40a 193a 410a
411b 414b 425a 426b 427b 428b.
- Cerastræ ictus remedia.** 47b 127b 421a.
- Chironiorum ulcerum remedia.** 147a
284b.
- Choleras sedare.** 73b 213b 215b 291a.
- Cicatricum remedia.** 23b 24b 30a 47b
58a 64b 118a 131a 178a 216a.
- Clauorum remedia.** 63a 101a 117b 242b.
- Cœliacorum remedia.** 25b 45a 52b 58a
61a 63b 65b 67a 71a 73b 83a 86a 106a 107a
113a 116b 131a 132a 137b 147a 191a 199b 240b
243a 273b 297a 298b 312b 320a 391a 399b
400ab 401a 409b 427b.
- Coli remedia.** 80a 92a 106b 111b 117b 127b
221a 232b 369b.
- Colorem commendare.** 24a 117b 208a.
- Collectionum remedia.** 83b 18b 30a 47a
83b 131b 168a 234b 246b 277b 292a 300b 308b
328a 336a 340b 414b.
- Comitialis morbi remedia.** 5b 15a 17a
45a 49b 84a 91a 96a 99a 103b 104a 106a
113a 116ab 117b 147a 166b 190b 204a 211b
225a 239a 240a 241a 243ab 244b 245a 257a
266a 276a 289b 308b 322a 366a 373b 385ab
397a 398a 402b 428a.
- Conceptionem adiuvare.** 235a.
- Concoctionem iuuare.** 5a 11a 18b 30b
36a 41a 85a 157b 160a 170b 177b 179a 225b
227b 289b 398a 401a 402a 403b 420a.
- Conuulsionis remedia.** 24b 5b 11ab 15a
19a 33a 37a 46b 47b 55a 86a 88b 98b 117b
174b 180a 191a 192b 193a 195a 202b 203a
207b 209b 210b 215b 218a 220b 223a 239a
241a 243ab 244b 249b 259a 284b 289a 295b
300b 343a 385a 402b.
- Condylomatum remedia.** 11b 24b 71a
73b 105a 205a 228a 238b 254a 304b 308b 314b
409b 410a 419a.
- Cordis tremoris medicinz.** 5a 50a.
- Coxendicum doloris remedia.** 8a 14b
45a 117a 134a 145b 146a 166b 168a 169b 190b
191a 207b 221ab 245a 295a 300b 308b 315a 345b
403b.
- Cruditatis remedia.** 22b 399a 403a.
- Crustas adimere.** 31b 32a 63b 165b.
- Crustas generare.** 11b 405a 414a 418b.
- Culices fugare.** 45b 117a 106a.
- Cutem albicare.** 51a.
- Cutem erugare.** 246a.
- Cutis uiria tollere.** 2a 11a 13a 29a 24a 28b
80a 85a 96a 97b 116b 129b 133b 143a 171b
197b 347b 424b.
- D.**
- Dentium doloris remedia.** 17a 27a
39a 45a 47b 48b 52b 64b 66b 68a
82a 85a 96b 100a 109b 118a 145b 147b 166a
177b 180ab 181b 184b 185a 186a 197b 199a
203a 206a 208a 223a 238a 241a 242a 244b
255a 212a 294a 295a 308a 323b 326a 343a 345b
366a 369a 374b 376a 396b 418a.
- Dentium stuporis remedia.** 144b.
- Dentitio.**

INDEX.

Dentitiones infantium iuuare. 164 116.
Dentificia. 406 89b 420b 427d.
Dentes firmare. 204 35b 406 64d

70d.
Dentes albicare. 424d.
Dentes uitiatos extrahere. 65d.

Destillationes cohercere. 25d 31b 35b
164 45d 59d 105d 159b 174b 203b 208d 242d
315b 421d 403d 420d.

Discussoria medicina. 21b 23d 33b
41d 128b 170d 246b 283b 402b 420d.

Draconis marini morfus remedia. 94b
98d 118d 159d 410d 420d.

Duricia emollire. 2d 24d 84b 117d
129b 133b 172d 180d 223d 234b 241d 245d 278d
308b 338b 426d 427b.

Dysentericorum remedia. 16b 25b 35d
40d 45d 50b 57b 61d 65b 67d 68d 73b 77d
85d 100b 101b 107d 113d 115d 116b 120d 125b
129d 131d 132d 137b 145d 147d 148d 189d
190b 191d 255d 259d 263b 273b 281d 294d
296b 298b 304b 307b 310b 312d 350d 391d
392d 397b 399b 400d 401d 409b.

E.
Ebrietas. 173b 392d.
Elephantia remedia. 47b 88b.

Emollientes medicina. 11d 18b 21b 24d
35d 30ab 31ab 32d 35d 37d 41d 44d 45ab
48d 57d 58d 83b 111d 115d 120d 128b 223d
245d 246d 247d 411b 418b.

Enterocela remedia. 295b 300d 310b;
Epiphytidis morbi remedia. 63b 71d
80d 85b 117b 142d 147d 154d 163b 205b 230b
246b 389b 391d.

Eruptionum remedia. 27d 30d 37b
110b 134d 143b 145b 166d 173b 221d
400b.

Excretionis remedia. 19b 37b 38d
40d 43d 50d 52d 58d 61d 107d 121d 145d 216b
240b 292d 345b.

Excrecentia deprimere. 66b 69d 89b
116b 159d 405d 410b 411b 414b 418b 420b
421d 423b 425d 426d.

Extenuatoria medicina. 34d 166b
207b 210b 223d 261d 277d 401b 407b 408d
409d.

Exiccatoria medicina. 12d 35d 111b
147d 184b 213b 227d 228b 230d 239d 360d
407b 415b 418d.

Extractionis medicina. 31d 111d 166b
170d 245d 246b 369b 411b.

F.
Facies uitia auferre. 142d.
Facies rugas auferre. 429d.

Fatidium discutere. 205b 400d 402d.
Fatigationum remedia. 116b.

Faucium morbi remedia. 68b 110b 118b
203b 242b 391d.

Febrium remedia. 21d 29d 31b 35d 102b
104b 108d 145d 167d 170d 190b 292d 297d
299d 422d.

Febris quartana remedia. 198b 308b
389d.

Fistularum remedia. 2d 33b 147b 176d
177d 198b 240d 270d 308b 342b 366d 375b
382d.

Flatus discutere. 5b.
Flatum adgenerare. 401d.

Fluxionum remedia. 39d 45b 61d 33d
100b 105d 111b.

Fœminas sterilefcere. 96d 185b.
Formica morbi remedia. 85b.

Fractura remedia. 68d 177b 143d.
Fungorum uenenatorum remedia. 31b
76d 117b 118b 205b 255d 396b 416b 411d
422b 420b.

Furunculorum remedia. 84b 111d 131b
168d 177d 244b 421d 422b.

Furfures tollere. 20b 23d 24b 25d 27b
28b 30d 43d 63d 64d 71d 85b 83d 97b
118d 121d 129d 139b 143b 166d 175d 253d 338d
397b 400b 419b.

G.
Gangraena morbi remedia. 24d 33b
68d 83d 86d 113b 134d 136b 142d 178d
242b 338d 375b 384b 391d.

Genitalium morbi remedia. 65d 205d
292d.

Genarum morbi remedia. 27d 39b 41b
61d 63b 85b 97b 118d 167d 245d.

Genituram extinguere. 221d 218d.
Genituram augere. 230b

Gingiuarum morbi remedia. 17d 20d
25b 35b 60d 61d 64d 66b 70d 78b 110b
147d 205d 211d 297b 304b 391b 400b 409b
416b 419b 421d 427b.

Glabros uel depiles facere. 95d.
Grauedinis remedia. 56d.

Gutturis remedia. 84d 105d 121b
397b.

H.
Hæmorrhoidarum remedia. 31b
32b 68d 145d 164b 203d 205d 304b
410d 427d.

Halitus oris remedia. 35b 227d 360d
398d.

Hastulas infixas corpori extrahere.
55b.

Hepaticorum remedia. 39d 43b 80d
191d 192b 352b 399b 402d 403b.

Hernia remedia. 32d 33ab 37d 45b
70d.

INDEX.

Hirudines pellere. 396b.

Hominis morsus remedia. 814 1344.

Hulcerum remedia. 24454b 27b 30b 31b

33a 39a 43a 45b 51b 52a 54b 61a 63b 64a

69a 71a 80a 88b 89b 117b 129b 147a 177a

180a 183a 185a 188b 193a 195b 197b 212b

219b 223a 230b 238b 241a 251b 254a 255ab

239a 270a 292a 347b 350b.

Humorum malorum medicina. 24 24a

39b 203a.

Hydropicorum remedia. 8a 13b 65a

84ab 130b 136a 166a 176b 178a 179ab 196b

209b 234b 252b 258b 266a 337b 366a 381a

396a 401a 403b 421a.

I.

Iecinoris remedia. 2b 6b 7b 12b 13b 16b

169b 157a 172b 184b 190b 194a 204a

206a 218a 240a 245a 277a 287b 307b 308b

347a 402a 415b.

Ignis sacri remedia. 13b 45b 52a 54b 60a

61b 63b 71a 116b 117b 118a 133a 139b 142a

143b 144b 147b 150b 155a 188b 210ab 211b

230b 253b 259b 277b 292a 300b 301a 305b

308b 317a 320ab 324b 325b 328b 331a 334b

336a 337b 341b 374a 396b 409b 416b 421a

429a.

Ileimorbi remedia. 20a 31b 63a 277a.

Impetiginis morbi remedia. 35b 37b 43a

64b 80a 118b 120a 121a 130b 137b 167a 168a

197a 221a 245b 277a 313b 366a 374b 395b

396b.

Inflationes facere. 65b 165b 177b 242b.

Inflationum remedia. 6b 7b 13a 19a 46b

98b 191a 204a 205b 208a 227a 228ab 229b 232a

241a 281b 338a 399a 402ab 403a.

Inflammationum remedia. 10a 12a 39a

45a 48ab 52a 56b 62b 63b 65b 103b 117a 121a b

127b 128b 129b 131a 134a 141b 143a 147a 149b

155a 177a 184b 191b 208a 211a 219a 231ab 259b

270a 277b 283a 297b 304b 315b 317b 319b

320a 334b 337b 381a 385a 393a 396b 414a.

Inguinum morbi remedia. 28b 31a 299a

352a 419b.

Infantiam inducere. 37b.

Infantientium remedia. 289b.

Intertriginem tollere. 39a 62b 174b.

Ischiadicorum remedia. 5b 15a 19a 22a

25a 87a 190a 101b 169a 180b 205b 203a 216ab

223a 214b 241a 280b 282a 285b 286b 287ab

289b 345b 354a 367a 370a 397a 398a 403b

418a 424b.

Iumentorum scabiem emendare. 43a.

47b 65a 134a.

Iumentorum ulcera emendare. 25b

43a.

L.

Labiorum scissuræ remedia. 61a

115a

Lachrymas cicere. 2a.

Lactis ubertatem facere. 52a 111b 130b

183a 237a 265b 401a.

Lassitudinum remedia. 12a 15b 19a

245a 339b 421a.

Laterum doloris remedia. 1b 9a 15a

16b 35a 37a 41a 45a 117b 118b 142a

192b 193a 203a 221a 223a 232b 243b 244b

255b 338a 353b 369b 385a 401b 403ab.

Lendes necare. 47b 118b 143b 165b

395b 419b.

Lentiginis remedia. 2a 10a 11a 23b 96a

116b 120b 133b 136a 142a 148a 166a 178a

242a 244b 248a 271a 384b 424a.

Lepre remedia. 20b 22b 33b 35b 41a

46b 49a 50b 64b 85a 92a 107b 117a 121b

125b 137b 142a 166a 167a 168a 172b 180b

183a 242a 245b 253a 294a 366a 367b 369b

371a 379a 385a 390b 396b 409b 420a.

Leporis marini remedia. 47b 93a 110b

173b 184b 438a.

Lichenas sanare. 78b 85a 107b 166a

191b 242b 390b 420a 421a 424ab.

Lienismorbi remedia. 2a 7b 17a

21a 61a 62b 73b 83b 136a 180ab 185a

188b 192a 193a 198a 206a 211b 226b 234b

245a 300b 358a 390b 402a 424a.

Lippitudinis remedia. 9b 38a 59a

70a 147a 164b 205a 336b 424b.

Locorum muliebrium remedia. 2a.

Lumborum affectuum remedia. 24b 11b

51a 302a 354a.

Luscioforum remedia. 116ab.

M.

Maculas tollere. 23b 29b 193a 384b

424a.

Malorum serpentium remedia. 61b 147a

292a 311a.

Mammarum morbi remedia. 73b 82a

131a 133ab 169b 177a 210b 232a 248b

281b 288a 323b 374a 395b 423a 428ab.

Maxillarum doloris remedia. 107a.

Meatus aperire. 85a.

Meliceridum morbi remedia. 12b 219a.

Menstrua prouocare. 32a 85a 221ab.

324b 330b 242a 256a 349b.

Menses trahere. 8a 9a 10a 11a 12b

13a 14ab 17a 28b 35a 36a 47b 57a 62b

64b 80a 92a 98b 107b 112b 117a 134a

141b 148a 149a 152a 156a 166a 169a 172b

174a

I N D E X.

1742 1802 190b 1912b 2042 205b 209b
2162b 2182b 2232 2242 225b 2312 234b
2372 243b 267b 280b 2872 299b 3122 3662
4012 401b.

Morbi regij medicinae. 6b 51b 612
101b 1072 1172 130b 1382 1412 145b 1462
1492 169b 173b 1792 1862 2052 209b 215b
2392b 2402 255b 258b 2732 2782 2792 280b
287b 289b 308b 313b 3162 317b 3192 3262
3542 3992 4022b 4032b 4202.

Mures necare. 96b.
Muris aranci morfus remedia. 862
109b 1662 205b 314b.
Mufcas necare. 291b.

N.

Narium morbi remedia. 45b 702
195b 4192.

Naufeam discutere. 502 2112.

Nervorum morbi remedia. 5b 132 212
21b 244b 252 312 322 43b 862 95b 98b 120b
1892 195b 200b 2412 2432b 309b 373b 385b
393b 4012 423b.

Nomorum remedia. 15b 40b 472 57b
61b 702 812 1012 1162 1182 1312b 1362 1472
1772 184b 255b 2702 336b 338b 3922 396b
397b 407b 4082 4092 4282.

Nyctiloparum morbi remedia. Vide Lu-
scioforum remedia.

O.

Oculorum morborum remedia. 172
18b 232 35b 382 392b 42b 43b 45b
47b 48b 52b 592 602 68b 70b 73b 922
942 97b 1052 1112 116b 127b 150b 152b
1542 1592 1832 192b 195b 2062 216b 218b 220b
2212 2392 2452 306b.

Oculorum caligines discutere. 2b 102
112 14b 20b 22b 35b 37b 47b 592 612 902
1072 118b 1702 1712 173b 1762 1862 1872
195b 205b 243b 252b 3472b 378b 4082 4232
4262 427b 4282.

Opisthonicorum. id est, ceruicis rigore
laborantium remedia. 28b 201b 2042 2432b
288b.

Opj remedia. 124b 4212.
Oris halitus remedia. Vide, Halitus oris
remedia.

Oris ulcerum remedia. 4b 152 56b 572
61b 63b 66b 70b 1472 2052 209b 2702 2772
304b 3082 3692 391b 4192 4212.

Orthopnoicis. id est, difficulter spiran-
tibus utilia. 152 192 212 352 45b 48b
73b 1182 172b 1742b 207b 2082 215b 216b

2252 228b 234b 2402 2422 2452 2552 267
2972 310b 3382 3382 373b.

Os fracta consolidare. 40b 512.

P.

Palpebrarum remedia. 40b 412
68b 1522.

Panorum remedia. 442 63b 84b 1172
1412 1472 2102 299b 334b 338b 381b 396b
4232.

Papularum remedia. 24b 712
4292.

Partus necare. 5b 48b 1692 172b
2162 221b 3662 3682 3792 3802 3852
404b.

Partus trahere. 222 212 24b 15b
282b 31b 352 372 392 472 64b
98b 112b 1172 1342 1482 1662 1702
185b 192b 1952b 210b 212b 216b 220b
2212 225b 2372 244b 2452 251b 267b
273b 280b 300b 349b 3852 403b 419b
4202 4292.

Paronychiarum. id est, unguium morbo-
rum remedia. 37b 712 106b 3122.

Parotidum. id est, aurium apostematum.
remedia. 84b 117b 129b 131b 1382
1472 169b 246b 281b 3242 325b 338b
4292.

Pectoris morbi remedia. 1b 132 352
39b 412 46b 119b 163b 1702 174b
186b 1912 208b 2212 2392 245b 3382
401b 4022 4032.

Pediculos necare. 252 47b 165b 185b
418b.

Pedum rimarum remedia. 932
1792.

Perfrictionis medicinae. 222 202 2262
243b 402b.

Pernionum remedia. 28b 37b 61b 84b
103b 1152 1332 1342b 145b 173b
1762 177b 1792 345b 393b
419b.

Peripneumoniacorum remedia.
2072.

Phalangiorum ictus remedia. 33b 51b
70b 832 862 932 139b 145b 1562
185b 205b 2172 2422 247b 2552
256b 2872 3132 3192 336b 349b
395b.

Phagedæna morbi remedia. 188b 197b
223b 2252 345b 375b 384b 397b
419b 4212.

Phreniticorum remedia. 62b 2182
2412.

Phthiriasis. siue pedicularis morbi reme-
dia. 242 52b 3692 4192.

* iij

I N D E X.

Phthisis. 434 349 b 425 b.
 Pituitæ remedia. 24 b 25 a 51 a 61 a 136 a
 166 b 170 b 173 a 183 a 216 b 238 a 240 a 243 b
 255 b 294 a 366 a.
 Pinorum erucæ. 27 b 131 b.
 Plagarum uibices emendare. 30 a.
 Pleuriticorum remedia. 195 a 345 b.
 Podagræ morbi remedia. 12 b 45 a 49 b
 63 a 65 a 92 a 99 a 103 b 115 a 116 b 117 b 141 b
 150 b 152 b 173 b 176 b 178 a 211 a 223 a 239 a
 259 a 267 b 320 b 323 b 334 b 336 a 336 b 340 b
 367 a 371 a 381 a 389 b 391 a 409 b 420 a 421 a
 425 b.
 Polypi morbi remedia. 174 b.
 Preteritis serpentis morsus remedia. 304 b.
 Præputiorum morbi remedia. 205 a.
 Præcordiorum remedia. 60 a 69 b 191 a
 206 a 402 a 403 a.
 Pruriginem emendare. 84 b 209 b 211 a
 341 a 369 a 371 a 420 a 429 a.
 Psoræ morbi remedia. 22 b 23 b 85 a 88 a
 113 a 186 b 209 b 308 b 369 a 371 a 385 a 390 b
 395 b 421 a.
 Pterygii morbi remedia. 61 b 68 a 71 a
 84 b 97 b 194 b 205 a 255 b 375 b 391 b 396 b
 409 b 419 b 421 a.
 Pulmonis morbi remedia. 13 b 15 a 47 b
 80 a 84 a 159 a 168 a 210 b 211 a 295 a 308 b 314 b
 338 a 369 b 402 a 403 a.
 Pulices necare. 266 a 297 b.
 Pus mouere. 44 a 111 b.
 Putredines purgare. 19 a 270 a 297 b 391 a
 421 a.
 Q
 Vartanæ febris remedia. Vide, Fe-
 bris quartanæ remedia.
 R
 Rucescinis remedia. 36 a.
 Reduias sanare. 61 a 63 b 70 a 308 b
 385 a 391 b 409 b.
 Refrigerantes medicina. 22 a 25 b
 27 a b 60 a 61 b 195 a 149 b 150 b 154 b 230 b
 231 b 292 a 297 b 320 a 324 a 325 b 335 b
 336 b 340 a 341 a 348 a 352 b 390 a 396 b 399 b
 406 b 410 a b 425 a 428 a 429 a.
 Renum doloris remedia. 3 b 5 b 6 b
 7 b 10 a 11 a 12 b 13 b 14 a 23 a 25 a 69 b
 80 a 84 a 88 b 105 a 110 b 118 a 119 a 145 b
 147 b 157 a 184 b 190 b 191 a 194 a 203 b
 226 a 232 b 234 b 236 a 276 a 279 a 287 b
 289 b 295 a 300 b 391 a 399 b 402 a 403 a b.
 Rheumatismis utilia. 84 a 105 a 392 b.
 Rigores seu horrores febrium excutere.
 32 a 170 a 238 a.
 Rimarum sedis remedia. 21 b 24 b 61 a
 62 b 93 a 101 a 198 b 205 a 267 b.

Rosionis remedia. 9 b 110 b.
 Ructum mouere. 234 b.
 Ruptorum remedia. 2 b 5 b 14 a 192
 37 a 46 b 47 b 55 a 86 a 117 b 174 178 a
 180 a 190 b 192 b 195 a 202 b 203 a 207 b
 209 b 215 b 218 a 220 b 223 a 239 a 243 a b
 244 b 259 a 282 a b 289 a 296 a 300 b 310 b
 343 a 385 a 413 b 426 b.
 S
 Aliam euocare. 170 b.
 Salamandræ ueneni remedia. 433 b.
 Sanguinis reiectio. 13 b 15 b 40 b 63 a
 63 b 65 b 70 b 73 b 80 a 117 b 121 a 128 b
 147 b 163 b 190 b 199 b 282 a 358 a 403 b 425 a
 428 b.
 Sanguinem sistere. 45 b 92 a 100 a 104 b
 108 a 103 b 188 b 205 a 213 b 221 a 228 b 309 a
 310 a 339 b 396 b 416 b 420 a 424 b.
 Sanguinē concretum discutere. 45 a 86 a
 216 b 230 a 315 b.
 Sanguinem per urinam expellere. 47 a
 133 b.
 Sanguinem per nares expellere. 198 a.
 Sanguinem per urinam reddentium re-
 media. 230 a.
 Sanguis fugas necare. 102 b.
 Scabiei morbi remedia. 5 b 10 b 64 a
 69 b 130 b 154 a 166 a.
 Scolopendræ morsus remedia. 86 a
 177 b 421 a.
 Scorpionis ictus remedia. 4 b 5 b 11 b
 33 b 48 b 70 b 85 a 93 a 94 a 98 a 101 a 105 b
 108 b 109 b 117 b 118 b 137 b 138 a 149 b 150 b
 156 a 159 b 177 b 207 b 218 b 231 b 237 b 242 b
 249 a 252 b 255 a 295 a 345 a 378 b 389 a b
 395 b 420 a 427 b.
 Scorpionis marini ictus remedia. 159 a
 410 a 420 a.
 Secundinas pellere. 14 b 29 a 39 a
 58 a 98 b 104 a 139 a 210 b 255 b 265 b 267 b
 280 b.
 Sedis inflammationis remedia. 22 b 28 a
 105 a 132 b 238 b 295 b 340 a.
 Sedis morbi remedia. 40 a 43 a 60 a
 70 a 71 a 73 b 115 a 139 b 149 b 173 b 400 b
 410 a.
 Sensus recreare. 156 a.
 Sepis bestiolæ morsus remedia. 108 b
 145 a 397 a.
 Serpentium uenenis resistere. 98 b 99 a
 100 a 168 a 196 b 223 b 251 b 258 b 300 a.
 Serpentes fugare. 47 b 107 a 115 a
 199 b 207 b 210 a 216 a 241 a 242 a 244 b
 256 a 258 b 291 b 427 a.
 Serpenti ictus remedia. 2 a b 15 a 19 a b
 33 b 37 a 43 a 45 a 46 b 48 b 53 b 55 a 62 b 81 a
 83 b

I N D E X.

81b 93a 98b 99a 101b 104ab 116b 117b 118b
 103b 170a 173b 177a 190b 192b 199b 204a
 207b 209b 210a 211ab 215b 220b 221a
 224a 226a 228b 230ab 234b 235b 236a
 239a 243b 248b 249b 250a 253ab 255b 256b
 257a 258b 280b 289b 294a 307b 315a 318b
 323b 358a 391a 403b 411a 413b 428ab.
 Serpentes necare. 244b 401b.
 Siccantes medicinare. 304b 320a.
 Singultum pellere. 98b 148a 191a 193a
 215b 228a 229b 275a 297a.
 Sirialis remedia. 152b 154a 155b 189b.
 Sitim generare. 165b 179b.
 Sitim extinguere. 84a 194a 217a 295a.
 Somnum conciliare. 12a 30b 32a 62b
 80a 116a 220b 299b 300ab 391a 403a.
 Sordes purgare. 47a.
 Spicula corpori infixa extrahere. 31a
 35b 100b 175a 193a 299b 300a 312a 371a
 381b.
 Squamas ossium extrahere. 15a 191a
 241a 244a.
 Sternutamenta mouere. 98b 159b 166b
 173a 181b 164a.
 Strigatum remedia. 181b.
 Stomachi morbi remedia. 11b 16b 25b
 27a 39b 40b 49b 60a 69b 70a 80a 83b
 91a 104b 144b 149b 178a 190b 191a 205b
 219a 231b 232b 259a 271b 304b 340a 427b.
 Strumæ remedia. 2a 43a 85b 99a 103b
 117ab 111b 111b 134a 138a 147ab 170b
 180a 230b 238b 248a 255a 281b 308b 328b
 337ab 338b 351b 358a.
 Strangulatus remedia. 31a 28b 45a 182a
 Stranguriæ morbi remedia. 47b 146a
 215a 236b 249b 275a 285a 300b 312a 341b
 353b.
 Sudorem deprimere. 16b 20ab 22a 24b
 25b 27b 60b 178a 220a 423b 428b.
 Sudorem euocare. 84a 174a 214b
 218a 239a 240b 285a 301a.
 Suffusionum morbi remedia. 173b 242b.
 Sugillatorum remedia. 111a 131b 156a
 165b 172a 178a 205b 208a 216a 218b
 239b 369b 385a 431a.
 Suppurationum remedia. 169a 213b 318a
 352a 418a.
 Sulfuriis remedia. 17a 21a 43a 103b
 147a 179a 190b 208a 255b 277b 283b 318a
 369b 402a 419a 420a.

T.

Tenesmi morbi remedia. 28b 119a 144a.
 Testium morbi remedia. 71a 110b 169b
 77a 212b 211a 230ab 253b 223b 340a 391a
 411a 428ab.

Theriomatum remedia. 32a 113b 114a.
 Thoracis remedia. 2b 48b 84a 163b
 169b 194a.
 Tibiarum ulcerum remedia. 84b.
 Tineas laras pellere. 5b 11a 70a 81a 83a
 142a 165b 196b 242a 300b 383b 389b 416b.
 Tineas necare. 35a 208a 215b.
 Tonfillarum morbi remedia. 43a 47b
 61a 78b 83a 106b 118b 166b 205a 209b
 291a 297b 317b 334b 391b 400b 408a
 416b 419b 421a.
 Torminū remedia. 2ab 3b 5b 15a 16b
 30a 46b 55a 82a 84b 98b 106b 111a 125b
 148a 170a 179a 190b 191a 195a 204a 215b
 218b 211a 235a 235b 228ab 229b 230b 232b
 237a 238b 241a 248b 255a 256b 266a 284b
 287b 302b 351b 395b 399a 401b 403b 422b.
 Tremorem excutere. 33b 96a 98b.
 Tuberculorum remedia. 83a 134a 165a
 172b 177a 204a 207b 223b 230b 245a 246b
 266a 285a 314a 328b 314a 356a 367a 369b
 381b 414b 419a 423a.
 Tumorum remedia. 52b 55a 66a 152b 168a
 172a 183b 199b 210b 216b 218b 224a 234b
 237b 239a 242a 270a 273a 278a 283a 293a
 300b 308b 317b 324a 334a 341b 343a 348a
 359b 367a 378b 381b 414a 419b 423a.
 Tussis remedia. 2a 5b 11a 14a 15a 18a 35a
 36a 37a 39b 40b 41a 43a 45ab 46b 47b
 55a 58a 61a 72a 80a 82b 84a 118b 110a 121a
 124a 129b 136a 165b 170a 172b 174b 179a 195a
 203b 208a 209b 210b 220b 221a 235b 232a
 234b 237a 241a 243a 244a 255b 259a 310b
 320a 323b 314b 343a 352b 358a 385a 391a 396b
 401a 402ab 403ab 419a 420a.

V.

Varos purgare. 25b 30a 35b 108b 119b
 163b 164b 178a 211a 271a 274a 284b
 418a.
 Varices sanare. 350b.
 Venerem cohibere. 109a 155a 156a.
 Venerem stimulare. 13a 18b 108b 134b 157b
 163b 168a 176a 177b 213b 225a 227a 270b
 273a 300a 318a 319b.
 Venas excitare. 4b.
 Venarum spiracula aperire. 21a 29a
 31a 32a 33ab 38a 118b 166a 174a.
 Venenatorum ictus remedia. 7b 11a 15a
 62b 65b 85a 113a 121a 191a 211b 397b 401b.
 Venenorum remedia. 20a 43a 61a 74b
 82a 96a 98b 136a 139b 169b 190b 193b 204a
 207b 215b 232a 289b 297b 308b 347a 357b
 361b 397b 416b.
 Verrucas tollere. 27b 85ab 108b 181b
 216b 221a 278b.

Vertiginis

INDEX.

- Verriginis morbi remedia. 154 241 244 b
385 ab 398 a.
- Vesicae morbi remedia. 36 76 484 554
69 b 70 b 84 a 92 a 105 a 107 a 110 b 119 a 139 b
144 b 147 b 153 b 154 a 157 a 178 b 191 a 194 a
203 b 223 a 232 b 234 b 241 a 273 b 279 ab 289 b
348 a 391 a 403 ab 427 b.
- Vesparum ictus remedia. 484 139 b 148 a
282 a 421 a.
- Viperæ morsus remedia. 104 126 466
49 a 96 a 103 b 118 a 121 a 134 a 136 a 141 b 152 a
165 b 179 a 184 b 240 b 247 b 297 b 300 b 302 a
381 a 384 a 390 b.
- Virium infirmitates roborare. 39 b 68 b
84 a.
- Viscerum morbi remedia. 69 b.
- Vitiliginis remedia. 23 b 48 b 71 a 85 ab
92 a 96 a 97 b 131 b 134 a 143 b 152 a 164 b 166 a
170 b 176 a 177 b 180 a 189 b 192 b 197 b 211 a
239 a 253 a 273 b 300 b 366 a 371 a 373 a 420 a
424 a 429 a.
- Vocem claram reddere. 142 a 165 b 398 a.
- Vomitiones mouere. 31 b 48 a 91 b 136 ab
154 a 178 b 180 a 283 b 370 b 371 a 374 a 416 b.
- Vomitiones cohibere. 50 a 131 a 148 a 215 b
218 a 228 a 302 b.
- Vomicæ morbi remedia. 327 b.
- Vrinæ harenosæ et asperæ remedia. 311 b
424 a.
- Vrinæ stillicidio auxiliari. 26 36 56 144
102 b 145 b 148 a 223 a 230 a 232 b 249 b 265 b
284 a 292 a 315 a 363 a 425 a.
- Vrinam citatam sistere. 27 b.
- Vrinam mouere. 263 b 46 66 76 84 94 b
104 114 126 136 144 154 186 304 316 374 394 b
406 414 466 554 574 584 646 656 704 b 726
736 804 886 109 b 118 b 121 b 122 a 125 b 1304
136 b 139 a 147 b 148 a 153 b 156 b 157 b 172 b 199 b
202 b 286 b 218 a 221 a 227 a 228 a 232 a 239 a
242 a 318 a 338 a 363 a 384 a 400 a.
- Vulæ remedia. 434 66 b 78 b 106 b 209 b
338 b 391 b 396 b 408 a 419 b 421 a 427 b.
- Vulnorum remedia. 37 b 39 b 45 b 50 b 62 b
68 b 83 b 108 a 145 a 173 b 176 a 188 b 194 b
195 a 253 a 281 b 301 a b 393 a.
- Vulvæ remedia. 36 46 66 126 136 146
154 166 b 186 19 a 23 a 25 b 27 ab 28 ab 29 a
30 b 31 a 32 a 33 b 35 a 36 a 38 a 40 a 43 a 45 a
46 b 48 a 52 b 58 a 60 a 61 b 62 b 65 ab 67 b
69 b 70 a 71 a 73 b 86 a 102 b 107 a 111 b 113 a
115 a 118 a 119 a 130 a 139 b 145 a 147 b 149 b
163 b 166 b 190 b 191 a 195 a 211 a 211 a 213 a
218 a 240 a 244 b 266 a 267 b 277 b 279 a 282 a
284 b 283 a 294 a 317 a 378 b 400 b 402 a.

Indicis Curatiui Finis.

PEDANII DIOSCORIDIS ANAZARBEI, DE MEDICINALI MATERIA LIBER PRIMVS, IOANNE RVELLIO SVESSIONENSI INTERPRETE.

Singulis stirpium historijs, uicis, & ad naturæ æmulationem expressis imaginibus seu picturis adiectis: ut ea quæ nudis uerbis exponit historia, rectius exprimeret, atq; adeo altius animo infigeret artificiosa pictura. Additis etiam annotationibus breuissimis quidem, quæ tamen omnem controuersiam de medicinali materia facile tollunt. Ex doctissimorum uirorum lucubrationibus summo studio concinnata.

IRIS. CAPVT I.

Iris Florentina.



Iris Germanica.



IRIS à cœlestis arcus similitudine nomen accepit. Folia fert gladioli, sed maiora, latiora, & pinguiora. * Flores à caule æqualibus inter se spacijs distant uarij: siquidem candidi, pallentes, lutei, purpurei, aut cœrulei conspiciuntur, quæ diuersi coloris specie, quædam cœlestis arcus imago representari uidetur. Radices subiacent geniculatæ, duræ, odoratæ: quæ frustum dissectæ, in umbra siccantur, & traiectæ lino reconduntur. Melior est Illyrica, & Macedonica: & inter has laudatissima, quæ pœmilia ferè

A

D I O S C O R I D I S

** Alij feruido.* A & densa constat radice, frangenti contumax, subrufo colore, gustu amaro, * odore perquam sincero, ita ut nullum prorsus situm redolet. quæ dum tunditur, sternutamenta mouet. Secundum locum habet Africana, candicans, gustuq; amara. Terebinthes in uetustate sentiunt, tunc tamen odoratiores reddi solent. Vis omnibus ex calfaetoria, extenuans, contra tussim efficax. humorum, qui ægrè reijciuntur, crassitiem digerunt. bilem crassamq; pituitam ex hydromelite drachmis septem epotæ purgant. somnum conciliant. lachrymas ciunt. torminibus medentur. Eadem potæ ex aceto auxiliantur serpentium ictibus, lienosis, conuulsis, perfrictionibus, horribibus, & quibus genitura effluit. menses ex uino potæ pellunt. Decoctum earum, sceminarum fortibus utiliter imponitur, ad emolliendos locos, laxandaq; in eis uenarum spiracula. ischia dicis infunditur. fistulas ac sinus carne explet. Radices ex melle glandis modo subditæ, partus extrahunt. quin etiam coctæ & illitæ, strumas, ueteresq; duritias emolliunt. Siccæ quoq; ulcera replent, & cum melle purgant. nudata ossa corpore operiunt. doloribus capitis, cum aceto & rosaceo magna utilitate illinuntur. Ad motæ cum albo ueratro & duabus mellis partibus, lentiginis & uitiæ cutis in facie à sole contractæ, maculat. pelsis, malagmatis, & acopis inferuntur. In uniuersum, magni ad omnia usus.

NOMINA ET EXPLICATIO.

IPIZ, Græcis. Latinis Iris. Germanis, Himelschwertel/Blaw liliën/ & Violwurg. Brabantis, Lis ouer See. Galis, des flambes, à foliorum similitudine, quæ flammæ linguas referunt, dicta. Quinetiam nonnulli gladiolum appellauere eadem ratione: unde in quibusdam Gallie partibus nomen adhuc retinet: nōcant enim, du glaiz. Officinis proprium nomen retinuit.

Gal. lib. 1. Anti. Iridis radix laudatior parua, densa, frangi contumax, subrufo, amara, sternutamenta dum tunditur ciens, odorata, qualis ex illiride mediterranea Dioscoridi, Galeno, cæteris omnibus predicatur: ob id eam illiridem *Gal. lib. 6. & uocare consuevit Andromachus.* Elige autem in illiricæ genere odoratiorem: nam unumquodq; est præstantissimum, quod generis sui odorem habet ualentissimum. *Iris* autem quæ ex Libya magna Romam affertur, tantum ab illirica differt, quantum corpus mortuum à uiuo. Quæ autem in alijs regionibus crescit, non ita multum deficit: unde Iris Gallica alba purgata usurpatur lib. 8. comp. pharm. part. & hodie passim pro illirica, *Gal. li. 1. A. 1. Lib. 9. c. ph. p.* Florentina nobis obtruditur.

Iris coquit, tenuat, calfacit, pituitam crassam & bilem purgat, humorem ex pulmone crassum expulsores.

Acorum. Caput II.

Acorum folia iridis habet, angustiora tamen: radices non dissimiles, complatas, non in rectum sed obliquum actas, & summo cespite sparsas geniculis interceptas, albicantes, gustu acres, odore non ingratis. Optimum est denium, candidum, plenum carie, non exesum, odoratum, cuiusmodi Colchidicum & Galaticum, quod asplerion dicunt. Radici uis calfactoria. Decoctum potu urinam cit. prodest lateris doloribus, & iecinoris atq; thoracis: item torminibus, uulsis, ruptis, lienem absumit. urinæ stillicidio, & serpentum ictibus auxiliatur, insidentibus ad mulieres affectus iridis modo utiliter imponitur. oculorum caligines succo discutit. antidotis radix magno usu commiscetur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

AKOPON & Aphrodisiam Græci uocant. Aphrodisiam uerò à Venere, quàm *Apopos* & *lar* uocant, & hos Latini etiam imitati Veneream appellauerunt, & radicem nauticam, eo quod plurimum in secus amnes & in aquis natales suos habeat, licet etiam in alijs locis nascatur: sed primæ habentur, sumq; in prima bonitatis æstimatione acori radices, quæ in aquis nascuntur, autore Plinio lib. 25.

Acorus gustu acri, & modicè amaro, odore iucundo, tenui consistenteria, calidus, siccus ordiæ tertio. Is nūc esse uidetur quibusdam Calamus aromaticus, alijs potius Galanga. Quibus repugnat Aëtianus in antidoto alexandria Alexandri, in qua γαλαδρυαπ (sic enim cum Arabibus uocat) & multis interiectis, acorum, eodem pondere, ad finem uerò calami aromaticum, diuerso pondere, misceri scribit,

Acorus

LIBER PRIMVS.

Acorum.



Acorum, quod hodie Officina falso utuntur. A
Germanis, Ackerwurz. Geel schwer
sel. Drachenwurz. Geel
wasser Lilien.



Acorus omnino uerus, magnitudine iros, Galanga maior hodie Officinis, Gallis Galange grosse, ou gran-
de Galange. Germanis, Groß Gulgant wurzel/dictus. Ignotus tamen quibus adhuc est, eius loco galan-
gam minorem magno successu miscuerint, interdum calanum odoratum. Qui uero nobis frequens ostendi-
tur, palustris acorus est, & aliqua saltem acori species, insipidus, inodorus, substantia crassa, frigidus, siccus,
& xiri planta acri diuersissimus: quadripartito tamen scetus, & sole siccat, triennio seruat: non utendus
hic, nisi medicus imperauerit. Veri autem prouentus nunc uberrimus ubiq; conuehitur ex India, Lusitanorum
(ut audio) navigationibus.

Meum. Caput III.

Meon, quod Athamanticum uocant, in Macedonia & Hispania plurimum gi-
gnitur, anetho * folijs & caule simile, sed eo crassius, binum ferme cubitorum * Alq aniso.
altitudine attollitur, sparsis in obliquum rectumq; radicibus, longis, tenuibus, odo-
ratis, linguam ex calfacientibus. Quæ feruefactæ ex aqua, uel trita citra coctionem,
præclusorum renum uesciæq; farctæ uitia potu leniunt, uring difficultati medentur,
stomachi inflationes discutunt. Torminibus, affectæ uulvæ, articulorum dolori-
bus, atq; fluxionibus pectoris, trita cum melle in eclegmate auxiliantur. sanguinem
per menstrua pellunt, defensionibus feruefactæ, infantibus autem illita imo uentri,
urinas mouent, quod si plus quam deceat ex his bibatur, caput dolore afficiunt.

Galen. libro 1.
Antido.
Galen. lib. 9.
comp ph. p. &
lib. 7. Simp.



Erysiceperi nomen etiam peculiare & commune est aspalatho & uerbenace, à calathio & uirga.
Nan

DIOSCORIDIS

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis Μεύον & Διόσκοριδος. Meum seu Meon Latinis.
Officinis anethum, pluesche hodie uocant.
Germanis, Deerrwurzt.
Gallis uulgo feniculus tortuosus dicitur. apud Allobroges mōs
kanos, Curach.

MEUM, nobis frequens, Dioscoridis picturam explet, ta-
men præstantius Macedonicum, aut Hispanicum: sed Athaman-
ticum laudat Andromachus minor. in sua Theriace.

Calidum est ordine tertio, sicum secundo: urinas & menses
mouet, ut asarum, sed largo usu cephalalgicum est.

Marcellus Vergilius Florentinus hic perperam & falso le-
git, tum apud Plinium, tum apud Dioscoridem: caule folijsq; an-
etho similibus: cum hæc herba, quam hic meon, ille meo uocat, ca-
ule & folijs anetho similis sit. Et sic etiā meon interpretantur Me-
dici recentiores, dicentes, id esse agrethe anethum.

Herbam, Germanis Deerrwurzt dictam, quidā non male Tor-
dylon siue Sefeli Creticum affirmant.

Cyperus. Cap. IIII.

Cyperus, quem aliqui erysiceptrum, ut a-
spalathum appellant, folia fert porraceis
proxima, sed longiora & exiliora: caulem odo-
rati iunci, cubitalem aut maiorem, angulosum, in
cuius acumine minuta folia cum semine exoriun-
tur: radices, quarum in medicina est usus, coha-
rentes inter se, oleis oblongis similes, aut rotun-
dæ, nigro colore, suauis odore, amaro gustu. In la-
cunosis, palustribus & cultis enascitur. Optima
est grauiissima, densa, fractu contumax, plena
& aspera, odoris cum quadam acrimonia iucun-
di, qualis est Cilicia, Syriaca, & quæ à Cycla-
dibus insulis petitur. Huic calida uis inest. Ve-
narum spiracula laxat, urinam ciet, ad calcul-
los, aquamq; subter cutem utilissimè bibitur,
aduersus scorpionum ictus remedio est, perfric-
tionibus uulgi, & præclusionibus, fotu pro-
dest, pellit menses. Contra ulcera oris, etiam si
depascent uorentq; farina eius efficax est. Ma-
lagmatis calfacientibus, & unguentorum spiss-
samentis bene adijci solet. Aliud cyperi genus
tradunt in India nasci, gingiberis effigie, quod
manducatum croci uim reddit, gustu amaro
sentitur, & illitum præsentem phloethri uim
exhibet.

NOMINA ET EXPLICATIO.

GRÆCIS κύπερος & κύπερος & δὲ ἐρύσσειον
ἄσπελον.

Cyperus & Cypirus Latinis dicitur.

Officina Latinum nomen adhuc retinent.

Germani uocant, Wilde galgen/ Seldkircher Gal-
gent, ubi magna copia prouenit, etiam locis incultis.

Gallis, sonchet & galange sauvage.

LIBER PRIMVS.

Nam Græci $\epsilon\upsilon\sigma\upsilon\gamma\alpha\lambda\alpha\theta\iota\upsilon\mu$ vocant, & $\sigma\pi\omicron\tau\alpha\mu$ uerò $\sigma\epsilon\pi\tau\tau\upsilon\mu$ & uirgam. Sicq; dictæ sunt, coquod caules & uirgæ ipsorum uirides lentore suo in calathos, $\sigma\pi\omicron\tau\alpha\varsigma$, tegetes, & id genus alla texti, & in nexu circumagi possunt.

Cyperus seu radix cyperi calefacit, seccat sine morsa, substringit, incidit, ulcera præhumida cicatrice claudat, calculos frangit, urinam & menses mouet, oris halitum commendat, ut lignum aloës uerum.

Cyperus Indicus inter zingibris radices inuentus, Curcuma Venetijs, in Gallia uulgo terra merita dicitur, Galen. libro 1. comp. ph. p.

Curcuma.



Cyperus Babylonicus.



Ad odoris gratiam cyperus additur tenuantibus capillos. A figura caulis, iuncus triangularis Plinio: quadratus Celso. licet rarò hic quadrangulus: angulosus Dioscoridi, non defuncto angulorum numero.

Cyperus Babylonicus galanga quibusdam dicitur, uulgaris scilicet ac minor, nam maior, acorus esse dicta prius est. Est autem Actuarius, Barbaros in multis imitato, radix subrubra, geniculata, intorta, grauis, sapore acerrimo linguam admodum uellicante, calida, sicca tertio gradu, odore & figura quadam cyperi. Coctionem inuau, flatu dissipat, oris halitum commendat, uenerem excitat, etiam ore retenta, cerebrum roborat, & naribus indita, cordis palpitatiõni proficit. Germanis Galgant wurzel. Gallis galange dicitur.

Serapio.

Cardamomum. Caput V.



Cardamomum optimum est quod ex Comagene, Armenia, Bosphoroq; deuehitur. In India quoq; & Arabia prouenit. Eligi debet plenum, fragenti contumax, oclulum, fæctumq; (quod enim huiusmodi non est, exoletum iudicatur) & gustu acre, subamarum, & odore caput tentans. Ex calfactoriam uim habet, potumq; ex aqua facit ad comitiales, ischiadicos, tussis, neruorum resolutionem: item adrupta, uulsa, tormina. Iatas uentris tinea excutit. Ex uino autem potum, renibus, difficultati urinæ, à scorpiõne ictis, neq; non omnibus uenenum uiuantibus, auxilio est. Cum cortice radi cislauri epota drachma calculos comminuit, partus si fitu enecat, scabiem ex aceto illitum adimit. Et ad unguentorum spissamētā additur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis $\kappa\alpha\phi\delta\alpha\mu\omicron\mu$. Officina Latinum nomen retinuerunt. Germanice Cardamomlin. Cardamomum maius, minus uerò Paris F&Sner nuncupant, quemadmodum & officina distinguere solent.

Galli melegeite, grains de paradis. Cardamomum minus, maius uerò Latino nomine & officinis usitato nominant.

Iacobus Syluius nostra tempestate doctissimus medicus, contendit Cardamomum Serapionis utrumq; tam maius, quod Granum paradisi & mellegetam uocatum putant pleriq; quàm minus, nihil habere commune

DIOSCORIDIS

Acum uero, id est, Dioscoridis & Galeni Cardamomo. Sed Valerius Cordus, eximie eruditionis iuuenis, patet-
ris uestigijs insitens, incredibili restaurande medicina studio amoris flagrans, contrarium asserit, scilicet
nos uerum Cardamomum hodie non desiderare, cum Dioscorides fructum frangenti contumacem, non semen, in-
tellexerit. Habet enim semen quasi in capsulis, unde Graecis capsicon nuncupatur. Vnde apud Galenum legi-
tur: καρόα καμύου δ' ἐστὶ σπέρμα, non quod ab internis purgatum est, & interiore sua parte euacuatur,
sed uidelicet cuncto, sed cui exterior cortex capsulae detractus est, durus & frangenti contumax.
Cardamomum nigrum, lib. 9. comp. ph. part. & antid. & in theriaca, ad Pisonem.
Blasarius Ferrariensis inter tria Cardamomi genera solam amaritudinem desiderat.

Nardum. Caput VI.



Dvonardigenera: unum Indicum, alterum
Syriacum appellatur, non quod in Syria
proueniat, sed quod in otis, in quo oritur, pars
una ad Syrios, pars altera ad ludos flectitur.
Ex hoc Syriaci genere precipuum est recens &
leue, largam gerens comam, flauum colore, per
quam odoratum, ac cyperum redolens, breui
spica, amaro sapore linguam siccante, quod diu
in sua odoris gratia permaneat. Ex Indicis au-
tem nardum quoddam Gangitis uocatur, à flu-
uio Gange, apud quem enascitur, montem præ-
terfluente, quod genus ob multam loci, in quo
prodit, uliginem, uiribus infirmus est, atque pro-
cerius adolefcit, plures ferens spicas ab unica
radice comosas, unaque conuolutas, ac grauiter
olentes. Montanum autem odoratius, spica bre-
ui ac mutila, odore cypero uicino. ceteras ha-
bens Syriaci dotes. Est & genus quoddam cui
Sampharitico nomen locus indidit, frutice bre-
ui, in magnas se spargens spicas, candidiore in-
terim medio caule, hircorum uirus supra mo-
dum redolente, quod improbat. Madefactum
uendi solet, quod uitium ex eo deprehenditur,
quod candida sit spica, & squalida, nulloque pul-
uere obfita. Adulteratur stibio cum aqua, aut
palmeo uino, inspissationis ponderisque causa
inspirato. Intueri autem oportet, si lutum, radi-
cibus infideat, & in cerniculo puluerem excute-
re, eluendis manibus utilem. Vim habent exca-

factoriam & exiccantem. Vrinam mouent: aluum potu sistunt, uulue profluvia, sa-
niemque apposita supprimunt. Nausee ex aqua frigida auxiliantur, & stomachi rosio-
nibus, inflationi, iecinori, regio morbo, renum uitijs. Aquæ autem incoctæ fotu ad
infectum, uulue inflammationibus medentur, ad glabras oculorum genas ualent: si-
quidem eas ad densiorem pilum reducant, perfusis humore corporibus inspargun-
tur. Miscentur antidotis, & in fistili non picato ad ocularia medicamenta recondun-
tur, trita in farinam, & cum uino in pastillos coacta.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Nάρδος Græcè. Spica nardi, & nardus Latine nominatur. Officina Latino nomine uocant. Carma-
nis, Edelstembd woltrichende Spic en nardi. Latino serè nomine. Gallicè, Aspic doultre mer.
Galen. libr. 9. Nardi spica & radix, calida excessu primo, sicca secundo: astringit, subacris, & leuiter amara, secus &
simpli. stomachum roborat, sumpta & admota, urinam ciet, fluxiones intestinorum, capitis, thoracis siccat.
Lib 6. & 3. c. Nardus igitur est mista substantia & facultatis tum digerentis, tum repellentis, & odorantis. Nardus
ph. p. prætere uim habet non exiguam coquendi omnes frigidas dispositiones. Ea est omni plex, præstantissima est
Indica.


7

A
Lib. 9 c. ph p.
Lib. 6. c. ph. p.
Lib. 1. Ann.

Lib. 9 c. ph p.
Gale. lib. 7. ph.

par.
Lib. 1. Anti,
Luc. Syl.

Caput VII.



B

Latinis, qui Græcam appellationem imitantur, Celticum *nardum*. Officinis
Spica *celtica* & *nardum Gallicum*.

ioscorides tradit, Salicem nominatur.

Gal. lib. c. phar
Lib. c. co. ph.
Ibidem.
Lib. 1. Antido,

Caput VIII.

A 4

DIOSCORIDIS

A men spinosis asperisq. Radicibus binis niritur, aut pluribus, nigris, odoratis, ceu lxx
stule regie, sed longè gracilioribus, & longè minoribus. Neq; caulem, neq; fructum,
neq; florem profert. Ad eadem ad quæ Celticum efficax.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis ὀπὺν νάρδεσ. Latinis montanum nardum dicitur. Hodie hoc omnino caremus.

Asarum. Caput IX.

A Sarum, quod & ipsum aliqui sylvestre nardum ap-
pelant, hedere folijs, minoribus * multo, rotundio-
ribusq. floribus cytini, hyoscyami, purpureis. inter fo-
lia proximè radicem emicantibus, odoratis, in quibus
semen acinosum (* Cauliculos habet angulosos, aspe-
ros & molles) radices numerosas, genicularas, tenues,
obliquas, graminis non dissimiles, longè tamen gracilio-
res, odoratas, excalfacientes, & quæ linguam uehemen-
ter mordent. Excalfactoriam uim habet, urinam cit, hy-
dropicis & uetusto coxendicium dolori prodest. Radices
senis drachmis ex aqua multa potæ, menses trahunt, & ue-
ratri albi modo purgant. In unguenta additur. Vmbro-
sis montibus prouenit, sed plurimū in Ponto, Phrygia,
Illirico, & Italiæ Iustinienfi * agro.

* Alij densiori-
bus.

* Abundat hæc
clausula.



* Iustinienfi, ui-
detur abundan-
te, cum hic au-
tor longè ante
Iustinum Cæsa-
scripserit.

NOMINA ET explicatio.

ΑΣΑΡΟΝ Græcis.

Asarum Latinis. Officinæ ge-
nuinum nomen retinuerunt.

B Germanis Haselwurz. Brä-
bantis, Mansdooren. Gallis Duca-
baret appellatur, syllabarū metha-
testi. Bachar enim uocabant olim.

Iac. Syl.

Asarum ualet folijs, flore, semi-
ne, sed efficacissimum est radice,
ellebori albi modo purgatoria, Dio-
scor. Galenus tamen in hierapicra
etiam asarum recipiente, solam
aloën purgatoriū uim habere scri-
bit, asarum uerò humores malos
ad urinas deducere, uires habere
radices acori, sed ualentiores.

Fodienda est cum folia mittere
Galen. lib. 12. incipit, & in sole siccanda (nisi
comp. ph. p. & recens utenda sit) quia in umbra
lib. 6. Simp. situm celeriter trahit & senescit,
præcipuè ex locis riguis: Ex ma-
eris autem & sitientibus (quæ im-
primis amat) minus est putredini
obnoxia.

Phu. Caput X.

Valeriana.



Phu

Phu, quod & aliqui syluestre nardum appellant, nascitur in Ponto, folio olus-
tri, aut elaphobosci, caule cubitali, aut altiore, leui, cauo, molli, in purpuram ver-
gente, geniculis intercepto, florib. nar cisso proximis, maioribus, * teneris, & ex al-
bicante purpureis: radice superius ad digiti minoris crassitudinem, ex obliquo uil-
losa in nigri ueratri aut iunci odorati modum: capillamentis inuicem contextis, fla-
uescentibus, odoratis, cum quadam odoris gravitate nardum amulantibus. Ex cal-
facit, urinam mouet, si sicca potui detur. Decoctum eadem prestare potest, ad lateris
etiam dolorem efficac. menses cit. antidotis inferitur. Adulteratur radice rusci am-
mista: sed maleficium deprehenditur: quoniam hæc dura est, & frangenti contu-
max, sine ulla odoris gratia.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Greci, φού. Latini Phu, & Nardum syluestrem uocant. Officine illius loco Valeriana utuntur. Ger-
mani, Wild Coimus/ Groß Baldrian/ & Tinnacs hæc appellant. Valerianam autem Bapen-
traut/ Klein Deimarch, & Klein Baldrian/ Valeriaen.

PHV Dioscoridis, & cæterorum Græcorum, nostra Valeriana, quam Germani, ut diximus, Deimarch
& Baldrian appellant, plurimum exprimit, nisi florum, qui in muscario pusilli sunt, magnitudo desidere-
tur, quare aliam herbam, priorem scilicet, quam Galli simul & Germani maiorem Valerianam nominant, ue-
rum esse Dioscoridis Phu, nemo sane mentis negabit, cum descriptioni per omnia respondeat.

Malabathrum. Caput XI.

Folium Indi, quo hodie utuntur Officine,
Mauritius Tembulum appellatum.



Malabathrum arbitrantur aliqui esse In-
dici nardi folium, falsi quadam odoris
cognitione: permulta enim nardum olent, quæ
admodum phu, asarum, niris. secus autem res
se habet. Nanq; Malabathrum folium sui ge-
neris est, quod Indicæ gignunt paludes, lentis
palustris modo innatans aquis, sine radice. Id
collectum statim lino transiuitur, & siccum
reconditur. Tradunt siccatis æstiuo feruore a-
quis, humum aridis fruticibus uri: quod ubi
non euenerit, ne amplius quidem renasci. Lau-
datur recens, ex candido nigricans, integrum,
nec fragile, odore caput feriens: quod diu in
suauis odore permaneat, & nardū sapore imi-
tetur, nullo salis gustu. Infirmum uero & minu-
tim cōsum, præsertim si cariosum uirus olet,
uitiosum est. Eisdem nardo fortitur uires, sed
efficacius omnia præstat. Vrinam uero uolenti-
us ciat, a stomacho magis prodest malabathri
uis. Lippitudinibus inflammationibusq; tritu-
tis in uiuo seruata, et commode illinitur: sub ditum linguæ, oris halitum & suauita-
tem commēdat. Vestium quoq; odorem interpositum seruat, & ab erosione tuetur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

φούλον φούλον, φούλον φούλον φούλον, & simpliciter φούλον Græci.

Latini, folium Indum, & folium Malabathri.

Officine amissa & deperdita re nomen genuinum retinuerunt. Germanis, Negel bletter.

Galli Latinum nomen, quemadmodum & Germani uerbum uerbo reddentes, feulet de inde, & feulet de
Malabathre, appellant.

Malabathrum sui generis folium, Indicæ nardo, ut odore & sapore, sic uiribus simillimum, sed nardo es-
ficacius. Laudatur recens ex candido nigricans, contumax frangi, integrum, odore uergeto nares feriente,
& qui folio semoto persistat. Id nunc desijt, à quo tamen unguentum foliatum, diuitibus Romanis mulieri-
bus frequens, est dictum. Desijt & folium Syriacæ arboris, Plinio celebratum. In horum locum Maurim-
uexerunt folium laurino proximum, sed maius, & nervis tribus folium intercurrentibus distinctum, odore
incundo,

A incundo. Primum illud folium Indum dicitur Serapioni: tamen Actuarius in *hedichromagmate*, folium Indicum, & folium Malabathri, eeu diuersa miscet: *φύλλοι* ab his diuersissimum Dioscoridi describitur, uulgo *Italis* folium syluestre dictum. *Hermol.*

Casia. Caput XII.

Casia, cuius complura sunt genera, iuxta odoriferam Arabiam gignitur, crassior corticis sarmento, folijs piperis. Eligenda est fuluescens, pulchri coloris, coralliaemula, perquam angusta, longa, crassa, & fistulosa, gustum mordens, & cum aliquanto feruore adstringens, aromatica, uinoso odore, cuiusmodi est, quæ ab incolis *achy* appellatur, ab Alexandria negociatoribus *daphnitis*. Huic præfertur crassa, purpurea, & nigricans, *Zigir* cognomine, quæ rosam odore imitatur, præcipui in medicina usus. Secundum locum tenet antedicta. Tertia, cui *Museletico* blasto, id est, germani cognomen est. Reliquæ uiles, & quæ *aphemum* * dicitur, nigra, infutauis, cortice tenui, ac rimoso: & quæ *darca* & cito uocatur barbaro nomine. Similior huic est *pseudocasia*, quam ut explicari possit, quæ gustu coarguitur, cum nec acris, nec odorata sit, hærentemq; medullæ corticem habeat. Inuenitur etiam lata quædam fistula, mollis, leuis, furculosa, quæ antedictæ præfertur. Damnatur candicans, scabra, hircinum uirus redolens, & quæ tenui fistula & scabra cute sit. Vim obtinet calfaciendi, urinam ciendi, siccandi, & leuiter astringendi. Conuenit ad medicamenta oculorum, quæ præstandæ claritatis gratia concinnantur, & ad malagmata. Lentigines tollit cum melle illita, menses trahit, contra uiperarum ictus pota auxiliatur: aduersus intestinas inflammationes omnes, & renum uitia, pota proficit. Fœminis in folio desidentibus, aut suffimentis, prodest ad dilatationem uulua. Ea duplo pondere præbet, ad plurima perquam utilis.

NOMINA ET EXPLICATIO.

- B** *Κασία* Græcè.
Casia lignea & aromatica, Latine (est autem nostra *Canella*) Officinæ nomen legitimum retinuerunt.
Casia uerò genere proxima *cinamomo* est, quin ipsa nunquam ex emulacione euadit *cinamomum*, ut totum quidem ueluti exacta arbor, *Casia* uideatur: furculi autem in ea quidem *cinamomi*, ramis *casie* proximi reperiantur. Optima *casia* in *cinamomum* degenerat. Vidit enim sepe *Galenus casie* sublimis & *ramose* ac *fruticis* emule in magnitudine furculos *cinamomi* furculis omnino similes, corticis tenuitate, & firmissimis *cinamomi* notis in odore & gustu deprehensis.
- Lib. 1. Antido.** *Casia* sepe imponit, nisi in dijudicando expertus: *pseudocasia* enim uerè est per similis, sed odore minus est grato, & corticem medullæ adherentem habet. Optima autem laudatissimaq; est *rusa*, rosam spirans, & uinum olens, gustum dulcem præferens, fistulosa, & aromatum modo uehementer odora. *Casie* coralliaemula.
- Lib. 4. & 7.** *tex* Actuarius etiam dicitur *σύριγξ τῆς κασίας* idem, *Casia* Aegyptia idem, in *asynetrico* *Casia* cathartica, c. ph. p. *κασία* id est, purgatrix quibusdam dicitur. *σύριγξ τῆς κασίας*, lib. 1. Antidotorum in compositione theriaces. *Ca* & *αφύττις*.
- Lib. 9. c. ph. p.** *σύριγξ* id est, fistula, & *νιββία* id est, *rusa* dicitur in arteriacis *Andromachi*: *νιββία* uerò bis lib. 6. e.
- Lib. 1. Antido.** *ἀσπλην* eadem Actuarius, & Arabum alumnus *casia* lignea, *Casiam* fistulam cum *Andromacho* minore ad *Galen* ætatem omnes theriacæ miscebant: hæc autem omnibus nota est, & comparatu facillima. Corticem uerò exterioriorem (quem & fistulam dicunt) odoratu & gustatu ualentem habet: quod autem intus est, maximum inbecillum, ob id inutile. Aduersus putria, deleteria, uenena, proxima post *cinamomum casia*, quæ optima est, atq; illi cognata ualeat: aromataq; cetera, nardus, iuncus odoratus, calamus, *aspalathus*, *myrrha*, *crocus*, eandem habent facultatem: sed *Cinamomum* digerit, *Casia* uerò & *malabathri* folium, & *amonum* astringentem participant, *Casia*, *crocus*, *costus*, *amonus*, *nardus* astringunt quidem, sed magis digerunt, præsertim *costus*.

Cinamomum. Caput XIII.

Cinamomi genera plura, patrium sibi nomen uendicantia. Præfertur tamen *Mosyliticum*, quod *casia*: cui *Mosyliti* nomen est, aliquam conferat effigiem. Sed in eo genere retens, nigrum, ex uinolo in cinereum uergens, leue, tenuibus ramulis, ac

ac frequentibus nodis cinctum, perquam iucundè olens. Optimi ferè indicium, iu- A
cundi odoris proprietate constat. Inuenitur enim cum optimo, eoq; quod peculiare
est. (* odor rutæ aut cardamomo proximus). Insuper acre, mordens, & cum calia- * Additum uide-
tione quadatenus falsum, quod non citò confricanti asperum, aut frianti lanugi- detur Galeno.
nosum, leuibus tamen internodijs appareat. Sicertior fieri uoles, uelliro ab radice
furculum, facilis est huiusmodi probatio, namq; fragmenta miscellanea quædam
esse uidentur. Quæ autem melius spirant, suo halitu cum nares primùm consulun-
tur, olfactum expleant, deteriores dignotionem impediunt. Est etiamnum monta-
num, crassum, pumilum, fuluescens admodum. Tertium à Mosylirico, perquam
suauiter olet, nigrum, fruticosum, paucis intercedentibus geniculis. Quartum, fun-
gosum, candicans, aspectu tuberosum, uile, ac friabile, magnam habens radicem, quæ
castram planè repræsentat. Quintum genus, odore nares feriens, subrufum, & corti-
ce fuluæ casie simile, tangenti firmum, minus neruosum, densa radice firmatum. Iis
quæ thuris, casie, myrti, aut amomi odorem spirant, minus suauitatis inest. Deligito
scabrum, album, rugosum: at leue, & lignosum circa radicem, ut inutile, reijcio.
Est etiamnum simile aliud, cui pseudo cinnamomo cognomen est, uile, inualidi odo-
ris, solutaramq; uirium. Vocatur etiam Zingiber, cum tamen in xylo cinnamomū,
præbens quandam cinnamomi faciem. Est autem lignosum cinnamomum, tam en-
ta longa * robustaq; ferens, odore longè cinamomo inferiore. Sunt qui xylo cinamo * Alij parua, ut
mum, à cinamomo genere differre dicant, quòd à natura eius abhorreat. Cinnamo- * xpo: pro mu-
mum omne exalfacit, emollit, & concoquit, urinam ciet, tam menses quàm partus- * as.
potum aut ex myrrha impositum pellit, contra bestias quæ uirus eiuculantur, uene-
riq; conuenit. caliginem pupillis oculorum obuersantem discutit, crassitiem exte-
nuat, lentiginis & uitia cutis in facie ex melle illitum detergit. cōtra tussis, defluxio-
nes aquam subtercutem fusam, renum uitia, & urinæ difficultatem efficax est, unguē-
tis preciosis inferi solet, & in summa, magni ad omnia usus. Tritum uino excipitur,
umbraq; siccatum, quò diutius eduret, reconditur. Est & quoddam cinnamomum,
quod aliqui pseudo cinnamomum appellant, perquam denso atq; crasso sarmento, B
longè tamen inualidius cinnamomo, & odore & gustu.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Κιννάμωμον Grecis.

Cinnamomum Latinis & Officinis (est autem uera Græcorum Casia)

Germanicè, Siment rôlin. Gallicè, de la Canelle, appellatur.

Cinnamomum, arbor lauro, folijs & baccis similis, & eius ramorum, non trunci, tertio quoq; anno delibrato Ludouicus Ro-
manus Patricio

rum cortex.

Cinnamomum calidum tertio ordine, siccatur autem & digerit super omnia æquè calida, propter summam eius.

sentie partium tenuitatem: propter hæc dispositionibus scirrhalis mederi solet. Idem cunctas corrigit pu- Galen. libr. 7.

trides & uenenatas uires ichorum, & humorum, & lethaliū pharmacorum, & ueneni uiulentarum be- simpli.

stiarum. Idem sua facilitate altera curice & digerente, & odoris gratia, presidium est non paruum aduersus Lib. 6. c. ph. p.

omnes præuæ dispositiones, & casia, & pleraq; alia aromatum materia. in diabesi.

Cinnamomum quatenusissimum est partium, uentriculi meatu aperit, quia humores crassi & lenti inha- Lib. 7. c. ph. p.

seruati, tenuit & terget, ob id commodè hyere miscetur. Cinnamomi autem facultas qualis initio adest, in- Lib. 8. c. ph. p.

græseruari nequit ad annos triginta, multò minus ad centum, uel etiam ducentos, ut quibusdā un usum est, Cū ibidem.

cinnamomum senij expertus putantibus. Nam id seruatum uasculis ligneis ab Imperatoribus uarijs, Traiano, Ha-

drano, Antonino, Commodo, Seuero, imbecillius tanto est expertus Galenus, Seuero theriacen componens,

quanto uetustius: contrā tanto ualentius, quanto recentius. Nam Seuero Imperatori theriacam parare ius-

sus, qualem Antonino Imperatori parauerat, coactius Cinnamomum capere ex Traiani & Hadriani tempori-

bus relictum, cum nondum triginta anni præterissent, multò inualidius expertus est. Arborem enim totam præ-

mi generis cinnamomi ex Barbaria in serinio cubitos quatuor & semissim longo ad Antoninum allatā uidit

Rome Galenus, ex eaq; theriacen paratam alijs longè præstantiorem expertus est, ut ea etiam ante duos men-

ses Antonino uti licuit, non expectata medicamenti coctione.

Cinnamomum optimum, ijs qui id crebrò uiderunt omnium facillimè dignoscitur: & cum principum cū

namomorum sex sine differentie generales, optimi tamen supra deterrimum insignis est excessus, ut in Casia,

quarum tamen optima parum à prauissima Cinnamomo abest. Id autem Cinnamomum est odoratissimum.

A ac indicibilem quandam odoris gratiam super alia omnia refert, gustatu admodum calidum est. non tamens adeo, ut molestè rodât: color illi est lacteus, cum quædam, id est, glutino et cum cyaneo mistus.

Gal. lib. 5. phar.
Lib. 1. Antido.

Cinamomum quantè Casia sit præstantius, docet Galenus lib. 5. comp. ph. part. in denificatio: Quod si odorum facere uis, misce casie aut amomi drachmas duas: si regi paras, Cinamomi drachmam unam, ubi non solum casie pondus duplat, sed etiam mediocribus dicat Cinamomum regibus. Ob id penuria Cinamomi duplum casie miscendum, omnes propemodum ueteres scripserunt, uti quod pondus aliquis robustus ferre consuevit, eo absente ferant duo imbecilli. Quintus autem penuria Cinamomi multum, uti duplum, carpesij miscbat. Cinamomo miscet casiam duplicatam Actua. in pastillo, ad uiosos. Pseudocinamomum uerò est simile, ob id facile nobis imponit, sed gustu et odore longè est inferius. Xilocinamomum lignosum est, ualida habet uirgulta, nec similem habet suauolentiam. Cinamomum omnium præstantissimum est cinericium colore, uirgultis gracilibus, nodis frequentibus, odoratum uehementer: id quod odore longè optimo et suauissimo, gustu acriter admodum mordaci, et quod mansum, πικρὸν (id est, rutam olere uidentur, leuc, confringi facile: Addit ibidem ueri cinamomi genera aliquot. Vero igitur Cinamomo nos caryensis, nostra autè canella, quam uulgò Zimenterdum, et officinæ Cinamomum appellant, aut Casia est, aut pseudocinamomi species. ἀνθόνιστον Actuario pro optimo usurpatur.

Amomum. Caput XIII.

A momum exigue frutificat, ex ligno secō uoluens in racemi modum, flore, ceu candida uiola, paruo: folijs uitis albæ similibus. Laudatur quammaximè Armeniacum, fuluo auri colore, ligno subrufo, ualde odorato. Medicum, quoniam in campestribus et aquis nascitur, infirmius esse constat. Est autem magnum, subuiride, tacta tenerum, frutice uenoso, odore origani. Ponticum uerò subrufum, paruum, fragile, racemosum, fructu turgens, et odore nares feriens. Delibito recens, candidum uel subrubrum, quod nec astrictum cohæreat, nec conuoluatur, sed solum diffandatur, seminis plenum, uis paruis simile, graue, odoratum, modò carine non contraxerit, acre, gustu mordens, simplici colore non euariante. Vim habet calfaciendi, astringendi, exiccandi. Somnum allicit, et illitum fronti, doloris sensum aufert, inflammationes et meliceridas concoquit, discutitque, iuuat quos scorpius percussit, ex ocimo illitum, et podagricis confert, inflammationes oculorum uiscerumque lenit ex uua passa, ad uuluarum uitia in pepsis, aut infestationibus utile est. decoctum secinori, renibus, podagre, potu conuenit. Antidotis immiscetur, et preciosissimis unguentis. Adulteratur herba amomo simili, quæ amomis uocatur, sed sine odore, sine fructu, nascitur in Armenia, flore origani. Quare in huiusmodi probationibus fragmenta fugienda sunt: eligenda autem, quæ ab una radice integros furculos emittunt.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Lib. 8. c. ph. p.



Amomi uua sæpe Galeno et Actuario ob id dicitur, quod racematum uelut in uua cohæreat. Laudatur Amomum Scythicum, lib. 8. comp. ph. part. Non esse uerò rosam Hierichuntis, Hierosolymitanam uulgo dictam (aut hic depictam) aperte conuincit utriusque historia. Hodie passim desideratur, nam quod ostendunt officinæ, inodorum est. Iacobus Syrius scribit se habere fuluum, paruum, oblongum, angulosum, odoris dum fricatur incundissimi.

Costus. Caput XV.

Pracellit Arabicus, candidus, leuis, eximia odoris suauitate. Secundum locum sibi uendicat Indicus, leuis, uber, ut ferula niger. Tertius est Syriacus, grauis, colore buxeus, et odore feriens. Optimus est recens, albus, abundè plenus, densus, aridus, à teredinibus non erosus, sine graeolentia, gustu calidus ac mordens. Vis ei exaltatoria, urinam ciet, menses pellit, uitijs quæ uulnam male habent, tam impositu quam fori et suffitu auxiliatur. Contra uiperarum morsus sextantem.

sextantem * bibere prodest: item aduersus pectoris dolores, conuulsa, inflatio-
nesq; ex uino & ablinthio, uenere ex mulso stimulat, latus uentris tinea ex aqua
pellit, horribus ex oleo, ante febrium accessiones, & neruorum resolutionibus
oblinitur: uitia cutis in facie, cum aqua uel melle illitus, emendat. Additur in antido-
ta & malagmata. Sunt qui admistis helenij Comageni præduris radicibus, adulte-
rent, quod deprehensu facile est, siquidem neq; gustu feruet helenium, neq; ualidum
odorem uiibrat, ut caput tentare possit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Costus subamarus, modicè astringit, acer ad cò et calidus ut ulceret. D. Iac. Syl. Lugduno missus à Caro-
lo Paludano (eius urbis iure medico primario si Hieronymum Montuum nulli eruditione secundum excep-
ris.) Costus præcellit Arabicus, candidus, leuis, eximia odoris gratia, recens, abundè plenus, densus, siccus
à teredibus non crosus. Secundus est Indicus, uber, leuis, niger. Tertius Syriacus, grauis, colore buxeus, odore
striens.

Costus autem hortensis, herba amara est, magis piperitis aut Siliquastrum Plinij.

Odoratus iuncus. Caput XVI.



Odoratus iuncus, in Africa, & Arabia nascitur. Lauda-
tissimus ex Nabathæa: proximus Arabicus, quem ali-
qui Babylonium cognominant, alij teuchitin: pessimus ex
Africa. Eligendus est rufus, recens, floribus refertus, tenuis,
rubentibus fragmentis, qui manibus confricando rosæ odo-
rem emittit. igneæ mordacitatis ad linguam. Floris, culmo-
rum, radiciq; est usus. Vim urinæ ciundè habet, menses pel-
lit, discutit inflationes, caput aggrauat, modicè astringit,
comminuit, excoquit, ac uenarum spiracula laxat. Flos eius
in potu utilis sanguinem reiicientibus, doloribus stomachi,
pulmonis, iecinoris, & renum, miscetur antidotis. Radix B
astringentior est, ideo fastidijs stomachi, hydropicis, con-
uulsis, drachma una cum pari pondere piperis, per dies ali-
quot datur. Decoctum uulnè inflammationibus, ad desiden-
tium fotus, utile est.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Σχοινός Græcis dicitur, quamuis omnem iunci speciem hoc nomine signifi-
cent: at absolute positum, hunc per excellentiam significat.

Iuncus odoratus et rotundus Latinis, ad differentiam palustris,

Camelsheew Germanis.

Gallis pasture de chameaulx, hoc est, pastum Camelorum nominatur.

Officinis, nomine deprauato, Squinantum dicitur.

Hippocrates Schoenon hedyosmon, ut Galenus libello quem uocabulis Hip-
pocratis dicauit, id est, suauem iuncum nominat.

Σχοινός, id est, iuncus absolute scriptus, iuncus odoratus, Arabicus, Li- Gal. li. i. Antid.

bycus, seu cum Celso rotundus, à triangulari cypero cum separante. Nescio

autem qua causa uulgo Σχοινός dicitur, cum raro flos eius ad nos de-

feratur, sed herba sepe, eius parte superiore à camelis crosa. Eam enim in A- Lib. 8. simp. et

rabie uis copiosissime crescentem, ob id parui precij, libentissime cameli pa- Lib. 6. co. ph. p.

scuntur. Σχοινός Actuarij, uulgo Schoenantum: modicè calfacit, et

modicè astringit, est omnibilib tenuium partium, ob id mediocriter digerit, et

mediocriter repellit: radice astringentior, flos calidior, urinas ac menses ciēt, sumptum et soti adhibitur,
iccoris, stomachi, uentriculi phlegmonas inuat, hæmoptoicis, id est, sanguinem siccantibus cum alijs prodest. Lib. 1. Antido.

solo odoratus uigore deligitur: nam odoris illius gratia celeriter uanescit.

Calamus odoratus. Caput XVII.



* Hæc uox abjs
deest.

Calamus odoratus in India nascitur. melior est fulvus, densè geniculatus, & quæ assulose frangitur, plena araneorum fistula, albicans, lentus in mandendo, & astringens, ac cum aliquanta acrimonia amarus*. Vrinam potu ciet, quare cum graminis aut apij semine coctus, in aquæ subtercutem fusæ morbo, renum uitijs, stillicidio urinæ, ruptisq; commode bibitur, menses & potu & appositu pellit. tussi suffitu medetur per se, aut ex resina terebinthina, hausto per arundinem fumo, ad mulieres infusus decoquitur, & clysteribus imponitur. Suffitionibus, malagmatisq; odoris gratia commiscetur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Calamus aromaticus Græcis, Dioscor. & Galeno. Vnguentarius Hippocrati. Arabicus Plutarcho. Alexandrinus Celso.

Officinæ omnes Calamum aromaticum nominant.

Germanis Calmus wurzel appellatur.

Galli Latium nomen retinuerunt.

Calidus, siccus, ordine secundo: leuiter astringit, minus

Cal. lib. 7. simp. mium acer est, partium nonnihil tenuium: remedijs uentriculi & hepatis calidis misceri potest, ac menses mouentibus.

Balsamum. Caput XVIII.

Balsamum, arbor alba uiolæ, lycij, siue pyracanthæ magnitudine conspicitur. Folium rutæ proximum, longè candidius, perpetuò uiuens. In Iudæa solum quadâ ualle & Aegypto nascens: his differens modis, scabritia, proceritate, gracilitate. Quod igitur tenui & capillacea coma est, therisum* uocant, quasi demersibile, fortassis quoniam ob gracilitatem facile demetur. Aestiuus sub ortu Canis ardo ribus, arbor unguibus ferreis inciditur, manatq; è plaga succus, quem Opobalsamum uocant: sed tam exiguo stillatu, ut annis singulis, ne plures quidem quàm senis septemue congij cogantur, inibiq; pondus duplo rependitur argento. Succus probatio est, ut sit recens, ualidi odoris, syncerus, non ad acorem uergens, dilui facilis*, leuis, astringens, ac modicè mordens gustu. Sed uariè uitiat, misto ab aliquibus terebinthi, cypri, lentisci, balani unguento: item su fino, metopio, melle, aut Cypria cera liquida, quod maleficio facile deprehenditur. Namq; merus in lancem uestem fusus, neq; maculam facit, neq; si eluatur, notam relinquit: uitiat autem inhæret, & lac instillatus coagulat, quod adulteratus non efficit. Quinetiam syncerus in aqua aut lacte celerimè liquatur, coloreq; lactescit: uitiat uerò olei modo innatat, se coagulens, aut

* Alij, qui facile
penetret.

Balsamum.



* Alij, instilla-
tum, & uis-
cerata.

* Alij, minimè
fissum, & dâxv
top.

in stellæ modum diffundens. Syncerus senescens crassescit, deteriorq; redditur. Hal lucinantur, qui aqua concretum* pessum ire, & ad ima sidere arbitrantur, postea dissipatum* supernatant. E ligni genere, quod xylobalsamum uocant, probatur recens, sarmento tenui, fuluum, odoratum, quadam tenus opobalsamum spirans. Necessarius etiam seminis erumpit usus, quare eligatur flauum, plenè, grande, pondus de rosam, mordens gustu, feruens in ore, modicè opobalsamum olens. Adulteratur semine hyperico simili, quod à Petra oppido defertur. Sed coarguitur magnitudine, inanitate, uirili ignauia, sapore piperis. Efficacissima uis inest succo, & quæ maximè calfaciens, abstergit quæ tenebras oculorum pupillis offundunt, medetur perfrictionibus uulnæ, cū rosaceo cerato appositus, menses quoq; secūdas, & partus extrahit, horrores

horrores illitu discutit, ulcera sordida expurgat, & cruda concoquit, urinam potu acciet, aggre spirantibus prodest: datur in lacte contra aconitum haustum, aut serpentium ictus, miscetur acopis, malagmatis, & antidotis. In summa, precipua autoritas succo, secunda semini, minima ligno. Semen commodè potui datur doloribus lateris, pulmonum uitijis, tussis, ischiadicis, comitialibus, uertiginosis, orthopnoicis, urina difficultati, torminibus ac serpentum moribus: ad muliebres sufficit perquam utile est: uuluum aperit in deflesionibus balnearum decoctum, & humorem euocat. Lignum easdem habet uires, aliquanto minores, ex aqua potum cruditatibus, torminosis, uuluis, uenenatorum ictibus opitulatur, urinam cit, ad capitis uulnera cum sicca tri conuenit, squammas ossium extrahit, & ad unguentorum spissamenta additur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Balsamo planta secundo excessu calida sicca, tenuium partium: & carpobalsamo & xylobalsamo liquor Galen. lib. 7. est tenuior, minus tamen calidus quam quidam existimant, tenuitate partium decepti. Sape enim expertus sum, non tuisse dispositionem caliditate egentem. Opobalsamo igitur (quod & Ballo & Ballo & Ballo uocari dicit Simon) syncero, dilui facili, leui, astringenti, non acido, linguam modicè mordenti, est precipua inter Gal. lib. 2. c. ph. has plante huius auctoritas, & uis efficacissima. Laudatissimum autem est Syriacum, siue Iudicum, siue ex par. Syria palestina, ac precipue Sigadinum, à loco Palestina, in quo copiosissimum & optimum gignitur. Lib. 1. Antido, Opobalsamon sit Syriacum, tenue, perspicuum, substantia non crassum, quale in fundum uasis subdere solet, quale item sit uetustate. Opobalsamon uarijs adulteratur modis, ut agere possit, etiam ab exercitissimis, quoque: alius uero Opobalsami notas ex Dioscoride requiras. hodie pro uerummodum desijt uideri. Lib. 1. Antid. Carpobalsamon adulterari non potest, si Galeno credimus.

Aspalathus. Caput XIX.



Aspalathus, alijs crysiceptron, frutex est surculosus, multatis spinis horrens, nascitur in litro, Nisyro, Syria, & Rhodiorum insula, quo ad unguentorum spissamenta pigmentarij utuntur. Optimus est grauis, detracto cortice rubens, aut in purpuram uergens, densus, odoratus, gustatu amarus. Est & alterum genus candidum, lignosum, sine odore, quod deterius habetur. Vim calfaciendi cum astringitione obtinet: unde decoctum cum uino ad terra oris ulcera colluenda conuenit, ad nomas genitalium, & sordida ulcera * infunditur. subiectum in pello, partum extrahit, alutis * Alij addunt, sistit eius decoctum: & sanguinis reiectionem potu cohibet, urinae difficultatem in orationesq; discutit. orationes.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Asportatur ad nos aspalathus à Rhodiorum insulis, inde Rhodij ligni appellationem declinauit. Quin & de flore fruticq; toto ad Rhodios negotiatores retulimus, qui florem ei rose tribuebant, predicabantq; huiusmodi arbutum, fruticemque lignosum, crebris spinis aculeatum. Ea igitur, que fidei narratione accepimus, & ipsius ligni pericula, que unusquisq; facere potest, in hanc traxerunt opinionem, ut Rhodium hoc lignum sit idem, quod aucteribus aspalathus diceretur. Accedunt etiam nostre nimirum sententie, qui diligenter hec scrutati, & singulas notas disquirere uoluerunt. Galenus gustu acrem aspalathum, astringentemq; deprehendit, cuius iudicio lingua satis subscribit. Vide plura in historia Agalochi.

Muscus. Cap. XX.

Byon, id est, muscus, à quibusdam splachnon appellatur: in cedro arbore, populo alba, & quercu inuenitur. Optimum est cedrinum: proximum populeum: in quo genere candidum & odoratius præstat, nigricans improbat. Astringendum habet. Decoctum in fidentiū uuluis utile: unguento balanino, oleisq; inspissandi gratia inseritur: thymiamatum, acoporumq; compositionibus conueniens.

Muscus.

NOMINA ET EXPLICATIO.

BRYON Græc.

Muscus arborū, canis scilicet uilli, quales in senescente quæ-
cū maximē uidemus, Latinis.

Officinis & Arabum familia vsuea nominatur.

Germani, Gemöſſ von Bäumen, uocant.

Muscus arboreus, non sphæchnon & bryon tantum, sed et
am hypnon ac sphagnon appellatur ab Aëtio serm. 12. ca. 44.
in oleo glencino. Item serm. 13. ca. 117. sphagnum siue hypnum
habet, ac rursus cap. 118. eiusdem sermonis quid sit hypnon ex-
ponit, inquit: Hypni canalicula est parua, ex arbore Damas-
scena & Rhodacina exorta. Quare apparet muscum hunc

non tantum supradictis arboribus innasce, sed etiam alijs, uelut hic Aëtius Damascena & Rhodacina di-
cit. de quibus arboribus suo loco dicitur.

Plinius canos arborum uillos sphagnon appellat.

Hodie aliud genus Musci pharmacopolijs in usu est, qui animalis potius sanguis aut sanies esse à Serapio
ne traditur: uehementē odorifera res: qui tamen tempore Dioscoridis, Galeni, & ceterorum Græcorum
incognitus fuit. Aëtium tamen cum nouisse putandum est, qui quum alibi, tum serm. 12. cap. 46. in medica-
mento purgatiuo ex hermodactylis, uoq̃ op̃ x̃e p̃e d̃ r̃ i o p̃, & habet, id est, musci siliquum unam, id quod de nulla
alio musco intelligi potest.

Est autem & tertium adhuc musci genus, quod item bryon Græcis appellatur, itemq̃ lichen, sed hic in po-
Gal. lib. 6. Simp. tris roscidis nascitur in mari, de quo suo loco plura, & c. Vm habet astringentem, inuicidam. Nec enim mul-
tum est frigidum, sed proximē ferme medijs. qui uidelicet & digerendi & emolliendi facultatis est parti-
iceps, maximē quod in Cedrinis lignis reperitur.

Agallochum Caput XXI.



Agallochum, lignum est quod ex India atq̃ Arabia
A deportatur, thya ligno simile, maculatum, odora-
tum, gustu astringens, cum quadam amaritudine, cute ue-
rius quam cortice uestitur, aliquantulum uersicolore.
Manditur, aut decocto os colluitur, commendandi hali-
tus gratia. Sudores arcet toto corpori insparsum: pro-
thure ad suffimenta substituitur: radix epota drachmæ
unius pondere, humida stomachi uitia, & imbecillitatem, feruoremq̃ mulcet, si la-
teris, iecinorisue dolor excruciat, si dysenteria, aut tormina infestant, ex aqua bi-
bere prodest.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Arborum huius triplicem scribit Ludouicus Roma. Patricius in tractu Indico uideri, Calampat perfe-
146. Syl. ctissimam, Bochor uilissimam, iubam mediam. Xyloaloe Aëtio & Actuatio dicitur, id est, lignum aloës ar-
boris, non herbe. Rhodijs militibus est frequens in corollis precarijs. Quod uero ostendunt Officine, uerius
est aspalathum acre, & austerum. Galen. lib. 6. simpl. quod aroma apud suos nasci idem Galen. scribit lib. 8.
comp. phar. part. & in Syria & Rhodo Dioscorides: graue, detracto cortice, rubens aut purpurascens,
densum, odoratum, amarum, astringens: alterum deterius, candidum, lignosum, inodorum. Verum Agallo-
chum Germani, Des heiligen Creuzes holz, hoc est, lignum sanctæ crucis appellant. Aspalathum uero
Paradijs end Aloes holz.

Narcaphthum. Caput XXII.

Narcaphthum ex India deferitur, corticosum, simile sycomori libro, quod iu-
cundi odoris gratia suffitur. Miscetur thymiamatis compositis. confectio-
nibus uulnæ suffitu prodest.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Ioan. Ruels
Succ.

Serapio Arabs Nabach uocat. quid sit nondum comperi. Narcaphthum, quod & ab alijs nascaphthum
uocatur.

vocatur, olim ex India deportabatur, corticosum natura, et putaminibus arboris mori: Pretermisum à A Plinio, ut arbitror, consultò, quia incerta esset eius facies, ut aliorum quoque plurimum, quæ nostro orbi tantum nominibus cognita sunt. Paulus Lacaphthi meminit inter eas, quæ in magno cyphi, quod cognominant heliacum, adijciuntur, et corticem Picæ, uel alterius arboris existimat: ego Lacaphthum cum Nascaptho idem esse reor, et nostro seculo planè ignotum.

Cancamum. Caput XXIII.

Cancamum Arabici ligni lachryma est, myrrhæ quodammodo similis, uirosi^{us} Alij, odori, gustus, quam ad suffimenta usurpant. Vestes eo ex styrace & myrrhâ suffiuntur. Vim proditur obtinere extenuandi obesos, si ternum obolorum pondere ex aqua, aut multo aceto plusculos dies ebibatur: lienosis datur, comitialibus, & suspiriosis, menses cum aqua multa pellit, oculorum cicatrices confestim emendat: uino madefactum medetur eorundem hebetudinibus: aduersus gingiuas humore prægnanteis, doloresque dentium, non aliud efficacius.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis κάμαρον. Cancamum Latinis. Officinis Cacca nominatur.

Lachan sape Actuarius dicitur passim, ac præcipuè in duplici descriptione dii lachan, ubi scribit κάμαρον καθαρόν purgatum.

Cancamum ex confinio casie cinamiquè deuenitur, sed per Nabatheos et Trogloditas, qui confedere ex Ioan. Ruell. Nabatheis. Paulus arboris Arabæ odoratam esse lachrymam tradit, myrrhæ non dissimilem, quæ suffi-^{Suesf.} mentis usurpetur. Addit uim obtinere extenuandi præpingues, et obesos. Ceterum non sum nescius, à Barbaris, qui Dioscoridis et Pauli citantur testimonium, id Lacam dici, quod Dioscorides et Paulusancamum appellarunt, idemque plurimis recentiorum Græcorum compositionibus hoc nomine dictum. An tamen lacca sit Gummi illud quod hodie passim ostendunt Officinæ, de quo agitur, Cancamum, non satis habeo comper-^B tum. Quod si genus hoc myrrhæ referat speciem, tamen uicere mibi uidetur odore, qui posuit ad suffimenta dari, sapore uiroso. Adicere Mauritaniam rubram esse Laccam, timetoribus expetitam, roris modo supra surculos arborum insidentem, præsertim mæssili, et coalescentem in gummi. Infectores floccorum purpure, cam^B macerant, ut colorem ebibant lane, et quod remanserit, lacca esse dicitur, cum uetus inodorum et sicem potiusancamum, quam ancamum aut lacca dici oporteret. Seito autem tria hoc nomine lacca nuncupari, Vnum est uerum Dioscoridis ancamum. Alterum grana quædam arte facta, quæ Venetijs uirgino parantur, aut cocco, et alijs nonnullis: hac pictores utuntur. Est et tertia lacca, ex qua ruber color fit, qui uulgo carne sinus appellatur. Ex his omnis error detegitur, etc.

Ant. Mus.

Cyphi. Caput XXIII.



Cyphi thymiamatis compositio est, dicata dijs, qua abundè Aegyptij sacerdotes utuntur. In antidota misceri solet suspiriosis datur in potu. Per multæ componendi rationes, quarum una hæc est: Sumito cyperi dimidiū sexarium, cum pari baccarum iuniperi aduicta modo: uuæ passæ pinguis, exemptis uinaceis, minas duodecim: resinæ repurgatæ minas quinq: calami & iunci odoratorum, & aspalathi, singulorum minam: myrrhæ duodecim: uini ueteris sextarios nouem, cum duabus mellis minis: uuam passam detractis uinaceis tusam, cum uino & myrrhâ subigito: cætera tusa & cribrata adijcito: die uno humorem combibere finito. dein mel coquito, dum sibi glutinis ascescat crassitudinem: elix quaram resinam accuratè permisceto cum reliquis diligenter contritis, & in fictile uas recondito.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Cyphæ compositio à Democrite hæc describitur: σαύδις, id est, uuæ passæ pinguis (à qua cor-^{ex} rex et semen totum sine exempta) carnis leuigatæ probè, terebinthine usæ, ana drachmæ Atticæ 24. Myrrhæ, seboe, anthus, seu iunci rotundi, ana drachmæ 12. Cinnamomi drachmæ quatuor, Bdellij lachrymæ, spicæ nardi, casie bonæ et puræ, cyperi, baccarum iuniperi grandium et pinguium, calami odorati ana drachmæ tres.

B 3

A Aspalathi drachme due & dimidia. Croci drachma una. Mellis & uini modus mediocri. Bællium, myrrham, uinum in mortario tere ad mellis liquidi crassitiem, melle superaddito unam cum alijs tere. Omnia ubi erunt leuia, fac cyclos paruos.

**Paulus Aegine-
tis.** His Aegyptij sacerdotes dijs suis propitiandis suffitu utuntur. Sic Rufus uir optimus, & in arte exercitatus, parandum prodidit. Permultæ enim eius compositiones etiam Dioscoridi, quarum unam describit ab hac diuersissimam, tamen quam in antidota quoq; misceri ait. Paulus quoq; lib. 7. describit cyphi magnam hæmorrhoidy, id est, solare dictum, ex rebus 36. confectum: & σελυριακόν, id est, lunare, quod ex rebus 28. conficitur: utrumq; ab hoc maxime differens: tamen etiam ad conciliandos Deos odore grato compositum, & naribus nostris adiuuendum, ut distillationes à capite in partes subiectas concoquat, & grauedine, obstructia neq; nos liberet, & cerebri uentriculos purget, & pestilentibus morbis resistat. Per os etiam cyphi sumitur tum ad hæc, tum ad ea quæ pectori inherent coquenda, nec non ad frigidos hepatis affectus. Miscetur medicamentis præcipue epithematibus & antidotis, quæ inde Cyphoidea uocantur. Paulus lib. 7. Etiam officinis hodie in usu est cyphoeus compositio, sub nomine trochiscorum Eosion, à uera compositione non longe diuersa, sed admodum deprauata.

Crocum. Caput XXV.



* Alij, Thessalæ uolunt.

* Alij, subrusum.

C Rocum, optimum in medendi usu Coryceum, recens, & boni coloris, paulum candidi gerens in capreolo, oblongum, omnibus suis partibus constans, non fragile, plenum, à quo detractum est nihil, quod madefactum manus inficit, nec situm redolet, aut cariem sentit, subacre. sin huius generis non est, aut uetus, aut humore perfusum creditur. Secundus locus datur Coryceo, è tractu Lyciæ contermino. Tercius Lycio è monte Olympo, dein ex Aegibus Aetoliæ, Cyrenaicæ & Centuripinum inter Sicilica omnia uiribus infirmius est. Omnium natura oleracea. Itali tamen ob succi copiam, & coloris uenustatem, tingendis mortarijs dicauerunt, quibus de causis magno uenditur. Vtilissimum in medicina quod antè descripsimus. Adulteratur immisto crocomagmate tuso, atq; etiam sape subtilu: contrita, quò pondus adijciatur, simul argenti spuma, aut plumbagine, sed maleficium declarat infidens puluis, præsertim si defrutum in odorando subolet. Thessalus ipsum tantum odoratum esse uoluit*, Alij exitiosum, tribus drachmis ex aqua potis. Proculdubio uim coquendi, emolliendi, atq; substringendi habet, urinam cit. Elegantem colorem præstat, qui ex passo biberint, crapulam non sentient. oculorum fluxiones illitum cum humano lacte, cohibet, additur in potiones, quæ in teraneorum causa temperantur. ad uulnæ etiam sedisq; caræ plasmatæ, utiliter inditur, uenerem stimulat. uergentes ad ignem sacrum inflammationes mulcet, auricularijs collectionibus utile. Quò facilius conteratur, in calido fictili sole siccati oportet, celeriterq; uersari. Urinam mouet radix ex passo pota. Fit etiam expressis unguenti crocini odoramenti, & in formas digestis, quod crocomagma uocant. Optimum est odoratum, modicè myrrham olens, graue, nigrum, ligni expers, leue, subamarum*, quod madefactum croci colorem reddit, gustatûq; uehementer dentes ac linguam inficit, multis durans annis: quale est quod à Syria defertur. Habet suas uires ad delenda quæ caliginem oculis obuersione: urinam cit, calfacit, coquit, & emollit, uires croci pro portione quadatenus repræsentat, quandoquidem plurimam croci partem sibi crocomagma uendicat.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Κροκος Græcis. Crocus Latinis appellatur.
Officine antiquum & genuinum nomen retinuerunt.
Germani Saffran/ Siment Saffran/ or Saffran/ zamer Saffran.

LIBER PRIMVS

Galli du saffran uocant.

Crocus calidus ordine secundo, siccus primo, parum ac mediocriter astringit, qua facultate cor & par- Galen. lib. v. com-
tes alius roborat, ut suo calore moderato coquit ac digerit, & siccando modicè dispositiones pectoris phthi- ph. p. 4. 7. 8.
sicos tuat, putredines corrigit. Lib. 1. Antidot.

Crocus Coryceus à Coryceo antro, in quo nascitur, ueteribus atq; adeò Poëtis præter ceteros celebra-
tus: alijs sanè procerior, non tamen alijs robore odoris aut diurnitate est præstantior. Eligendus uerò est non
procerior, sed odoratissimus, & flauissimus, & longo tempore in suo uigore persistens. Præstantissimum
igitur aliquem crocū apto quodam & diu loco repositum obserua sepe, ut per nosseas: nam id colorem odo-
remq; pristinum diu seruabit: Adulterati uerò odor & color celeriter uanescit. Crocus Cilicicus etiam laus
datur. Nunc passim & in Germania feritur, uerum nullibi uegetior quàm in Viennensi agro.

Helenium. Caput XXVI.



Helenium folia habet uerbasci angustio-
ris folijs, asperiora, oblonga: caule qui-
busdam in locis non emittit: radicem sub bi-
dam, interdum sub trifidam, odoratam, suba-
crem, uegetam, magnam, ex qua agnata pro-
pagines liliorum autari modo feruntur. Mon-
tibus in umbrosis, siccoq; solo provenit. Fodi-
tur æstate radix, particulatimq; dissecta sicca-
tur. Potum radice decoctum menses & uri-
nas ciet, ipsaq; in eclegmate ex melle prodest
tussi, orthopnœæ, ruptis, conuulsis, inflatio-
nibus, & serpentium moribus. In summa ex-
calfaciens. Folia ex uino cocta utiliter ischia-
dicis illinuntur. Helenium stomacho utile in
passo conditum: siquidem salgamari paulu-
lum siccatam radi-
cem, mox deco-
ctam, & frigida a-
qua madefactam,
in sapam conijci-
unt, & ad usum re-
condunt. trita po-
taq; ad cruentas
excretionem effi-
cax est. Alterum
Helenij genus in
Aegypto gigni
Cræteas tradit:
herba est cubitali-

bus ramulis, serpylli modo per humum repentibus, folijs lenticulæ circa ramos, &
longioribus crebrisq; radice pallida, digiti minoris crassitudine, per ima tenui, su-
perne crassa, cortice nigro. Nascitur in maritimis collibusq; Radix una in uino co-
cta, contra serpentium ictus auxiliatur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

EAENION Græcis. Helenium, Elenium, & Enula Latinis.

Officinis Enula campana dicitur. Germani, Niantwurzel.

Galli Champagne uocant. & Λένιον λευκόν, ἡ γὰρ λευκὴ Ἀθηνῶν appellat.

Elenij radix odorata, subacris, amara, calfacit non primo statim occurrit, siccatq; non exatè ob humore
in se recrementitium. tandem uerò etiam rubrificat, ischiadas & affectus alios diuturnos ac frigidos: ecle-
gmate cum melle, crassa & lenta ex pulmone & thorace expectorat, serpentium moribus prodest. Ex mon-
tibus & sicco solo præstantior, legitur æstate, particulatimq; dissecta siccat, uel melle aut saccharo condi-
ta seruat.



Oleum quod ex immaturis oliuis exprimitur, ad multos usus rectè ualentibus accommodatissimum, omphacinum id appellatur. Præstat recens, odoratum, quod non mordeat. Tale unguentorum compositionibus idoneum intelligitur. Stomacho utile est, quod astringat, gingiuas contrahit, dentes firmat, si contineatur in ore, sudores cohibet. & quò uetustius ac pinguius, eò ad medicamenta aptius est. Et, ut reliqua in commune dicantur, omne oleum calfacit. emollit uentrem, à perfrictionibus corpus tuetur, ipsumq; promptius ad obeunda munera reddit, aluum emollit, ulcerantium uenenorum uires permixtum hebetat, contra uenena datur, assidue potum redditumq; uomitionibus, soluit aluum hemina mensura cum pari ptisanæ succo aut aqua potum, ad tormina, calidum simul decocta ruta tribus sextarijs in potu datur, uentris animalia pellit, idem maximè ilei intestini morbo laborantibus infunditur, uetus magis calfacit & uehementius discutit, oculorum claritati sublitum confert. Si uetusti non sit occasio, in uase decoquitur ad mellis crassitudinem, ut uetustatem representet.

NOMINA ET EXPLICATIO.


Gd. lib. 7. Simp.
& lib. 2. comp.
ph. gene.

Oleum propriissimo nomine appellatur, quod ex oliuis exprimitur. Germanis, Baumöl.
Gallis uerò Huyle d'oliue appellatum: maturis quidem dulcissimum, calidum, moderatè humidum, uetustum est recens, frigidum humidum, ex crudis autem & immaturis omatribus & omphacinum quantà astringit, tantum refrigerat: illud ueteratum calidius fit, & potentius digerit: hoc autem si dulcescit uetustate, dulcis uires induit, quas sapore explorabis. Tenuè est purum, translucidum, & cuti affusum eius modicum, lassissimè per eam extenditur, continuum sibi manens, & citò à cute combibitur: idemq; optimum estimatur, quale in Italia Sabinum.

Oleum habet uim mitigandi & laxandi.

Oleum syluestris oliuæ.

Caput XXVIII.



Oleum quod syluestres oliuæ fundit, uehementer adstringit, & ad sanorū usus secundum sibi locum uendicat. In doloribus capitis utiliter pro rosaceo substituitur, sudores arceat, defluentes capillos inhibet, furfures, ulcera capitis manantia, scabiem, leprasq; abstergit, tardius canitiem sentiunt, qui eo quotidie perunguntur.

Candidum oleum fit hoc modo: Albū colore, nec anniculo uetustius, in nouum ficitile oris patuli funditur, centum heminarum mensura, & sub solem media quaque die concha refunditur, ex altoq; demittitur, ut assidua deuolutione, ictuq; agitarum respuerit:

resumer: octaua die scenum græcum mundum quinquaginta denariorum pondere, calida aqua madefactum donec emollescat, in supradictum oleum deijcitur, ita ne extillet aqua. postea tecta præpinguis picæ, assulatum casæ aequalis pondus adijcitur, & transactis octo diebus, oleum concha mouetur. Vbi candorem contraxerit, in uas nouum uetere uino affusum recondi debet, subtratis fertulæ Campanæ corollis drachmas undecim pendentibus, cum pari iridis pondere: sin minus, rursus soli mandandum, & idem munus obeundum, usq; dum malbescat.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Oleaster Græcis catmōs, dicitur syluestris olea, secundior satius, quod sive syluestres habent, eam cura fertilitatem minuente. Oleum tamen acius atq; magis astringens, &c.

Oleum album sine elotum, morfu omni caret. Lauandi modum docet Galenus in lib. de comp. phar. gene.

Sicyonium. Caput XXIX.

Sicyonij componendi ratio hæc est: In lebetem oris lati stanno inductum, funditur olei albi, quod crudæ oliuæ reddiderunt, congius unus, aqua semicongius. leui id igne coquitur. leniter mouendo, at ubi bis effebuit, & subtrasto igne refrigerat, innatans oleum concha decapulatur, & adiecta noua aqua conferuescit. & reliquis ut diximus peractis, reponitur. In Sicyonia maximè fieri cōsuevit, Sicyonij inde accepto cognomine Calfactoriæ ad quendam usq; modum uim habet. Febriæ ac neruorum uitij prodest. sceming ad commendandum faciei nitorem eo utuntur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Sicyonium oleum maximè in Sicyonia parari scribit Dioscorides, ut patriam appellationem inde habeat, Lat. Corn. docetq; eius faciendi modum ex oleo albo, ita ut dimidium eius aquæ affundatur, cum qua bis effervescat, nulla mentione facta cucumeris, ex quo incōsto fiat, & unde alij Sicyonium appellatum putant, ærō σικύον uidelicet cucumeris syluestris succo, aut eiusdem radicibus componi tradit. Aëtius autem ser. 9. cap. 27, non B quidem Sicyonij mentionem facit, sed alias olei in quo syluestris cucumeris radix sit incōsta, Indicauitq; Sicyonium simplex, quod ex incōctis oleo radicibus cucumeris syluestris fiebat, Paulus uerò tum compositum Sicyonium oleum, tum quod ex elaterij succo iidem compositum est, significat. quorum, omnium descriptiones Paulus lib. 1. cap. 20. habet.

Sicyonium oleum & cicutum, raphaninum, sesaminum, amygdalinum, caryinum, sinapinum, & alia plurima, ex fructibus & seminibus expressa & parata rerum, ex quibus extrahuntur & componuntur, naturā sequuntur. Quo pacto autem alexandria & sicilia fiant, rerumq; uirtutibus insiciantur, non abs re fuerit adposuisse ex Galeni De sanitate tuenda lib. quarto. Sine enim qui per infusionem illa tantum efficiant, sunt & qui per coctionem. Vbi uerò per infusionem fiunt, res quæ infunduntur, contundi prius debent antequam in oleum insiciantur, Sic enim qualitate & ui sui oleum citius insicient, quæ postquam macerata fuerint, quod quadraginta & plurium dierum spacio fiet, abijciuntur, humidum uerò luteo percolatur & usui seruatur. Qui uerò diutinam macerationem illam rerum ferre non possunt, eos parum in oleo percoquere coguntur, igni certè lento, qualis prunarum est, quæ tamen nec ipse multè esse debent, partim aquæ uiniue tantulum inijcere, quantum coquendo totum uanesceat. Is modus erit, si quadruplum eius aut quintuplum oleum sit. Vinum autem ad affectus podagricos & articulares, aqua uerò ad alios utilior est. Et sic cautiore operantur, quo nec inieci a torreatur, nec oleum uisionem odore referat. Verum qui his magis sunt curiosi, in duplicibus uasis coquunt: quod fit cum in lebeti, in quo fit aqua seruens, inseritur exiguum uasculum, in quod fundi oleum debet. Et hic commodior coquendi est modus.



Strigmenta balnearum. Caput XXX.

Strigmenta à balneis calfaciunt, molliunt, discutunt. ad sedis rimas & condylomata illinuntur. Illa uerò quæ ex palestris pulueri sibi afciuerunt, in sordis speciem redacta, articulo-

A culorum nodos imposita adiuuant. ischiadicis in foris aut malagmatis locum, eas lida commodè sufficiuntur. derafa gymnasiorum parietibus simulacrisq; sordes calfaciunt. tubercula, quæ agrè ad coctionem perducuntur, dissipant. desquamatis & ulceribus senum profunt.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Strigmenta Archigenes γλοιον dixit. Dioscorid. & Galen. & alij medici Græci etiam γλοιον appellare solent. Sunt autem trium generum strigmenta, balneorum, palestræ, & parietum atq; statuarum gymnasiarum, Balneorum ex sudore, oleo, & sordibus in balneo defrictis ab hominibus constant. Palestræ ex iisdem rebus componuntur, accedente insuper pulvere, qui partim ab olei illitione luctaturis inspergebatur ac asfricabatur, partim à luctantibus in arena mutuo manibus ingestus, itemq; ex lucta excitatus, corporibus inhebat. Prior sanè pulvis πῦρ & Atticis κόνιαλ & uocabatur, autore Galeno: eiusq; asfrictus aliquando solus, aliquando præmissa olei illitione, densandi ac corroborandi corporis per oleum emolliti gratia fiebat, uelut secundo & tertio γλοιον Galenus tradit. Quamquam & ob emendam gracilitatem, crura pulvere conspergere eiusdem operis libro 5. doceat. & affuso oleo consfricare, sed ita ut is plus tenuis & pinguis sit, κόνιον λεωπαρῶν appellat, in quo uidelicet nihil asperi, neq; acris insit. Extenuant enim magis quàm incarnant, qui pumicosa asperitudine, aut nitrosa acredine participant. Quin & refrigerandi & sudoris reprimendi causa idem pulvis adhibebatur, qui uim habeat obducendi meatus, refrigerandiq; ac repellendi, uelut 8. simp. phar. Galenus testatur. At uerò tertium genus Strigmentorum est parietum atq; statuarum in Gymnasijs, quæ sordes sunt ex oleo magis sui parte constantes, quæ ex materia, cui in herent, aliquid assumunt, uelut eruginem ex statuis æreis. His enim itemq; parietibus oleum quo se oblinebant palestrite, inter illinendum inspergebatur, quàmquàm etiam statuas quasdam fuisse in gymnasijs, itemq; uasa ærea, quæ oleum ipsum, quo se luctaturi oblinerent, continerent, ex Pauli ac Galeni uerbis apparet. Ait enim Paulus lib. 7. Sordes ex æreis statuis ac uasis, in quibus largum oleum remanet, quod & eruginis quippiam contrahit, discussoria sunt, & reficantes moderatè ac mollientes, quare tubercula cruda discutunt.

Elæomeli. Caput XXXI.

IN Palmyris Syriæ, quod elæomeli uocant, ex quodam caudice manat oleum, melile crassius, sapore dulci. Bilem, cruditatesq; detrahit, sextario cum una aqua hæmina dato. sed qui sumpere, torpescunt, & uiribus deficiuntur: quod minimè uereri oportet, uerum crebrò excitare, ne ueterno pressi fomnos capient. Fit & oleum è pinguitudinè furculorum oleæ. optimum uetus, crassum, pingue, non turbidum, calfacit. Priuatim caliginibus oculorum illinitur. lepras, neruorumq; dolores illitum emendat.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Elæomeli, uel Oleomeli, nostro seculo incognitum.

Magno implicatur errore, qui mannâ putant elæomeli ueteribus fuisse, quorum error facile exploditur. Nam elæomeli constat resinæ genus quoddâ esse, Palmyris familiare, quod è caudicibus profuscat, perinde quasi apud nos ex amosis Betulis liquor, qui limctus ualde turbat uentrem, sapore dulci.

Cicinum oleum. Caput XXXII.

Cicinum oleum hoc modo temperatur: Maturi ricini quæ uoles quantitate torrido sole flaccescunt, & uuarum more instrati tantisper insolantur, dum uestiens cortex fractus decidat. caro colligitur, & coniecta in pilam diligenter tunditur. postea in leberem stanno illitum, qui aquam habeat, demittitur. subiectoq; igni feruescunt. & ubi insitum prorsus humorem reddiderunt, sublato ab igni uase, innans oleum contha tollitur & reconditur. Sed in Aegypto, ubi largior increbuit usus, longè secus fieri solet. Nam repurgatos ricinos molæ mandant, & accuratè molitos per sportulam torculo exprimunt. Tum quidem ematur uerunt ricini, cum continentibus orbiculis exuntur. Ad psoras, & ulcera capitis manantia ualet, prodest sedis inflammationibus. uuluis conuersis atq; præclulis: item indecoris cicatricibus, & aurium doloribus emplastra efficaciora reddit additum, potu aquam aluo extrahit, uentris animalia pellit.

NOMINA

LIBER PRIMVS.
NOMINA ET EXPLICATIO.

Cicinnu oleum, est quod ex fructu Ricini, quem Greci xixu uocant, conficitur. quid autem sit Cici seu Ricinus, & quæ eius forma, facultas & temperamentum, libro 4. cap. 145. luculenter demonstrabimus. Hoc oleum, ut hic Dioscorides tradit, aliter Aegyptij, aliter alij conficiebant. Poterit hodie isdem planè rationibus parari, quamuis eius nullus sit in officinis usus, cum passim nunc in hortis proueniat. Est hoc oleum admodum tenue, ob id ad discutiendum potens.

Amygdalinum. Caput XXXIII.



Amygdalinum oleum, quod aliqui metopiū uocant, hoc fit modo: Semodius *ex amaris nuci-^{*hoc est, Sedit} bus repurgatis siccatisq; in pila ligneo pistillo leniter ^{rij tres,} tunditur in ossas, aquæ quæ ferbuerit sextarius adij-
citur, & ubi dimidia hora humorem hauserit, uehe-
mentius quàm antea tunditur, mox tabellis premitur,
& quod digitis hæsit, concha excipitur. Pressis nuci-
bus rursum hemina aquæ inspergitur, & postquam
ebiberint, idem opus prosequendum. Singulas hemi-
nas reddunt singuli modij. Contra uuluarum dolo-
res, strangulatus, conuersiones, & eorundem locorum inflammationes efficax est: ui-
tijs renum, calculosis, difficili urinæ, suspiriosis, lienosisq; proficit. dolores capitis,
grauitatem auditus, sonos incertos, tinnitusq; discutit. maculas & uitia cutis tollit
e facie, & eam erugat cum melle, radice lilij, & Cypria cera, aut rosaceo cerato. & o-
culorum hebetudines emendat. ulcera capitis manantia, & furfures cum uino ab-
stergit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Amygdali summariam considerationem quære infra cap. 139. Metopiū dicitur oleum amygdalinum, B
propter Galbanum, quod recipit. Vocatur & μετωπιον, patrio nomine, Aegyptiacum quoddam un-
guentum, propter Galbani mixtionem. Nam lignum, in quo Galbanum, aut, ut alijs placet Amonicum, na-
scitur, Metopion quoq; uocatur. Habet prædominatricem amaritudinem, adiuncta quadam uis defendendi, &
nitente simplice.

Balaninum. Caput XXXIII.

Simili modo fit balaninum oleum, quod repurgat maculas, lentigines, uaros, &
cicatrices nigras. aluum soluit. stomacho aduersatur. contra aurium dolorem,
sonos, & tinnitus auxilio est, cum anserino adipe instillatum. Similis sesamini ratio.
Fit etiam è nuce iuglande oleum, quod carynum uocant. Eandem uim habet
quam balaninum.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Βαλανιον & μυρε-Ιχνη, id est, glans unguentaria, Myrabolanus quoque Plinio dicta, ex Barbarica regione
allata, Ven Arabibus dicta, hodie frequens, stomacho aduersatur, cum hyaronelie pota carnis huius dra-
chma una est uomitoria: cum oxierato autem iocur & lienem purgat, cum aceto item (quo maxime gus-
det ad agendum) lepras, psoras, lentes, uirilignes, pruritus extergit: lieni & hepati indurato illinatur
cum farina aliqua siccante, ut erui, lolij: Lieni etiam prodesse scribit Galenus. Carnis huius succo calido
utuntur aromatarij: id enim modorum cum sit, omnibus suscipiendis odoribus est aptissimum, ut insipi-
dum saporibus, & coloris expers coloribus. Id oleum Balaninum hic Dioscoridi dicitur. Oleo ex Gal. in ther. ad
presso, quod reliquum est magna terreum & amarum, incidit, tergit, contrahit, stipat, ad prædicta etiam piscorum,
efficax, sed minus. Id autem uidetur esse μυροβαλανιον πιεσμεν, id est, expressum, quod cataplasmatibus
misceat Galenus.


Sesaminum oleum fit ex semine sesami, de quo lib. 2. cap. 91. Sesamon non parum in se continet uiscosum Lib. 11. & lib.
& pingue: quare emplastrum est, & emolliens ac modicè calidum. Eiusmodi saccharatis est quod conficitur 13. metho. & bis
oleum: & herbe quoq; decoctum simplicem uim habet. lib. 9. co. ph. p.

in naco

A

Gal. lib. 8 simp.

Gal. lib. 7 simp.



In nuce iuglande id quod edendo est, oleosum est, & tenue, itaq; etiam facile exprimitur: & quò diutius reconditum fuerit, magis tale efficitur. Quamobrem oleum ex eo inueterato exprimere liceat. Tunc sanè admodum fit per halitum euaporatorium. Itaq; quidam co gangrenas & carbunculos, & eglogas sanant, ac nonnulli ad neurotrota, hoc est, neruorum uulnera utuntur. Cæterum si recens sit, astringentis nonnihil qualitatis etiam obtinet.

Hyoscyaminum. Caput XXXV.

HYOSCYAMINUM sic fit: Semen candidum, recens ac siccum tunditur, & calida aspergitur aqua, ut in amygdalino diximus. dumq; insolatur, siccatur, quæ sub manu sunt, partes cum reliqua massa permiscantur. hoc autem fieri oportet dum nigrescat & grauiter oleat. mox pressum atq; excolatum reconditur.

Oleum è grano
gnidio.
Cnicinum.
Rhaphaninum.
Melanthinum.
Sinapis.

Ad aurium dolores efficax est, pelsis miscetur, ad emolliendum utile. Fit & è grano gnidio purgato & tuso. Vis ei alium soluere potu. Non secus cnicinum oleum temperatur, cui facultas eadem est quæ factò è gnidio grano, uerum inualidior. Rhaphaninum è raphani semine fieri solet, cæterorum more. Phthiriasis mala ualitudine contractas tollit. Scabrities cutis in facie emendat. Ad obsonia utuntur Aegyptij. Melanthinum idem quod rhaphaninum potest. Tritum sinapis semen, et calida aqua madefactum, adiecto postea oleo exprimitur. Id ad diuturnos dolores efficax est. transfert humores qui in aliqua parte concreuerunt.

EXPLICATIO.

Hoc oleum à semine Apollinaris herbe denominatur, quam & hyoscyamum, id est, fabam porcinam appellant. eius historiam & picturam quere lib. 4. cap. 59.

Vsus seminis & per se, & semine expresso stuporem gignit, atq; adeo insaniam.

Falluntur qui granum gnidium è chamelea nasci autumant, similitudine filiorum decepti, ut fufius dicemus cum tractabitur eius historia lib. 4. cap. 154.

Oleum ex gnidio grano strictum eandem uim habere quam cicinum, Plinius affirmat. Habet hoc oleum magnam uim, præter ea quæ à Dioscoride dicuntur, in alio lenienda, si umbilico admoveatur.

Gal. lib. 2. simp.
cap. 5. & lib. 5.
sanita. tu.

Gal. lib. 6. simp.



Cicini semen calidum, ordine tertio, purgat pituitam. Officina semen carthami appellant. Oleum seminis lac cogit, & astrictam alium soluit in historia plantæ certius lib. 4. cap. 168. de eo agetur.

Rhaphaninum oleum Galenus ait cicino oleo calidius esse, aliàs simile.

Melanthium unde melanthinum oleum, est Gith, & officinarum Nigella.

Sinapisinum oleum fit ex semine madefacto in oleo expressoq; quo utuntur ad neruorum rigores, lumborumq; & coxendicum perfrictiones.

Myrteum. Caput XXXVI.

MYRTEI faciendi ratio est: E myrto nigra syluestri, aut satiuâ, foliorum molliissima quæq; rufa premuntur. succo pares omphacini olei portiones adijciuntur, subiectisq; carbonibus inferuescunt donec concoquantur. innatans oleum deraditur. Sed longè facilior hæc compositio: Tenera folia contusa coquantur in oleo & aqua, & quod innatat eximitur. Priuatim alij deiecta in oleum folia in sole macerant: alij prius oleum inspissant malicorio, cupresso, cypero, & iunco odorato. Efficacius est amarum gustu, & oleosum, uiride, translucens, & olens myrtum. Astringit & indurat, ideo medicamentis miscetur, quæ cicatricem obducit, prodest ulceribus in capite manantibus, ambustis igni, & papularum eruptionibus. Facit ad attrita & furfures, sedis rimas, condylomata, articulos laxatos, corporis sudores

res

LIBER PRIMVS.

Ves compescit, & omnia quæ adstrictionem inspissationemq; desiderant.

Hodie utitur oleo myrtino in uentris fluxibus: uehementer enim exiccet. Myrti picturam & summam
riam considerationem quare cap. 128.

Laurinum. Caput XXXVII.

Laurinum fit hoc modo: Lauri bacca cum maturæ sunt, in aqua coquuntur: siquidem ex obducto cortice quandam pinguitudinem reddunt, quæ manibus subacta concha excipitur. Alij omphacinum prius oleum cypero, iuncto odorato, & calamo inspissant, deinde tenera lauri folia concoquunt. Alij etiam baccas, donec oleum odorem contraxerit, alijs styracem & myrrum addunt. Optima laurus ad id latifolia & montana. Oleum laurinum utilius quæ recentius, quôque uiridius colore, amarissimum, & acre. Vis ei excafactoria, emolliens, uenarum spiracula aperit, laesitudines discutit, omnibus neruorum uitijs, algoribus, destillationibus, aurium doloribus, malis renum frigore contractis, illitum, non aliud iuuantius, attamen potum nauseam parit.

* Alij, myrrbâ.

Laurinum oleum quidam è baccis exprimunt tantum: alijs folijs modo: alijs folia & corticem necnon styracem addunt, aliosq; odores. Excafacit uehementer, & emollit: ita ut ij, qui scabie secatent, & asperis impetiginibus obfidantur, illiti in balneo, persanentur. Sed eo conuenit abstinere, liehenibus & psoris, inflammationem minantibus: in calidis quoq; temperaturis & biliosis: siquidem frigidis corporibus, humidis & pituitosis congruit: item ijs, quorum articuli algoribus, aut persictione affliguntur: ischiadicis subsidio est: uermes & pediculos caecat, furfures capitis emendat: alopecias & ophiasis corrigit, usus eius in lauacro natri: postea detergere oportet uino & melle, & foenigraci farina: sed cauendum est, ne capiti dolorem sentienti, laurinum hoc oleum admoveatur.

Lentiscinum. Caput XXXVIII.

Similis lentiscini ratio. Nam è maturo fructu temperatur, fractis prius spissamentis, ut in laurino diximus. hoc scabiem iumentorum canumq; sanat, utilissimum pelsis, a copis, & leprarum medicamentis, sudores cohibet. Nec secus terebinthinum fieri solet, quod refrigerat & astringit.

Ginguis ex inflammatione laborantibus optimum pharmacum est oleum lentiscinum caliditate temperatum ore retentum: sit autem recens, nam uetustius tanto recentiore peius est, quanto etate antecellit. Imponatur autem uasculum in quo calsit lentiscinum, in aliud maius uas, quod aquam è alidam multam completat. Maxime per è itaq; inflammationi ginguarum hoc conducit. Nec uerò minus etiam si iuxta aliam quandam partem, tum pelliculæ linguam ambientis cum succingentis totum os, aliquis dolor ob inflammationem oriatur, dolorem sedat lentiscinum. Repellit enim citra molestiam & absq; asperitate, quam plerq; augsterum habent, discutitq; citra mordacitatem, cuius rei inflammationis præcipuus usus existit.

Mastichinum. Caput XXXIX.

Mastichinum è trita fit mastiche, quod contra omnia uulnè mala efficax est, mediocriter calfacit, astringit, & emollit, aduersus prominentes stomachi durities, coeliacorum, dyntericorumq; cruciatu utile, faciem emaculat, & colorem nitidum facit, optimum in Chio insula componitur.

Resinarum iure præstantissimum est Lentiscina, id est, Mastiche, huius oleum corfortat stomachum, neruos, hepatis & iuncturas, lenit apostemata dura, & sedat dolores.

Mastixivoy è mastice. & πονιδωτερον conficit Paulus, simplicissimum scilicet & magis uarium. Vltimum accipit olei sext. 50. libras elemij 5. xylobalsami lb. 10. schœnoanthos lb. 5. card. moni lb. 7. mastiches lb. 5. xylomastiches lb. 8. terebinthine lb. 3. come absinthij libram unam, uini odorati sext. quinq; aque sextarios decem. Res sicca in uino madefiant per tres dies, misceantur oleo & aqua, & coquantur horas sex, & tunc mastiche & terebinthina additur, & exactè commixta & infrigidata depurantur. In simplicissimo, pro oleo sesamino Paulus accipit omphacinum, & non nisi unciam unam mastiches: licetq; aliquos addere absinthij & styracis aut uinciam unam.

Paulus Asclepiades.

DIOSCORIDIS
Vnguentorum compositio. Caput XL.



DE ratione unguentorum consequenter tractandum existimauimus, quando-
quidem ea in nonnullis corporum uitijis, aut medicamentis mista, aut corpo-
ri perfusa, aut naribus obiecta, plurimum prosunt, in quorum probationibus con-
sultare nares oportet, an ea oleant ex quibus temperantur: optimum huiusmodi
iudicium, quod in quibusdam planè obseruari non potest, propter ea quæ admiscen-
tur odore cæteris præualentia: ut in amaracino & crocino, telino, & pleriq; alijs,
quæ crebra circa hæc meditatione experiri conueniet.

EXPLICATIO.

Vnguenta quandoq; sunt ex floribus, ut Rosaceum, Leucoium, Susinum. Aut ex folijs, ut Myrthinum
aut ex radicibus, ut nardinum, &c. Vnguentis porrò ueteres multis modis usi sunt. Ad salubritatem, ut ua-
santes, & lauantes. Ad necessitatem, ut certantes Ceromate ungebantur. Ad luxuriam, ut delicati causa Ve-
neris & mensarum. Græci nuxtum unguento uinum bibere non erubescere, quod dicebatur Myrtes. Ba-
thilli populi unguentis madent. Huius luxuriæ inuentum Persis refertur acceptum. Vnde Horatius: Persicos
odi puer apparatus. Eius rei fidem facit serinium unguentorum laudatissimorum, quod expugnatis Darij ca-
stris repperit Alexander. Cyprij quoque Cyziceni, & Corinthij eadem mollitiæ effeminati sunt. Constat
B usum unguentorum aliarumq; rerum ad delicias repertarum, usque ad Iulij Cesaris tempora Belgas fuisse
ignotum. Imperator Belgas fortissimos dicit, quod ad eos non comment, qui quæ ad effeminandos ani-
mos pertinent, illuc comportent. Inuasit hic luxus totam paulatim Italiam, adeò ut M. Ottho Neroni mon-
strauerit uestigia pedum unguentis tingi, hisq; balnearum parietes quandoque aspersi sunt. Caium quoque
principem ferunt unguento solitum lauari. Anno post urbem conditam, 565. P. Lucinius Crassus, &
Iulius Cesar censores edixerunt, ne quis uenderet unguenta exotica. L. Plotius, Plotij bis Consulis fra-
ter proscriptus à Triumuiris, in Salernitana latebra unguenti odore proditus est. In confesso est Helioga-
balum Imperatorem triclinia quandoque, lectos & porticus omni florum genere strauisse, ut lilij, uiolis,
hyacinthis, & narcisis, ac per eos ambulasse, seq; unguentis omnium fragrantissimis nudum se penumerò
perunxisse. Quem secuti Imperatores prope nullum mollitiem sibi non permisissent. Quod ego in Romanis
principibus, quamuis damnum plurimum, non tamen admodum miror, quum etiam apud eos abiectissimi ho-
munculi, idem sibi indulserint.

Vnguenta hæc ad uoluptatem tantum & suauolentiam inuenta & ad delicias, ad curam uerò corporis
non adeò, planè interierunt: etiam si hodie unguentorum nomine ueniunt alia medicamina, quorum usus est
ad ulcera & tumores corporis consummandos, &c.

Rosaceum. Caput XLI.



* Alias, sensim.

Rosaceum sic fit: Lunci odorati quinq; libras & bessem tun-
dito, & subactas aqua in uiginti olei libris & quincunces
subinde mouendo, coquito, dumq; percolaueris, in olei libras
uiginti, & quincuncem, adijcito rosas non madefactas numero
mille, & manibus melle perunctis identidem moueto: interdum
* premens, finito nocte tota macerari, postea exprimito, & ubi
recrementum pessum ierit, mutato uase, in craterem melle illitū
recondito. Cæterum rosas quæ antea pressæ fuerunt, in label-
lum demittito, & affusis octo libris & quadrante spissati olei,
iterum premito, eritq; secundarium oleum, Quod si tertias usque, quartasue
perfu-

perfusiones infundens exprimere uoles, secundarium fiet, tertiarium, & quartarium unguentum. Sed quoties id feceris, uasa melle oblini debent. Si uero secundam infusionem instituere libet, in expressum oleum, numero pari recentes rosas, nullo humore imbutas inijcito. manibus melle præmadefactis, agitans premito. & iterum, tertio & quarto, simili modo exprimens facito. totiesq; recentes rosas detractis unguibus immittito. fiet enim ita oleum multo ualidius, nam septies oleum rosarum infusionem admittit, nec amplius. prælum melle perungatur. oleum à succo diligenter secerni oportet, nam si minimum quid relinquatur, unguentum corrumpet. Alij autem detractis unguibus, rosas tantum oleo macerant in sole, hoc modo: Rosæ quæ silibram pondere æquant, in sextario olei diebus octo madescunt, & usq; tertiam perfusionem quadraginta diebus insolantur, & sic oleum reconditur. Alij calamo, aut aspalatho prius olei spissamenta faciunt. Alij coloris causa anchusam admiscunt, & salem, quo minus oleat. Vimastringendi & refrigerandi obinet. Alij, corrumpatur.
mentis & cataplasmatibus utile. Potum soluit aluum, stomachi ardorem restringit, ulcera caua replet, & mulcet, quæ cacoethie uocantur. ulceribus in capite manantibus, atq; feruidis eruptionibus illinitur. caput dolens eo perfunditur. dentes inter initia doloris collui prodest. ad genarum duritias illitum efficax est. ad lacescitam interanea & concitatas uuluas utilissimè subiicitur.

EXPLICATIO.

Paulus Rosaceum sic construit: Rosarum rubearum exungulatarum per diem unam naturalem exiccatarum unc. 3. Olei omphacini sextarium unum: obscrue diligenter uas ne expiret, expose soli per quadraginta dies: repones; non super pauimento, sed tabula. Alij non soli exponunt, sed in puteo ponunt: alij solum sub terra quadraginta dies. Arabum modus in huius olei compositione hodie officinis usitatus mihi melior uidetur. Habet uirtutem frigidam & stipticam, & ideo ad dolores capitis ex febre seu ex calore solis optimum est.

Elatinum. Caput XLIII.

FRacta elate tusa & scarificata, in labellum deiicitur. omphacinum oleum tri-duo infunditur, mox per sportulâ exprimitur. uerum pares esse debent utriusq; portiones. dein mundo uase ad usum reconditur. Viribus rosaceo proportionem respondet. aluum tamen non mollit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Elæx stenellum palmæ germen, secundum Galenum, iuxta Dioscor. ipsum fructus tegumentum. Secundu-
m Histichium, prima palmæ germinatio. De eo longius & certius in historia Palmæ, paulo post.

Melinum. Caput XLIII.



Melinum hoc modo temperatur: Olei mæcōgius, decem aquæ sextarijs admisce-
tur. Adijcitur elatæ palmarum fractæ quadrās, & iunci odorati uncia; quæ die uno macerata coquantur, mox in uas oris patuli oleum exco-
latur, & indita arundinacea crate, aut uetusta tegete, cotonea mala superponuntur, & uesti-
mentis operta tantisper inibi resident, dum ma-
lorum uires ad se oleum alliciat. Aliqui coto-
nea, decem dierum spacio operimentis inuol-
uunt, ut contineatur odoris suauitas, nec euanescat. postea biduo macerata oleo
exprimuntur, oleumq; reconditur. Id uim refrigeratorem & astringentem habet.
Contra scabiosa ulcera & quæ serpunt, ac furfures, perniunculosq; effectum præ-
bet. exulceratis uuluis infunditur. citatam urinam sistit infusum. sudores cohibet.
contra cantharidas, buprestim, pinorum erucas, bibitur. Laudatur maximè quod
cotonæa mala olet.

A Magni usum est hoc in ventris fluxibus. Paulus *μυλινον* vocat, & in hunc modum componit: Cydoniorum bene deterforum, & cum suis corticibus incisorum accipit unc. tres, olei omphacini sextarium unum, & ponit soli diebus quadraginta.

Oenanthini compositio. Caput XLV.



O Enanthe è labrusca, optimè olens postquam emarcuit, deiecta in omphacinum oleum mouetur, voluiturq; & cum biduo manserit, exprimitur, & reconditur. Astringit, proximum rosaceo, flectu prebens: sed aluum non resoluit, aut mollit. Probabilissimum est quod odore oenanthem refert.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Oenanthem vitium sylvestrium, quod cum floribus Galeno appellatur, ex quo succedentibus diebus una fit: plura in ipsius Oenanthem historia & pictura.

Teleni componendi ratio. Caput XLVI.



Foeni graeci librae quinque, calami libra una, cypiri librae duae, olei libris nouem, septenis diebus macerantur, quotidie ter mouentur, postea premuntur, & reponuntur. Aliqui pro calamo cardamomum substituunt, & cypiri loco xylobalsamum macerant. Alij oleo antea his odoribus spissato foenum graecum macerantes exprimunt. Hoc telinum abscessus emollit, & concoquit. omnibus uuluarum duritijs magnoperè conuenit. foeminis difficilè parientibus subicitur, ubi praeter excretis humoribus loci siccitatem contraxerunt. sedis inflammationes lenit, tenesmo subditum prodest, ulcera capitis manantia surfuresq; expurgat, ambustis & perniciosis addita cera proficit: uitia cutis in facie emendat, pigmentis ad conciliandum faciei nitorem inferitur. Eligi oportet recens, quod non uehementer foenigraeci odorem praeferat, & manus abstergat, sapore ex dulci in amarum inclinato: tale enim optimum iudicatur.

Hoc unguentum à Silicula, id est, foenu graeco nomen habet, in Telo insula etiam Menandri temporibus celeberrimum.

Sampfuchini compositio. Caput XLVII.

Serpylli, casiae, abrotani, florum sisymbrii, frondium myrti, sampfuchi singulae portiones, quadam pro uiribus ipsorum coniectione, una tunduntur, atque is omphacini olei modus adicitur, qui madentium uires non euincat. hac post quadriduum exprimuntur denuò noua alia, simili mensura & aequali tempore macerata premuntur, ita enim ualidius reddi solet. Eligi oportet sampfuchum colore ex atro uiridi, plurimum redolens, medio critere acre. Vim habet acrem, calfactoriam, extenuantem, aduersus uuluae praeclosurenes, conuersionesq; efficax est, menses & secundas & partus extrahit, uuluae strangulatus recreat, lumborum inguinumq; dolores lenit, sed cum melle uti eo praestat, quandoquidè uehementi astringitione locos induratur, lassitudines illitum discutit, in opisthotonicorum, uulsozumq; cataplasmata utilissimè additur.

Maiorana, Amaracus, Sampfuchus, Dioscoridi, Theophrasto, Plinio eadem sunt herba: unguentum tamen antecicium à Sampfuchino cur diuersum sit Dioscoridi, doctè mihi Musa coniectare uidetur, ex plantae huius appellatione consuetudine utriusq; regionis, in qua utrumq; id unguentum fiebat laudatissimum.

Ocimini compositio. Caput XLVIII.

Ocimum

O Cimum oleum fit ut cyprinum: Ocimi folia decerpta librarum undecim A
& besis pōdo, dienoctūq; uiginti olei libris macerato, premito, colato, cumq;
exhauseris quallum, rursus parem olei modum fundito, & exprimito. Vocatur au-
tem id secundarium, nam tertiæ perfusionis non est capax. Deinde recens ocimum
æquali pondere, ut in rosaceo diximus, rursus maceratur, & cum tāto temporis spa-
cio maduerit, exprimitur, & oleum reconditur, quod si in animo fuerit ter aut qua-
ter madefacere, semper ocimum recens addes. Potest ex omphacino confici, sed il-
lo modo melius. Idem quod sampfuchinum potest, sed inefficacius.

*Ocimum oleum fit ex ocimo, aut si masis, oximo, ab ὀξυς, quod redolere significat, herba odora, quæ
nunc Basilicon dicitur, Germanicè Basillen.*

Abrotonini compositio. Caput XLIX.

O Lei cyprini odoribus imbuti libris nouem & quincūce, foliorum abrotoni li-
bras octo die noctūq; madefactas, premito: quod si in longum tempus oleum
uelis asseruari, eiectis prioribus folijs, noua appones, & macerata exprimes. Cal-
facit, ad uulua duritias præclusionesq; efficax est, menstrua & secundas pellit.

*Abrotoninum oleum corpori infirmitatibus, rigores circuitu remanentes per sanat. Abrotoni hyloriam & pi-
stiram quære lib. 3. cap. 25.*

Anethini compositio. Caput L.

O Lei libris octo & dodrante, florum anethi libras undecim & bessem, macera-
tas in oleo die una, manibus premito, & recondito: quod si iterum perfunde-
re uelis, recentes anethi flores consimiliter madefacito. Vuluarum duritias emollit,
uenarum spiracula laxat, contra horrores febrium circuitu redeuntis auxiliatur.
calfacit enim, & lassitudines discutit: prodest articuloꝝ doloribus.

*Hic Dioscorides pro lb. 8. & unc. 9. olei, ponit florum lb. 11. unc. 8. exponit soli diem unum. deinde expri-
mit et reponit. Ego tamen non uideo, quo pacto olei illa mensura tot florum sit capax. Præsertim cum Paulus
accipiat comedat per unum diem unc. 1. pro Sextario.*

Susinum. Caput LI.

Susinum, quod alij lilinum appellant, sic temperatur: Olei libras nouem cū quin-
cun ce, calami libri quinque & quadrans, myrrhæ uncie quinque, permixto odori-
fero uino decoquantur, & colato oleo, cardamomi tusi & celesti aqua madefacti li-
bræ tres & semis macerantur, premunturq; tres libras cum semisse spissati olei assu-
muntur, mille lilia decerptis folijs, in latum, uō tamen profundum, labellum demit-
tuntur: iniectum oleum, manibus melle perunctis agitatur: die noctūq; conque-
scunt, & in pyxidem matutinis exprimuntur, quod defluet oleū, protinus ab aqua,
quæ simul expressa fuerat, colo incerni oportet, non enim, ut rosaceum, moram to-
lerat, nam concalfactum feruet & computrescit: quare sæpius decapulandum, uasa
melle illinenda, tenuis sal inspargendus, & si qua fordes uasis faucibus hæsit, exime-
da. Odoramentis iam expressis ex quasillo in labellum transfusus, rursus olei pri-
us odoribus imbuendi, quod primum pondus æquet, & cardamomi tusi drachmæ
decem conijciuntur. Hæc manibus scite pressa, interiecta breui mora exprimuntur:
quod profluit, repurgatur: tertio eadem infunduntur, adiecto cardamomo & sale,
& manibus melle madefactis. Longè optimum erit quod prius exprimitur, secun-
dum quod sequitur: tertium locum sibi uendicat quod nouissimum prodit, denuō in
mille lilia euulsis folijs expressum primò oleum infunditur: tum eadē ratione pro-
sequendum, idemq; faciendum ut prius, addito cardamomo, dein expresso: & quod
frequentius recentia lilia maceraueris, eò ualidius unguentum efficies. Deniq; cum
factum abundè uidebitur, singulis compositionibus miscere conuenit myrrhæ quā
optimæ duas & septuaginta drachmas, & croci decē, cardamomi quinque & septua-
ginta: croci uerò & cinnamomi pares portiones tunduntur, & cribratæ in lutram

DIO SCORIDIS

A cum aqua demittuntur, expressumque, primo unguentum infunditur, & paulo post excipiuntur uasculis siccis, myrrha aut gummi antea perfusis, & croco, melle & aqua madefactis. eadem fiunt in altera aut tertia expressione: aliqui simplex ex balano, alioue oleo, & lilijs componunt. Optimum esse constat in Phœnice, mox Aegyptio factum. Sed cum primis laudatur quod lilia redolet. Excalfacit, emollit, uulnæ præclusiones, & collectiones aperit, utilissimum ad muliebria mala, ulcera in capite manantia, feruidas eruptiones, uaros, furfuresque emendat, uibices cicatricesque celerrimè ad colorem reducit, ita ut sæpe fallant. in summa extenuat, porum bilem per aluum extrahit, urinam ciet, sed stomacho alienum est, & nauscam parit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Susinum, quod σούριον & ρόριον Græci uocant, diuersum ab eo est, quod liliuin officina nominant, quum præter lilia & oleum multa alia eius compositionem constituunt. Σούριον σούριον, hoc est compositum, sic conficit Paulus: Olei sext. 3. Calami aromatici lb. quinq; myrrhæ unc. 1. Cardamomi lb. 3. πούριον & ρόριον lilijs exungidatorum & diem unum expanforum, lb. 10. Cinamomi unc. 3. croci semunc. Primo infunde in uino myrrham & calamum per dies quinq; mouendo ter in die: post coque cum oleo donec uini ferè consumptum sit. Secundo cardamomum aqua infunditur, & ter in die mouetur, & similiter coquitur per horam unam cum oleo. Postea auferentes cardamomum, oleo puro imponimus tertiam partem liliorum, & post tres dies priore ablata, addatur alia tertia liliorum pars, & interim post tres dies hac amota, additur ultima tertia pars cum croco resoluta, & post tres dies oleo puro adāmus cinamomum confusum, & reponitur. Idem Paulus in compositione simplicis Susini accipit unc. 2. foliorum, & sextarium olei, ut in Rhodino, & exactè obturat ut non respiret, perque tres dies exponit soli. abiectis dehinc folijs alias unc. duas apponit, & iterum exponit soli per alias tres dies.

Narcissinum. Caput LII.

Narcissini olei spissamenta ita fiunt: Sex libræ asphalathi cum sextante turgentur, olei eloti libræ septuaginta cum uncis quinq; assumuntur. Asphalathus aqua madefactus in tertia olei parte coquitur; quo exempto, calamus quinq; libris & besse adijcitur, cum myrrhæ gleba contunditur, cribrataque ac uino ueteri odorato immista decoquitur, simulac autem cum ijs efferbuerit, eximitur, refrigeratum oleum excolatur, cuius portio in labellum mittitur, flores narcissi quàm plurimi coniunguntur, qui bidui spacio, ut in susino dictum est, permoti exprimuntur. Oleum subinde decapulandum, siquidem celerrimè putredinem sentit. Valet hoc ad emolliendas uulnæ duritias, præclusionesque, sed capitis dolores facit.

Plinius lib. 21. cap. 5. & 19. item Dioscorides lib. 4. cap. 1. 42. narcissi duo genera faciunt, licet à Theophrasto & Apuleio non nisi unum genus constituatur: nisi ex floribus diuersitate duplex eius genus facere uoluerint. Est autem planta narcissus, congener aut saltem similis lilio: quare quidam ipsum non minus quàm liliū lilion uocant, ut tradit Dioscorides lib. 4. cap. 1. 42. ubi de narcisso plura.

Crocinum. Caput LIII.

Cum crocinum componere uoles, prius olei, ut in susino diximus, spissamenta facies, eisdem ponderibus & mensuris, cuius olei libræ treis & semissem, croci unciam unam assumes, identidem quotidie moueto, & sexta die quàm hoc assiduò peregeris, oleum à croco colis incernito: eidem croco parem olei modum adijcito, moue triduo*, dein contusæ myrrhæ atque cribratæ drachmæ quadraginta permisceto, & in pilo agitatum recondito. Aliqui oleo aromatibus ad cyprinum imbuto in crocini compositione utuntur. Optimum est quod abundè crocum spirat, in mēdendi usu expeditum. Proximum quod myrrham refert. Calfacit, somnum allicit: quare per sæpe phreniticis subuenit, perfusum, aut naribus admotum, aut illitum, pus mouet, ulcera purgat, contra uulnæ duritias atque præclusiones, & ulcera quæ caeco the uocantur, prodest, cum croco, cera, medulla, duplicato olei pondere: concoquit enim, emollit, humectat, & permulcet ad oculorum glaucitates ex aqua illinitur. Huic autem proportionē respondent butyrium, onychinum & styracinum, quæ etsi nominibus distant, uiribus & compositione cognata sunt.

* Alij, dieb. tredecim cōtinuis.

EXPL.

LIBER PRIMVS.

EXPLICATIO.

Crocini oleum hodie neglectum, quamuis ab autore Luminis inter uulgata & commoda olea recensetur, diuersum tamen ab hoc, quia alia arte utitur quam hic.

Ex unguento crocino fit crocomagma, expressis aromatibus & in massam coactis, quare uiribus inter se non multum distant.

Cyprini spissamentum. Caput LIIII.

Olei omphacini eloti pars una, aquæ celestis tantundem cum semisse, cuius una parte oleum diluitur, altera adijciendis odoramentis admiscetur: dein assumptis aspalathi libris quinq; & semisse, calami libris sex & semisse, myrrhæ libra una, cardamomi libris tribus & dodrante, olei libris nouem, & uncis quinq;. Aspalathus tufus & aqua affusus decoquitur in oleo, donec cōferuefcāt. myrrha autem timo uetere odorifero subacta, contususq; simul calamus, digeruntur in offulas, quæ exempto aspalatho immittuntur, & ubi efferbuerint, sublato atheno, oleū percolatur. Cardamomum tufum reliqua aqua aspersum infunditur, spatha agitatur, nulla, dū refrixerit, interpellatione. Post hæc colato oleo, in uigintiocto libras olei, floris ligustri, quod cyprum uocant, sex & quadraginta libræ cum bese instillantur, quæ sufficienter madefactæ per sportulam exprimuntur. quod si copiosius desideretur, idem recentium florum pondus iniectum simili modo prematur. & iterum aut tertio, si quis uelit, madefacere poterit, & ita reddetur efficacius. Eligi oportet bonum, quod cum odoris suauitate nares feriat. Aliqui cinnamomū addūt. Calfacit, emollit, ora uenarū adaperit, uulnæ neruorumq; uitij conuenit: pleuritidis, fractisq; per se uel cerato immistū. malagmatis imponi solet, quæ opisthotonicis, angina laborantibus, inflammationiq; inguinū opitulatur. itē in acopa adijcitur.

Cyprinum oleum Arabes oleum de Alcamia uocant, quod enim Græcis Cyprus, Arabibus Alcamia est, ut Marardo placet: hodie non conficitur. Posidonius alio modo parabat, ut tradit Paulus Aegineta.

Irii spissamentum. Caput LV.

Spathæ quàm minutissimè contusæ sex libras cum bese in tribus & septuaginta libris & quincuncæ olei, æreo uase, additis decem aquæ heminis incoquito, quoad odorem acceperit, postea in capulam melle oblitam colato, ex eo aromatibus imbuto oleo, irinum primo temperatur, iridē ex oleo inspissato macerata, ut scripsimus. Sed alia est componendi ratio: In olei septuaginta libris & quincuncæ, xylobalsami, ut dictum est, contusi, libras quinq; & sextantem excoquito. postea detracto xylobalsamo nouem libras & dextantem adijcito, & myrrhæ glebam uetere uino odorato perfusam, & in olei ita odoribus imbuti quatuordecim libris, tonidē tufæ iridis, binis diebus acnotibus madefacito, strēuē & uehementer adstringito, quod si uis ualidius fieri, par pondus iterum ac tertio similiter maceratum exprimito. Longè optimum est quod solam irin olet, quale est in Perga Pamphiliæ, & Elide Achaiæ narum. Vim habet calfactoriam atq; emollientē, crustas adimit, fordidæ ulcera & putrida purgat, confert foeminis uulnæ causarijs. item inflammationibus eiusdem atq; præclusionibus, partus eiicit, hæmorrhoidas recludit, contra aurium sonitus ex aceto, ruta & amaris nucibus, prodest, diuturnis destillationibus, naribus illitum, & contra graueolentia earum ulcera, quas ozænas uocant, auxilia tur, alium purgat cyarbus epotus, facit ad ilei cruciatus, urinam mouet. difficileis uomitiones adiuuat, perunctis eo digitis & immisissis, uel ijs quæ ad uomitum ciedum inducunt, angina etiā illinitur, aut ex aqua mulsa gargarizatur. itē contra arteriæ scabritiam datur ijs, qui ci curā, coriandrum, aut uenena fungorū hauferunt; Alio modo nunc parant officinæ: esset nunc magnarum uirium si bene pararetur, ut Dioscor. tradit.

Gleucinum. Caput LVI.

Gleucinum absolute constat omphacino oleo, iunco odorato, calamo, celticā nardo, spatho, aspalatho, sertula cāpana, costo, & musto, circūdati, interim

Auinaceis uasi, quod aromata, uinum & oleum conceperat. Tricenis diebus, bis in die mouetur, postea expressum oleum reconditur. Calfacit, emollit, remittit, horrorib. & nervorum uulua; q; uitijs auxiliatur, omni acopo iuuantius, quippe quod emolliat.

EXPLICATIO.

Τλινάριον Latinis sonat musticum, hodie exoletum. Eius constructionem monstrat Galenus lib. 7. com. medic. κατὰ γένος. Calfacit & quous acopo ad emolliendum utilius. Galenus proprium Glencinum, quo usus est, habuit, cuius descriptionem uide loco iam citato.

Amaracinum. Caput LVII.

Amaracinum longè optimum in Cyzico fieri solet ex omphacino & balanino, spissamentis ex xylobalsamo, iunco odorato, & calamo factis, conditisq; amaraci, costi, amomi, nardi, casia, carpobalsami & myrrhæ odoribus. Aliqui, quò preciosius fiat, cinnamomum addunt. Mel autem & uinum assumuntur: hoc in uasorum illitionem, illud ad cogendas tusorum aromatum offas. Amaracinum calfacit, soporem mouet, uenarum spiracula aperit, emollit, feruorem excitat, urinam citat, putrilaginibus ac fistulis perquam utile: nec non humentibus hernijs, postquàm medica manus operam suam impenderit: crustas, & terra ulcera, quæ theriomata uocant, rumpit: difficili urinæ, illita sede, & eius inflammationibus auxiliatur: hæmorrhoidas illitu soluit, uulua; subditum menstruos cursus euocat, duritias, ac uulua; tumores discutit, uulneratis nervis, musculis confert, laneo centunculo modicè madefactum & impositum.

Ex hoc loco quidam probare uolunt, amaracum & Sumpsyichum diuersas esse herbas, quandoquidem de Sampsuchino & Amaracino unguento seorsim scribit Dioscor. sed falluntur, Dioscorides enim, distincta fecit capita, quòd non sit eadem compositio, sed diuersa.

B Megalinum. Caput LVIII.

Factitabatur olim Megalinum, sed nunc compositio exoleuit & prorsus oblitterata est: cuius ad historiæ complementum meminisse non fuit alienum. Mistura cum amaracino eadem erat, sed resina exuperabat, hac tantum ratione differens. Quare leuiter emollit. Resina unguentis, neq; tutelæ neq; uoluptatis gratia adijcitur, sed coloris crassamentiq; causa. Ea tantisper coquitur, dum desinat olere: cuius coquendæ ratio declarabitur, dum de resina differemus.

Hedychroum. Caput LIX.

Quod hedychroon uocant, in Co fieri solet: eisdem præditum uiribus & misturis, quibus amaracinum, sed suauius spirat.

EXPLICATIO.

Hedychroi descriptionem, quam Dioscorides hic reliquit, inquit eandem eius uim ac preparationem esse, quæ amaracini est unguenti. Galenus habet tum lib. 1. de Antidotis, ex Andromachi uersibus, tum ad Pisonem ex Magni traditione. Habet autem & eam Aëtius, 13. cap. 89. & Paulus 7. cap. 11. uariantibus tamen paululum inter se descriptionibus. Apparet itaq; hedychroi usum non solum in Theriaca quondam fuisse, sed etiam unguenti loco usurpatum esse, & oxænis odoris gratia illitum à Galeno, sicut etiam pulmonis per odorem resiccandi gratia, cuiusdam se idem exhibuisse refert locorum affectuorum 4. fine. Quæ gratia etiam medicamentis ad fumum comparatis inditum fuit.

Metopium. Caput LX.

Fit in Aegypto unguentum, quod metopion patrio nomine appellatur, propter galbani mistionem: nam lignum in quo galbanum enascitur, metopion uocatur: constat amaris nucibus, omphacino oleo, cardamomo, odorato iunco, calamo, melle, uino, myrrha, balsami semine, galbano & resina: probatur pingue, graui odore, quod

LIBER PRIMVS.

quod magis cardamomum & myrrham, quàm galbanum respiciat: Calfacit uehementer, & adurit atq; extrahit, ora uenarum aperit, ulcera purgat, extrahitq; ad præcisos neruos, & musculos, ad hernias humore contractas, cum erodentibus medicamentis efficax est, ceratis & malagmaris inseritur: horribus, conuulsisq; præfertim quibus ceruix in scapulas deiecta, & retrorsum contracta est, utile habetur. sudores ciet, uulua spiracula recludit, & eiusdem duritias laxat, in summa, molienti naturam habet.

Metopium ex Galbano unguentum, ut Dioscorides ipse testatur, sic dictum ab ligno ex quo desudat, de la chryma metopij uide plura lib. 3. cap. 79.

Mendesium. Caput LXI.

Mendesium constat balalino oleo, myrrha, casia, & resina. Aliqui tamen post singulorum pondera, cinnamomi exiguum addunt, nullo compendio, nam quæ simul excocta non fuere, uim nullam exhibent. Similem metopio uim obtinet, sed inferiorem multò.

EXPLICATIO.

Mendesium unguentum quo modo fieret, docet hic Dioscorides, & Paulus lib. 7. ca. 18. meminit eius etiam Plinius. Mendesium dictum est, quod in præfectura Mendefiorum in Aegypto inuentum esset, & laudatissimum fieret, atq; hoc est quod Paulus lib. 7. cap. 18. ait: ἀγνίστα εἶσα δὲ ἐν αἰγύπτῳ ἐν τοῖς ἐνδύοις οὐκ ἔστιν ἄλλο οὐδὲν τῆς περὶ τοῦτο. Id est, dictum est Mendesium, propterea quod in Aegypto inuentum sit, ubi etiam Mendes nutritur. Quamquam ego pro τῆς περὶ τοῦτο legendum putem, ὅτι ἐν τῷ αἰγύπτῳ, id est, colitur. Est autem Mendes hircus, utemq; Pan deus, Aegyptia uoce ac lingua uocatus, quem hirci effigie Mendefij uenerabantur, ut etiam ipsi inde appellationem inuenerint, uelut apparet. Hippocrates porrò unum. Mendem sepe probat, quod non à Mendefijs in Aegypto, sed Thracie urbe Mendæ appellata nomen inuenit. At uerò Galenus lib. 2. ca. 2. de comp. pharm. part. Mendesium etiam Megaleum uocari dicit, utroq; cognomine à Megalo accepto, qui scilicet Mendefius patria fuerit. Sed & Aegyptium idem à tota regione appellatum est. Dioscorides Megaleum suo tempore defecisse supra dixit, & aliud à Mendefio fecit.

Stacte. Caput LXII.

Stacte uocatur pinguitudo recentis myrrhæ, cum exigua aqua tuscæ, & origano expressæ. Ea perquam odorata, ac preciosa est: atq; unguentum per se facit, quod stacte nominatur. Maxime probatur quæ nullam olei missionem admittit, cuius minima portio compos est uirium plurimarum. Vim calfactoriam myrrhæ & calidis unguentis respondentem habet.

Officine styracem liquidam uocant. Huius sex styrax rubra dicitur Arabum familie.

Cinnamominum. Caput LXIII.

Cinnamominum confit è balanino oleo, & xylobalsami, calami, iunci odorati spissamentis, atq; cinnamomi, & seminis balsamini suauitate conditur, quadruplaq; myrrhæ ad cinnamomum portione: mel ad cogenda omnia adijcitur. Laudatur non acre, molli odore, planè myrrham redolens, crassum, odoratum, gustu perquam amaro. Id non à resina, sed myrrha, crassitudinem obtinuit. resina enim neq; amaritudinem præbet, neq; ullam odoris gratiam adijcit: uim habet admodum acrem, amaram, & calfacientem. Itaq; ora uenarum aperit, calfacit, discutit, diffundit, humores & spiritus attrahit, caput aggravat, cõtra uulua uitia cum duplo oleo, cera, & medulla efficax est: ita enim ferè multum acrimoniæ exolefcit, & quadam emolliendi uis contrahitur, alioqui adurit, & præ omnibus crassis unguentis induratur, facit mirum in modum ad fistulas & ulcera, quæ putredinis uitium tenferunt: itè ad hernias humidiores, carbunculos, febrium horrores, tremores, gangranasq; cū cardamomo: aduersus serpentium morsus illinitur, scorpionum & phalangiorum ictibus cum tritis grosis imponitur.

CINNAMOMI

A Cinnamomi unguenti Dioscorides hic sanè elegantem præparationem ostendit: quam tamen facere non possumus, quum uero cinnamomo careamus. Sed si etiam cum uulgarì paretur, erit satis utile.

Nardinum. Caput LXIII.

Ratio nardini faciendi uariar. Nam aut malabathrino folio, aut sine eo fit: plerumque autem balanino oleo, aut omphacino, iuncus odoratus spissamenti gratia adijcitur: sicuti propter odoris suauitatem, costus, amomum, nardum, myrrha, balsamum. Laudatur tenue, non acre, nardi aridæ aut amomi odorem referens. Vis ei extenuans, acris: expurgat, ex calfacit, absterget humores, rarefacit. Hoc liquidum est, nec habet strigmenti crassitudinem, nisi refinam recipiat. Fit etiam simplex ex omphacino oleo, iunco, calamo, costo & nardo.

EXPLICATIO.

Foliatum unguentum ex malabathri folio, quod ipsum etiam peculiariter folium appellatur, compositum fuisse atque appellatum, satis constat ex Dioscoride, qui diuersa capita facit, quanquam Plinius lib. 13. Nardinum & foliatum appellet. Cuius rei causa ex hoc loco Dioscoridis elici potest, ex eo scilicet quod nardinum unguentum tum cum folio, tum citra folium malabathri apparari scribit, & mox capite sequenti de malabathrino unguento prodit eadem esse eius spissamenta quæ nardini, nisi quod plus myrrhæ in ipsum additur. Porro spicatum, à spica nardi quoque nominatum, ex eaq; compositum fuisse nemo dubitat. Fucram itaque diuersa unguenta, Nardinum ex optima nardo, spicatum ex nardi spica, & foliatum ex Malabathro, quorum ingentia præcia Romæ tempore Galeni fuerunt, sicut etiam apud Plinium uidere est indicatum. Ceterum Galenus unguentum nardinum lib. 1. cap. 2. de comp. ph. part. ter simpliciter nardum uocat, atque id etiam genere communis, habet enim: $\mu\epsilon\tau\alpha\ \nu\omicron\delta\omicron\delta\ \omicron\upsilon\ \tau\alpha\varsigma\ \alpha\phi\omicron\tau\eta\varsigma$, id est, cum optimo nardo: & mox, $\tau\eta\ \delta\epsilon\ \iota\tau\eta\varsigma\ \mu\epsilon\tau\alpha\ \nu\omicron\delta\omicron\delta\ \alpha\omicron\upsilon$, id est, liquefacto cum nardino. & rursum, $\kappa\omicron\tau\alpha\ \pi\omicron\upsilon\delta\ \epsilon\iota\ \mu\epsilon\tau\alpha\ \mu\upsilon\pi\tau\eta\varsigma\ \eta\ \mu\epsilon\tau\alpha\ \nu\omicron\delta\omicron\delta\ \omicron\upsilon$, id est, cum myrrho aut nardino uti: quem modum loquendi etiam hic Dioscorides usurpauit de nardino unguento, ita loquens: $\delta\ \upsilon\sigma\alpha\mu\epsilon\varsigma\ \delta\epsilon\ \alpha\upsilon\tau\eta\varsigma\ \lambda\epsilon\tau\eta\omega\varsigma\ \iota\sigma\mu\iota\ \delta\ \sigma\mu\epsilon\iota\alpha$, & cæ. Et mox, $\upsilon\gamma\epsilon\tau\ \delta\epsilon\ \epsilon\sigma\tau\ \kappa\epsilon\iota\ \delta\ \gamma\lambda\omicron\iota\omega\delta\ \eta\varsigma$, id est, liquidum est, & non strigmentosum. Nam de ipsa nardo hoc intelligi non potest. & Tibullus poeta:

Iamdudum Syrio madefactus tempora nardo, Hoc est nardino unguento, & Horatius
Nardo uina merebere. Nardi paruos onyx elucet cadum.

B

Malabathrinum. Caput LXV.

Malabathrinum spissamenta nardini habet: insuper myrrhæ plusculum additur, qua de causa calfacit, crocino, aut amaricino uiribus respondens.

Malabathrinum siue foliatum dictum à Malabathro, uel potius nardus pistica illa, cuius Euangelistæ meminunt, si Barbaro credimus, hodie peregrinum & exoletum.

Iasminum. Caput LXVI.

Hoc caput non
putatur esse
Dioscoridi.

Apud Persas fit, quod Iasminum cognominatur, ex albis floribus uiolæ: quorum sextans, in Italicum sextarium sesamini olei demittitur, uiolis, ut in lili-
no diximus, uicissim permutatis. Apud Persas inter epulandum usurpatur odoris causa. Nam toti corpori conuenit, præsertim cum in balneas descensum est. Sed his opitulatur corporibus, quæ calfactionem, laxationemque desiderant: grauius enim spirat, quam ut libenter à plerisque recipiatur.

EXPLICATIO.

Iasminum, iasme, uel iosma, frutex topiarius in Galliæ hortis colitur. Græcum nomen subolet, licet ueteribus ignotum fuisse uideatur, ut Anthonio Musæ placet, quia Serapion in cap. de Zambac, siue Sambac, siue Iasmin, autores Græcos non citat, quod argumenti genus tamen ualidum non est, quum quandoque ille idem autor de aliquo simplici medicamento commemorat, de quo antiquiores quidem Græci mentionem habuerunt, tamen eos ut illius rei ignaros præterit: quandoque uero illos citat, cum tamen nullas in eorum, quæ apud nos sunt, commentariis, memoria. citius igitur æstimandum est Iasminum uiolam Dioscoridi innotuisse, cum hic Iesminum siue Iasminum unguentum describat, ab ea uiola sic cognominatum, quemadmodum etiam Hermolaus annotauit: tametsi nonnullas esse sciam antiquorum compositiones, quæ ab aliquo simplici

simplici medicamento cognominari videntur, in quas tamen nullum huiusmodi immittitur. de hac re plura in A sequentibus.

Myrrha. Caput LXVII.



MYrrha lachryma est arboris, quæ in Arabia gignitur, Aegyptiæ spinæ non dissimilis, è cuius uulnere defluit lachryma in subiectas regetes: alia circum caudicem concreuit. Dicitur ex his aliqua pedisimos, præpinguis, quæ expressa, statim emittitur: alia gabraea pinguisima, lato & pingui solo nascens, ea copiosam sudat statim. Omnis prima est quæ trogloditica appellatur, accepto cognomine à loco, in quo provenit, splens, subviridis, ac mordens quinetiã legitur tenuis * quædam, quæ à trogloditica secunda est, bellij modo mollis, verum odore grauiuscula, apicis nascens. Alia caucalis cognominatur, præter modum exoleta, nigra, & terribida. Omnium deterrima quæ ergastima dicitur: pingui carens, cano situ obducta, acris, ad gummi imaginem uergens, & uiribus eius proxima, improbatum amineæ cognomine, ex his patilli sunt, sed è pinguibus pingues, & odorati: è hœcioribus haud quaquam pingues, & inodorati minus odore * pollet, quæ oleum non admittit, cum in pastillos digerebatur. Adulteratur macerato gummi aqua, in qua myrrham aduerit. Eligenda est recens, squalore obsita, leuis, undique concolor, quæ con fracta uenas unguium modo candidas & leues ostendat, minutis glebis, amara, acris, odorata, calfaciens: superuacua & inutilis est ponderosa, coloris piceæ. Calfacit, cohibet, soporem gignit, glutinat, siccatur, astringit, uulnam emollit, & præclusam aperit, mensis & partus celeriter extrahit, cum abinthio, lupinorum cremore, uel succo rutæ admota, tuberculo fabæ deuoratur in uetere tulsis, orthopncea, in lateri pectorisq; dolorib; in alui profluuiis, & dysenteria, horrores discutit, duabus horis ante febrium accessiones, fabæ magnitudine pota cum pipere & aqua, subdita linguæ liquataq; scabritiem arteriæ expolit, obtusam uocem expedit, uentris tinea enecat, contra grauem oris halitum manditur, & aduersus alarum tædia, cum liquido alumine illinitur, gingiuas & dentes stabilis, colluto cum uino & oleo ore, uulnera capitis illitu glutinat, medetur fractis auribus, ac ossibus nudatis, peruncta cum cochleæ carnibus, item purulentis auribus inflammatisq; cum meconio, castorio, & glaucio: ad uaros autem cum casia & melle illinitur, impetigines ex aceto purgat, defluentes capillos cum ladano & uino myrteo illita, firmat, diuturnas defillationes lenit, illitis penna naribus, oculorum ulcera complet, albugines tollit, caliginem discutit, scabritiem læuigat. Fit è myrrha, perinde atq; thure, fuligo, & ut postea ostendemus, ad eadem conueniens. Bœotica myrrha, dissecta radix est arboris cuiusdam in Bœotia nascentis. Melior est quæ myrrham odore repræsentat: uis ei calfactoria inest, emollit, discutitq; suffimentis commodissimè inseritur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *συγγρά, συγγρά*. Latine Myrrha appellatur. Officinis nomen retinet. Germani, Myrrhen. Galli Myrrhe uocant. Myrrha est arboris Arabiæ lachryma, calida sicca ordine secundo, tenuis essentie, multa amaritudine, Lib. 5. Simp. terget potenter, tamen sine exasperatione, imò lenit: digerit non ignauiter, sed citra rosiorem, siccatur ualde, tamen sine astrictione: coquit modicè etiam prauos humores, & præter naturam habentes: quæ ratione stomachicis in id malum compositis miscetur, sed pauca, & cuius qualitatis medicamento se absurditas odoriferis superetur, tamen ea tutius auferri potest. Myrrha rubra Asuaris, quæ dicitur à *ῥοῦβον*, Myrrha uerax eadem. Eligenda recens, squalore & situ obducta, leuis, tota concolor, & quæ conspectu candidas unguium modo uenas, & leues ostendat, glebis minutis, amara, acris, odorata, ut Dioscoridi placeat. Quæ propter colicæ Paccij Antiochi pauca myrrha miscetur, quæ odorem tantummodo præbet. Improbatum è *μυρρίνα* nomine Dioscoridi: Galeno autem eligitur Troglodytis, quæ & *μινεα* dicitur, à regione ubi præstantissimam gigni affirmant. Ea gratissimi sit odoris, & nullo uiciata liquore (ubi *μινεα*, uel ut bis lib. 9. comp. ph. part. legitur, *μυρρίνα*, uidetur eadem quæ Dioscoridi Amineæ improbatum) adulteratur enim gummi macerato aqua, in qua myrrham aduerit, ut Dioscorid. tradit. Vera enim est rara mentis, præcipue synetra: nam in optima myrrha opocalpsion iuuuatur, ab optima myrrha diuersam, ut in Galbano Sagespenti, in casia

Lib. 9. c. ph. p.

Lib. 6. c. ph. p.

Lib. 1. Anti.

A in casia cinnamomum, & horum aliqua medium, quæ à se inuicem discernere is solus potest, qui sepe ea obseruat, adeo ut ex una sepe sola nota internoscatur. Nam Sagapenum ex Galbano odoris hircini speciem retinet: non habet autem proprietatem odoris cuiusdam, ut proprie dictum Sagapenum. Tamen in hoc Sagapeno & congeneri Galbano parua est differentia ad medicamenti compositionem. Ambo enim conueniunt, qui aduersantur uirulentis & deleterijs: sed Galbanum minus Sagapeno. At opocalpason lethale est intra corpus sumptum: ob id sua ætate multos perijisse scribit Galenus usu myrrhæ, quæ opocalpason habebat, à nonnullis de industria mistum myrrhæ, ut eam redderent laudatissimam. Nam sic mista, collirijq; in diuersis citra rationem discutit, ac interdum suffusionem incipientem substantia tenuem, siue ceratum, siue emplastrum, siue aliud medicamentum myrrham opocalpaso mistam recipiens oculo iniicit. Myrrhæ igitur officinarum omnino adulteratæ parum tutus est usus in sumendis.

Hactenus Gale.
Lib. 1. Antido.

Styrax. Caput LXVIII.

Styrax lachryma est arboris malo cotoneæ similis. Præfertur sordescens, flauus: rethinosus, albicantibus grumis, quàm plurimum in sua odoris gratia permanens: qui dum molliuit, melleum liquorem reddit, qualis è Catabalis, Pissidia, & Cilicia deuchitur. Deterior niger, surfuratus, friabilis, canoq; situ obductus. Cæterum lachryma inuenitur gummi similitudine, perlucida, & myrrhæ æmula, uerum per pauca manat. Adulteratur ligni scobe, quàm uermiculi erodentes excusserunt, melle, & iridis sedimento, & quibusdam alijs. Alij ceram aut adipem odoribus imbutam, flagrantissimis foliis cum styrace subigunt, & per laxa cribri foramina in frigidam aqua uermiculos exprimunt, uenundantq; Styracem hunc, quoniam in uermiculorum speciem contrahatur, seolecitem cogminant, quem tanquam syncerum imperiti approbant, non animaduertentes ad præcipuam odoris fragrantiam: siquidem acer admodum est, qui adulterationis uitio caret. Styrax calcificat, emollit, & concoquit, medetur tussi, destillationibus, raucedini, grauedini. & interceptæ uoci, uulnæ præclusæ duritiæ laboranti conuenit, cit menses potu appositusq; alui leuiter molliuit, si exiguum cum resina terebinthina catapotij modo deuoretur. misceatur utiliter discutientibus malagmatis, ac opisq; adoleatur autem & igni torretur, ut fiat ex eo, uelut ex thure, fuligo, ad eadem conueniens ad quæ thuris fuligo: ex eo etiam in Syria styracinum oleum componitur, quod calcificat uehementer, & emollit, uerum caput dolore afficit adgrauatq; & soporem adfert.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, *Στύραξ*. Latini Græcum nomen retinuerunt.

Officinæ perperam uocant storacem calamitam.

Lib. 8. simp.

Styrax lachryma est arboris Syriacæ, calcificat, molliuit, coquit, tussis, catharrus, coryzus, branchos: mentes autem mouet sumptus & admotus. Styracis drachmam unam miscet Andromachus arteriacæ 13. lib. 7. comp. pharm. part.

Lib. 1. Anti.

Adulteratur multis modis Dioscoridi: sed ab eo præscriptis notis dolus deprehenditur.

Styrax calamitates.

Styrax iniiciendus theriacæ, qui ex Pamphilia in arundinibus offertur, hic autem paucissimus est, & tanto discrimine à copioso hoc Styrace uariatur, quantum salernum uinum ab eo, quod in tabernis uenditur. Tamen illius penuria, huius accipe quod calidissimum & odore & gustu ualidissimum est.

Lib. 5. simp. ca. 18.

Styrax, ut crocus, myrrhæ, quantitate sunt deleteria: nam largus potus quædam dementant, quædam mentem auferunt, sed mensura apta alijs mista iuuant.

Στύραξ αὐανός, id est, Hispanum, cognominatur Actuarius in Trochisco Neapolitæ.

Bdellium. Caput LXIX.

* Quidam Scythica, aut Arabica.

Bdellium, alij bolchoni appellant, alij madelconi, lachryma est saracenica * arboris. Probatur gustu amarum, translucidum, taurini glutinis in morem, intrus pingue, liquefcens facili, ligni ac sordis experts, suffitu odoratum, ungui simile. Est etiamnum bdellij genus sordidum, nigrum, uerioribus glebis in offas conuolutum, aspalathi odore, ex India aduectum: deferretur etiam à Petra oppido siccum, resinofum, liuescens, sed facultate secundum. Adulteratur gummi: sed ita uitiatum non perinde gustui amaritudinem repræsentat, nec usque adeo suffusionibus odoratum.

ratum, calfacit & emollit duritias, & turgentia guttura, humidatq; hernias discutit, cum ieiunā saluū dilatum, uulnū spiracula laxat appositū & suffitū. & partus humiditatesq; omnes extrahit, calculos potu comminuit, urinam mouet, tussientibus, a serpente percussis, utilissimē datur: ualet ad rupta, uulsa, laterum dolores, & discursantes spiritus: malagmati inseritur, quæ contra duritias & neruorum nodos profunt: contritum resoluunt affuso uino aut aqua calida.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Greci βδέλλα. Latini bdellium arborem & ipsius lachrymam uocant, Greca appellatione: quo nomine & Germanis & Gallis cognita lachryma.

Bdellium lachryma est arboris Sarracenicæ, calfacit, mollior & coquit, discutit mediocriter. Scythicum est acrius, resinosius ad emolliendum efficacius. Arabicum autem est petra delatum resinosum, liuescens, dilucidius, magis siccans quam emolliens, nisi recens & humidum sit, & quod tundo faciliē mollescat, id enim idem pollet quod Scythicum. Tertium Indicum addit Diosco. sordidum, nigrum, grandioribus glebis in offas conuolutum. Optimum uerò est, ligno, cortice, sordibus carens, ut taurinum gluten translucens, ob id bdellium clarum dicitur lib. 8. comp. phar. part. quo libro Democritus in quarto malagmate Bdellium onycha appellat, optimum bdellium, & quod incensum ac suffitum onychis Indici conchilijs testæ odorem referat. tale hic Dioscorides optimum esse dicit. In hodierno pharmacopoliarum bdellio nulla similitudo ad unguem conspicitur, ad onychem uerò aromaticam Indici conchilijs testam, bdellium accensum odoris similitudinem habere libentius crediderim, & eius rei periculum etiam facere possumus, si onychem aromaticum habemus. Nam quæ Blattæ Byssintæ uulgo appellantur, ut infra audies, dubium apud me est, an ueri onyches existant, qui apud Dioscorid. libro sequenti describuntur: sicut possibile est etiam bdellium officinarum non esse sinerum, ut corium ex suffitu utriusq; experimentum facere non queamus.

Thus. Caput LXX.



Thus in ea gignitur Arabia, quæ thurifera cognominatur. Primum tenet in eo genere masculum, itagonias appellatum, suapte natura rotundum, tale autem individuum est, candidum cum frangitur, intus pingue, in suffitu statim ardens. Indicum uerò fuluescit, & colore liuet, sed rotundum industria facilius: nam in quadrangulares formas dissectum fistilibus uersant, donec rotunditatem cōtrahat. uerum huiusmodi thus tempore stauescit, quod atamiū aut syagrum appellant. Secundum locum habet Arabicum, & in Smilo nascens, quod aliqui copiscum uocant, minus multo & fuluius. Est & genus aliud, cui amomitæ cognomen est, alioqui candidum: quod dum mollior, mastiches more digitis cedit. Adulteratur in cinere, pini resina & gummiis, quod faciliē deprehendi potest, siquidem suffitum gummi flammam non eiacularur, & resina in fumum euanesceat, thus uerò statim ardet: idem maleficium odor prodit. Ad calfaciendum & astringendum pollet. oolorum caliginem discutit, caua ulcera complet, & ad cicatricem perducit, cruenta uulnera glutinat, infrenatq; cunctas sanguinis eruptiones, etiam si cerebri membranis effluat, ulcera quæ caecothæ uocantur, & sedis & reliquarum partium permulcet tritum cum eo & lacte linamentum. fornicantes uerrucas inter initia, impetiginesq; ex aceto & pice illitum, tollit. ambusta igni, perniohesq; cū faullo adipe aut anserino, & ulcera in capite manantia cum nitro, si infricetur, sanat. paronychijs cum melle, auribus fractis cum pice, medetur. ad reliquos aurium dolores cum dulci uino infunditur, inflammata a partu mammarum cum cimolia & rosaceo magna utilitate perungitur: additur ad arteriarum uiscerumq; medicamenta. prodest sanguinis excreationi potum, sed in secunda ualerudine haustum insaniam mouet, & largius cum uino potum interficit. In fistili mundo thus crematur, flagrante glebula succensum à lucerna, donec exuratur. post perfectam uestionem operire oportet usq; dum restinguatur, sic enim in cineres non redigitur. Aliqui ollulam æneo uase cauo circa medium perforato cingunt ad excipiendam fuliginem, ut in eius mentione mox ostendemus: alij crudo fistili luto oblitō, & in fornacem indito, cremant. Fistili etiam nouo uiuacibus prunis torretur, dum non amplius bullit, aut pinguedinem uaporū emittat: faciliē enim comminuitur quod perustum non est.

DIOSCORIDIS
NOMINA ET EXPLICATIO.

A Græci *λίανθρον*. Latine thus arbor lachrymam sibi cognominem fundens. In Officiis Latinam appellationem seruauit.

Germanis, *Weirauch*. Gallis *Encens* & *labre dencens*, dicitur.

Thus est lachryma Arabice arboris, calidum ordine secundo, siccum primo, modicè astringit, tergit imbecilliter, coquit phlegmonas, acrodyonon est & sarcoticum, cicatricem remouetur, emplastri temperaturam iuuat, acris mīstum uehementiam illorum obtundit, pus mouet, quia calidum emplasticum, nullam eminentem astringendi uim sortitum, præcipuè pinguius & albius. Nam flauius siccatur magis.

Primitum tenet in thuris genere masculum, quod *λίανθρον* & *αἶθρον* Aëuario dicitur, suapte natura rotundum, indiuiduum, candidum, cum frangitur intus pingue, in suffitu statim ardens. Dicit autem Dioscorides naturaliter rotundum, quod Galenus lib. 5. cap. 10. comp. pharma. *αἶθρον* uocat in quodam Aristarchi medicamento, nam sectum de industria rotundum fit, mirum cum quadrangulati figura sectum ac in sigulā coniectum, tam diu obuoluitur, donec rotundum fiat, atq; hoc *αἶθρον* appellatur, illo deterius, ut contrariæ appellationis. Dicuntur hæc genera etiam *αἶθρον* & *αἶθρον*.

Thuris cortex. Caput LXXI.

Prafertur thuris cortex crassus, pinguis, odoratus, recens, leuis, minimè scaber, sine membranis. Adulteratur admisto pini aut nucis eius cortice. sed horum index ignis est: siquidem reliqui cortices suffiti nequaquam incenduntur, sed sine odore fumum eructant: thuris uerò cortex ardet, & cum odoris fragrantia uaporem ei aculatur. thuris modo uritur, & uis eadem quæ thuri, sed ualidior astringentiorq; Quare potu cruentis excreationibus, uuluis fluxione laborantibus, in pefso confert, ad cicatrices oculorum, & caua sordesq; efficax est. tostus scabris lippitudinibus auxiliatur.

Cortex thuris insigniter astringit, siccatur ordine secundo, crassiorum est partium quàm thus, minimam habet acrimoniam, ardet igni cum odoris fragrantia.

B Manna thuris. Caput LXXII.

Manna thuris probatur candore, micarum frequentia, & puritate. Vim habet eandem quam & thus, sed inualidiusculam. Sunt qui cribrata pini resina, ac polline, aut cortice thuris confusi adulterant, sed hæc igne deprehenduntur. Neq; enim æquè suffitu aërium uaporem, sed fuliginosum & impurum expuit, & permixtum sua uolentia halius uirus habet.

EXPLICATIO.

Mannam seu mannum thuris (ut lib. 9. comp. pha. part. bis leges) propriè micæ thuris ex magnis fasciculis concussis elisas, à thure leuigato diuersas. Nam fragmenta quædam exigua corticis thuris ei manne inhererent, à quibus exiguum quiddam astringentis assumpsit, quæ differt à thure, quippe quo magis astringit, tamen etiam coquitur, ut Galenus lib. 1. comp. pharma. part. & lib. 13. Meth. Dioscorides hic mannâ albam puram & granulosa probat. Sorbonius Largus mannâ thuris sæpè numero pollinem thuris appellat. Paulus uerò lib. 3. cap. 22. de cicatricibus & albuginibus oculorum *μαρμαριον* appellat etiam *μαρμαριον*, atq; ita etiam Aëtius uocat serm. 12. cap. 44. in fine.

Thuris fuligo. Caput LXXIII.

Fuliginem thuris sic facito: Forcipicula, lucernis accensas singulatim thuris glebas, in nouam sicilem ollam concuam imponito, & æreo uase in medio perforato, deterfa diligenter forde, obtegito. alteram admoueto, ex altera eius parte aut utraq; subiectis quaternum digitorum altitudine lapillis, quò facilius perspiciqueat, si urantur, & qualocus capax fuerit, glebula alias supponito, & antea quàm prorsus prior gleba restinguatur, aliam imponito, donec sufficientem fuliginem uidearis coegisse. Continuo tamen externæ aramenti partes spongia, aqua frigida madefacta, abstergantur: ita enim temperato aëris feruore, fuligo omnis inheret, quæ alioqui per leuitatem decidua, thuris cineribus admisceetur. Deterfa itaq; fuligine, cinis cremati thuris seorsum substrahendus est. idem opus, quoad satis factum


ubi uidebitur, obeundum. Oculorū inflammationes mitigat, fluxiones suspendit. A
ulcera purgat, caua explet, carcinomata sistit. Simili modo ē myrrha, resina, styra-
ce, reliquisq; la chrymis, fuligo excipitur, ad eadem conueniens.

Alium modum querendi thuris fuliginem, uide apud Vitruuium de architectura. nescio tamen an ali-
quibus hodie in usu sit. Plura in annotationibus nostris in cap. 80. huius libri de fuligine liquide picis.


Picea & Pinus.

Caput LXXIII.

Nux pini.



Nux pini.



Pinas & Picea generi
eidem ascribuntur, sed
quandam flagrant spe-
cierum distinctionem. ar-
bores uulgo cognita: qua-
rum cortex astringit, pro-
dest tritus & illitus inter-
trigini, ulceribus sum-
mum corpus occupanti-
bus, ambustisq; cum spu-
ma argenti & manna. ul-
cera delicatulorum acri-
moniam recusantium, ce-
rato myrrino exceptus,
ad cicatricem perducit, tri-
tus cum sutorio atramen-
to serpentia cohibet. suf-

fitu partus & secundas ejcit, potus aluum sistit, urinam mouet. Folia eorum trita &
illita inflammationes leniunt, uulnera ab inflammatione uindictant, trita autem &
decocta in aceto, feruenti collutione, dentiū dolores mulcent. hepaticis utilia sunt,
drachmæ pondere in aqua aut mulla pota. Pineæ nucis cortex & folia potu idem
præstant. Teda earum particulatim secta, si in aceto coquatur, & decocto dens col-
luatur, dolores leuat. ex his etiam fit spata acoporum pessorumq; compositioni-
bus idonea. quinetiam earum crematarum fuligo ad librarij atramenti confectio-
nem excipitur. ea circumlitionibus efficacissime imponitur, quibus palpebras or-
nant, coloremq; mentiuntur. calliblephara Græci uocant. arrosio oculorum angu-
lis, callosis glabrisq; genis, & collachrymationibus opitulatur. Pityides appellan-
tur pinorum piceæq; fructus, qui in conis inueniuntur. Vim astrictoriam habent, Alij, coquendi.
& aliquantum exsiccantem, tussi & pectoris uitij auxiliantur, per se, aut ex mel-
le sumpti. Nuces pineæ cum repurgata manduntur, aut cum passo aut cucumeris
semine bibuntur, urinam cient, acrimonias in renibus & uescica hebetant, stomachi
rosiones leniunt, data cum portulacæ succo, uirium infirmitatem roborant. corru-
ptorum quoq; humorū labem obtundunt. Pineæ nuces integræ recenter arbori-
bus decerpæ in passo franguntur, & decoctæ, uetusti tussi ac tabitudini conferunt;
si quotidie ex co liquore terni cyathi bibantur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Pinus Græcè πινυς. Germanicè, Ein forchen, Arden, bringt frucht zu essen, so man pineen kern
nen nemet. Gallicè ung pin uocatur.

Picea Græci Πίτυς. Germani, Rot dannen, ut quibusdam uidetur, alijs Ein Sichter dannen.

Gallicè ung abre du genre du pin appellatur.

Pinus arbor uulgo nota, non nisi à uertice ramosa, folio pectinatum modo dissecto promissisq; ac mucrone
aculeato, conis lignosis, frequenti nucamento in turbinatam effigiem compactilibus, in quibus nuclei singulis
cameratis toris incluse. Officina pineæ. Germani, pineen kern. Galli corix au pomes de pin, appellant.
Sunt magni usus in Officiis.

Picea uero larici similissima est, folio breui, sete proximo, crassiore tamen duroq; ut cupressis, immortali ui-
rore: ad laricis uero comam colliso, rariore, sicciore, tenuiori; ac magis argenti; ramis statim à radice mo-
dici, uelut brachia lateribus inhaerent, materie abieti proxima, frequens in Alpibus Colijs uisitur, fundens
resinam thuri usq; eo similem, ut pro eo sepe fallat, & odor adeo non ingratus. Galli du garipot uocant.


D a

A Nuces pineis similes, sed minores, ut et arbor tota pinu humilior graciliorq;

Pinus et Picea, ut scribit Dioscorides, eidem adscribuntur generi: sed quandam flagitant specierum distinctionem: sic autem differt a pinu picea, quod pinguior ac tenuior folio est, quodq; minus alta, minusq; recta quam pinus adsurgit: praeterea et conum minorem ac magis algentem, nucleos quoq; resina per fusos obtinet. Virg; folium capillamenti modo pretenue, ac breui seta uillosum, crassiore, duraq; ceu cypressis. materies candida et abieti similior. Pinus uetis radicibus non repullulat. Picea repullulat, ut in Lesbo accidisse Theophrastus scribit, incenso Pyrrhei montis nemore, quod pinis scatebat.

Lentiscus.

Caput LXXV.



Lentiscus nota arbor est, cuius inest astringendi. femini enim, folio, ramo, cortici, radicibusq; cognatae insunt vires. Liquefactum autem ita fieri solet: Folia, cortex & radix in aqua coquantur, & ubi abunde cocta refrigerataq; sunt, folia abijciuntur. aqua denuo coquitur. donec mellis habeat crassitudinem. Lentiscus sua astringendi dote, ualet aduersus sanguinis reiectiones, alui profluvia, & dysenterias in potu. item contra eruptionem sanguinis è uulua, & eiusdem aut sedis procidentia. In totum acaciae & hypocisthidis uicem representat. idem facit succus è tritis folijs. Decoctum fori caua explet, & fracta ossa ferruminat. uuluae fluxiones sistit. nomas arcet. urinam pellit. motus dentium collutione stabilit. Virentes furculi calamulorum uice dentibus repurgandis affricantur. Fit è semine oleum, quod prodest cum quid astringi opus est. Lentiscus resinam gignit, quae lentiscina cognominatur, & ab aliquibus mastiche. Pota utilis est sanguinem reijcientibus, & tussi ueteri. stomacho auxiliatur, sed ructum mouet. additur in dentifricia & illitiones faciei, ad nitorem cuti conciliandum. palpebras oculis incommodas replicat. manducata halitum oris commendat. gingiuas contrahit.

Optima & copiosissima in insula Chio prouenit: Praefertur (nitedulae modo) resplendescens, & candore Tyrrhenicae cerae similis, adula, retorrída, friabilis, odorata, stridore ædens. Viridis autem inferior est. Adulteratur thuris, resinaeque pineae nucis mistura.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Graece Ξύλον. Latine Lentiscus. Officinis incognita. In Germania non prouenit.

Galli Lentisq; et Restringe Monspelluli uocant.

Arbor est roboris magnitudine, sorbi folio, terebinthi odore, acinis syluestris punice rubentibus, ubi maturuerint nigris, tantisper dum coquantur rufis. Fertur et alia iunipero similis.

Lentisci baccas Schinides appellauit Hippocrates.

Resinam lentiscus ubiq; sudat, mastichem uero dictam in Chio tantum insula ferè. Officinis Graeco et Latino nomine cognita, Germanis et Gallis mastix appellata. Parum astringit, siccat sine morbo, calida et sicca ordine secundo, minimum est acris, tenuium maxime partium, stomachi intestinorum, hepatis imbecillitati et phlegmoni prodest. Laudatissima et copiosissima è Chio insula (unde Galeno Mastiche Chio passim dicitur) offertur.

Terebinthus.

Terebinthus.

Caput LXXVI.

A



Terebinthus cognita arbor est, cuius folia, & semen, & cortex astringunt, & ad eadē ad quā lentiscus conueniunt, simili parata modo sumptaq;. Fructus eius aptus est, sed stomacho aduersatur. ex calfacit. urinam mouet. uenem excitat. contra phalangiorum morsus conuenienter in uino bibitur. Resina eius ex Arabia petraea defertur. Prouenit etiam in Iudea, Syria, Cypro, Aphrica & Cycladibus insulis. sed praualer candida, perlucida, uireo colore, & in caeruleum uergente, odorata, terebinthum olens. Terebinthina resinas omnes antecedit proxima lentiscina, & ē pinu, & abiete. has sequitur ē picea & pineis nucibus resina. Natura omnibus calfacere, mollire, discutere, expurgare. tussi ac tabi conueniunt per se, aut in eclegmate ex melle. uitia pectoris expurgant. urtham cient. cruda concoquunt. uentrē emolliunt. palpebras commodissime replicant.

lepras tollant, cum ærugine ac futorio atramento, nitroq; auribus saniem emanantibus cum melle & oleo, item in pruritu genitalium utiles. malagmatis, acopistis admiscuntur. laterum doloribus per se, illitu & appositu auxilio sunt.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Τερεβινθός. Latine Terebinthus.

Officina ueram Terebinthinam non habent, nam ea quæ hodie passim utuntur, resina est Piceæ ac Tedæ.

Germanis quoq; & Gallis hodie incognita, uulgare Terpentini & Gloriet, Galli Termentini appellant.

Terebinthus arbor, cuius picturam damus, iuxta Monspelsum nascitur, Pidis appellata.

Terebinthus arbor circa Idam Macedoniamq; breuis, fruticosa & contorta: in Syria uero magna & copiosa, decoratq; materie, lenta, nigra, lauri penè folio, oleæ flore, sed puniceo, bacis primum herbaceis, mox rubris, & tandem maturitate migrantibus, magnitudine fabæ, resinosis, sulphureosis, & radice ualida in profundum acta. Fert & folliculos emittentes quædam animalia cæu culices, lentoremq; resinofum, qui ex cortice erumpit, Periviv Teguar Diva Græcis dicta, hoc est, Terebinthi resina, cæterarum præstantissima, astringit manifestè, sed minus quàm mastiche: emollit autem magis, coquit, digerit. qualitate subamara, & partium tenuitate terget angustos meatus uasorum, & in eis osculorum obstructions liberat. ob id putredinem prohibet, aut finit: & hepaticis probe miscetur, è profundo potentius trahit quàm cætera resine. Hæc alium cætra noxam soluit, & uiscera omnia cecur, lienem, renes, pulmonem abstergit. Terebinthina Resina omnis ex Chio insula est præstantiss. & odore & gustu cæteris præcellit. Chia igitur semper utenda, si haberi potest. Huius penuria Libyca, Pontica, & ex alijs regionibus optima est miscenda theriace & alijs medicamentis: non autem Libyca, tanquam omnium præstantissima cum Andromacho. Præstantior est alba, uel cærulea, uel colore uetri, perlucida, odorata, & Terebinthum plus reserens, qualis quæ ex insulis Cycladibus affertur: ob id Chiam quoq; Terebinthinam laudat Galenus. Minus laudata Cypria, Syriaca, Iudaica, Arabica, Aphrica, Libycam tamen, ut dixi, laudat Andromachus. Nunc Cypria Venetijs commendatur. Quæ autem pro Terebinthina resina uenditur, aut Lauricea est, aut Abietina, ut supra manuimus.

Resinæ aliæ.

Caput LXXVII.

Liquida resina ē pinu & picea, à Gallia & Hetruria conuehi solet: atq; olim à Colophone petebatur: hinc Colophoniam sibi cognomentum uendi cauit. A Gallia quoq; subalpina, quam uernaculo nomine laricem appellant incolæ. Ea in linctu, & per se, magnoperè prodest tussi ueteri. Colore inter se distant, siquidem alia candida est, alia oleosa, alia mellei liquoris similitudine, ut larigna. Cupressus etiā liquidam fundit resinam, quæ ad eadem pollet. Quæ uero aridarum generi ascribitur, quædam ex pineis nucibus, aliæ abiete, aliæ picea & pinu exierunt. Eligi debet longè omnium odoratissima, translucens, non retorrída, neq; diluta, quandam cæ-

D 3

Larix.



ra faciem præbens, & friabilis. E picea & abiete resinæ cæteras antecedunt: odoratæ etiam sunt, atque thus odore imitantur. Præstantiores à Pityula insula deferuntur, quæ secundum Hispaniam sita est. Sed quæ è picea, nusibus pineis & cupressis manarunt, nihil ad illas, nec tantis viribus potiuntur. Veruntamen eorumdem gratia quorum & illæ sumi solent, Lentiscina terebinthinæ respondet. Vritur resina omnis liquida in vase quadruplæ capacitatis ad humorem qui infunditur. itaque resingocius, in duobus aqua pluvii coquitur, subjectis leuibus prunis: resina assidue mouetur, donec omnis odor aboleatur, & friabilis & retorrida reddatur, ac digitis cedat: cæterum ubi refriguit, in fistile non picatum, quod aconitum uocant, id est, non illitum, reconditur. Fiet etiam eximij candoris, si resina omnis eliquata præcoletur, quo sæculenta sordes excernatur. Vruntur quoque sine aqua, primum lento igne, & ubi coire cœperunt, maior carbonum strues supponitur, & triduo citra intermissionem discoquantur, usque dum antedictas naturæ suæ notas exuerint. mox ut dictum est, reponuntur. Aridas unius diei spa-

NOMINA ET EXPLICATIO.

Arborum partibus praesertim truncis à germinatu incisis & scarificatis resinas elicimus.

Caput LXXVIII.

Pin

Pix liquida, quam alij conum uocant, è pinguisimis pini piceæq; lignis congregatur. Optima est splendens, sincera, leuis. Contra uenena, phthisin, purulentam excreationem, tussis, suspiria, & pectoris humores, qui difficilè extulsuntur, efficacax est, eleganter cyathi mensura cum melle dato. tonsillarum & uuae inflammationes, anginæq; utiliter perunguntur. purulentis auribus infunditur cum rosaceo, & illinitur cum trito sale serpentium moribus. adiecta uerò pari cera scabros ungues extricat, impetiginesq; emendat. uulug duritias ac sedis tubercula discutit: cum farinaq; hordeacea & pueri impubis urina decocta, strumas rumpit. cohibet ulcera quæ serpunt, cum pineo cortice, aut sulphure, aut furfuribus illita. cæterum cū thuris manna & ceratò profundos ulcerum sinus conglutinat. rimis sedis & pedum, magno auxilio illinitur, ulcera replet, & cum melle purgat. quin & cum uua passa & melle carbunculos, & putrida ulcera emarginat, disrumpitq; erodentibus medicamentis, quas septas uocant, probè immiscetur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Kovoy Gaza Conum transfert, Marcellus uerò nucem pineâ interpretatur, ut accipit Dioscorides, alij tetteres Græci, Galenus autem Conon arborem appellat, fructum eius, hoc est nucem, *κόνικα*, & *σπόδα*, atq; hoc pacto apud Paulum accipi debet.

Accensis arboribus resinosis, ut pina, picea, larice, terebintho, tæda, cedro, ex resinosa substantia igni parum succata fit pix liquida, cui post supernatatis anthum tenui consentia, & facultate est astringente, ob id cuticem siue ulla noxa tardat. Vt pissaleon, id est, pix liquida cum olco mista.

Germanicè, Schiffbech/ Ddr.

Picinum oleum. Caput LXXIX.

Epice fit quod pissaleon appellant, separato liquore aquoso, qui supernatat piscis, sicut serum lacti. Nam expansa, quandiu pix coquitur, supra cortinam uellera pura madescunt, acceptoq; halitu eius exprimuntur in uas. Quas pix liquida, præbet utilitates. alopecias capillo replet cum farina hordeacea illitum: quibus pix medetur. iumentorum ulcera scabiemq; emendat.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Pissaleon, hoc est, oleum picatum, Galenus uocari in Asia dicit oleum cum liquida pice permixtum, quod ipsum neq; hic Dioscorides, neq; Paulus, neq; Plinius, ubi de pissaleo agunt, uolunt: sed pissaleon seu oleum picinum uocant id quod in pice liquida serosum superstat, & quod dum pix coquitur, pura supra tensa lana excipitur ex sublato uapore. Verum hoc ipsum Galenus ad superioris differentiam, non pissaleon uocari dicit, sed pissanthos, hoc est, picis florem & Paulus lib. 3. cap. 74. *ὀππῶστος* apud eundem appellat, hoc est, picis seruum. Scribonius autem largus cap. 40. ait: picis florem, quod pissaleon appellant.

Fuligo liquida picis. Caput LXXX.

Fit hoc modo è liquida picè fuligo: In lucerna noua quæ ellychnium habeat, nõ nihil picis incendito, lucernamq; fictili uase in clibani speciem conformato, superius in angustum fornicato, inferius perforato, ut clibani esse solent: operito, & adoleri finito, consumptoq; liquore nouum infundito, quoad sufficientem usui fuliginem collegeris. Vis ei astringens, acrisq; usui est ad pigmenta quibus palpebras linunt & uenustant, & ad circumlitiones, item ubi glabris pilos restitui oportet, ad imbecilles lachrymososq; oculos: in super ad eorundem ulcera non inutilis est.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *λύγες*. Latine fuligo. Officina latinum nomen usurpant. Germanicè Râß.

Fuligo omnis excoctoria est, ac perinde terrestris est essentia, habens quasdam etiam ignis, qui materiam combusit, reliquias, sed id pusillum est. Porro tota natura terrena est, tenuium partium. Sed quæ speciatim in ea differentia sunt, ac pro ista materia cucurbitæ: ex acriore & calidiore, tali etiam proueniente fuliginis, ex dulciore simili quoq; & hinc fuliginis proueniente. Primum enim thuris fuliginis utuntur in ocularibus medicinis mista, eas uidelicet quæ ad oculos etiam uulnibus phlegmone tentatos accommodantur, atque etiam cum fluxione uexantur, & ulcera habent: nam & illa expurgat, & carne implet. Ad hæc usurpant quoq; eam ad facultates quas uocant calliblepharas. Præterea Terebinthine myrrhæq; fuligo molestia caret.

A non aliter quam thuris: sed styracis quodammodo uolentior est: magis etiam picis liquida, qua etiam magis cedri. Porro acrioribus utuntur ad uitia superciliorum, uocata ptila, et crosos oculorum angulos humidosque citra phlegmonem. At mollioribus mitioribusque tum ad haec, tum ad ea ad quae competere paulo superius diximus, thuris fuliginem.

Pix arida. Caput LXXXI.

Liquida pix decocta in spissam coit, quam uocant aliqui palimpissam. quo in genere quaedam uisci modo lentescit, boscas cognominata, altera sicca est Probatur pura, pinguis, odorata, subrufa, resinosa. Talis Brutia & Lycia, picis resinisque simul naturam habentes. Calfactorem uim habet. dura emollit, pus mouet, tubercula panosque discutit, ulcera replet, uulnerarijs medicaminibus commodè permiscetur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Si pix iterum collatione siccetur, Palimpissa dicitur ueteribus Graecis, sicca adeò, ut puluerizari possit: quae sit est Graeca, etiam Colophonia, et Hispana, et Gallica dicta πικρα. Sperta lib. s. comp. phar. p. et hic Dioscoridi probatur et Lycia. Est etiam Dioscoridi ex iisdem arboribus resina liquida et sicca.

Pix arida, Germanice Griechisch dech/ Spiegelharz/ Getgenharz/ gesottē Harz/ uulgo dicitur.

Zopissa. Caput LXXXII.

Zopissam aliqui aiunt derafam nauibus resinam cum cera, quam alij apochyma appellant. Ea dissipandi naturam habet: quoniam marino sale macerata sit. Alij pineam resinam hoc nomine uocauerunt.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Zopissa uocatur, ut Dioscorides quoque testatur, derafa nauibus maritimis pix, efficitur omni pice et resina traditur: ad omnia quibus ille profuit, uidelicet adiecto salis callo. Optima à tyrocinio nauium eradicatur cera nauibus, marino sale macerata. Additur in malagmata ad discutendas collectiones.

Bitumen. Caput LXXXIII.

Bitumen Iudaicum caeteris antepositur. Cuius probatio est, ut purpuræ modo splendeat, sitque ponderosum, ac ualidum odorem uibret, nigrum autem & sordidum, uitiosum est, adulteratur pice. Gignitur in Phoenice, Babylone, Zacyntho, & Sydone. Liquidum inuenitur in Agragantino Siciliae, fontibus innatans, quo utuntur ad lucernarum lumina, olei uice: Hallucinantur quidam Sicilicum oleum nominant: nanque liquidi bituminis genus esse constat.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Asphaltos hic aut haec, lib. i. Antidorum Galeni, id est, Bitumen, uerum est nigrum splendescens: dñ aquis innatat, molle: cum siccatum est, pice sicca durius efficitur, calfacit, siccatur ordine secundo. Optimum est ex mari mortuo, stagno salso in Celsosyria.

Vero asphaltos, id est, bitumine in officinis caremus. Possumus autem ipsa mumia loco ipsius uti. Nam in Syria pauperes mortui bitumine implentur, uendunturque poëa, Diuites autem Myrrha, aloë, croco, balsamo, alijsque id genus coniunguntur. Sed cum propter illam hominum partem quae secum admiscetur, inualidius necessario, ac deterius multò reddatur, longè melius nobis fuerit, eo omisso, aut pice sicca uti, cum eis de ferè polleant facultatibus, aut petroleo, quod ex agro Siculo ad nos importatur, hoc enim inter Bituminis genera hic quoque connumerat Dioscorides, quam Arabum Mumia, quae licet ex bitumine, et alijs rebus confecta sit: credendum tamen est uitium potius attraxisse ab hominis corporis situ, et putrefactione, et proprias uires, aut omnino, aut multum earum perdidisse, quam nouas ex eo et ad medicinam praestantiores acquisuisse, neque ita potentem esse ut antea, in exiccando.

Pissasphaltum, Caput LXXXIII.

Nascitur in Apolloniatarum agro circa Epidaurum, quae pissasphaltos appellatur. Ea Ceraunijs montibus deuoluta, impetu fluminis rapitur, aestuque in litus expuitur, illic coacta in glebas, mistam bitumini picem redolet.

Pissasphaltus est Mumia Scorpionis.

Naphtha.

Naphtha. Caput LXXXV.

A

Naphtham uocant Babylonij, bituminis colamē, colore candidum. inuenitur etiam nigrum. Vis ei ignium rapax, ita ut ex spacio protinus in eam transiliant. Ad suffusiones oculorum, & albugines utilis. Bitumen omne discutit, glutinat, emollit, ab inflammatione tuetur. uuluarum procidentia, strangulationesq; olfactu, suffitu, imposito emendat. comitiales morbos suffitum deprehendit, gagatæ lapidis more purgationes mulierum cum uino & castorio potum elicit. tulsim uetere, & anhelitum adiuuat, serpentium moribus, coxendicum laterumq; doloribus auxiliatur. datur celiacis in catapotio deuorandum cum aceto potum, discutit sanguinem concretum. dysentericis cum ptisana liquatum infunditur. destillationibus suffusione medetur. mitigat dentium dolores oblitum. cæterum pilos incommodos siccum replicat, impositum. concalfactum autem & cum farina hordeacea, nitro & cera illitum, podagris, articulorum doloribus, lethargicisq; prodest. Pitis asphaltos eadem, quæ pix & bitumen, si misceantur, potest.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Plutarchus in gestis Alexandri Magni scribit: Peragrata uictaq; omni Babylone, quæ armis & imperio eius sine labore subito cesserat, nihil æquē cum regem admiratum fuisse, quā in Ecbatans: sic enim regionis eius pars quædam uocatur, ubi scaturit naphtha. Scribit in hunc sensum: In Ecbatans autem admiratus præcipue est ignis ueluti ex fonte continuē emergentis hiatum. & Naphthæ ex eo fluxum, qui non procul ab hiatu illo tantæ eructatur copiam, ut paludem faciat, cuius adeo ad trahendos ad se ignes tam facili natura sit, ut ex interuallo etc. De naphtha Strabo lib. 15. meminit, cuius uerba adijciam: Liquidum bitumen, quod uocant naphtham, admirabilem habet naturam. Nam adiunctam ignem ilico corrumpit, & si corpus co illitum igni admoueris, deflagrat, nec aqua ullo pacto extingui potest, sed magis ardet, nisi ualde multam superinfuderis ceno, & aceto, & alumine, & uisco oppressum extinguitur. Vnde Alexandrum tradunt, experientie gratia, puero cuidam balneo Naphtham inperississe, ac lucernam admouisse, ut puer totus deflagrasset, nisi circumstantes multa aqua flammam euicissent.

Cupressus. Caput LXXXVI.

B



Cupressus refrigerat, & astringit. Cuius folia ex passio & exiguo myrrhæ pota, uesciæ rheumatismis, & urinæ difficultati auxiliantur. pilulæ autem ex uino tuscæ in dysenteria, alui fluxione, rufsi, & orthopnœa, aut si rejiciatur sanguis, conuenientissimè bibuntur. earum decoctum eosdem præbet effectus. tuscæ cum fico durities emolliunt, nariumq; polypo medentur. in aceto coctæ & cum lupinis detritæ scabros ungues eiciunt. hernias intestinorum prolapsu erumpentes illitu reprimunt. Folia eadem præstant. Pilulæ cum arboris coma suffitæ, culices abigere existimantur. folia trita & imposita, uulnera conglutinant. sanguinem supprimunt. capillum ex aceto tingunt. illinuntur per se aut cum polenta ignibus sacris, ulceribus quæ serpunt, carbunculis & oculorum inflammationibus. admoda cum cerato ito machum corroborant.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, κυπρίδιος. Latine Cupressus.
Officinæ Pila sine fructus cupressi, nomine nucis cypressi tantummodo cognitus. Germanicè Cypressen nuss.
Galli Cyprez, appellant arborem, fructum uero noyx de cyprez.
Didymus cupressos duplici nomine uocari solitas memorie prodidit: charitas, quod oblectamento nobis sine, & cyparissos à partu parilium ramulorum & fructuum, ἀπὸ κυπρίδιος, hoc est, quod ex aquo & ramos & fructus creat.

Cupressus

A Cupressus procera arbor est, caudice oblongo ac tereti, folio pini, sed carnosiore, amaro, nec ita pungenti. Fronde indecidua, odore uehementi. Semen comis innascitur prætenue, exile, & quasi laricis fructui proximum, quod pilula sua fatiscente labitur. rara materie & macilentia: radice per summa cespitum uigante.

Cupressi pilule, que etiam Coni quibusdam dicuntur, unde Conifera Cyparissi. Verg. siccant ualenter sine insigni calore aut acrimonia: ob id hæc molles & recentes ulcera magna in duris corporibus glutinant, enterocelas iuuant.

Chamaecyparissus.



B

Iuniperus.



Resina è Cupressu manat, quæ cum res sunt unctæ, à carice uindcantur.

Est & coactæ breuitatis frutex, quem chamaecyparisson, quasi pumilam cupressum uocant, hortis familiarem. hunc ab odore formaq; foliorum eiusdem nomenclaturæ arboris, Cypressen, iudgo nominamus, quod in genere sit pumilionum, & quasi Cupressi uideretur abortus, folio incano & perenna. Sunt qui Chamaecyparissum, alij uerò qui adonijum esse putent, quasi abrothoni speciem: tametsi Nasonus flos adonij purpureus est, huic uerò aureus. Pollet aduersum omnium serpentium scorpionumq; uenena, ex uino potum, sed de ea alio loco insequentibus amplius.

Iuniperus. Cap. LXXXVII.

Iuniperi genera duo, altera maior, altera minor, utraq; acris est, ex calfacit, & urinam mouet. accensa serpentes fugat. Baccarum nonnullæ nucis iuglandis magnitudine nonnunquam grandescere, alig nucem Ponticam æquare inueniuntur, rotundæ, odoratæ, in mandendo dulces, subamaræ, quæ arceuthides etiam, id est, bæccæ iuniperi, nominantur. Modicè calfaciunt & astringunt, stomacho utiles. contra pectoris uitia, tussim, inflationes, tormina, & serpentium ictus efficacissimè bibuntur, urinam cient, unde ruptis, conuulsis, & uulnæ strangulatui subueniunt. folia acrimoniam habent, ideo tam ipsa quam eorum succus ex uino contra uiperarum morsus illini aut bibi prodest. Corticis cinis cum aqua illitus lepras eximit. ramenta ligni deuorata interficiunt.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Ἀρκευθίδες, ἢ ἄρκυδις. Latine Iuniperus uocatur.

Officinæ Latinam appellationem retinuerunt.

Germanicè, Wecholtzer, Krametbeer, id est, turdorum grana uocantur, quod fructibus eius turdi pinguescant. Brabantis, Geneueer boom, Geneueer.

Galli arborem Geneure, bæccas uerò, grain de geneure appellant.

Iuniperus Latine dici uidetur, quod iuniores & nouellos fructus pariat: sola enim ferè arborum fœtus suos in biennium prorogat, qui ne maturescunt quidem, nouis superuenientibus.

Iuniperi fructus calidus ordine tertio, siue primo: sed folia calida sicca gradu tertio.

Iuniperi gummi nec Dioscorides, nec Galenus memorant, fortè quod ad

LIBER PRIMVS.

ad nihil sit ntile, ut Acturius, Plinius. Subit uerò mirari, cur medicis hodie Arabas secutis, Sándaracha ha-
ectur, & suffutibus prope omnibus misceant, fluxiones à capite prohibentibus, cum sit calidum, & plante i-
psa etiam umbra, non solo uapore sit grauis.

Verrugo dicitur Hermialao, uernex uulgo, quòd rore uerna magis concresecat. Scriptoribus in usu est
multo & pictoribus.

Herba Sabina. Caput LXXXVIII.



Sabina duorum generum est. Vna folijs cupresso simi-
lis, spinis horridior, grauius olens, acris & feruens. ar-
bor est coactæ breuitatis, quæ sese magis in latitudinem
fundit. huius folijs nonnulli pro suffitu utuntur. Altera
tamarici folio similis est. Vtriusq; folia nomas sistunt, col-
lectiones illitu mitigant, & cum melle nigritias sordesq; re-
purgant carbunculos cum uino pota rumpunt, sanguinem
per urinam eliciunt. partus apposita extrahunt, & suffitu
idem præstant. unguentis calfacientibus immiscentur, &
priuatim gleucino.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Greci, Βασίλινος & Βάσαλον.

Latine, Sabina uel Sauina.

Officinae Latine nomen seruant. Germanis, Seuenbaum, palm-
baum, Seuenpalmen. Inferiori Germanie, Saueboom.

Gallis, Sauimera & du sauer, dicitur.

Pasim in hortis nascitur. Tertius est ordinis ex calfacientium & deficcant-
ium, & ex numero eorum, quæ uel maxime tenuium sunt partium.

Cedrus. Caput LXXXIX.

Cedrus arbor magna est, ex qua picem colligunt, quæ credria uocatur. iuniperi
modo baccas parit, baccarum magnitudine, rotundas. Cedria optima myrti
est crassa, perlucida, grauis odoris, quæ dum effunditur, guttatim non dissipata coit.
Cui ea uis inest, ut defuncta corpora conseruet, & uiuentia corrumpat. quæ ex causa
mortuorum uitam, aliqui appellauere. uestimenta quoque & pelles eximia calfaci-
endi & siccandi dote, corrumpit. magni ad ocularia medicamenta usus. quippe illi-
ta oculis claritatem affert, albugines cicatricesq; detergit. instillata autem cum ace-
to, uermes aurium necat. cum hyssopi decocto infusa, sonitus sibilosq; sedat. cauis
dentium indita eos frangit, & dolores lenat. idem facit cum ex aceto colluitur. per-
uncto ante coitum generali abortiuum fieri constat. anginae ea perunguntur. ton-
sillarum inflammationibus auxilio est. lentes pediculosq; illitu enecat. cerasia mor-
sibus cum sale imposita subuenit. contra hausta leporis marini uenena, in passio sum-
pta, auxiliatur. in elephantia, aut linctus, aut perunctione proficit. pulmonum ulcera
purgat. & si cyathus eius sorbeat, persahat. uermes & tineas subterindita necat.
& partus extrahit. Fir & oleum, à cedria separatim, dum coquitur, uelleribus supra
halitum eius expansis, ut in pice, eiusdem ad omnia usus. priuatim uehementer per-
unctum scabiem quadrupedum, canum, boumq; persanat. inhaerentes ricinos ene-
cat. ulcera quæ ex tonsura acceperunt, ad cicatrices perducit. Cedrides cedri fructus
uocantur. Calfatoria uim habent. stomacho aduersantur. auxilio sunt tussi, con-
uulsis, ruptis, stranguaria. menses eiunt. ex polline piperis poti. contra haustum lep-
orem marinum in uino sumuntur. serpentes fugantur, peruncto ex adipe ceruino, aut
medulla, corpore. in anti dote adduntur. Fuliginem, quomodo ex pice, cõgeri oportet,
quæ eandem quam picea fuligo uim præbet.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Greci, ξέδρος. Latine Cedrus. Officinis incognita.

Germanici, Ein Zedarbaum, omnino peregrina arbor. Gallis Cedre,

A Cedrus præterquam nomine, omnino ferè ignota est, utpote alibi quam trans maria nasci susticiens. Optima classibus, nauigijs, & tiremibus, neq; non domorum tectis: quippe cum ipsi insit æternitas. Plurima in Cylia, Syriaq; proflit: sed laudatissima in Creta, Aphrica, & Syriæ môtibus, quæ inibi usq; ed crassescit (si Theophrasto credimus) ut quinq; hominum complexu cingi nequeat.

Dioscorides & Plinius Cedri usum damnant propter ancipitem naturam uiuentia corrumpendi, & defuncta conseruandi: cum uitam auferat spirantibus, defunctisq; pro uita sit. ob hoc non censent interius sumendum. Huius tamen diuersitatis rationem perpulchrè Galenus innuit: quia tametsi adurat, ita ut ordine quæto calfacientium censerimeruerit, inter omnia tamen erodentia medicamenta, quæ Græci & septica & sepias cognominant, infirmisimum esse constat. proinde uiuentibus admotum uitali calore adiuncto, adsumit uires & quasi accenditur, atq; ita ingulat: sed defunctis additum, putrilaginem exierit, & uitiosos humores depascit, quibus detractis corpora à labe corruptionis asserit.

Laurus. Caput XC.



Laurus quædam tenui folio constati altera latiore. Vtraq; ex calfacientium naturam habet, & emollientem. unde decoctum earum in muliebres infusus additum, uulvæ & uetricæ uitijs conuenit. uirentia folia sensim substringunt. illita quoq; ac trita uespærum apiumq; ictibus opitulantur. eadem cum polenta & pane illita inflammationem omnem mitigant. sed pota stomachum effundunt, & uomitiones mouent. Lauri bacca magis quam folia calfaciunt, ergo in eclegmate tritæ cum melle uel passio profunt. abi, orthopnææ, & omnibus thoracis rheumatismis. contra scorpionum ictus ex uino bibuntur. uirilignes emaculat. succus baccarum utilissimè aurium dolori & grauitati instillatur, cum uino uetere, & rosaceo. in medicamenta autem adhiçuntur, quæ neruorum lassitudines reficiunt; acopa uocant: & ad unguenta quæ calfaciunt & discutunt. Cortex radicis calculos rumpit. partus necat. hepaticis prodest, tribus obolis in uino odorato potus.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Laurus arbor, Græcè Δάφνη. Lauri bacca δάφνη.

Latine Laurus arbor, & Lauri bacca.

Officina Latinum nomen retinuerunt.

Germanicè, Lorbeerbaum, arbor: bacca uerò, Lorbeer.

Gallis ung Laurier & le fruct d' ung laurier, dicitur.

Lauri folia & fructus calfaciunt, & siccant uehementer, sed he magis quam illa: leuiter astringere hic addit Dioscorides, quam uim & amaritudinem soli radicis cortici tribuit Galenus, qua calculos confringit.

Platanus. Caput XCI.

Tenerrima platanus folia in uino decocta, mox illita, oculorū fluxiones sistunt, tumores & inflammationes leuant. Decoctus cortex in aceto, dentes in dolore colluit. uirides pilulæ in uino potæ, serpentium moribus auxiliantur. exceptæ autem adipe, igni ambusta sanant, insidens foliorum pilularumq; lanugo, oculos & aures offendit.

Græcè:

Græc. πλάτανος. Latine Platanus, à latitudine foliorum dicta.
 Germanicè, Alhorn. Gallicè Plaine, dicitur. Officinis peregrina & incognita.
 Platanus cum adoleuit cubitorum est sexdecim, cortice crasso, fronde vitiginea, longo rubroq; pediculo,
 flosculo pallido, pilulis scabris, lanuginosis, minutis.



Fraxinus. Caput XCII.

Fraxinus arbor nota est, cuius foliorum succus, & ipsa peruncta, aut ex uino pota, uiperarum ictibus auxillantur. corticis cinis ex aqua illius lepras eximit. ligni ramenta scorbemq; potu perniciem afferre tradunt.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Μελλά. Latine, Fraxinus.

Officinis Latinum nomen seruant.

Germanicè, Eichenbaum.

Gallicè Fraisine, dicitur.

Fraxinus arbor est procerà, caudice tereti, leui cortice, spisso, tenui, rubro, ramis utring; pinnatis, folijs lauri, per ambitum teniter serratis, non sine quodam marginis uel cacuminis aculeato callo, portacei coloris, semine minuto folijs ipsis incluso, amaro: radice multa, crassa & sublimi.

Actu facillima fraxinus: semen reddit post undecimiam & arcturum.

Populus. Caput XCIII.



Potus albæ populi cortex uncia unius pondere, ischiadicis ac urinæ stillicidio prodest. Abor. Btium fieri tradunt, si cum mulino rene bibatur. folia quoq; cum uino post purgationes pota, idem prestare produntur. tepens foliorum succus utiliter aurium dolori instillatur. pilulæ quæ primo foliorum partu exiliunt, illitæ cum melle, oculorum hebetudini medentur. Memoriæ prodiderunt, corticem albæ populi & nigræ, particulatim cæsum, & sulcis stercoreatis mandatum, omni tempore anni edules fungos proferre. Populi nigræ folia cum aceto illita magna utilitate podagricis doloribus illinuntur. Rheinam populus fundit, quæ in malagmata additur. Semen porum ex aceto comitialibus utile est. Lachrymam populorum commemorant, quæ in Padum amnem defluat, durari, accoïre in succinum, quod electrum uocant, alij chrysophorum, id attritu iucundum odorem spirat, & aurum colore imitatur. tritum porumq; stomachi uentrisq; fluxiones sistit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Ἀύκη.

Latine populus alba.

Germanis, Saubachbaum/ mit weissen blettern vnden. Gallis, ung Peuplier.

Populus nigra, Græci Αἰγυγός. Germanicè, Saubachbaum/ poplenbaum/ Alberbaum.

Gallicè, du tremble & peuplier, dicitur.

Populus, ut Dioscorides tradit, duplex: Ἀύκη, id est, alba, & αἰγυγός. Galenus, αἰγυγός Dioscoridis est, id est, nigra, & γυγός, id est, flores, seu σπάκια, id est, pilulæ, primo foliorum partu exilientia. Officinis

Oculi populi. *Germanis Alberfproß dicuntur, calida primo à temperatis recessu: nam in ἡ ἄρρητος ἄρρητος, Paulus & Manardus in Galeno legunt: licet in τὸς ἰσχυρὸς, id est, in tertia habeat co-*
dux Aldinus, & ita legerit in Arabibus, unde uerit uetus interpres: & Oribasius Græcus medicus libro se-
cundo ad Euenaptem, & libro 15. ad Iulianum Cæsarem. Paulo sicciora, quàm quòd humido & sicco est tem-
peratum: tenuium partium potius quàm crassarum. Folia floribus sunt similia, sed imbecilliora: & Resina
eius exigna floribus similem habet facultatem, sed calidiorem: semen floribus & resina siccior, non multò
calidius, sed partium est tenuium. Folia λεύκος, id est, populi albe media sunt inter folia lauri calidissi-
ma, & folia ἀνίσυρ herbæ refrigerantis Dioscoridi, sic enim libro secundo comp. pharma. legendum censue-
rim potius quàm ἀνίσυρ, qui libro sexto simplic. dictus est calidus ordine tertio, etiam si uetus interpres ex
Arabibus eoloco habet agni casti. λεύκος ἡ ἄρρητος, id est, populi albe fructus digerentis est facultatis, ibi-
dem paulò anti.

Gustanti Manardo populum nigram & communem, uisa est modicè astringere, postea minimum ama-
 ra, odore non insuauis, sed languido. Ex eius igitur floribus Myracopum sine unguentum populeum refrigerat,
 cum præter adipem & populi oculos modicè calida, cætera habeat frigida, etiam magna parte ad supre-
 mos usq; ordines.

Populus alba temperata ex aqua tepida substantia, & terrea tenuata terget: eius flores multum acres no-
 bis sunt, ex hisq; uulgo fit unguentum populeum: licet acopum Διαιγύς apud Galenum & Paulum lego-
 eur, non est λεύκος.



ei ex Germania septentrionali, & insulis maris Germanici, quod hodie nobis est compertissimum: ad hæc li-
 quata igni ualentiore, quia à frigido intensiore concreuit, pineam apertè olet, calidum primo gradu, siccum
 secundo, stomachum roborat, uomitum, nauscam arceat: cordis palpitatioui prodest, prauorum humorum &

uerationem prohibet.

Germani, Weiß vnd gelb Hagestern & Brechsteyn.
 Galli ambra uocant: uulgo in corollis precarijs frequens.

Macer.

Caput XCIII.



Macer ex Barbaria aduehitur, cortex flauescens, crassus, gustu perquam astringens,
 qui contra cruentas excretaiones, dysenterias,
 & alui fluxiones bibitur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Macer hoc loco Dioscoridi est cortex flauescens, seu cum Pli-
 nio, rubens, radice magna, nomine sue arboris nobis incognita,
 crassus gustu, perquam astringens, ex Barbaria allatus.

Galeno autem est cortex gustu multum acerbis, cum leui qua-
 dam acrimonia, odorem iucundum redolens, ut plerq; aromata. siccatur ordine tertio, calore & frigore est
 temperatus. Ex Iudea uerò affertur. Macis autem Arabum, cuius picturam damus, membrana est exima
 nucem Moschatam propè totam uestiens, tenuis, rufa, aut flaua, interdum nigricans, aromatica, odore suauis,
 sapore subacri, & minimum amaro, tenuium partium: calida sicca tertio gradu, uentriculum roborat, co-
 ctionem iuuat. Ex quibus liquet, Macis & Macer res planè diuersas, licet odore, colore quadammodo conue-
 niant: & temperamento tamen differunt, nisi contendas in Dioscoride & Galeni simplicibus mendam esse,
 quod uix queas demonstrare. Quòd si res sunt diuersæ, ut ex Plinio apertè patet, Macer hodie est incogni-
 tum: tamen pro Nicolai Macis Actuarius Macis reponit.

Vlmus.

Caput XCV.

Vlmi & folia & cortex & rami, uim habent spissandi. Folia trita ex aceto ad
 lepras efficaciter illinuntur, uulnera glutinant, sed multo magis corticis filia
 & fasciis

LIBER PRIMVS.

Vlmus.



si fasciæ loco intorqueatur : nam A
in lori morem flecti potest. crassi-
or cortex in uino aut aqua frigida
unciatim potus, pituitas trahit, fra-
cta ossa celerius solidescunt, si de-
cocto foliorum corticis aut radi-
cis foueantur. humor in folliculis
enascens, prima germinis eruptio-
ne, cuti illitus nitorem inducit, faci-
emq; splendidiorem præstat. qui
dum siccatur, in animalia abit, quæ
culicum formam gerunt. folia cum
senescunt cocta olerum more ad
obsonia usurpantur.

NOMINA ET EXPLI- catio.

Græcè, πτελέα.

Latinus Vlmus.

Germanis, Ulmerbaum / Rästbaum /
Ryssenbaum / Xlmén / Lindbast.

Gallis Orme appellatur.

Proceræ est arbor, foliis indiuiduo, lente
cremato, scabro, oblongiore quàm pyro, se-
men racemosum, in foliis & petiolis gummi
producit, & quoddam bestiarum genus
quod carpis dicunt, materia flaua, robusta,
nervata, deformi, & quæ nihil præter cor ha-
beat, uiridis, & suu facili, sicca difficilis, apud B
aquis, facili incrementi.

Lignorum marcor.

Caput XCVI.

EX caudicibus lignisq; ueteribus caries congeritur, quæ farinæ modo illita, ul-
cera purgat, & ad cicatricem perducit. serpentia cohibet, si cum pari aniso & ui-
no subacta, linteisq; imposita, illinatur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Lignorum caries, præsertim ulmi, tumentia purgat ulcera, & explet, Germanicè Wurm meel
appellatur.

Harundo.

Caput XCVII.



IN harundinū ge-
nere quædam na-
stos, id est, factior
uocatur, ex qua sa-
gitte factitari solēt.
alia foemina, qua ti-
biarum ligulas effi-
ciunt. alia quod fistu-
lis addicta sit, syrin-
gias: cui multum in-
est carnis, crebris
cincta geniculis, ad
librorū conferptio-
nem accommodata.
alia crassa, concaua,

D I O S C O R I D I S

A apud amnes nascens, quæ à quibusdam cypria, ab alijs donax appellatur. alia phragmites, seu uallatoria, gracilis, candicans, uulgo cognita: cuius tria radix per se, aut cum bulbis suis illita, ipicula aculeosq; corpore extrahit. luxata, libori nq; dolores cum aceto mulcet. uirentia folia tuta & imposita ignibus sacris, medentur, & cæteris inflammationibus, corticis cinere peruncta cum aceto alopecia lanantur. panicula lanugo si aures intrauerit, exurdat. Eundem effectum implet harundo, quæ cypria dicitur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis κάλαμος. Latins harundo, siue arundo appellatur.

Officina Latinum nomen seruarunt. Germani, Roer. Galli ung roseau uocant.

Arundo principatum in aquaticis fruticibus tenet: Caule consurgit gemulato, tereti ac fistuloso, qui non senescens fissili marefcit ligno, in leue fastigium cacuminato, circa quod densius excrefcit tomentum, ad faciendâs culcitras non inutile: folia ex artibus alterno laterum gradu emergentia, membranæo calicium uerticillato cortice usq; ad medium internodium: hinc enim à cauo alarum sinu resupinantur, procumbente languido promissiore coma uel panicula pondusculo. Radix quoq; multis gemculatur articulis, facunda stirpe, uel quæ etiâ uel adusta uel recisa latius numerosiusq; reuifcat.

Papyrus. Caput XC VIII.

Papyrus qua charta sunt, nullis non cognita, præcipuè in medicina utilitatis ad laxandas fistulas, madefacta lino inuoluitur, utq; dum inaruerit: conficta enim atq; immissa in hiatum, humore completur, & in tumescendo fistulas aperit. Habet uelicio quid alimenti radix: itaq; Aegyptij eam mandunt, succum tantum de uorantes, & mansam expuunt. ipsis radicibus pro ligno utuntur. Cremata papyri cinis depascentia ulcera cum omnium partium, tum oris maximè, cohibet, uicium melius id combusta charta præstat.

EXPLICATIO.

Papyrus nascitur in paludribus Aegypti, aut quiescentibus Nili aquis ubi euagata stagnum, duo cubito non ex: dum gurgatim altitudine, brachiali radice oblique crassitudine, triangulis lateribus, decem non amplius cubitorum longitudine, in gracilitatem fastigiatum thyrsi modo cacumen includens, &c. Plura de papyro uide apud Theophrast. lib. 4. cap. 9.

Fiebat apud ueteres è papyro charta, cuius ut in Europa nunc euaguit usus, ita nomen remansit. Etenim quam ex contritis hodie lincolis chartam passim conficiunt, isdem quibus & illa comendata doctibus, quippe tenuitate, candore, densitate Niloticæ nostra charta non cedat, quam etiam uulgo illius imitatione papyrum uocat.

Non papyro hodie, qui nobis ignotus & peregrinus, sed sponsa utimur ad laxandas quæ præcluse sunt fistulas, & intumescendo ad introitum medicamentorum aperiendas.

Myrica. Caput XC IX.

MYrica seu tamarix, arbor uulgo cognita est, cum apud nigras & stagnantes aquas enascatur, fructum quasi florem ferens compage muscotum. Aegyptiæ Syriæq; alteram gignunt miriorem, syluestri cætera similem. fructum parit gallæ proximum, in aqua saliter astringentem gustu, quo conuenienter utimur uice gallæ in medicaminibus oculorum orisq; datur cruentæ excreationi in potu, & coeliacis, & contra profluvia fœminarum, regium morbum, & phalangiorum morsus. illitus tumores inhihet. Cortex in eosdem usus adhibetur. Decoctum foliorum cum uino potum, lienem ablumit. ad dolorem dentium in collutionibus salutare & mulieribus fluxioni uulua opportunit in defensionibus. pthiriasi lendibusq; circumfusum prodest. abundantiam fœminarum sistit impositus arboris cinis. potioris calices è caudice lienosis moluntur, quò datus in his potus proficiat.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis, Μυρική. Latins, Myrice & Tamarix. Officinis Tamariscus.

Germanis & Gallis Tamarisc nominatur.

Tamarix seu Myrica, fructu, radice, folijs, extremis ramulis tergit incidit sine manifesta siccatione, parum astringit, tenuium partium, lienis indurato cum aceto aut uino coctis prodest: fructus & cortex ualentius

Myrica.



uolentius astringunt. fructum tamen & succum, & non radicem, adhibet splenetici remedijs Galen. lib. 9. comp. pharm. part. Quinetiam trunco in uascula uel potoria, uel scaria cauto, lionem arcano quodam odio subus & hominibus longo usu absumit.

Plinius contra Dioscoridem & Galenum, nullum fructum ferre dicit libro 16. cap. 20. his uerbis: Fructum arborum solæ nullum ferunt, hoc est, ne semen quidem, tamarix scopis tantum nascens, populus, alnus, ulmus, &c. quod itaq; Dioscorides dixit: καὶ τὸν ὅλον τὸν ἄνδρα φέρει. Bpud des nate rlu σῶσας, id ipsum Plin. tum semen, tum fructum esse aut dici posse non putauit. Porro calices fieri, ut supra quoq; monuimus, ex trunco myricæ arboris solitos, qui splenetici essent in usu commodi, Dioscorides prodit. Sed ea gratia hodie uina ex tamarisci uirgulis concinnantur in superiori Germania cisrhenana, quæ splenetici utiliter bibuntur, Tamariscina uulgo appellata: quod ut nouitium inuentum adscribere nolui, quum facticij huius uini Dioscorides inter tot genera non meminisset. & Democritus apud Constantinum Cesarem libro decimonono, capite septimo, ad eandem remedium prunis Myricæ superfusum, & sic potatum magis probet.

Erica.



Erica. Caput C.

Erica fruticosa arbor, myricæ similis, longè minor, cuius flore apes reprobum mel efficiunt. tam flos quam coma serpentium ictibus illitu medetur.

Grecis ἔρικα. Latinis Erica. Officinis inusitata.

Germanis, Heyd. Gallis, Bugere.

Quidam esse putant, quam Galli rosmarinum aculeatum, uel potius io-

uarinum appellant.

Ericæ digerentis plantæ flore potissimum ac folijs utendum: semen etiam adhibetur apud Galenum lib. 6. comp. pharm. par. Erica dictum sepè lib. 9. comp. pharm. part. in spleneticijs.

Acacalis. Caput CI.

Acacalis fructus est nascentis in Aegypto fruticis, seminis myricæ quadam tenus similis, cuius aqua in

A qua maduerit, ad collyria additur, quæ ad excitandam oculorum aciem conueniunt.

Hodie planè incognita: nomen frutici à nymphæ datum crediderim Acacali.

Rhamnus.

Caput CII.

Rhamnus.

Vua crissa.



B

Rhamnus fruticat in sepibus, ramos ferens rectos, & aculeos in acuta spinæ modum, folijs paruis, oblongis, suppinguibus, teneris. Alterum ei genus candidius, tertium nigrioribus latioribusq; folijs constat, & quadam tenus rubentibus, cuius rami quinam cubitorum longitudinem implent, spinosiores quidem, sed infirmioribus minusq; rigentibus aculeis. Fructum ædit latum, cædidum, tenue, folliculari specie, verticillo similem. Omnium folia igni sacro, & serpentibus ulceribus, efficaciter illinuntur. Fama est, ramos huius ualuis fenestrisue impositos, ueneficia depellere.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Rhamnus frutex spinosus, apud ueteres tria habet sãstigia. Ego Rhamni unum genus hoc puto, quod Galli burgam spinam, uel Neprum uocant. fructu myrti, foris nigro, intus uridi, ob id ad colorem cum tingentibus idoneo. Germani, Creuzbeer / Wãcherbeer / Serbẽner / Serbbeer, appellant. Cortex arbori subniger, & nitidus quasi ceraso, intus uirens, post luteus, lignum extrã candidum, interiore medulla rubet: eo ualidos areus nostri fabricant. Audio etiam adhuc hodie Italis spinum ceruinum uocari, nam & ab ijsdem Dioscorides spinam cerualem dicere statuitur.

Rhamni sãstigijs genus aliud annumerandum in afflatu maris nascent, frutice nonnunquam arborescente, prælongis ramulis, qui rigidis armantur spinis aculei mucrone sauentibus, folijs tamen annula facie ligustrum exprimentibus, ut pro illis fallant, bacca folliculari specie, uerticillata primum candida, post maturitatem rubefacta, foris flaccida, intus rimosa, quam pastores pecorum pabulo decutunt.

Sunt qui primum Rhamni genus arbitrantur hoc, quod officinae uiam crispam, Germani Brenselbeer, Galli uerò grosselles uocant. fruticosi namq; generis est, ramulis uictis, recte spinarum mucrone horridus, flore ex herbido candicante, in frutetis & sepibus nascent: folia tamen non respondent, quæ circinata rotunditatis conspiciuntur, apij modo dissecta, frutice aculeato, acinus candidus, & à maturitate diuicibus, granosis translucidis, ciborum condimentis expeditis.

Halimus,

Caput CIII.

Halimus

Halimus frutex est sepimentis idoneus, similis rhamno, sine spinis, folijs oleis. A sed latioribus nascitur in sepibus & maritimis. Folia decoquantur tiberum gratia. radix conuulsa, rupta, torminaq; mitigat, drachma pondere in aqua multa pota. eadem lactis ubertatem facit.

Halimus in magno nominum ambitu est. Ruellius arbitrat fruticem eum qui in Gallia uitis Sepibus fructus, blancputa uulgo appellatur, Halimum esse, gustu subacero in salislagment tendente, quare mensis folia cum tenerescunt non essent ingrata, tamen non esse edendo, cum prope nimia habeantur olea.

Paliurus. Caput CIII.



Paliurus frutex cognoscitur aculeatus, durus, cuius semen pingue & fuliginosum inuenitur, quod potum tuisi opitulatur. uesciae calculos comminuit. serpentium ictibus aduersatur. Folia & radix astrictoriam uim habent. quorum decoctum potu aluum sistit, urinam trahit. contra uenena & serpentium morsus auxiliatur. Radix recentia tubercula, tumoresq; omnes discutit, trita & imposita.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Παλίζος. Latine, Paliurus.
Officinis inusitata. Germanicè, Weelberin.
Gallicè aubepin, appellatur. aut saltem paliuri species est.

Apud nos paucis antea annis frutex inuenitur, qui etiam arborefcere possit, folio per ambitum lacina, im sinuato, rotundo, molli, ramis spini, quem alium cognominant, modo maculatis bacis, rotundis, rubris, myrtis, longè maioribus, gustu iucundo, qui et uinum suauitate sua commendat. Condiuntur et grato ori cibo. Cæpit me memoria propagari in ista, quantum reor, albo spino. Qui colum in hortis, uelut alienigenam et adueniam arborem, Myribalanum appellant. Hanc esse putauerim, nullis ferè notis reclamantibus paliurum Africanam, eam præsertim que non filiqueatur. Ruellius Paliuri genus esse coniecit fruticem aculeosum, uulgo Weelberin, Gallicè aubepin, id est, album spinum. Fertur enim farina e fructu olim in farre quasita, unde Germanicum nomen habet, quod sanè etiam de Paliuro tradunt ueteres. Item fruticem quandam rura Gallie iuncunt non ausim affirmare, quòd ei spina pro folio sit.



Acuta spina. Cap. CV.

Acuta spina, quam pyram aut pityanthen aliqui uocant, arbore est pyralto similis, spinosa ualde, & minor. baccas proferit myrti, plenas, rubras, fragiles, & intus nucleum: radice multifidam, alè descendente. Huius bacca potu aut tibo, alui profluuium, et abundantiam fecminarum sistunt. radice illita aculeos & spicula extrahit. abortu fieri tradunt, si ter radice uenter, aut sem si feriat, aut perungatur.

A

Ribes.



B

Rubus canis.



Græcè, ὀξύκανθος, ἢ ὀξυῦκανθος. Latine acuta spinâ.

Officinis Berberis, & Bugia.

Germanicè, Erbselein / Saurauß / Weinleglin, uocatur.

Galli, quod huius acinis uinum exprimatur, spinui netam appellant, alii qui acrem spinam.

Oxiacanthâ uel Oxiacanthi racemose bacculâ, dum maturuerunt rubentes, astringunt: uis eadem folijs, sed languidior. E baccis uinum exprimitur eodem serè usu, quo uinum ex malo punico. Conduntur etiam uel melle uel saccharo ad restringendam sitim, depellendamq; febricitantium maliciâ. quorum morosum nimis palatum cibum ferre quicunque, respuat. Elanguescens appetentia grato huius acore recreatur.

Frutex Arabibus Ribes dictus, huic planè congener, racemosus, acidus, acerbus, frigidus siccus secundo gradu, sitim extinguit, uomitû & fluorem alui biliosum sistit, morbillis & uariolis, quas uocant, saluber: frutex à nobis potterium rubrum dicitur. Germanis dicitur S. Johans reublin. Inferiori Germaniæ, Helbesien / S. Jans besyffens / offi Druyffens. Quid sit, frutex an herba, & quæ, ambigit Serapio in suis testimonijs. Succus ex his expressus, cum saccharo cydoniati modo coctus, est delicatissimus.

Ribes Damasceus Musæ additur, folijs rotundis, & magnis iisdem.

Rubus canis. Caput CVI.

Frutex est arboris instar, rubo longè maior, folia multò latoria myrto, firmis circa ramos spinis. flore candido, fructu oblongo, nucleo oliuæ simili, qui per maturitatē fuluescit, & flocculos intus continet. Fructus exemptis interioribus floccis arefactus, aluum sistit: seruifacit enim in uino, mox poti, arteriam infestant.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, ῥυβός, ἢ ῥυβός. Latine, Rubus canis. Officinæ cum syluestri Rosa confundunt. Germanicè, Roubuten / Wickdoorn / Strauß.

Gallicè ung eglantier sans odeur, in differentiâ rosæ syluestris, aspullatur.

Rubi, seu sentis, Græcè βέρβη genera Theophrasto tria sunt: magnus seu rectus, humilis, & medius, qui suo loco declarabuntur. Batus magnus seu re-

Ligustrum.

ctus, est Dioscoridis & Galeni ῥυβός, βέρβη, fructu oblongo per maturitatem rubente, cytino simili, quo cœu lanæ flocci arteriam si deuorentur infestant: huic folijs, fructu, rosa similis est cynosrhoda, Englentier Gallis dicta: & rosa frutex omnis, nisi quod serè gerit folia florū magis multiplicia & maiora, arte opior adiutâ: sed Cynosbatus spinis hamatis horridior, rector, et altior assurgit, odore caret, quæ Cynosrhoda tota habet præstantissimum: rosa uerò frutex flore solo est odorata, nunc albo, nunc rubro, nunc amborum medio (incarnatum Galli Germaniq; Leibfarb uocant) nunc etiam muschbatum.

Ligustrum. Cap. CVII.

Ligustrum arbor est oliuæ folijs circū ramos, latioribus, mollioribus, & uirentioribus: flore candido, muscoso, odorato: semine sambuci nigro. Optimū nascitur in Canope & Afcalone. Folia asporiam uim habent: quare commanducata ulceribus oris medetur. illita feruidis inflammationibus, carbunculisq; profunt. decocto

cocto eorundem igni ambusta fouentur. capillum rufant trista folia, quæ in radicu-
la succo maduerint. flos ex aceto fronti illitus capitis dolorem sedat. Cyprinum
oleum quod ex eo fit odoratum, exalfacit, emollit neruos, si quæ feruenti natura
prædita sint, assumat.

Philyrea.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Ligustrum Plinij alisurumq; Latinorum, cuius picturam
datus, omnes ferè hæcenus Dioscoridis Cyprum interpre-
tati sunt: sed illos nuper redarguit doctissimus uir Franci-
scus Massarius Venetus. Quilupæ quidem tiliam esse de-
monstrans, ligustrum autem Quilupæ, non cyprum, ut se
quenti capite fufius.



Philyrea. Caput CVIII.

PHilyrea arbor est ligustri magnitudine,
folijs oleæ, nigrioribus & latioribus, fru-
ctu lentisci, nigro, subduli, racematim cohæ-
rente, asperis nascitur. Huius folia astringunt,
ad eadem utilia ad quæ oleaster, cum astringe-
ntione est opus: maxime ad oris ulcera, com-
manducata, aut si decocto colluantur. pota
urinam ac menses cient.

Græcis Quilupæ.

Plinio alisq; Latinis Ligustrum.

Officinis saltem Germanico nomine cognita.

Germanis, Beynshölzlin/Mundtholz/Kartrigel/
Reinweiden/Berngere. Inferiori Germaniæ, Mont-
hout/Königswilghe.

Gallis Dutroefne dicitur.

Philyra.



Quilupæ Græcis. Tilia Latini & Officinis. Germa-
nis Linden/appellatur, alia ab hac, est arbor quæ hîc
Dioscoridi Quilupæ vocatur, quod non animaduerten-
tes uiri etiam nonnulli doctissimi, utraq; arbores magnè
errore confundunt, quod forma admodum discrepent, ut
è Dioscoride & Theophrasto lib. 3. de plantarum histo-
ria cap. 10. inuicem collatis abundè constabit. Differunt
itaq; inter se Philyra, quæ Tilia est, & Philyrea, de quâ
in presenti capite Dioscorides agit, neq; una hoc utraq;
arbor significatur, sed diuersæ, quemadmodum ostendit
uuper doctissimus uir Franciscus Massarius, ut supr à me
minimus.

Cistus. Cap. CIX.

Cistus, quem aliqui citharon, aut cissâ-
ron uocant, ramosus frutex est, sed im-
procerus, foliosus, saxosis locis nascens, fo-
lijs rotundis, acerbis, hirsutis, flos masculo
ut mali punice, fœminæ albet: Vis astringens, unde flores in uino austero bis in die
poti, profunt dysentericis. & nomas per se illiti cohibent, uetustati ulcerû, & igni
ambustis cum cerato medentur. Hypocistis, erythronon*, aut cytinus nonnullis* Alij, oroban-
cognominata, iuxta cisti radices nascitur, floris punici similitudine, quædâ flaua, al-
tera uirens, tertia candida. Liguatur acaciæ modo. Aliqui tamen exiccant,
fractamq; macerant, & incoquant, reliquaq; ut in Lyclo prosequuntur. ui-
res acaciæ habet, uerùm aliquantò magis siccatur, & astringit, prodest dysente-
ricis.

Aricis, coeliacis, sanguinem excreantibus, sceminarum profluuiis, & pota & indita.

EXPLICATIO.

Cisti frutex Germanis peregrinus. In quibusdam Gallie montibus, & (ut aiunt) Patavinis hypocistis videre licet, & fruticem sub qua nascitur, ocymi folio, flore candido, quasi sylvestris rose, radice lignosa, prædura, è cuius serè medio hypocistis uelut infixa pullulat, cuius officinis succus est notior, quàm ut explicari mereatur.

Hypocistis succus, & Hypocistidis succus passim dicitur in lib. comp. phar. part. Hypocistidis succo addita γλυκίως, id est, passi parte, macerat. gummi, tragacantham, myrrham, ibus, lib. 7. comp. phar. part.

Ladanum. Caput CX.

Est & alterum cisti genus, ledon à nonnullis appellatum, frutex simili modo nascens, longioribus folijs, & nigrioribus. quæ uerno tempore quiddam contrahunt pingue. foliorum uis astringens, atq; effectus cisti præbens. Fit ex eo quod ladanum dicitur: Siquidem cum cisti frondes pascuntur capræ, hirciq; pinguetudine conspicuè barba carpunt, & suo lentore uillosis cruribus adhærescentem reportant: quam depeccantes in colēs, colantesq; cogunt in offas, & ita recondunt. Alij uerò attractis funiculis, insidentem fruticibus lentorem abstergunt, conglomerantq; in ladanum. Maximè probatur odoratum, subuiride, facile mollescens, pingue, quod arenas non collegit, nec squalore oblitum est, resinofum, quale in Cypro gignitur. Arabicum uerò Libycumq; uilius. Natura ei spissandi, calfaciendi, molliendi: ora uenarum patefacit. capillum fluentem continet, addito uino, myrrha, & myrteo oleo, cicatricibus decorem reddit, cum uino illitum, medetur aurium doloribus, cū hydromelite aut rosaceo infusum, suffitu secundas eijcit. pepsis immixtum, uulnæ duritiem sanat, in medicamenta quæ dolorem tussimq; finiunt, & malagmata utiliter inseritur, aluum sistit cum uino uetere potum. & urinam ciet.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Cistis, quæ alio nomine Lada & Ledon appellatur, frutex is est, unde capræ & hirci folia decerpentes, **B** barbas ac uillos laterum succo eorum imbuunt, unde postea homines depeccunt, quod Ladanum uocatur, offi Plinij error. cinis optimè notum. Verum Plinius haud in paruum errorem delapsus est, qui ob uacuum cisti & cistibi uicinitatem, cistum hunc hedere speciem existimauit. At uerò Ladanum non tantum ex barbis hircorum depeccit, ut ueteres tradiderunt, sed alijs etiam modis inde colligit, aperte ostendit Galenus lib. 1. cap. 1. de com. phar. part. quum dicit non manifestum esse, an hoc solum Ladanum, quod ex hircorum barbis depeccitur, in illud medicamentum, quod tradit, adhiberi uelit: & possibile esse per hanc speciem totum Ladam genus designari. Sed tamen nullum certum modum neq; hic, neq; alibi quod sciam, eius colligendi prodit. Dioscorides certè hic unum aliquem amplius colligendi Ladam modum præscribit, qui funibus per forfices tractis contingit, ut sci licet eo modo glutinata pinguitudo postea ex ipsis funibus deradatur: quem modum etiam Plinius lib. 12. cap. 17. tradit. Quin & tertium quendam modum eius colligendi Plinius lib. 26. cap. 8. habet. per neruos in arcu lanis circumdatos, atq; id fieri in Syria atq; Africa, unde etiam toxicum appellatur. Toxon enim arcum Græcis significat. Rufus porrò apud Erembos populos Ladanum illud prouenire dicit. Sunt autem Erembi Æthiopie populi, qui & Troglodytæ, utroq; simili nominis etymo appellantur. Galenus lib. 7. simpl. phar. ma. Cistum qui & Ladanum, in calidioribus regionibus nasci dicit, non alterius generis ab eo qui in Asia prouenit, sed ob regionis proprietatem, illud diffusoriam habere caliditatem. & in hoc ab Asiano differre, quod non solum frigiditatem deposuerit, sed caliditatem assumpsit. Plinius lib. 12. cap. 17. apud Nabateos Arabas hoc fieri scripsit, atq; mox uerum Ladanum Cypro insula attribuit, quæ sub illius fide relinquo.

Ebenus. Caput CXI.

Ebenus optima habetur Aethiopica & nigra, nullos habens uenarum discursus, factitij cornus læuore. cum frangitur densa apparet, mordens gustu, atque astringens, suffitur iucundo odore supra carbones sine fumi radio, recens autem ad ignem prolata, ob pinguitudinem accenditur, & trita ad cotem hæuiscit. Altera est Indica, internatis segmentis candicantibus, & modicè fuluis, item frequentibus maculis, cæterum prior bonitate antecedit. Apud quosdam sesamina, aut spinea ligna * confimilia pro ebena uæneunt: quod discernitur ex eo, quod fungosa sunt, et in purpureas assulas resoluuntur, nihil mordacitatis in gustu, nec redolentia in suffitu

* Alij, Syamini-
na, aut spinea In-
dica.

LIBER PRIMVS.



suffitu præferentia. Caliginem oculorum absterget. ad veteres defillationes, pustulasq; mirum in modum pollet. si quispiam facta ex eo corticula collyrijs utatur, melius proficiet. ad oculorum medicamenta efficax est, si scobes ramentæue uino Chio die noctuq; macerata, in collyria digerantur. nonnulli prætrita ipsa excoquant, reliqua; eundem in modum peragunt. alij pro uino aqua utuntur. Vritur in fictili nouo, donec in carbones redigatur. lauatur plumbiusti modo, & ita siccis scabrisq; lippitudinibus conducit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Lignum, quod ea gens Barbaræ, quæ nobis transmittit, uernacula lingua Guaiacum appellat, ab Hispanis Italis Sanctum, à Germanis Franzosen Holz / Elater Holz. Gallicis Guaiac, dictum, Latinis uerò Indicum lignum appellatum. Ego cum aliquot doctis medicis Ebenum esse puto, uel omnino aliquam eius speciem: namq; per omnia descriptioni, quam de Ebenò hic Dioscorides ponit, conuenire uidetur: præter enim soliditatem & reuerentem duritiem, aquæ non superfidet: sed innata plurima terrestri substantia fundum petit, quod Ebenum tantum præ ceteris arboribus attribuit Aristoteles. Triplex eius genus esse dicunt, & quod ex Aethiopia uenit, probatissimum esse & in Pompeij Mithridatico triumpho, primum Romæ urbi spoliū gratissimum & admirandum fuisse narrat. Radicem magis terra exsertam, nigro colore, scribit Dioscorides, nihilominus tamen pleriq; neotericorum, à Theophrasto non dissidentes, apud Indos in altitudinem mediocrem arborescere, eorum qui ab India ueniunt, relatu adfirmant, crassitie corporis hominis, filijs plantæ agnis, sed minoribus paulò & rigidioribus, glandibus ad modum quercuum, & ueluti oliuis, ramorum extremitatibus inhiantibus. Et ex eo optimum censetur, quod recens satis, neq; admodum uetus & cariosum existit: tale etenim igni superimpositum, ob resinaceos fauos, quibus interius nigrum medullium discriminatur, citius accenditur, & flammam agit: quo solo ligni bonitatem ab adulterato probare solent: laudatur item quod subcitrico & buxco est colore, quale est nostrum, quod passim in officinis diuenditur: & post detractum corticem, colore ad liuidum uergente: item quod in gustu præter astringentem saporem, etiam leniter linguam erosionem morâcet. Lignum est satis calidum, morbis omnibus ex humore, præsertim frigido natîs, salubre: nam acrimonia & amaritudine incidit, tenuat, terget, uiscuat. De huius facultate mira doctissimus Anthonij Galli medici commentarius, his diebus paucis in lucem editus, facit, ne mihi de hoc pluribus sit agendum: us interim taceam Hutterum, Mathcolum, Massam, & alios quàm plurimos, qui uerbofissimè uires eius nobis inculcarunt, potissimum in curanda lue Hispanica, siue potius Gallica: sed tamen etiam morbis alijs, præsertim frigidis, conferre, adeò est hodie persuasum, ut certatim eo etiam magnates uti gestiant.

Rosa,

Caput CXII.



Rosa

Rosa refrigerat & astringit, sed sicca multo magis. Succus recentibus folijs exprimitur, defectis forficis unguibus (sic appellantur candidæ foliorum partes) reliquum in pila premi & teri debet in umbra, donec cogatur, & ita ad oculorum circumlitiones recondi. Siccantur etiamnum folia rosarum, continuo uersata, ne muceant, neque sitis in ijs infideat. Aridis rosis & in uino decoctis expressus liquor, facit ad dolores capitis, aurium, oculorum, gingiuarum, sedis, recti intestini, ac uulua, pinna illitus aut infusus, eadem sine expressione tusa, præcordiorum inflammationibus, humidis stomachi uitijs, igni sacro illini prodest. Siccis ac tritis femina * asperguntur, miseri solent uulnerarijs antidotis, atq; compositionibus, quas antheras uocant. Folia uruntur in calliblephara. Flos qui in medijs rosis inuenitur, siccat, gingiuarum fluxionibus efficaciter inspergitur. Capita pota citam aluum, & cruentas reiectiones sistunt.

* Alijs, femori intertrigines.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, ρόδον. Latine & Officinis Rosa. Germanis, Rosen.

Gallicè une Rose, appellatur.

Rhodon autem Græcis, Plutarcho teste, nominatur, quod largum odoris effluuium emitat.

Rosa omnis amara est atq; astringens, præcipue rubra, à qua substantia refrigerat, siccat: flos autem eius astringit magis, proinde etiam siccat ualentius. Rosarum flores potius quam rosas, quia imbecillam astringentem habent, in Diabesa ponit Herac. lib. 6. comp. pharm. part. Gale. & Andromachus in stomachicis, lib. eodem. Flos autem est pars interior, in qua semen est & capillus. id semen uulgus Antheram uocat, cum Anthera compositio sit Græcis, rosas siccas & alia recipiens: quin & sine rosarum flore Anthera medicamentum est. lib. 6. comp. pharm. part. Rose præstantissime sunt, quæ longe omnium sunt suauissime, et alijs rubicundiores. Siccandæ uerò sunt loco sublimi meridiano, quo solis radij penetrare, rosas tamen non tangant. Rosarum succus essentia est tenuissima, nam celeriter acefeit, & lentore caret, & unguentorum omnino odores exoluit & obscurat. Ex Rosis calidissime uidentur Moschate: post has roseo colore insignes, incarnatæ nobis dictæ, Germanicè Leibfarb Rosen, quæ & cerebrum ualenter fruiunt, paulo minus abe-

Rosei pastilli. Caput CXIII.

Pastilli, quos rhodides uocant, hac ratione conficiuntur: Rosarum uiridium, quæ nullo antea humore madefacta extrahuerint, drachmæ quadraginta, Indi cæ nardi drachmæ decem, myrrhæ drachmæ sex, trita digeruntur in pastillos, qui trium obolorum pondus æquent, siccatiq; in umbra, in fictili non picato, atq; obrurato reconduntur. Alij adijciunt costi drachmas duas, iridis Illyricæ totidem, & uinum Chium cum melle miscent. Mulieribus monilium uice collo circumdato usui sunt, ad retundendum graue sudoris uirus: tritis etiam utuntur ad illitiones & diapysmata, quæ fiunt ad sudores coercendos, ita ut à balneis inarefcant corpora, dein frigida aqua abluantur.

EXPLICATIO.

Officina sub nomine trochiscorum diarthodu alio modo parant, ab hoc non multum diuerso, ualidiores autem sunt omnibus his trochiscis, qui à rosis nomen acceperunt, qui à Nefuc traduntur sub nomine trochiscorum de Rosis & Eupatorio.

Lycium. Caput CXIII.

* Alij, latiss.

Lycium, quod aliqui pyxacanthan uocant, arbor est spinosa, ramis trium cubitorum, aut longioribus, folijs buxi, densis, fructu piperis, nigro, laui, amaro, densoq; cortice pallido. nō dissimili lycio madefacto, radicibus multis, obliquis, lignosis. Nascitur plurimum in Cappadocia, Lycia, & plerisq; alijs locis. aspera loca amat. Succus extrahendi ratio hæc est: Rami cum radiculis tusi, & ante permultos dies macerati coquuntur, tum abiectis lignis itidem liquor, donec mellis crassitudo fiat. Adulteratur id lycium, adiecta decoctioni amurea, aut absinthij succo, aut felle bubulo. Innatans spuma inter coquendum exempta, oculorum medicamentis additur. reliquo ad alia utuntur. Simili modo fit lycium, semine expresso & infolato. Optimum quod uri potest, festinctumq; rubentem spumam ostendit glebis extrinsecus nigris, intus cum fregeris rufis, odore minimè uiroso, cum amaritudine astringens,

gens. crocino colore, cuiusmodi Indicum est, cæteris præstantius. Lycium astringit. A caliginem oculorum discutit. genarū scabiem, pruritus, ueteresq; fluxiones sanat. facit ad purulentas aureis, exulceratas gingiuas, tonsillas, labiorum fissuras, sedis rimas, attritusq; illitum: cæliacis, dysentericis, potum inditumq; cōuenit. datur sanguinem ex cretibus & tussi, ex aqua. cōtra rabiosi canis morsus in cataportio deuoratur, aut in aqua bibitur. flauos facit pilos. reduujs, ulceribus quæ serpunt aut putrent, medetur. fœminarum profluuia appositū sinit. rabiosorum ictibus ex melle * Alij, lacte. potum, aut uice cataportij deuoratum, auxiliatur. Tradunt Indicum fieri lycium, ex frutice lonchitide appellato, ea spinarum generi ascribitur, ramos rectos habens, ternum cubitorum longitudine, maiorē sue, rubo crassiores, à radice numerosos, fractus cortex rubescit. folia oleæ similia. Herba in aceto decocta proditur lienis inflammationibus & regio morbo mederi: & fœminarum purgationes elicere. asseuerat etiam crudam in potu, eosdem effectus præstare: semen cyatho dimidio potum pituitam expurgare: uenenis quoq; auxilio esse.

EXPLICATIO.

Lycium à Lycia regione dictum, & delatum, hic succus est Pyxiacanthæ Dioscoridi & Galeno liquidus, quo utebantur ad sugillata, Phlegmonas oris & sedis, herpetas, putredines, ulcera contumacia, aures purulentas siccant, & digerit ordine secundo, astringit, terget. Calore symmetris est proximum. Copiosum etiam est in Cappadocia: Indicum autem ad omnia est ualentius. Hæmorrhagiam à naribus Lycium sistit, linamentum impositum. Gal. lib. 2. comp. phar. par. Lycium coquit, digerit, ut castorium, Indicum autem dico, nō quod apud nostros gentes nascitur lib. 4. comp. phar. par. Lycium etiam Afrum dicitur lib. 3. comp. phar. par. Spumam lycij appellat ex Solone, lib. eodem. Succo ex bacis Peryclimeni Lycium mentitur. Modus alius est in lib. de dynamibus, qui Galeno adscribitur.

Pruna syluestria.

Acacia. Cap. CXV.



Acacia in Aegypto nascit, spina instar arboris fruticosa, non se in rectum attollens. B florem habet candidum, & semen lupino simile in folliculis: ex quo succus expressus siccatur in umbra, niger ex maturo semine, subrufus ex uiridi. Eligatur modicè rufus & odoratus, ut in hac arbo re esse potest. aliqui exprimunt ex folijs & semine succum. Manat & gūmi ex ea spina. uis ei ad spissandum, refrigerandumq; efficax. Succus oculorum medicamentis utilis. ualet ad ignem sacrum, ulcera quæ serpunt, perniones, pterygia, & oris ulcera. procidentes oculos reprimat, mensium abundantiam sistit. prociduum uulnū cohibet. citam aluum supprimit, aut porus aut subter inditus. capillos denigrat. lauatur oculorū medicamentis, trito in aqua, mox effuso quod concreuerat, donec pura exeret aqua, & ita cogitur in pastillos. uritur etiam in cruda fidelia, donec fictile fornacibus percoquatur: torreturq; in carbonum halitu persata. Spinæ decoctum solutos artus foris cōmittit.

F

A Praefertur eius spinæ gummi, quod in uermiculorum speciem contrahatur, & uitri modo perluceat, ligni expers. proximum est candidum, si diducta uerò ac resinofum inutile. Cutis meatus obstruit, & medicamentorum, quibus admiscetur, acrimoniam heberat, ambustis ex ovo illitum, pustulas non patitur erumpere. Alteri acaciæ genus in Cappadocia Pontoque prouenit, Aegyptiæ spinæ similitudine, longè minus, tenerius, humile, aculeorum uallo munitur, folia habens rufa: semen lentiuscula minus fert autumnò, in loculis connexis, ternum quaternumue capacibus. Sucus eius astringit, uiribus inferior, & ocularibus medicamentis inutilis.

EXPLICATIO.

Acacia ueterum succus ex fructu seu semine, interdum & folijs spinæ Aegyptiæ expressus, in umbra siccat, siccat ordine tertio, refrigerat primo: secundo autem, si lotionem leuem suam acrimoniam deposuerit. Acacia κίζφα, lib. 7. comp. pharma. part. indyacodio Hera. Hæc tamen humidior usurpari potest, ut in thesiace leges apud Galenum.

Eligenda modicè rufa & odorata, quatenus illi datum est. Eius loco ex bacculis prunorum agrestium coctis succum expressum tessellatim confectum insolatūq; usurpamus minimo errore, quia refrigerat, siccat, astringit ut ueterum acacia.

Ex hac Acacia Aegypti spinæ, ex cuius semine aut fructu succum exprimere antè diximus, manat gummi in uermiculorum speciem contractum, uitri modo perlucidum, purum, refrigerat, densat.

Huius non meminit Galenus in Acacia lib. 6. simp. uti nec Acaciæ nomen facit paulò post in Acantha Aegyptia seu Arabica (quo nomine solo Dioscoridi uocatur) unde colligas licet, Accaciam & Acantham Aegyptiam seu Arabicam diuersas esse in Aegypto spinas arbores. Tamen in libro comp. phar. frequenter legitur non nisi absolute iragachante coniunctum pro gummi Arabico, quod nomen βιζαίον uocat lib. 7. comp. phar. part. à Thebis opinor Aegypti centifloribus, uti etiam Babylonicum quibusdam dicitur, à Babylone Aegypti Arabiam attingentis, nomen δροπ αἰγαιῶν περσεπε Actuarii uocat.

Vitex.

Caput CXVI.



tatem custodientes, folijs huius cubitus sibi sternunt, & lygon quasi uimen, propter inuictam ferè ramorum flexitatem.


NOMINA

LIBER PRIMVS.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, ἄγνος. Latine, Vitex. Officinis Agnus castus.
Germanicè, Abrahambaum / Reuschbaum / Schaffmille.
Agynos, id est, castus, quod ad castitatem conseruat, folijs & floribus sumptis & substractis, & semine fri-
xo, uel non frixo: id enim sumptum, ut semen rutæ, nocturnas ueneris imaginationes cohibet. Galen. lib. 6.
simp. & lib. 6. sanitatis tuendæ. Calfacit, siccatur ordine tertio, acris est ac astringens, & substantiæ multum
tenuis, status omnium maximè discit. Ob id lege libro primo alimentorum, calfacit, non cum Græcis exem-
plaribus & ueteri interprete, refrigerat, quod effecta illis adscripta indicant.
Item lib. 2. comp. phar. part. de cephalalgia ab æstu, ubi Agnum inter refrigerantia commemorat: & pau-
id post ubi Archigenis dicta distinguit, folia lauri calidissima: Agni uerò mediocriter refrigerant. Legerem
non & yros, sed & xivos, quæ planta Dioscoridi refrigerat, & astringit, etiamsi Galenus fortè alibi nusquam ea
herba sit usus. Neq; enim placet elusio, quod per accidens refrigerat: id enim etiam folijs Lauri & calidis
omnibus commune est.

Salix. Caput CXVII.



Salix uulgò nota est. Cuius semen, folia, cortex & suc-
 cus spissandi uim habent. trita folia cum exiguo pipe-
 re & uino pota, iliosis subueniunt. sumpta per se & cum
 aqua, præstant mulieribus ne concipiant. salignum semè
 in potu sanguinem expuentibus prodest. cortex eosdem
 præbet effectus. corticis cinis admisto aceto maceratus,
 illitu clauos & callos tollit. ex folijs & cortice succus cū
 rosaceo in calyce punici calfactus, aurium doloribus au-
 xiliatur. decocto eorum podagras foueri utilissimum.
 surfures purgat in corpore. Ex cipitur succus qui manat
 ex ea, cum floret, exciso cortice. in plaga enim concretus
 humor inuenitur, qui ad purganda, quæ obstant oculis,
 suam uim præbet.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis, ἰτέα. Latinis Salix.
Officinis Latinum nomen seruaturum. Germanis, Weiden.
Gallis, Saulge, appellatur.
Salix uerò à saliendo dicta est, quod ea celeritate crescat, ut quasi sali-
re uideatur. Sic etiam Iteam quasi salicem uocauerunt Græci. Plura uide
apud Theophrastum, per nos in alium atq; commodiorem ordinem redactum.

Syluestris olea. Caput CXVIII.

Syluestris olea, quam aliqui oleastrum appellant, aliæ Aethiopicam oliuam, folia
 astringunt. trita autem & imposita ignem sacrum, ulcera quæ serpunt, epiny-
 ctidas, carbunculos, reducias, nomasq; cohibent, crustas emarginant cum melle il-
 lita. quinetiam sordida ulcera repurgant. inflammationes panosq; cū melle imposita
 discutiunt. cutem à capite uulsam conglutinant. oris ulceribus & priuatim infanti-
 um, commanducata medentur. Succus & decoctum eisdem habent effectus. sangui-
 nis eruptiones, ac muliebres profluium, ad motus succus inhihet. uux oculorum, pu-
 stulisq; prodest. ulcera & ueteres defluxiones sistit: quapropter in collyria addi-
 tur: ad genarum erosiones perquam utilis. Exprimitur succus tuis folijs, affuso ui-
 no aut aqua, siccatusq; sole in pastillos digeritur. sed longè ualidior ad reconden-
 dum succus habetur, qui cum uino, quàm cum aqua expressus est, auribus subuenit,
 siue ulcerentur, siue pus effluat. Folia conuenienter cœliaci cum farina hordeacea
 illinuntur. uruntur cum floribus folia, ut spodiū uicem cinis præstet. in cruda olla,
 obliuio ore luto, usq; dum figlinum percogatur: restinctaq; uino & rursus subacta,
 eodem modo uruntur. postremò cerusæ modo elota coguntur in pastillos. Huiusce
 modi cinerem in medicamentis oculorum constat spodio non cedere, sed eisdem

Sylvestris olea.



uiribus prædictum esse putandum est. Foli-
liorum sativæ oleæ eadem vis intelli-
gitur, sed aliquanto inferior: unde ocu-
laribus medicamentis ob suam mitio-
rem vim convenientior est. Sudor ligno
uirenti accenso manans, illitu sanat li-
chenas, furfures & scabiem. Oleaginum
semen illitum medetur furfuribus, & ul-
ceribus, quæ depascunt uorantq; quod
autem intra nucleum est, ex adipe & fa-
rina scabros ungues excutit. Colymba-
des trita & ambusti illita, pustulas gi-
gni prohibent, sordida ulcera purgant.
muricæ succus collatas gingivas contra-
hit, & motus dentium firmat. Oliua fla-
ua & recens stomacho utilior est, uen-
tri difficilis. nigra autem & matura cor-
ruptioni opportuna est, stomacho ad-
uersatur. oculis non convenit, capitis
dolorem mouet, arefacta illitu depascen-
tia ulcera sistit, & carbunculos emargi-
nat. Oleum sylvestris oliuæ gingiuis pu-
tri ulgine laborantibus colluitur. den-
tium mobilitates stabilis. calfacti foras,
gingiuis fluxione laborantibus utilis est.
lanam enim specillo circumligatam oleo
madefacere oportet, & gingiuis admo-
uere, donec albæ spectentur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Κότινος, ἢ ἀγρίλαος.

Latine, Oleaster & sylvestris olea. Officinis Latinum nomen retinet.

Germanicè, Wilder Ölbaum. Gallicè, Oliuier sauvage, dicitur.

Sylvestris olea fecundior sativæ, quod ferè sylvestres habent, seu cura fertilitatem minime. Oleastro
uita longior quàm oleæ, sed olympicæ longissima. Sylvestris olea ex sativæ nucleo nascitur. Mansuere hanc
densis curatæ, aut omnino translatione mitem fieri, uix potest adduci Theophrastus ut credat.

Lachryma æthiopica oleæ. Caput CXIX.

Lachryma quam æthiopica olea stillat, scammonia similis quadantenus est, ful-
ua, stillis exilibus constans, mordax. quæ autem ammoniaci, aut gummi simi-
litudinem refert, colore nigricans, nec gustu mordens, superuacua est. Nostrates
oleæ, oleastriq; similem lachrymam sudant, quæ commodè ad oculorum hebetudi-
nes illinitur. cicatrices albuginesq; illitu emendat, urinam & menses ciet. canis den-
tium impressa, ad dolores efficax est. inter uenena scribitur. partus pellit. lepras &
impetigines sanat. Appellatur autem æthiopica & agrestis olea.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Gummi Elemi ab elea, uel corruptè & enhamum.

Ex elea, id est, olea Aethiopica & nostrate, inquit Dioscorides, & Italica Plinius, & oleastro lachryma
funditur scammonio similis, fulua, stillis exilibus constans, mordax. Similis autem hammoniaci, uel gummi, co-
lore nigricans, morsus expers, inutilis. Explora an uerum sit Officinis.

Amurca. Caput CXX.

Amurca expressæ oliuæ recrementum est. decocta in cupreo uase ad crassitudi-
nem mellis astringit, cæteros præbens lycij effectus. insuper dentium dolori
& uulneribus, cum aceto, uino aut mulso comode illinitur. additur in medicamenta
ocularia.

Myrica.



valentius astringunt. fructum tamen & A
succum, & non radicem, adhibet splenicis
remedijs Galen. lib. 9. comp. pharma. part.
Quinetiam truncus in uiscula uel potiora,
uel escaria cauto, lienem arceno quodam
odio subus & hominibus longo usu absumit.

Plinius contra Dioscoridem & Gale-
num, nullum fructum ferre dicit libro 16.
cap. 26. his uerbis: Fructum arborum sola
nullum ferunt, hoc est, ne semen quidem, ta-
marix scopis tantum nascens, populus, al-
nus, ulmus, &c. quod itaq; Dioscorides
dixit: καὶ τὸν ὅλον τὸν ἄνδρα φέρει
ἅπαντες καὶ τὸν ὅλον τὸν ἄνδρα φέρει, idipsum
Plin. tum semen, tum fructum esse aut dici
posse non putauit. Porro calices fieri, ut
supra quoq; monuimus, ex truncis myricæ
arboris solitos, qui splenicis essent in usu
commodi, Dioscorides prodit. Sed ea gratia
hodie uina, ex tamarisci uirgulis concin-
nantur in superiori Germania cisthenana,
que splenicis utiliter bibuntur, Tamaris-
cina uulgo appellata: quod ut nouitium
inuentum adscribere uolui, quam fæcticij
huius uini Dioscorides inter tot genera, non
meminerit. & Democritus apud Constan-
tinum Cæsarem libro decimonono, capite
septimo, ad eandem rem uinum prius My-
rice supersusum, & sic potatum magis
probet.

Erica.



Erica. Caput C.

Erica fruticosa arbor, myricæ similis, longè minor, cu-
ius flore apes reprobum mel efficiunt. tam flos quàm
coma serpentium ictibus illitu medetur.

Græcis ἑρική. Latinis Erica. Officinis inusitata.

Germanis, Heyd. Gallis, Brugere.

Quidam esse putant, quam Galli rosmarinum aculeatum, uel potius io-
marinum appellant.

Ericæ digerentis plantæ flore potissimum ac folijs utendum: semen etiam
adhibetur apud Galenum lib. 6. comp. pharma. part. Erica dictum sepiè lib. 9.
comp. pharma. part. in splenicis.

Acacalis. Caput CI.

Acacalis fructus est nascentis in Aegypto fruticis, se-
minis myricæ quadam tenus similis, cuius aqua in

A qua maduerit, ad collyria additur, quæ ad excitandam oculorum aciem conueniunt.

Hodie planè incognita: nomen frutici à nymphea datum crediderim Acacali.

Rhamnus. Caput CII.

Rhamnus.

Vua crispa



B

Rhamnus fruticat in sepibus, ramos ferens rectos, & aculeos in acuta spinæ modum, folijs parvis, oblongis, suppinguibus, teneris. Alterum ei genus caudius tertium nigrioribus latioribusq; folijs constat, & quadam tenuis rubentibus, cuius rami quinam cubitorum longitudinem implent, spinosiores quidem, sed infirmioribus minusq; rigentibus aculeis. Fructum a dit latum, cædidiū, renucm, follicularij specie, uerticillo similem. Omnium folia igni sacro, & serpentibus ulceribus, efficaciter illinuntur. Fama est, ramos huius uauis fenestrisue impositos, ueneficia depellere.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Rhamnus frutex spinosus, apud ueteres tria habet sãstiga. Ego Rhamni unum genus hoc puto, quod Galliburgam spinam, uel Neprum uocant fructu myrti, foris nigro, intus uiridi, ob id ad colorem eum tingentibus idoneo. Germani, Crenzbeer, Wãdche beer, Seiblsamer, Seibbeer, appellant. Cortex arbori subniger, & nitidus quasi ceraso, intus uirens, post luteus, lignum extrã candidum, interiore medulla rubet: eo ualidos arui nostri fabricant. Audio etiam adhuc hodie Italis spinum ceruinum uocari, nam & ab iisdem Dioscorides spinam cerualem dicit testatur.

Rhamni sãstigijs genus aliud annumerandum in afflatu maris nascens, frutice nonnunquam arborescente, pro longis ramulis, qui rigidis armantur spinis aculei mucrone seuientibus, folijs tamen amula facie ligustrum exprimentibus, ut pro illis fallant, bacca folliculari specie, uerticillata, primum candida, post maturitatem rufescente foris flaccida, intus rimosa, quam pastores pecorum pabulo decutunt.

Sunt qui primum Rhamni genus arbitrantur hoc, quod officina uuam crispam, Germani Breuselbeer. Galli uero grosselles uocant, fruticosi namq; generis est, ramulis uietis, rectè spinarum mucrone horridus, sed re ex herbido candicante, in frutice & sepibus nascens: folia tamen non respondent, quæ circinata rotunditatis conspiciuntur, apij modo dissecta, frutice aculeato, acinis candidis, & à maturitate dulcibus, granosis, translucentis, ciborum condimentis expeditis.

Halimus. Caput CIII.

Halimus

Halimus frutex est sepimentis idoneus, similis rhamno, sine spinis, folijs oleis, A
sed latioribus nascitur in sepibus & maritimis. Folia decoquuntur ciborum
gratia. radix conuulsa, rupta, torminaq; mitigat, drachmæ pondere in aqua mullâ
pota. eadem lactis ubertatem facit.

Halimus in magno nominum ambitu est. Ruellius arbitratu fruticem cum quâ in Gallia uiuis sepibus fre
quens, blanc-puta uulgo appellatur, Halimum esse, gustu subacerbo in falsilagnem tendente, quare mensis fo
lia cum tenerescunt non essent ingrata, tamen non esse edendo, cum prope nimia habeantur olera.

Paliurus. Caput CIIII.



Paliurus frutex cognoscitur aculeatus, du
rus, cuius semen pingue & fuliginosum
inuenitur. quod potum tui opitulatur. uesi
cæ calculos comminuit. serpentium ictibus
aduersatur. Folia & radix atrictoriam uim
habent. quorum decoctum potu alium sistit.
urinam trahit. contra uenena & serpentium
morsus auxiliatur. Radix recentia tubercula,
tumoresq; omnes discutit, trita & imposita.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Παλίσκος. Latine, Paliurus.

Officinis inusitata. Germanicè, Weelberm.

Gallicè aubepin, appellatur, aut saltem paliuri speci
es est.

Apud nos paucis antea annis frutex inuenitur, qui etiam
arborescere possit, folio per ambitum laciniatim sinuato,
rotundo, molli, ramis spinis, quem album cognominant, modo
maculatis bacis, rotundis, rubris, myrtis, longè maioribus, B
gustu iucundo, qui & uinum suauitate sua commendat.
Conduuntur & grato ori cibo. Cæpit mea memoria propa
gari insita, quantum reor, albo spino. Qui colunt in hortis,
uelut alienigenam & aduenam arborem, Myribalanum ap
pellant. Hanc esse putauerim, nullis ferè notis reclamanti
bus paliurum africanam, cum præsertim que non silique
tur. Ruellius Paliuri genus esse coniecit fruticem aculeo
sum, uulgo Weelberm, Gallis Aubepinum, id est album spi
num. Fertur enim farina è fructu olim in fame quesita, unde
Germanicum nomen habet, quod sanè etiam de Paliuro tra
dunt ueteres. Item fruticem quandam rura Gallie iuncum

marinam, uel potius Iomarinum appellant, cui aliquantulum fauere delineatio uidetur, an tamen Paliurus sit,
non ausim affirmare; quòd ei spina pro folio sit.



Acuta spina. Cap. CV.

Acuta spina, quam pyrinam aut
pityanthen aliqui uocant, arbor
est pyraïsto similis, spinosa ualde, & mi
nor. baccas profert myrti, plenas, ru
bras, fragiles, & intus nucleum: radicè
multifidam, altè descendente. Huius
baccæ potu aut cibo, alui profluuium, et
abundantiam fecunditatis sistunt. radix
illita aculeos & spicula extrahit. abortu
fieri tradunt, si ter radice uenter, aut sen
sim feriatu, aut perungatur.

A

Ribes.



B

Rubus canis.



DIOSCORIDIS

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, ὀξυάνανθος, καὶ ὀξυάνανθος. Latine acuta spina.

Officinis Berberis, & Bugia.

Germanicè, Erbselein / Sautauch / Weinleulin, uocatur.

Galli, quod huius acinis uinum exprimitur, spinui netam appellant, alii qui acrem spinam.

Oxiacanthæ uel Oxiacanthi racemose bacculæ, dum maturuerunt rubentes, astringunt: uis eadem folijs, sed languidior. E baccis uinum exprimitur eodem ferè usu, quo uinum ex malo punico. Conduntur etiam uel melle uel saccharo ad restringendam sitim, depellendamq; febricitantium maliciã. quorum morosum nimis palatum cibum ferre quicquid respuit. Elanguescens appetentia grato huius acore recreatur.

Frutex Arabibus Ribes dictus, huic planè congener, racemosus, acidus, acerbus, frigidus siccus secundo gradu, sitim extinguit, uomitũ & fluorem alui biliosum sistit, morbillis & uariolis, quas uocant, saluber: frutex à nobis potius rubrum dicitur. Germanis dicitur S. Johans vrenblin. Inferiori Germaniæ, Melbesien / S. Jans besytens / offit Dausytens. Quid sit, frutex an herba, & quæ, ambigit Serapio in suis testimonijs. Succus ex his expressus, cum saccharo cydoniati modo coctus, est delicatissimus.

Ribes Damasceus Musæ additur, folijs rotundis, & magnis issdem.

Rubus canis.

Caput CVI.

Frutex est arboris instar, rubo longè maior, folia multò latiora myrtò, firmis circa ramos spinis, flore candido, fructu oblongo, nucleo oliuæ simili, qui per maturitatẽ fuluescit, & flocculos intus continet. Fructus exemptis interioribus floccis arefactus, aluum sistit: seruicfacti enim ij in uino, mox poti, arteriam infestant.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, κυνδορά. Latine, Rubus canis. Officine cum syluestri Rosa confundunt. Germanicè, Zambutten / Wickdorn / Strauich.

Galicè ung eglantier sans odeur, in differentiã rose syluestris, appellatur.

Rubi, seu sentis, Græcè βέρβερτα genera Theophrasto tria sunt: magnus seu rectus, humilis, & medius, qui suo loco declarabuntur. Batus magnus seu re-

ctus, est Dioscoridis & Galeni κυνδοράτος, fructu oblongo per maturitatem rubente, cynosimili, quocumque lane flocci arteriam si deuorentur infestant: huic folijs, fructu, rosa similis est cynosrhoda, Englantier Galli dicta: & rosa frutex omnis, nisi quod ferè gerit folia florũ magis multiplicia & maiora, arte opior adiuta: sed Cynosbatus spinis hamatis horridior, rector, et altior assurgit, odore caret, quæ Cynosrhoda tota habet præstantissimum: rosa uerò frutex flore solo est odorata, nunc albo, nunc rubro, nunc amborum medio (incarnatum Galli, Germanicè, Leibfarb uocant) nunc etiam muschhatum.

Ligustrum.



Ligustrum. Cap. CVII.

Ligustrum arbor est oliuæ folijs circũ ramos, latioribus, mollioribus, & uirentioribus: flore candido, muscoso, odorato: semine sambuci, nigro. Optimũ nascitur in Canope & Ascalone. Folia astictoriam uim habent: quare commanducata ulceribus oris medetur, illita feruidis inflammationibus, carbunculisq; profunt. decocto

LIBER PRIMVS.

præbent corporis excrementis cum uino reprimunt. ulcera ad cicatricem perdu-
sunt. Sed inter primas utiles ex palmis humilibus Aegyptiæ.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, φοίνιξ. Latine, Palma arbor.

Germanicè, Dattelbaum. Gallicè arbre de dattes, appellatur.

Fructus Palme, Græcis δάκτυλος. Latinis palmula.

Officinis Dactyli. Germanis, Datteln.

Gallis, dattes & figue royales, dicuntur.

Ex palmulis caryotides celebrantur cibus, harum genera tria sunt: Nicolai, sorores Græcis adelphides.
Patri sunt & Eunuchi Aristoteli genus Palmule, quod alij enorchos uocant, quasi testiculares ac spado-
nias. Sunt & Magarides autore Plinio, palmæ breues, candidæ, rotundæ, acinis quàm balanis similiores:
quare à margaritis nomen accepere.

Φοίνιξ, ut hoc loco Dioscorides tradit, in Aegypto nascitur, uiridi colore, odore mali cotonei, medio ma-
turitatis uigore per autumnum decerpi solet. Arabici Myrabolanum similit, sine offe, quæ Myrabolanum quoq;
uocari Hermolaus affirmat. Πάλαα autem & δάκτυλος etiam Dioscoridi uocatur, quod ex hac fructu palmæ
Aegyptie humidior, acerbo, astringente, expresso, potus sit sitim sedans, Solino autore, qualis nobis ex po-
nis, pyris, sorbis. Hic autem fructus si usq; ad maturitatem in arbore suatur, solibus nigricat, & παμνικα
Βάλαανος uocatur.

Φοίνιξ uerò palmæ ipsius fructus, præsertim dulcis, non paucam obtinet caliditatem: tamen desiccatur, ro-
boratur, contrahit, stipat, densat, sumptus & admatius.

Hic autem fructus à palmæ Aegyptiæ fructu ex offe differt: nam hic os habet magnum & longum &
dissimulatum, in quo semen, uel uisum & tritum ualenter digerit, lib. 6. comp pharm. part. Dactylus à digito
rem forma dicitur. οὐ φοίνιξ uerò dictus Actuario & alijs quibusdam Græcis recentioribus ab acido apo-
re, palmæ syluestris fructus, Tamar Indus, id est, Dactylus Indus Barbaris. Germanis uerò Tamarinden.
& sur Datteln uocatur: quamuis cholagogus sit comprimendo, ut palmæ Aegyptiæ fructus Phœnicoba-
lanus: tamen os habet quod satis arborem nobis produxit, alijs multis communis & differt, ut mox audi-
es: sed Oxyphoenix ueteribus in dictus, cum phœnicobalanus in his frequens sit. Oxyphoenix subniger, lucidus,
tener, uillis tanquam radicibus mistus, recens, pinguis, acido sapore. Quibus notis apparet, quantum conue-
niat cum Phœnicobalano, & quantum discrepet: ad hæc offe ut diximus, & usu hic recentiorum tantum:
ille etiam ueterum. Si frigidus est ueteris, oxyphœnici debet misceri mastiche uel macis uel spica nardi. Rã
rò per se datur, picrocholis saluberrimum ad uncias quatuor dari potest: annis 10. seruatur.

Oxyphœnix.
Tamar Indus:
Phœnicobala-
nus.

B

Palma, elate. Caput CXXVI.

Palma, quam aliqui elaten aut spatham appellant, fructus palmarum adhuc flo-
rentium, inuolucrum est calyxq; quo in spissamenta unguentarij utitur. Opti-
ma habetur odorata, astringens, ponderosa, præclusa, intus pinguis. uis ei adstrictio-
ria, sistit ulcera quæ depauperant, laxatos artus committit. trita miscetur cataplasma-
tis & malagmatis. prodest præcordijs, imbecilli stomacho, & iecinori affecto, mista
conferentibus cataplasmatibus. Eius decoctum sabinde detersum, capillos denigrat,
datur bibendum congruè, renum, uesicæ, & uiscerum uitijs. uulnæ ac uentris fluxio-
nes sistit, scabiem cum resina & cera sanat. si uiginti diebus recens apponatur. Inuo-
lutusq; in ea elate fructus, quem suo amplexu fouet, elate etiam uocari solet, & ab
aliquibus borassius. Adstringit, & spathæ effectus præstat, non sic unguentis experi-
tus. Alba medulla caudicis recens in cibo, aut decocta, eadem facit quæ borassius.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Non solum summus cortex palmule (ut quibusdam placet) ἐλάτη appellatur, sed ipsum adeo recens
palmule fructus germen, ut Galenus ait. Idem hic Dioscorides indicat, ἡ δὲ πικρὸς καὶ ὀξύς ἐστιν ὁ καρπὸς τοῦ φοίνικος, hoc est, contentus in ipso cortice fructus itidem elate dicitur. Ceterum
quod a Galeno ἐγκέφαλος in eadem palmula dicitur, id ab eodem 2. de alimentis, uertex & summitas pal-
mæ appellatur. At uerò quod hic à Dioscoride ἐγκέφαλος uocatur, omnino aliud est, medium uidelicet in
eius ligno, tertium à cortice. ἐγκέφαλος enim uocabulo etiam aliàs medium alicuius rei, & quasi corculum
aut medulla appellatur, quomodo Græci Medici etiam ἐγκέφαλος τῶν σπινδάνων, scilicet internam partem uo-
cant. Ipse autem Plinius palmule ἐγκέφαλος, cerebrum dixit.

Malum

70
A **DIOSCORIDIS**
Malum punicum. Caput CXXVII.



Malum punicum omne boni succi est, stomacho utile, perexiguum sufficiens alimentum. Dulcia stomacho utiliora habentur, sed aliquantulum in eo calorem gignunt, inflationes pariunt, unde in febris abdicantur. Acida adstringunt, æstuant stomacho auxiliantur, & multo magis contrahunt, ac urinam cient. ora gingivasque lædunt. Vinosa uero mediam fortiuntur naturam. Nuclei acinorum acidi punici in sole siccati & obsonijs insparsi, concoctiue, fluentem aluum stomachumque sistunt. cœlesti aqua madescunt, bibunturque commodè sanguinem excreantibus: ad desessus dysentericorum, foeminarumque fluxione uulvæ laborantium utiles sunt. expressus nucleorum succus coquitur cum melle, ad oris, uirilitatis, & sedis ulcera, nomas, reduuias, & ea quæ in corpore extuberant, aurium dolores & narium uitia, præsertim acidorum.

Cytinus.

Malicorium.

Balaustium.

Huius flores cytini uocantur, qui adstringunt, siccant, cohibent. sanguinolenta glutinant, quas punicum, præstant utilitates, humida gingivarum uitia mobilesque dentes decocto colluuntur. herniam prolapsu intestini erumpentem cataplasmate repellunt. memoriæ tradunt, qui tres quàm minimos cytinus deuorauerit, nullam eo anno lippitudinem passurum. eliquatur hypocistidis exemplo. Malicorium, asperum est mali punici putamen, quod aliqui sidion appellant. Id spissandi uim habet, & quos cytini, præbet usus. decoctum radiceis potu latas uentris tineas pellit, et easdem euocat. Balaustium syluestris punici flos est, cytino similis. cuius complura genera reperiuntur, candidum, fuluum, colore rosaceo. succus ex eo exprimitur, hypocistidis modo, cui adstrictoria uis inest, eadē faciens quæ hypocistis & cytinus.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, ποινά, apud nonnullos γιδν. Latine, Mala punica. Officinis Granata.

Germanicè, Granatbaum/arbor. Granatöpfel/fructus.

Gallis arbor ung pomeir de granade, fructus pomier de granade, & Mygrenes, appellatur.

B Malum granatum seu punicum triplex: dulce, acidum, & acidodulce, scilicet succo, saporis naturam uiribus refert: omnium tamen flos, cortex, nucleis astringit, sed acidi & acerbi magis, dulcis nullò minus: medij horum mediocriter. malicorium, id est, cortex nondum adulterum sed perfectum propinquorum est melior ad astringendum in ore affectus ex fluxione nascentes.

Balaustia.



Balaustium syluestris punice flos, cytinus satius & domesticæ Dioscoridi & Galeno, primogenita punica. Nā quando arbor florere desinit, fructus ipsius apparet in mali Punice speciem figuratus. Hi in fine ueris gignuntur, & meliores sunt ex granatis acidis & acerbis, quia magis astringunt, ibidem. Ambo tamen insigniter astringunt, refrigerant, siccant, crasse sunt substantia: ambo etiam hodie à medicis cū Plinio Balaustia, Germanis, Granat blüet. Gallis fuer de pome granade uocatur.

Myrtus. Caput CXXVIII.

Myrtus satia nigra utilior est medicinæ, quàm candida, & in hoc genere multo magis montana. semen tamen imbecillius parit. Vis & myrti & seminis adstringit. semen uiride aut aridum in cibo datur sanguinem excreantibus, & uesicæ erosionibus. succus uirentibus

baccis expressus, eosdem effectus exhibet. stomacho utilis. urinam cit. prodest contra phalangij morsum, & scorpionis ictus in mero. seminis decoctum capillum tingit. ius decocti in uino ulcera in extremis membris nata sanat. oculorum inflammationes illitum cum polline polentæ lenit. contra ægilopas illinitur. crapulam arcet præsumptum uinum, quod feruefacto aliquantū eius semine exprimitur, alijs enim

acorem

Myrtus.



Myrtus Officinarum.



acorem contraheret. præstat idem seminis effectus. utile procidentis uuluarum in defensionibus, sedis uirij, & sceminis fluxione uulua laborantibus purgat furfures, ulcera capitum manantia, atque eruptiones papularum fluentes continet additur quoque in medicamentis, quas libaras uocant, uti oleum quod ex folijs eius factum est. decoctum foliorum ad defensiones balnearum conuenit, & contra laxatos artus, & male foli descendent. eo fracta fermentationi repugnantia utilissimè fouentur. uiriditatem emendat perulentis auribus infunditur, & capillos denigrat. Succus eadem efficit. Trita folia & ex aqua uita humidis ulceribus & partibus omnibus fluxione laborantibus, ecchymosisque profunt. & admixto omphacino oleo, aut exiguo rosaceo cum uino, ad ulcera serpentia, ignem sacrum, testium inflammationes, opinyctidas, & condylomata. arantium foliorum farina utiliter inspargitur paronychijs, pterygijs, & contra alarum feminumque perfusiones. cardiacorum sudores cohibet. folia cruda seu cremata cum cerato, ambustis, paronychijs, pterygijsque medentur. Exprimatur folijs succus adiuuato uetere uino aut aqua celesti, cuius recentis ulus est, nam exiecatu planè cariem sentit, & uires amittit. Myrtidanum dicitur, adnatum inæquabile, uertucosum intumescensque, & cōcolor, quod

perinde quasi manus myrti caudicem amplectitur. magis quàm myrtus astringit. rosam addito austero uino reponitur, coactumque in pastillos siccat in umbra: multo efficacius & folio & semine, cerato, pelsis, in defensionibus, cataplasmatibus admixtum, ubi astringendum aliquid est.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis, Μύρτιν, uel Μυρτίαν. Latinis, Myrtus.

Officinis grana Myrti, Myrtilli.

Germanis, Welsch oder fremde Heydelbeer.

Gallis, Gram de Meurte, appellatur.

Myrtus ita nota arbor, due potissimum eius species, nigra & alba: nigra folia habet, quæ in uiriditate quandâ intensam, & serè subobscurâ tendunt, quæ nigredinem quandam præ se ferre uidentur: alba uero uiriditatem habent magis apertam, quæ respectu intense uiriditatis albedo dici potest. In genere autem omnia ex myrto, quæ in usum medicorum ueniunt, feliciora & efficaciora in nigra sunt, quàm in alba.

Myrti utriusque germina, folia, bacca, succus constant substantia calida, tenui, & contraria illi frigida terrea, astringente magis siccioris quàm satura. Bacca Catoni Myrta, Myrta Varroni. Myrtilli, Officinis, uulgo Welsch Heydelbeer.

Myrtus alba & nigra passim dicitur Galeno in comp. pharm. part.

Cerasia. Caput CXXIX.

Cerasia aluo utilia sunt, si uiridia sumantur. eadem siccata illam sustinent. Gummi quod cerasi resudat, cum

A

Cerasus.

Cerasiorum plu-
ra genera.

B



Cerasia.

cum uino diluto
tussi uetuste me-
detur. colorem
commendat. ui-
sum exacuit. ap-
petentiam inui-
tat. idem ex uino
potum calculosis
auxilio est.

NOMINA ET EXPLI-
catio.

Graecis, Κεράσις, κεράσιον.

Latinis, Cerasus & Cerasum fructus.

Germanis, Birschbeum, Birsen.

Gallis, Cerisier: fructus, une cerise.

Cerasia dicta sunt à ciuitate Ponti Cerasunte, im-
de primum ea attulit L. Lucullus, ut autor est libro
15. Plinius, qui ait: Cerasi ante uictoriam Mithrida-
ticam L. Luculli non fuisse in Italia. At urbis anno
sexcentesimo octogesimo, is primum uexit è Ponto.
Plura eorum genera inter quae Aproniana maximè
rubent. Nigerrima sunt Aetli. Ceciliania uerò et ro-
tunda. Iulianis gratus sapor, sed penè tantum sub ara-
bore sua, adeò teneres, ut gestatum non tolarent. Pri-
cipatus Duracinis, quae Campania Plinius appellat.
Sunt et alia quae tamen omnia alij sapore discernen-
tes in tria genera contrahunt et discriminant, dul-
cia, austera, et acida: quorum dulcia uentrem mol-
liunt et citissimè dilabuntur, maximè recentia, quae
quia lubricos ac putridos gignunt humores, stoma-
cho minus utilia sunt. Austera stomacho utiliora, adstringentia. Acida pituitosos et uiscidos stomachi humo-
res incidunt, et ipsum confirmant, sitim sedant, et appetentiam excitant. In uniuersum, ut et hoc loco Dio-
scorides testatur, bonam faciunt aluum recentia, siccata sistunt. Et Plinius libro 23. idem tradens ait: Cerasa
aluum molliunt, stomacho inuilia. Eadem siccata, aluum sistunt: Vrinam ciunt. Inuenio apud autores si quis
matutino roscida deuoret cum suis nucleis, in tantum leuari aluum, ut pedes morbo liberentur. Siccantur so-
le aut furnis. Saccharo ac melle condiuntur, ut quotannis apud nos fieri solet: quare uidetur Palladius quid di-
cat, cum in Octobri mense ait: Cerasa non aliter quàm in sole usq; ad rugas siccata seruantur. Sed forte hic
seruandi modus tantum suo aeo in usu consuetus fuit.

Siliquæ. Caput CXXX.

Siliquæ recentes stomacho aduersantur. aluum soluunt. eadem siccata sistunt,
stomachoq; utiliores fiunt. urinam ciunt: sed præcipuè, quæ uinaceis condiun-
tur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Graecè, Κεράτια, κεράτιον, ξυλοκεράτια. Latinis arbor siliqua, fructus xylocerata.

Officinis fructus corrupto uocabulo xylocerata. Germanis, S. Johans brot.

Gallis, Carouge, appellatur.

Quod ad medicinam pertinet ferè nullo in usu sunt Siliquæ, soluunt tamen uirides, utpote humectiores
aluum, quam reficcate sistunt, et tum quoq; stomacho utiliores esse ait, et urinam ciunt Dioscorides, ma-
ximè eas quæ reiectis acinis siue internis granis ipsarum edantur, ita enim existimo legendum, tametsi citra
exemplaris uetustioris fidem id non asseuerantiis astruam, nempe pro eo quod habetur in uulgatis exempla-
ribus omnibus, τὰ ἐν τῷ σέμφύλω σπυλόμενα, quæ uerba nullam certam sententiam exhibent. τὰ
ἐκ τῷ σέμφύλω ἐδιόμμενα, ut sit id quod Plinius lib. 15. cap. 28. dixit. Quum in pluribus semina plas-
ceant, in siliqua damnantur. σέμφυλα porro grana eius, sicut uinaceas dici opinor, quanquam etiam solida
retrimenti

Siliquæ.



retrimenta uue in torculari expressa, Galenus a. de alimentis *σέμψυλας* uocet, & alios radices uuarum ex sarmentis enascentes ita appellare tradat. sed *σέμψυλας* pro oliuarum nucleis siue officinalis accipiuntur, Constantino Cesare de agricultu. libro sexto cap. 11. teste. Galenus tamen loco iam citato, *σέμψυλας* quidem oliuarum etiam dici fatetur officula, sed oleo iam expresso reliqua.

Porrò quum in solidis illis uue retrimentis *σέμψυλας* appellatis, tum ipse uue ollares dictæ sternantur, uelut alio loco declarauimus, tum etiam oliue ipse componantur, ita ut antequam exprimantur uicissim in uase cum oliuis reponantur, uelut idem Cassius, Caesar libro nono de agricultu. cap. 31.

Videtur mihi omnino fieri posse, ut eodem planè modo uelut oliue, etiam ipse siliquæ componantur ac adseruantur, easq; ipsas *πικρὰς* *σέμψυλας* *συνθεσέμεν*, Dioscorides appellauit, hoc est, Siliquas in retrimentis uuarum compositas & adseruatas, atq; hæc sententia mihi præ superiore probatur.

Mala. Caput CXXXI.

Folia, flores & germina cum omnis mali, tum maxime cotoneæ, adstringunt. Pomis acerbis adstringendi uis inest, maturis uerò longè secus. Ex his uerna bilem gignunt, neruos omnes lædunt, inflationes pariunt. Cotonea stomacho utilia. **B**urinam cient, uerùm tosta mitiora habentur. profunt celiacis, dysentericis, purulentis extulsientibus, cholericis, præsertim cruda, maceratorum liquor, commodo in stomachi aut uentris fluxionibus potui datur. Succus erudorum assumptus orthopnoicis salutaris est. decocto fouentur uulux & sedes si procidant. Cotonea quæ melle condiantur, urinam mouent. mel autem sibi constringentem illorum uim & inspissantem asciscit. quæ cum melle coquantur, stomacho atque origratio sunt, sed minus inspissant. cruda cataplasmatibus adijciuntur, ad cohibendam aluum, aut si stomachus æstuet, aut in uomitiones effundatur, ad mammarum inflammationes, prædurus lienes, & condylomata. Fit uinum ex ipsis uitis expressisq; sed quò perdureret, quindecim sextariis succi unus mellis adiungitur, alioquin in acorem degenerat. Prodest ad omnia quæ dicta sunt. Fit & oleum ex his quod melinum uocauimus, quo utimur quoties astringenti oleo est opus. Eligi oportet uera, quæ sanè sunt rotunda, & parua & odorata: quæ uerò struthia dicuntur, magna quidem sunt, sed minus utilia. Flos & uiridis & siccus cataplasmatibus imponitur, his conueniens quæ astrictionem desiderant, inflammationibus oculorum, reiectionibus sanguinis contra citam aluum, & mensium impetus, in uino bibitur. Melimela uentrem molliunt, & ab eo animalia expellunt. stomacho negotium exhibent, æstuosa. Ea multis dulcia mala uocantur. Epirotica mala, quæ Latine orbiculata dicuntur, stomacho utilia. sistunt aluum. urinas euocant. malis tamen cotoneis inualidiora. Syluestria mala similia sunt uernis, & adstringunt. sanè in hunc usum immatura omnia opus sunt. Persica poma matura tam stomacho quàm uentri utilia sunt: acerba aluum cohibent, sed sicca uehementius. decoctum è ficcis alui stomachiq; fluxiones sistit. Armeniaca, quæ à Latinis præcocia dicuntur, miora sunt supradictis, & stomacho utiliora. Medica mala aut cedromela, quæ Latini citria uocant, nemini non cognita. Arbor ipsa omnibus anni temporibus po-

A

Mala Cydonia.

Mala.



Melimela.



Epirotica.



B

misera, alijs deciduis, alijs subnascentibus. malum oblongum est, rugosum, colore aurum imitans, cum grauitate odoratum. semen habet pyri. Id in uino potum uenenis resistit. aluum mouet. oris suauitatem commendat. decocto eius colluto, aut succo. estur in malacia mulieribus. uesciarijs impositum ab erosionis uitio uestes uindicare existimatur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis, Μᾶλεα arbor, fructus μᾶλον. Latinis, Malus, Malum.

Germanis, ein Apffelbaum/ ein Apffel. Gallis, une pome, et ung pomier dicitur.

Malorum, sicut et pyrorum, infinita sunt genera, quorum copiose meminit Plinius lib. 15.

Mala cydonia, quæ et cotonea dicuntur, mala sunt ex Creta insula aduecta, à cuius ciuitate Cydone dicta sunt Cydonia. Q. Serenus: Aut quæ poma Cydon Creteis mittit ab oris. Horum plura sunt genera. Nam sunt Chrysomela, quæ aurea mala interpretantur, à colore aureo, quem referunt. Sunt deinde minora et odoratiùs fragrantia, quæ Struthæa uocantur. sunt item quæ à mulleo sapore Melimela, et eadem à nascenti maturescendiq; celeritate uocantur musæa, uulgo uerò ab arborum paruitate, quòd pomilie sunt in quibus nascuntur, Nana appellatur et c. quæ genera lib. 15. à Plinio describuntur. Fit et uinum, mel et oleum à cydonijs.

C. 1007

condimentum Cotoneatum, vulgo Quitten Latweg. Gallis uerò contingnat, appellatum. Ceterum cotonea cocta suauiora in cibo: Cruda & matura prosum sanguinem excreantibus ac dysentericis, cholericis, coeliacis, ut Dioscorides testatur.


Persica.



Persica nota sunt poma, vulgo Pfersich, Gallis de pesches dicta, è Persia ad nos translata, unde nomen habent. Nec unum eorum genus est, è quibus tamen ante alia in precio sunt, à duricie & soliditate dicta duracina, quibus corpus ligno adheret auellit, nequit, in reliquis facile separatur. Plinius lib. 15, cap. 12. Persicorum palma duracina. Nationum habent cognomen Gallica & Asiatica. Post autumnum maturefcunt. Aestate præcocia Germanis S. Johans Pfersich. Gallis abricot dicta, intra xxx. annos repta tempore Plinij. & primò denarijs singula uenundata. Supernatia è Sabinis ueniunt, popularia undiq. Pomum innocuum, expectitur ægris, nec aliud fugacius: longissimæ enim decerpto bidui mora est, cogitq. se uenundari. Paulus Aegnetæ lib. 1. Persica, inquit, mali succi sunt, acescunt & facile corrumpuntur, ideoq. in prima mensa sumenda, quo deiciantur protinus, neq. propter moram in uentriculo corrumpuntur. Præcocia uerò & rhodacina & Armenia, persicis meliora sunt, neq. enim acescunt, neq. similiter corrumpuntur, ac sunt etiam delectabiliora. Ex quibus illud etiam intelligi potest, quod Celsus lib. 2. tradit. Non quicquid boni succi est, protinus stomacho conuenire: neq. quicquid stomacho conuenit, protinus boni succi esse. Nec illud omittendum, uidelicet. Armeniaca non inter Persica à Palladio & alijs, sed pruna numerari à Plinio & Columella.

Citria mala, que Dioscorides capite presenti, Persica quoq. & Medica & Citromala, Plinius Assyria appellari dicit. Quorum uaria sunt genera, magnitudine potius quam genere differentia, & ipsam quasi uiribus dotata, odoratissima & uenenis aduersantia, præcipuè quod priuatim & peculiariter Latine Citrum. Germani, Judenapffel, Citrinat. Gallicè ung Citron uocatur, de quo Virgilius intellexit, cum ait:

Citrum.



Felici mali, quo non præstantius ullum, Pocula si quando seue infecere noueræ, Miscueruntq. herbis & non innoxia uerba.

Estq. hoc pomum grande, & ut hic Dioscorides illud describit, oblongum, rugosum, colore ad aurum inclinato, cum grauitate odoratum. Habentq. arborem toto anno fecundam & superfectatam, ut à Palladio etiam in Martio mensetur aditur, ubi ait: Quod ego in Sardinia, & in territorio Neapolitano in fundis meis comperi (quibus solum & cælum tepidum est, & humor exundans) per gradus quosdam sibi semper poma succedere cum maturis se acerba substituant, acerborum uerò etatem florentia consequantur, orbem quandam continue fecunditatis sibi ministrante natura. Quæ omnia ferè etiam à Plinio

Pomeranzen.



Limonen.



A traduntur lib. 12. cap. 3. Verum diuersis citri partibus, diuerse insunt vires. Cortices enim calidi sunt: qui intus est succus semidecidus: semen item calidum, antore Auicenna. sed Paulus Aegineta lib. 7. dicit esse frigidum, & carnem eius crassum generare humorem, & pituitam adaugere, atq; refrigerare, & lib. 1. ait: Citri mali extrema pars acris est, quae uero ueluti carnis speciem praese fert, licet esui sit idonea, uix tamen concoquitur. Id uero quod intus continetur, siue acidum siue aqueum fuerit, uehementer in frigidat. Sum praeterea in citriorum & Medicorum censu minora quae Aurantia ab aureo colore, Germanis Pomerantia. Gallis aurenges uocantur, duplici sapore praedita, dulci & acri. Sunt & citrigenum generis, quos Limones dicunt, Germani Limonen, Galli Limons, de quibus omnibus eadem ferè dici possum, & de quorum utilitate eleganter & copiose satis scribit poeta percelebris Iouianus Pontanus lib. 2. de horis Hesperidum.

Pyra. Caput CXXXII.



Pyrorum multa genera, quae tamen omnia astringunt: proinde adduntur conuenienter in repellentia cataplasmata, decoctum è siccis & cruda ipsa aluum fistunt ieiunos esitantes laedunt. Achras pyraetri genus est, quod tardissime ematur rescit. Vim pyro atringentiorē habet, & ad eadem conuenit. stringunt etiam eius folia. Ligni pyrorum cinis effica ceter his auxiliatur, quos fungi strangulant. Aiunt fungos, si syluestria pyra cum eis coquantur, innoxios fieri.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Graecis pyrus arbor ὄρυγξ, & πῖος, fructus ὄριον, ὄρυγξ, uel ὄρυγξ: Etsi haec duo posteriora de syluestri potius dici uelint, πῖος & ὄρυγξ.

Latinis Pyrus arbor. Pyrum fructus. Germanis, Byrbaum/Byr.

Gallis ung poirier, & une poire, dicitur.

Pyrorum innumera sunt genera, quae copiosius à Plinio tractantur lib. 15. Ceterum pyrorum omnium cibus etiam ualentibus onerosus, & gravis quoque uini modo negatur, ut lib. 21. scribit Plinius: Decocta eadem mire salubria & grata, Quae cum melle decocta stomachum adiunam, ipsa aduersantur boletis atque fungis, pelluntque pondere & pugnante succo.

B Pyrum syluestre tardissime maturescit. Coneditur, suspensumque, siccatum ad sistendam aluum, quod & decoctum eius potum praestat. Decoquuntur & folia cum pomo ad eodem usus. Pyrorum lignum cinis contra fungos etiam nunc efficacius proficit.

Mespilus. Caput CXXXIII.



Mespilus, quae à nonnullis aronia uocatur, spinosa arbor est, folio acutè spinæ fert pomum suauē, exiguum, tribus intus ossiculis, quae ex causa id nonnulli tricocon appellauere. tardè maturescit, esu astringit, stomacho gratum est: aluumque suppressit. Alterum mespili genus in Italia nascitur, quod aliqui setanium, alij epimelida uocant. arbor folijs mali, sed minoribus. pomum fert rotundum, esui aptum, umbilico latiore: quod astringit, seroque maturescit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Graecis, Μέσπυλος, & μεσπίλη.

Latinis Mespilus. Legitur & Mespila, form. gene.

Germanis, Mespelbaum/Mespel.

Gallis ung nespier, meslier, appellatur.

Theophrastus Ideorum secutus observationem, tria Mespili tradit fastigia. Dioscorides duplici genere contentus est, ita ut alia quae Theophrasto & Plinio mespili distinctio representata est, & sanè qua dubitat, an mespilum cum sorbo ueteres confuderint, quandoquidem altissimis connumerant, quod certè sorbo quàm mespilo nunc uocata, magis conuenit, nisi quis nostratē Mespilum chamemespilum appellandam fortasse censcat.

Epimelis frequentissima est hodie ad syluam Hircinam, fructus eius unedo, uulgo Enbeer, appellatur. Hippocrates autem πυρρακείον, & πυρρακείον, uocat, uelut Galenus in glossis eiusdem testatur.

Lotus

Lotus arbor. Caput CXXXIII.

A

Lotus arbor est uastæ magnitudinis, ferens baccam pipere maiorem, dulcem, ci-
bis gratam, stomacho facilem. Aluum sistit baccis, ramentorum ligni decoctū
siue potu, siue infusione, dysentericis ac fœminis fluxione uulvæ laborantibus au-
xilium est, rufat capillos, citam aluum cohibet.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græci, Λωτός δ' ἐν ὅσῳ, Aphri, celtin. Latini fabam Græcam appellant. Italia hodie tum Amarenion, in Fabâ Græcâ,
pongeracum, tum uisciculum, quidam acrisolium, alij cicéragnem. Vti res fabam Syriacam, unde forsitan Padî
accole baccam Syriacam adhuc uocant. Romæ pullem Syriacam, Conomani hodie Calamum. Germanis hoc
tempore incognita arbor.

Λωτός πίνκας, id est, scobs Loti, ad sanguinis sputum usurpatur Astuario in ὄστρ. Ἀλεκτρεῖς: Galenus au-
tem ad muliebri profluuium, dysenteriam, coeliacos affectus. Huius fructus etiam ualenter astringit.
In Gallie partibus uulgo Alisa dicitur, et arbor ipsa Alister.

Cornus. Caput CXXXV.

Cornus syluestris.



Cornus dura arbor est, baccas ferens oliuæ
modo oblongas, quæ primùm uirent, dein
per maturitatem rubescunt, aut ceræ colorem re-
presentant. in cibo astringūt, profluuium alui atq;
dysenteria salutaris, siue in edulio, siue in defru-
to exhibeantur. Muria, ut oliuæ, condiuntur. Sa-
nics, quam uirentia folia torrendo resudarunt,
impetigini conuenienter illinitur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Κραμία. Latine, Cornus.

Germanicè, Welsch Kirschen / Cornelbaum / Rurber-
baum / Thierlinbaum.

Gallicè, Cornier, ou carmier, arbor: fructus, corne ou cor-
me.

Cornus arbor nota est Germanis. Nam et apud Helucios
et Alsatias nascitur, et alijs etiam ad Herciniam syluam lo-
cis, et fructus eius ab illis, instar oliuæ, muria condiunt, quod etiam Dioscorides fieri hoc loco tradidit, et
Columella.

Cornus fœmina, quam etiam syluestris cornum appellant Græcis Οὐλκρὰ πινκας. Germanis, Spind-
delholz et Saulbeer, dicitur, coriarijs expetitus frutex. Theophrasto, caudice fungoso et inuili assir-
git, ob id Germanicam appellationem Saulholz sortita est, uirgulis instar amerinæ fruticat, autumnalibus
baccis perquam acerbis, et cunctis animantibus gustu intas.

Sorba. Caput CXXXVI.

A



B

Sorba sumus molles durantia uentres,
Aptius hæc puero quam tibi poma damus.
Et Q. Serenus uentris solutioni mederi docens, ait:
Proderit & pueris, quos dentis origo fatigat,
Castaneas coxisse nuces, & sorba uictu.

DIOSCORIDIS

Sorba colorem luteum referentia prius quam maturascant, dissecta & sole siccata manduntur, ut aluum fiant. eadem est functio molitorum faring, si polenta loco sumatur. quod & decoctum eorum in potu præstat.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè δα, uel δγ arbor, fructus δδγ.

Latine sorbus arbor, sorbum fructus.

Germanis, äscherslin / Speierling / Spöbyren / Ailesber.

Gallis corma uel sorba, cormes, sed arbor cormier.

Sorba sunt fructus, malorum pyrorumque generi iure annumeranda, quibus quadruplex differentia, ut lib. 15. ca. 21. tradit Plinius. Alijs enim eorum rotunditas mali, alijs turbinatio pyri: alijs ouata species, eorum malorum aliquibus. Hæc obnoxia acri odore & suauitate iucunda. Ceteris uim sapor. Generosissima aliquibus circa pediculos folia. Quartum genus Terminalale appellam, remedio tantum probabile, aspidium prouentu, minimumque pomo, arbore dissimili. folijs penè platani. Non ferunt ante trimatum ex ullo genere. Cato & sorba sepe condi iubet. Seruantur etiam diu hoc genere. ut in Ianuario tradit Palladius, lecta duriora, ac posita, ubi mitescere coeperint, scitibus usque ad plenum conduntur urceolis, & pso desuper tellis & bipedanea scrobe loco suo sub sole merguntur ere peruerso, & desuper spissius terra calcatur item secta per partes siccantur in sole, ut hoc loco Dioscorides tradit, & seruantur in uasculis in hybernium. Cum uoluerimus uti, aqua feruenti macerata reuiviscunt sapore iucundo. Aliqui cum pediculis suis uiridia lecta suspendunt locis opacis & siccis. Celsus sorba stomacho aptissima tradit, & aluum astringere, magisque ea que terminalia uocantur. Martialis item sorborum uim astringentem & naturam exprimit hoc disticho:

Prunus. Caput CXXXVII.



Prunus arbor est nota, cuius pomum estur, sed stomachum malè habet. aluum mollit. Syriaca pruna & præcipue quæ Damasci gignuntur, exiccata stomacho utilia sunt. aluum astringunt. Folia pruni in uino decocta collutione & gargarizatu uiam, gingiuas, & tonsillas fluxione laborantibus reprimunt. præstant idem syluestrium prunorum baccæ, post maturitatem exiccata. cum sapa uerò decocta, stomacho utiliores redduntur, aluumque magis astringunt. Gummi prunorum agglutinatur. potum in uino calculos comminuit. ex aceto quoque illitum, lichenas infantium sanat.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, κοκκινυδία arbor: κοκκινύδωρ fructus.

Latine, prunus arbor: fructus prunum.

Officine Latinum nomen seruant.

Germanicè, Pflaumen / Briedchen.

Galicè, prunier arbor, fructus une prune dicitur.

Ingens est, inquit lib. 15. Plinius, turba prunorum: uersicolor, nigra, candidans. Hordeacea appellata à comitatu frugis eius. Asimina cognominata à uilitate. Nec non ab externa gente Armeniaca, quæ sola & odore commendantur.

mendantur. Damascena à Syriæ Damasco cognominata. In uniuersum Pruna alium molliunt. Stomacho utilissima, sed breui momento, ut ait Plinius. Dioscorides hic uerò stomacho nocere dicit, & Damascena sicca stomacho accommodata esse, sed alium cohibere, cum manifestè & hæc soluant, licet minus quam alia, ut Paulus Aegineta lib. 7. tradit. Martialis: Prima peregrine carie rugosa senectæ Sime, solens duri soluere uentris onus. Et Serenus: Sæpe cibi specie, uitio uel corporis ipso, Potibus aut duris restricta morabitur alius. Vincitur talis mora gramine Mercuriali: Prunaq; conueniunt, quæ mittit clara Damascus. Sunt autem talia ceteris præstantiora & salubriora. Seruantur etiam pruna sole uel furnis siccata, & aliter. Palladius in Nouembri mense, Pruna, inquit, siccantur in sole per crates loco sicciorè disposita. Hæc sunt quæ Damascena dicuntur. Alij in aqua marina uel in muria seruente recenter lecta pruna demergunt. & inde subleuata, aut in furno tepido faciunt, aut in sole siccari.

Arbutus.

Caput CXXXVIII.



Arbutus siue unedo, arbor est cotoneæ malo non dissimilis, tenui folio, cuius fructus pruni magnitudinem implet, nullo in nucleo huius memecylon cognomen est, maturus aut flauet, aut rubescit, in esu acerosus. Stomacho aduersatur, capitisq; dolor mouet.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis, ἄρβυκος. Latins Arbutus.
Germanis incognita. Gallis arbouees, dicitur.

Arbutus ἄρβυκος Græcis est quæ arbor una cum fructu suo, Memecylon Græcis appellatur, acerbæ qualitatis est, & stomacho incommodat, ac capitis dolorem inducit, ut Galenus 7. simpl. phar. de ea prodit, & Diosc. cap. præsentit: quod ipsum etiam de comp. phar. part. de ipso fructu Galenus perhibet, eaq; propter in capitis dolore febrii uitandū censet. Verum Plinius lib. 15. cap. 24. ait: Vnedo pomum in honore, ut cui nomen ex argumento sit unum tantum edentibus.

At, duobus tamen hoc nominibus appellant Græci, Comarum & Memecylon, ex quo apparet totidem esse genera et apud nos: alio nomine arbutus uocatur. Quibus uerbis Plinius quatuor uoces, Vnedonem, Comarum, Memecylon, & arbutum uni arbori ac fructui tradit, cuius tamen duo genera esse putat, atq; ita etiam libro 23. cap. 8. sentit. Arbutus, inquit, siue unedo, fructum fert difficilem concoctioni & stomacho inutilem. At uerò ἄρβυκος & arbutum eandem arborem esse, cuiusq; fructum Memecylon uocari, ex suprâ citatis Galeni ac Dioscoridis præsentis capite clarum est. Vnedonem autem alium esse fructum, & non Comari siue arbuti, sed arboris Epimelidis appellatæ superius cap. 133. ex eodem Galeno ostendimus, Sexto namq; simplicium phar. de Epimelide, ἑπιμελίδος inquit, acerbæ planta est, & ut dicere possis syluestris malus: appellatur autem à ruralibus in Italia δονέδω, hoc est unedo, ac plurimum in Calabria nascitur. fructus eius acerbus. Stomacho incommodus, & capitis dolorem inducens, nam peregrina qualitas quædam est ammixta. Quæ uerba ex Galeno etiam Paulus transcripsit, ut dubitari non debeat quin alia arbor sit ἑπιμελίδος, quæ una cum fructu suo in Italia unedo appellatur, & alia arbutus, cuius fructus Memecylon Græcis dicitur, atq; hoc propterea quod diuersis locis eorundem mentio fiat, & hoc ab his autoribus, qui æquè ut Plinius in Italia uixerunt: quanquam Plinius innuat potius quam exprimat, duo unedonis genera esse, ut uidelicet alterum de Memecylo, alterum de unedone accipi possit. Sed tamen mox leuiter satis dictum confundit, cum ait: alio nomine arbutus uocatur. Quare certum est ipsum existimasse arbutum & unedonem Latinis esse, quod Comarus & Memecylon Græcis, atq; id, ut opinor, ob similem uim, quæ de Memecylo & unedone proditur. Verum ex Galeni uerbis ostenditur, unedonem epimelidis fructum esse, Memecylon autem arbuti. Neq; refert fructuum & arborum appellationes singulatim inter se in suo genere confundi. Quin & libro 2. de alimentis idem Galenus manifestè inter comarum arborem, cuius fructus Memecylon appellatur, & inter arbutum aut sentem potius, quæ Epimelidis fert, & in Italia unedo appellatur, distinguit, ut certum sit duo diuersa genera unedonem & Memecylon esse, quorum ἄρβυκος Galenum fuisse credo, Plinium uerò, ut non adeo circa has res curiosum, ex Græcis tantum transcripsisse, & in his, uelut multis alijs, eos non assequutum esse. Porro Dioscorides suprâ cap. 133. alterum genus Mespilii in Italia nasci prodit, sed ab aliquibus ἑπιμελίδος uocetur, ut ex eius uerbis Epimelis & unedo ex Mespilorum genere sint. Arbutus uerò & Comarus ac Memecylon sui generis, & ab eis diuersi existunt, ut suprâ ostendimus cap. iam citato.

80
DIOSCORIDIS
A Amygdalæ. Caput CXXXIX.



A Mygdalæ amaræ radicem tritarum decoctum, vitia cutis in facie corrigit. illitæ nuges idem munus præstât. menses admotæ ciunt, capitis dolori auxiliantur, illitu fronti aut temporibus cum aceto uel rosaceo. epinyctidas sanant, ex uino item putre-

scientia ulcera, & quæ serpunt. & morsus canum cū melle earum autem esu dolores finiuntur. alium emolliuit. somnum faciunt. urinam cient. cōtra sanguinis reiectiones cum amylo assumuntur. renū uitijs & pulmonum inflammationibus ex aqua in potu aut eclegmate cū resina terebinthina dantur: calculosis difficiliter urinæ in passo auxiliantur, & illinctu cum melle & lacte, hepaticis, tussi, & inflationibus coli, nucis auellanae magnitudine. quinis septentisue præsumptis ebrietatem non sentiunt potiores. uulpes si cum quadâ esca eas uorauerint, emoriuntur. Gummi eius calfacit & astringit. reiicientibus sanguinē, potum auxilio est. impetigines quæ sum-

inum corpus occuparunt, illitum cum aceto tollit. tussi uetustæ cum diluto uino potū medetur. calculosis cum passo bibere prodest. E nucibus Græcis, dulces cibo idoneæ: sed multo minus ualent in remedijs, quàm amaræ: attamen extenuant, urinam ciunt. recentium esu cum suo putamine, stomachi uitia emendantur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

B Græcè, ἀμυγδαλή. Latine, Amygdala. Officinæ Latinæ nomen seruauit. Germani, Mandelbaum, Mandelkern. Galli des amandes appellant. Amygdala amara incidunt, tenuant, terguunt, digerunt sine morfu: ob id ex pulmone excretionem crassorum & lentorum promouunt, obstruendum hepar, lienem, renem, colum à crassis & lentis humoribus expediunt. Amygdala dulcia sunt modè calida, leuicula tamen amaritudinem habent, sed à dulcedine occultatam, quæ tamen temporis spacio fit manifesta.

Pistacia.

Caput CXL.



Pistacia Germanica.



Pistacia.

Pistacia.



Pistacia, quæ constat in Syria gigni, pineis A
nucibus similia sunt, & stomacho amica.
trita cum uino contra serpentum ictus pro-
sunt, siue edantur, siue bibantur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Πιστῆκία. Latine pistacea, uel pistacia. Ni-
cander Pistacia. Posidonius Pistacia uocauit.

Officini Pistici.

Germani, Welsch Bimpernüstlin.

Pistacia in Syria provenit, ut Galenus quoque scribit, &
pineis nucibus non absimilia: stomacho accommodata. Ga-
lenus exiguum præstare alimentum pistacia tradit, confir-
mando dilatandoque iecori haud inutilia: infraactos enim
humores excernunt: stomacho ne prosit Galenus incertum
reliquit: Serapion Dioscoridis monitu tantum recoñset sto-
macho conuenire, atque auellana magis exalfacere: quare
& amygdalis calorisficis amplius: Auicenna, uero pisti-
cos hæc eadem nominans duobus integris numeris calore
testatur, calidiores amygdala ac ipsa nucis: uerum puta-
uerim ego nucem auellanam Auicennam concepiisse, etenim
iuglandem tertio ordine calorisficam scripsit, quod errone-
um cum sit, deprauatum de iuglande scribentem Auicen-
nam uerisimile est: addidit ille, per exiguum nutrire pisti-
cia, iecori per amica, stomachum non parum iuuare, quem
nauseantem confirmant & manum.

Eam arborem, quam nomine pistaciorum Germanicorum adpinximus, omnino eam esse existimo, quæ
Plinio Staphylodendros dicitur, arbor, ut ipse tradit, trans alpes, simillima aceri, alba in materia, siti-
guas ferens, & in ijs nucleos sapore nucis auellane, Germanis, Bimpernüstlin dicti. & figura & sapo-
re parum à pistacijs differentes.

Nux iuglans.

Caput CXLI.



Nuces iuglandes, quas nonnulli Persicas uocant, sunt difficiles concoctu, sto-
macho inutiles, biliosæ, capitis dolorem inferentes, tussientibus inimicæ, &
æomituris

A uomituris ieiunis in cibo aptæ, cum ruta uerò & ficis præsumptæ, & à summo cibo, uenenis resistūt. nec minus si à ueneni haustu comedantur. largius esitatę tinea latas pellūt. illinuntur mammarum inflammationi, abscessibus, luxatisq; cum mellis exiguo & ruta. cum cepa autem, sale & melle, canis hominisq; morsui proficiunt. tormina, cum calyce suo perustæ, & umbilico admotæ, sedant. Putamen cōbustum tritumq; in oleo & uino, infantium capite peruncto, nutrit capillum. alopecias replet. Sistunt menses nuclei usti, si triti ex uino admoueantur. ijdem è ueteribus, illiti carbunculis, gangranis, & ægilopijs medentur. alopecijs commanducati & impositi præsentis sunt remedio. Nucibus tuis oleum exprimitur. Recentes stomacho innocentiores sunt, utpote suauiore. itaq; alio mistæ eximunt acrimoniam. liuores in corpore illitu tollunt.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Καρύδν βασιλικόν, ἢ ἐνδοίου κηρύα, καὶ πέρσικη.

Latine, Nux Basilica, iuglans, Persica. Germanicè, Baum nuss, Welsch nuss.

Gallicè, Vne noix.

Nux iuglans seu regia, nucleo est tenuium partium, ubi inaruit, siccante etiam sine morsu, ex quo in ueterato oleum ualenter digerit.

Nux Indica,



Nux Indica Actuaria in diasatyrio & diaromato. Veteres huius non meminerunt.

Nuces auellanae.

Caput CXLII.



Nuces auellanae, quas & leptocarya uocant, stomacho infestæ sunt. ipsæ tamen tritæ, & in aqua mulsa potæ, tussi ueteri medentur. tostæ & cum exiguo piperis potæ, destillationem concoquunt. crematarum cinis cum axungia aut adipe urfi perunctus alopecijs capillum reddit. Aiunt nonnulli usta earum putamina, & in cineris speciem redacta, cum oleo, cataractorum oculorum pupillas infantibus denigrare, per fusio sincipite.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Αερίον, id est, nux tenuis, Pontica, Prænestina. Auellana, à locis ubi luxuriat, Ponto, Prænesti, Auellis, dicitur.

Germanicè, Haselnuss. Gallicè Noiseti, ou melline. Plus habet terræ & frigide substantiæ, ob id austerior iuglandæ. Nuces tenere, rancidæ, ustæ, cinere digerunt & astringunt. Gale. lib. 6. part.

Morus.

Caput CXLIII.

Morus



Morus arbor nota est. cuius fructus aluum A
soluit. stomacho inutilis est. & facile corru-
ptionem sentit. Hoc idem præstat mori succus:
decoctus autem æreo uase atq; infolatus, ad tri-
gentior redditur. facit ad fluxiones, nomas, &
tonsillarum inflammationes. addito mellis exi-
guo. Sed insolefcit uis eius, adiecto scilicet ali-
mine, galla, croco, & myrrha: item myrica semine,
iri, & thure. Immatura mori poma siccantur, tu-
saq; acinorum rhois uice obsonijs miscentur, ut
cæliacos iuuēt. Radicis cortex decoctus in aqua
& potus aluum resoluit. latus uentris tinea excu-
tit. his quoq; auxiliatur, qui aconitum hauserūt.
Folia trita ex aceto illita, ambustis igni meden-
tur, tinguntq; capillum, uitium & fici nigrae fron-
dibus simul coctis in aqua cælesti. Succus folio-
rum cyathi mensura potus contra phalangiorū
morsus auxilio est. Feruifacit cortices & foetiorū
iure dentes aptissimè in dolore colluuntur. Ra-
dix circiter mensem incisa, facta in ambitu sero-
be, succum emittit, qui postridie concretus inue-
niri solet. Is in dolore dentium efficax est. tuber-
cula discutit, & aluum purgat.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ἡ μοῖρα ἢ οὐράριον & arbor, fructus uero Μορέμ.

Latine, Morus arbor: Morum fructus.

Officina Latium nomen seruauerunt.

Germanis, Maulber. & Maulberbaum. Gallis ung meurier, & une meure dicitur.

Morum album Græcis ueteribus inditum uidetur & Latinis, præterquam Ouidio, fortè quia per insitio-
nem in populo albo gignitur: nigrum cantatissimum, & arbor, cuius folijs bombyces pastri sericum nens pul-
chrius & splendidius. Mori tamen albe folium ad hos atendos est mollius, coq; hodie tota Italia utitur.

Mori fructus ab eo quod in stomachica pharmaca commodus est, apud nostrates nomen inuenit, Maul-
ber, appellatus.

Sycomorus.

Capit CXLIII.

Sycorum aliqui etiam sycaminum, id est, morum, uocant, cuius fructus sycos
morum etiam propter inefficacem gustum appellatur. arbor est magna, fico simi-
lis, frondosa, multo lacte abundans, folijs mori, pomum ter aut quater anno fert, nō
ramis, ut ficus, sed caudice ipso: caprifico non dissimile, dulcius grossis, sine granis
interioribus, quod non maturefcit, nisi ungue aut ferro scalpatur. Nascitur pluri-
mum in Caria, Rhodo, locisq; non multi tritici feracibus, ubi prouentu fecundo re-
stibilisq; iuuamentum adfert, cum annonæ caritas premit. Pomum aluo utile est, sed
perquam exilem præbet alimoniam. Stomacho aduersatur. Succus primo uere te-
nera arbore, antequam fructum ferat, eximitur, lapidis ictu summo cortice desqua-
mato. si enim altiore plaga uioleretur cortex, nihil effluet. Spongia aut uellere lachry-
ma excipitur, quæ siccata & in pastillos coacta fictili uase reponitur. Vis succi emol-
lit, uulnera conglutinat discutit collectiones coctioni repugnantes. bibitur etiam
aut illinitur contra serpentium morsus, duratos lienes, stomachi dolores, & perfric-
tiones, celerrimè teredinem sentit. Gignitur & in Cipro arbor genere distans, quæ
cum sit ulmus, prædita tamen est folijs sycomorī, fructu pruni magnitudine, multo
dulciore, supradictis cætera similis.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Sycomora eadem non sunt cum sycaminis siue moris appellatis, quanquam Dioscorides hoc loco quesitā
etiam ipsam sycaminum sycaminum appellare prodit: Sycomorum enim Galenus, plantam unā cum fru-
ctu se in Alexandria uidisse dicit, fructum quidem consimilem ficui parue albe, cumq; in med. o mororum
& ficuum locari posse ait, unde etiam nomen sit adeptus, à similitudine uidelicet, quam ad utrumq; fructum
habet.

auribus instillantur. Tam sylvestris quàm satiuæ fici lacteus succus coaguli modo lac contrahit, concretumq; dissoluit, ut acetum. exulcerat corpora, meatus aperit. soluit alium uulnam recludit cum detrita nucis græca potus. menstrua ciet cum luteo oui appositus, aut Tyrrhenica cera. podagricorum cataplasmatibus cum farina fœnigræci & aceto utilis lepras, lichenas, uirilgines, uicia cutis in facie, psoras, ulcera in capite manantia, cum polenta expurgat. instillatus plaga, percussis à scorpiione, uenenatorum ictibus & rabiosi canis moribus auxiliatur. prodest dentium dolori lana exceptus, & cauis eorum additus, uerrucarum informicationes tollit cum adipe, circumlita in ambitu carne. Hoc idem præstat succus è teneris ramis sylvestris fici, qui lacte prægnantes, silente adhuc oculo, tui exprimuntur, & siccat in umbra reponitur. Et lac & succus imponuntur exulceratorij medicamentis. Decocti cum bubulis carnibus ramuli ficulni, facilem afferunt decoctionem. lac efficiunt quod magis soluat, si inter coquendum ficulneo furculo spathe loco moueatur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Ζυκκ.

Latine & Officinis ficus.

Germanis, Feigenbaum.

Gallis ung figuer.

Ficum pluris traditur genera, de quibus Plinius partim libro decimo tertio, partim is agit. Inter quas Mariscæ fici.

Infanti melimela dato, satiusq; mariscæ.

Nam nabi que nouit pingere, Chia sapit.

De qua chia eiusdem etiam est alterum distichon hoc:

Chia semel simul Baccho, quam Setia misit,

Ipsa merum seium portat, & ipsa silem.

Sunt deinde à locis etiam dictæ Cœtana, de quibus etiam apud Martialem est distichon tale:

Hec quæ torta tibi uenerunt condita mentha,

Si maiora forent Cœtana, ficus erat.

Item Caricæ, quæ: consendenti nauim aduersus Parthos omni fecere M. Crasso uenales prædicantis uoce Causæ. Que omnia in Albanis ferus è Syria intulit L. Vitellius, qui postea censor fuit, cum legatus esset in ea provincia nouissimis Tiberij Cæsaris temporibus. Inter quas iam nominatas Caricæ optimè siccantur: Unde quidam siccas ficos Caricæ nominant. Sicut item Aphricanæ à provincia dictæ, quæ Romanis delendæ Carthagini occasionem dederunt, libro 15. tradente Plinio, Cato namq; perniciosa odio Carthaginis flagrans, nepotum securitatis anxius, cum clamaret in omni Senatu Carthaginem delendam, attulit quodam die in curia præcociem ex ea provincia ficum, ostendensq; patribus: Interrogo uos, inquit, quando hoc pomum demptum putatis ex arbore? Cum inter omnem recens esse constaret. Atqui tertium, inquit, ante diem sciote decerptum Carthagine, tam propè à muris habemus hostem. Statimq; sumptum est Punicum tertium bellum, quo Carthago deleta est: Et unius pomi argumento euerfa. Sunt præterea à prouentu eadem serotinae & præcones, bifera, alba & nigra cum melle uidentiaq; maturefcentes. Serotinae sunt, & à corio appellatæ duro, duricoræ. Grossi demum dicuntur fici antequàm maturefcent. Sed de generalibus earum ad presens satis. Ficiis mollis omnibus tactus. Maturis frumenta intus. Succus maturefcentibus lactis, percoctis mellis. Senescunt in arbore, anisq; distillant guttims modo lachrymam, siccanturq;. Panis simul & obsonij uicem siccata implent. Ceterum quantum ad naturam earum attinet, Ficus multi alimenti sunt. Sed aliene stomacho, insunt & alium mouent, autore Celso, mature recenteq; stomacho, testante Dioscoride, noxiæ sunt, sanguinem malum generant, unde si multum comedantur, pedunculis procreant, aut ut Paulus Aegineta & Oribasius.

Grossi. Caput CXLVI.

Grossi, quæ erinci nonnullis uocantur, coctæ, illitæ, strumas nodosq; omneis emolliunt. crudæ formicas, uerrucas & thymos, nitro farinaq; additis, tollunt. Folia eadem possunt. illita cum sale & aceto ulcera in capite manantia, epinyctidas & furfures sanant. ijs ficosæ extuberationes, & genarum scabritæ perfriantur. Nigræ fici solijs cauliculisq; candidæ uirilgines perunguntur. faciunt ad cæ-



num morsus, & ulcera quæ ceria, id est, fauos, uocant. Grossi cum syluestris papaueris folijs ossa extrahunt. furunculos cum cera discutunt. contra muris aranci morsus, & scolopendræ uenena, cum eruo & uino illitæ, auxiliantur. Fit ex cinere ficus tam syluestris quàm satiuæ lixiuium, crematis ramorum cauliculis, quod subinde macerari opus est & inueterascere: siquidem inter caustica intelligitur. Gangranis prodest: namq; expurgat & consumit quæ excresecunt. eoque sic utendum est: Spongia assidue hoc lixiuium imbura superponitur. Interdum dysentericis, & in fluxiones uetustas, & sinus cuniculati exedentes, magnosq; instillari conueniet. Etenim putgar, conglutinat, carne replet, & oras committit, non secus atq; emplastrum quæ cruentis uulneribus iniiciuntur: enæma uocant. bibitur ad discutendum sanguinem concretum, & contra præcipitationes, rupta, conuulsa, cum cyatho aquæ recentis colatum, addito olei exiguo. cæliaci, dysentericis per se cyathus datus prodest. neruorum uitij, conuulsionibus commodè illinitur ex oleo, utpotè quod sudores moueat. aduersus gypsi potum & phalangiorum morsus bibitur. Hæc eadem præstant reliqua lixiuia, præsertim quernum. omnia tamen adstringunt.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Grossi dicuntur fici, qui non maturuerunt. Germanicè, Vnzetig Feigen.

Persea. Caput CXLVII.

Persea arbor est in Aegypto, fructum ferens cibo idoneum, stomacho utilem, in quo phalangia cranocolapta nomine inueniuntur, præsertim in Thebaide. Arida folia in farinam redacta, illitu sanguinis eruptiones sistunt. Arborem hanc prodiderunt aliqui in Perside exitiosam esse, translatamq; in Aegyptum, mutata natura in cibos receptam.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Sunt qui ex Nicandri interprete uulgaris pomi persici arborem eandem esse uelint, quæ tum persica, tum persea dicitur, & pomum ipsum uenenatum cum cruciatu gigni in Persia, in Aegyptum deinde translatum factum fuisse mitius & esui aptum. Quod & Columella in carmine innuit, his uersiculis:

Stipantur calathi pomis, quæ barbara Persis
Misera (ut fama est) patrijs armata uenenis,
At nunc expositi paruo discrimine leti,
Ambrosios præbent succos, oblita nocendi.

Verum hoc falsum esse, & non de Persici, cuius mentionem supra fecimus, sed Persee arboris fructu, intelligi debere, ostendit Plinius lib. 15. cap. 13. Vbi sic scribit: In totum quidem Persica peregrina etiam Asia Græciæq; esse ex nomine ipso apparet, atq; ex Perside aduecta. Nam Persicæ arbores serò & cum difficultate transiere, ut quæ in Rhodo nihil ferant, quod primum ab Aegypto earum fuerat hospitium. Falsum est uenenata cum cruciatu in Persia gigni, & poenarum causa à regibus translata in Aegyptum, & terra mitigata. Id enim de persea diligentiores tradunt, in quæ totum alia est: mixta rubescentibus similis, nec extra orientem nasci uoluit. Eam quoq; eruditores negauerunt ex Perside propter supplicia translata, sed à Persee Memphis satum. Idem de persee, & non persici fructu testatur etiam hoc loco Dioscorides, & Galenus lib. simpl. pharma. &c.

Iberis.

Iberis. Caput CXLVII.

A



Iberis siue cardamantica, folia habet nasturtij, uere uidentiora: caulē cubitalem, aut minorem, in incultis nascitur. æstate lacteum florem promit, quo tempore efficacior est. Radices duas nasturtio similes habet, calfacientes & adurentes, ipsę enim ischiadicis cum salsa axungia emplatri modo utiles, quaternis horis alligata, ut de in balneas descendatur, & postea oleo cum lana locus perungatur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Ἰβέρης, ἢ καρδᾶμαντικὴ, ἢ ἀγριοκάρδαμον Græcis. Galeno & Paulo Lepidium minus.

Latinis Iberis. Nasturtium agreste.

Germanis, Gauchblum, Wild Fressen, Steynfressen.

Iberis herba, à regione Iberia nomen inuenit, & uelut Galenus testatur, eadem est quæ Lepidium Græcis appellatur.

Quo magis mirum est, Dioscoridē hoc loco scorsim de Iberide tradere, & in 2. lib. scorsim de Lepidio, ut herba in ciborum usum ueniente; quāquam sanè de Lepidij folijs testetur, eorum esse uim acrem & exulceratoriā, ut ea gratia ischiadicis commodum cataplasma exhibeatur.

De Iberidis autem radicibus prodit planè auxilium Galen. lib. 10. de comp. pharma. part. à Damocrate præscriptum, quod uidelicet cum adipe suillo tuse, ischiadicis imponere conducant. Paulus tamen Aegneta lib. 2. cap. 77. Iberidē & Lepidium, & agriocardamon, pro eadem herba agnoscens, item foliorū usum ischiadicis præscribit, & si eo tempore, quo usus eius expetitur, folia non sint, tū demum corticem radicis, cum axungia ad emplatri formam tusum, imponendum ischiadicis dicit.

Damocrates autem foliorum Iberidis in hunc usum non meminit, sicut neq; Aëtius duodecimo, cap. 2. qui uersus Damocratis, sed tamen lege carminis soluta prodit, & Iberidē etiam Cardamiam appellari dicit, propterea quòd odorem, & saporem, & figuram cardami, hoc est, nasturtij habeat. Id quod etiam Galenus lib. 7. simp. ph. de Lepidio testatur. Quare eadem est herba, Lepidion, Iberis, Cardami-

agriocardamon, siue nasturtium syluestre appellata. In Dioscoride tamen hoc loco Ἰβέρης ἢ καρδᾶμαντικὴ, pro καρδᾶμίνῃ, falsò legitur. Sicut descriptio quoq; corrupta est, μῆκος δὲ ὅσον πυχταῖον ἢ ἑλαττον. Decit enim καυλὸν uox, & πλεον: ut sic legatur, μῆκος δὲ καλὸν ὅσον πυχταῖον πλεον ἢ ἑλαττον, & sic sententia uersuum Damocratis, qui sic habent: καυλὸς δὲ αὐτῆς ὅσον πυχταῖον πλεον ἢ ἑλαττον, & sic πάλιν μακρὸς πλεον. Id est, Caulē cubitalis longitudinis gerit. Paulo maiore aut rursus ampliore &c. Nam & Aëtius sic describit. Sed & quod ad finem huius capituli habetur, καὶ ἐλάττον μετ' ἑλκὸς τοῖς τόποις ἐπιχρίδω, corruptè legitur, pro καὶ ἐλάττον μετ' ἑλκὸς τοῖς τόποις ἐπιχρίδω, hoc est, oleum cum uino loco superius citato, & Aëtius quoq;. Sed & Plinius libro 25. cap. 8. postea oleo & uino corpus perungatur dixit.

Finis Libri Primi.

H 2

A PEDANII DIOSCORI-
DIS ANAZARBEI, DE MEDICINALI MA-
TERIA, LIBER SECVNDVS, IOANNE RVELLIO SVSSIONENSI IN-
 terprete, cum figurarum debita appositione, & annotationibus, in singula capita,
 Per Gualtherum H. Ryff. Argentinum, Medicum, ex doctis.
 uirorum lucubrationibus adiectis.


P R A E F A T I O.



IN PRIMO, charissime Aræ, Libro, quem de medicinali materia
 cōdidimus, de aromatibus, oleis, unguentis, arboribus, & nascenti-
 bus ex eis succis, lachrymis, seminibusq; differuimus. In hoc autem
 Secundo de animantibus, melle, lacte, adipe, frugibus, atq; oleribus
 explicabimus, subuexis herbaceis, quæ acri prædita sunt facultate, ut
 pote quæ cum ipsis cognatione iuncta sint: qualia allium, cepa, sinapi, intelliguntur.
 Idq; ideo, ne cognatorum uires disiunxisse uideamur.

Echinus, sive Erinaceus.

Caput I.

*Erinaceus marinus.**Histrix.**Erinaceus terrestris.*

Marinus echinus stomacho uentriq; utilis est. urinam cit. huius testa cruda in-
 assata, commodè medicamentis admiscetur, quæ psoras abstergunt, cremare
 uerò cinis sordida ulcera expurgat, luxuriantem carnem reprimat. Terrestres erina-
 cei corium combustum alopecij cum pice liquida aptissimè illinitur. assiccatus cor-
 pus, & aceto mulso potum, renū uitij auxilio est. item aquæ quæ cutem subijt, cōul-
 sionibus, elephantia & malè habitis, quos cachectos uocant. uiscerum fluxiones
 exiccat. eiusdem iecur fictili solibus excocto arefactum, ad eosdem usus utilissimè
 reconditur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Echinus inter uarias significationes suas significat etiam animal marinum, & piscem è testaceorum ge-
 nere, erinaceus uulgo dictus: forma orbicularis, spinis circumuallatus, quibus pro pedibus utitur in orbem se-
 se uoluendo, nec aliter ingreditur. Caro illi intus nulla, idq; illi peculiare, sed nigra quædam in omnibus uice
 carnis spectantur. Meminit echini huius Martialis, hoc disticho:

Iste licet digitos testudine pungat acuta,

Cortice deposita mollis echinus erit.

Verum de Echinis, quorum etiam non unum genus est, autore lib. 4. de hist. ani. Aristotele: Plinius li. 9.
 ubi de sanguine carantibus agit piscibus, ait: Ex eodem genere sunt Echini, quibus spine pro pedibus. Ingredi
 est his in orbem uolui: itaq; detritis sæpe aculeis inueniuntur. Ex his echinometra appellantur, quorum spi-
 ne longissimæ, calices minimi. Nec omnibus idem uireus color. Circa toronem candidi nascuntur, spina par-
 ua. Oua omnium amara, quina numero. Ora in medio corpore in terram uersa. Tradunt seuitiā maris præ-
 sagre eos, correptisq; operiri lapillis, mobilitatemq; pondere stabilientes, nolunt uoluntatione spinas atterere.

Oyod

LIBER SECVNDVS.

Quod ubi uidere nautici, statim pluribus anchoris nauiga infrenant. Echinus marinus stomacho accommodatus est, autore Dioscoride. Celsus quoque aluum mouere testatur. Et Plinius lib. 32, ait: Echini ad calculos in cibus profunt. Est & Echinus terrestris animal, cuculi magnitudine, sed specie porcina, aculeis uallatus quemadmodum histrix est: ubi uero sensu uenientem, contracto ore pedibusque, ac parte omni inferiore, quateram & innocuam habet languem, conuoluitur in formam pile, ne quid comprehendi possit præter aculeos: in desperatione uero urinam ex se reddit tabicam, tergori suo spinisque noxiam, propter hoc se capi parum, cute cuius expoliuntur lina, & uulgo ericium, Germanice, Ein hechel appellant. Echinus Germanice, Ein Agel, tam aqua uillis quam terrestris: Græca uox est, à Latinis erinaceus appellatus: quamquam Theodorius echinum marinum ubique in Aristotele non aliter quam echinum interpretatus est, Plinium forte imitatus: attamen qui terrestris, Erinaceum conuertit. Histrix Erinaceo similis est.

Hippocampus. Caput II.

Hippocampus marinum animal est exiguum, cuius cremati cinis exceptus, cum liquida pice aut axungia seu amaracino unguento illitus, alopecias replet.

NOMINA ET EXPLICATIO.


Breue paruumque, hunc piscem Dioscorides ait esse, & nihilominus magnitudinis notam illi coniungenda: Quod enim Græci Hippo, multis in natura adiungunt, grande significat. Sed id sic intelligendum est, ut comparatum id animal olerum, aut arborum crucis, grande sit: marinis uero beluis & piscibus, breue & paruum.

Purpura, buccina, eorumque uolutæ. Caput III.


Purpura.



Buccina.



Uoluta.



Purpura usta exicat, dentes abstergit, excrescentias in carne cohibet, ulcera purgat, & ad cicatricem perducit. Eadem præstant concremata buccina, sed uehementius urunt. si quis salis plena, fictili crudo adurat, dentifricio conueniunt, ambulationis utiliter illinantur, quibus solui medicamentum non oportet, nam posteaquam uulnus cicatricem duxerit, ipsum in testæ modum induratum, sponte sua decidet. Fit etiam calx è buccinis, ut in eius mentione demonstrabimus. Cionia uocantur purpurarum buccinarumque mediæ partes, circa quas testæ uolumen clauiculatim intorquetur, cremata simili modo, maiorem purpuris buccinisque facultatem urendi consequuntur, quoniam apprimendi naturam obtinent. Buccinarum carnes origratæ sunt, & stomacho utiles, sed aluum non molliunt.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Purpura Græcis porphyra uocata, Concha est è turbinatorum genere, aculeis clauata, lingua digitali, firmata, torosa & ualida, duritia tantum conchas posuit perforare, flore purpureo, qui nigrantis rosæ splendore subluet, colorum omnium gratissimo, tingendis uestibus maxime expetito. Purpuram diu multumque considerant, cum aliam concham tandiu mordicus premeret, quoad suffocata hiscere. Consciendi purpurei coloris rationem nostri homines ignorare putantur. Olim purpurarum testas confringebant, & carnes ad tincturam condiebant, & aqua dilutas, & sordibus expurgatas, succensis ignibus in lebetæ coquebant, harum sanguis ab igne incallescens, fluebat, & efflorescebat, partimque flauiscebant, partim Cyaneo colore fiebat, partim in alium colorem conuertebatur, ac nimirum quid imponeretur, conuertebatur in illius colorem. Nasilientas hanc, & Murices, & Buccinas uocant Dios.

Petrus Gilius

A Ceryx à Plinio Latine Murex, & Buccinum appellatiue: Concha est clauiculatim intorta, & turbina-
Ceryx. ta, scabra, sine aculeis, magnitudine purpuris inferior, Buccino turbinato, quo sonus editur, similis, excepto
Murex. ore rotundo in margine inciso. Ergo eadem erit Buccini descriptio: nam est è genere turbineatorum Concha,
 sine aculeis, Buccino Concharum generi, quo sonus editur, similis, nisi rotundo ore differret, in margine inci-
 so: Buccinum enim quo sonus editur, non est incisum. Ligures Buccinos nunc uulgo Cornetos nomi-
 nam: Massilienses Bios Cornetos: Græci quidem hac etate Strophilidas. Speusippus dicit similes esse na-
 rantes, καὶ πορφύρας, καὶ σπρόβιλλας, sine ἀσπρόβιλλας: Dercitus dicit, commodos esse ad reddendum so-
 num. Officina hæc Concharum genera corrupto nomine Entale & Dentale appellam.

Entale &
Dentale.

Mituli.

Caput IIII.

Mituli laudatissimi in Ponto. Cremati eundem buccinis effectum præbent, pri-
 uatim plumbi more eloti, oculorum medicamentis cum melle utiles habentur, genarum crassitudines absumunt, albugines purgant, & cætera quæ oculis caliginem ofundunt, carnes eorum ad canis morsus utilissimè imponuntur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Myses. Myses à Theodoro uertuntur Mituli, sed quàm rectè, iudicare nondum audeo. Plautus tamen Myses in
 Rudente musculos uidetur appellare: & Cornelius Celsus inter ea quæ aluum mouent, salsamenta ponit
 Ostrea, Pelorides, Echinos, Musculos, & omnes ferè Conchulas. Equidem cum Græcis hominibus eos quos
 uulgò Veneti uocant Musculos, & Cuniculos ostenderem, dixerunt esse Mydia, hoc est, Musculos. Athenæ-
 us tradit sua etate Tellinas, & Romanis Mitulos nominatos fuisse.

Tellinæ.

Caput V.

Recentes tellinæ aluo utiles, sed maximè ius earum, salitæ uruntur, tritæq; in
 cinerem & cum cedria instillatæ, auulsos pilos renasci non patiuntur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

B Athenæus dicit Romanos sua etate Tellinam nominasse Mytilum. Marcellus, Dioscoridis interpret,
 Tellinas opinatur conchulas esse, quas memoria nostra Tellinas Romani uocant. Sed Aristophanes gram-
 maticus Tellinas patellis dicit similes esse, eisdemq; pueros pro cornibus uti solitos fuisse: à quibus longè di-
 uerse sole clarius uidentur eæ, quæ uulgo Tellinæ uocantur.

Chamæ.

Caput VI.

Chamarum conchularumq; in exigua aqua decoctarum ius, aluum ciet, id cum
 uino assumitur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Chamæ marine & uariæ & multiplices sunt, nam aliæ asperæ, aliæ leues: & hæc quidem digitorum cō-
 pressu confringuntur, illæ uerò uel ægerrimo saxo conteruntur. Quædam ipsarum nigræ sunt, nonnullæ
 argentei coloris: ac quemadmodum est earum uarium & multiplex genus, sic multas & diuersas sedes ha-
 bent. Quædam enim in littoribus dispersæ, iacent in arena, nonnullæ sub algam subijciuntur, aliæ in humo
 commorantur, aliæ in saxis & stabulantur, & præfulciuntur, &c.

Vnguis odoratus.

Caput VII.



Purpura.



Vnguis siue onyx conchiliæ re-
 gumentum est, ei simile quo
 purpura integitur, quod in Indiæ
 nardiferis lacubus inuenitur: sua-
 uem ideo spirans odorem, quod
 conchylia inibi nardi pabulo ue-
 scantur. Colligitur posteaquàm
 stagnantes aquæ æstiuis squallo-
 ribus inaruerunt. Laudatissimus
 qui à rubro mari defertur, candi-
 cans, pinguis. Babylonius nigre-
 scit, atq; minor cōspicitur. Ambo
 odoris

LIBER SECVNDVS.

odoris gratia suffiuntur. sed aliquatenus castoreum olent. idem suffitu excitant fœ-
minas uulvæ strangulatu oppressas, comitialesq; poti uentrem molliunt. Crema-
tum conchylum eadem efficit, quæ purpura & buccinum.


NOMINA ET EXPLICATIO.

Galenus unguem odoratum, qui hoc loco Dioscoridi ὄνυχ quoq; dicitur, Officinis uerò Arabica, aut certè
barbara uoce, Blattæ Byssantiæ, inter ostracæ ac testes purpurarum ac muricarum generatim comprehendit,
eorundem enim uim habet, & præterea suffitu ab utero strangulatas fœminas, & comitidi apprehensos
marbo excitat, quod tamen etiam de purpurarum testis Galenus in simp. pharm. tradit. Meminit eius ony-
chis Plinius quoq; 22. cap. 2. quum ait; Inuenio apud quosdam ostracium, quod aliqui onychem uocant, hoc
suffitum uulne panis mirè resistere.


Βλάττω & Βλάττω Βέζαντον, appellatur Actuario in aerea Alexandrina, diamargarito calido,
Vnguis odoratus uel ar omaticus, lib. 1. comp. pharm. part.

Cochleæ. Caput VIII.

Cochleæ terrestres.



Cochleæ marinæ.



Terrestres cochleæ stomacho utiles sunt. & non facillè corrumpuntur. Optimæ
Sardonicæ, Aphricanæ, Astypaleicæ, & quæ in Sicylia ac Chio gignuntur
& quæ in Liguria alpibus, pomatiæ, id est, operculares, cognominatæ. Marina
stomacho idonea, & facillè aluo excernitur. Fluuiatilis uirus olet: quæ uerò uepri-
bus fructisq; glutinata cohæret, quam uocant nonnulli scilicet, uentrem & stoma-
chum turbat, uomitiones excitat. Crematæ omnium testæ exalfaciendi & urendi

A

DIOSCORIDIS

Concha margaritifera.



naturam fortiuntur. purgant lepras, uertigines, dentesq; emendant oculorum cicatrices, & uitia cutis in facie, albugines, ac uisus hebetudines, si cum carne sua usq; tritaq; ex melle illinantur. crudæ cum tegumentis impositæ. aquæ inter cutem tumores exugunt. sed non antè soluantur, quàm omnis hauriatur humor. podagricas inflammationes leniunt. impactos corpori aculeos illitæ euocant. menses trita & admota ciunt. Carnes earum cum thure & myrrha illitæ, cum uulnera alia, tum maxime quæ nerui acceperunt, conglutinant. trita in aceto, sanguinem naribus erumpentem infrenant. uiuæ corpus, & præsertim Aphricanæ, cum aceto deuoratum, stomachi dolores mitigat. trita cum testa, uino & myrrha, si exiguum inde bibatur, colic uelicæq; cruciatus sanat. Terrestris pilos incommodos replicat, si quis abrafo ac lentore eius, pilum attingat.

NOMINA ET EXPLICATIO.

B

Duo cochlearum genera sunt. Aliæ namq; Aquatiles, quas Græci scombros, Latini turbines communè alio nomine uocant, quòd ex amplo in tenue deficiant in uertiginem tori. Aliæ sunt terrestres, quæ per hæmum terra delitescunt, uere prodeuntes, Græcè cochleæ & cochliæ appellantur, testa clauiculatim intorta: quæ ut domicilio utuntur, quo se exercentes, quoniã oculis carent, bina cornicula prætentandi iter causa protendunt, & si quid obstaculi sentiunt, resiliunt. Plinius libro nono ubi de crustatorum sanguine carentium genere agit: In eodem genere inquit, sunt cochleæ, aquatiles, terrestresq; exercentes se domicilio: binaq; ceu cornua protendentes contrahentesq; oculis carent, ideoq; corniculis prætentant iter. At uerò, ceu cornua, quoniam hæc non propriè cornua, sed similitudinariè tantum dicuntur. Nam, ut idem lib. 11. dicit, Cornua multis quidem & aquatiliū & marinorum & serpentium uarijs data sunt modis: sed quæ iure cornua intelligantur quadrupedi tantum generi.

Cochleæ Germanis, Schnecken. Gallis escargots, appellantur.

Limacæ marinas uulgo aquatiles cochleas Massilienses nuncupant, itemq; Cochlon Aristoteles animal testaceum aliud à limacæ tradit, quod Theodorus Umbilicum conuertit, forè hoc quod Officine ostendunt nomine umbilici marini, cuius pictura hæc est.

Umbilici marini.



Germanis faba marina à similitudine, id est, Meer bonen, appellatur. Petrus Gyllius scribit, se uidisse cochleam marinam, quæ ad eam magnitudinem accederet, ut tantum uim caperet, quantum piscator exicare uno prandio posset.

Cochleæ in cibo sumptæ alium mouent, autore Celso, boni succi & stomacho idoneæ. Paulus Aegnetæ tamen mali succi esse dicit, eius libro 1. uerba sunt hæc: Ius omnium quæ testis includuntur alium ducit: hanc ob causam terrestres quoq; cochleæ uentrem solum.

At uerò duræ carnis & coctæ difficilis sunt, quæ licet nutriet, mali tamen succi est, quapropter nonnulli ius cum garo & oleo condunt, atque sic uentrem subducunt. Item ethicis profum: pectori & pulmmoni, atque icteri auxiliares.

Cancr.

Caput IX.


Cancrorum



Cancrorum fluuiatilium exustorum cinis, qui duo **A**
 Cochlearia expleat, adiecto dimidio radicis gen-
 tianæ modo, triduo potus cum uino, magnoperè pro-
 dest canis rabiosi moribus. rimas pedum, sedisq;
 perniunculos, & carcinomata, cum decocto melle le-
 nit. triti crudi, potiù ex asinino lacte, auxiliantur con-
 tra serpentium phalangiorumq; morsus, atque scor-
 pionum ictus: decocti autem & cum iure esitati, ijs pro-
 sunt qui rabe conficiuntur, aut leporem marinum hau-
 serunt. necant scorpiones triti, & cum ocimo admo-
 ti. Possunt eadem marini, uerùm inefficacius omnia præstant.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Cancer ueris principio senectutem angulum modo exiunt, renouatione tergorum. His uita longa, pedes
 octoni omnibus in obliquum flexi. Fœmine primus pes duplex, mari simplex. Præterea bina brachia, denticu-
 Locusta marina. Cancer marinus.



B

latis forcipibus, superior pars in primoribus his mouetur, infe-
 riore immobili. Dextrum brachium omnibus maius. In pauore
 retrorsum pari uelocitate repunt. Autumno & Vere pingue-
 scunt, & plenilunio magis. Aristot. lib. 4. de histo. ani. caneros
 uidetur appellare eos tantum, quibus corpus rotundum est, cum
 locustis, squillisq; longum sit.

Cæterum cancri difficilis concoctionis sunt, cocti uerò affli-
 maticis & phibificis profunt: præstantq; ad isticia fouenda
 materiam, euacuata testâ, ipsorum carne ex cauda & chelis
 tusa: & per se quoq; mensis conueniunt, cocti ex uino & pipe-
 re, seu ex aqua, aceto & sale, aut ablata testâ in oleo butyro ue-


fricti in sartagine, & presertim parui aut teneri, qui senectutem iam primum exuerunt. Germanus, Meus-
 ser dicti.

Terrestris.

A

Terrestres scorpio.

Caput X.



Terrestres scorpio tritus & impositus, suæ plagæ remediū est, quin estur assatus, ad eadem.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Adrianus, libro uariæ historie, plura Scorpionum genera esse scriptum reliquit: album, fulvum, nigrum, sumi colore, viride, flammæum, quod omnium pessimum, uentrosum, caninicide, uolatile in India enim uolatiles Megasthenes esse prodiit, in uniuersum non coitu, sed humore ac calore concipiunt, singulis cauda sese complectentibus, nec oua, sed animal parium.

Syllius.

Oleum ex Scorpionibus paratum mirandarum uirium est, contra uenena omnia & pestilentia: de hoc oleo scribit Manardus se scire hominem hoc solo munitum, quantumuis se uam pestilentiam nihili facere, sed cum & seruos suos una secum uisentes pestilentia affectos, incolumes seruari: & sola unctione quosdam a se uisim uenenis potis liberatos. Duplici modo in officinis ex doctrina Mesue fieri solet. Prius ob scorpiones frigidum est: posterius ob aromata calidum & efficacius, non ob horum calorem & essentia tenuitatem (quibus aperit, incidit, tenuat, terget, perumpit) sed etiam totius substantia scorpionum proprietate, & ut loquuntur forma specifica, qua utrumque calculum renum & uesicæ frangit, illi tum tantum lumbis, si in renibus est: si uero in uesicæ, pubi, perinaeo, & injecta etiam tum pauca in meatum urinarium. Modum parandi docet Mesue & Nicolaus.

De Scorpione plura in sequentibus.

Marinus scorpio.

Caput XI.

Marini scorpionis fel conuenit ad suffusiones oculorum, albugines & hebetudines.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Cum Scorpio & Scorpæna eiusdem generis sint, multum tamen & colore & bonitate differunt. Nam Petrus Gillius, scorpio rufus & pelagus est, Scorpæna nigra & litoralis, & suauitate longè Scorpione inferior: quod ipsum non modò ex antiquorum conscriptione accepi, sed certè palati sapientia expertus sum. Iam porro non B nulla regiones Italiae utrumque Scorpionem appellant: & Græci à uero nomine aberrarunt, nam utrumque Scorpionem appellant: Massilienses ut nondum cessant rectè Scorpænam appellare, ita parum Massilicè Scorpionem Raffassam nominant. Secundum Pastinacam & Draconem nihil in mari uenenatius: etenim in dorso & brachijs bene acutos robustos habet aculeos, quos si Syponinus uidisset, non à similitudine terrestrium nomen duxisse scripisset, sed ex eo potius, quòd quemadmodum terrenorum aculei, sic horum perniciosi sunt, nuncupatos esse.

Draco marinus.

Caput XII.



Draco marinus dissectus & apertus impositus, & ictus spinæ suæ qua ferit, medela est.

NOMINA

LIBER SECVNDVS.
NOMINA ET EXPLICATIO.

Plinius lib. 12. Draconem à Dracunculo distinguit, huncq; dicti similem Graculo esse, atq; in branchijs ad caudam spectantes aculeos habere, eiusq; ictum uenenatum esse. Hunc Dracunculum Aristoteles & Oppianus uocant draconem, & similiter Plinius ipse, cum inquit libro 32. Draco marinus ad spina sue, qua ferri uenenum, impositus prodest: quod idem hoc loco testatur Dioscorides.

Ab Ephippo uocatur Dracenis: ipsum arbitror esse, quem Lignores, & Massilienses, & Plinius ipse alio loco Araneum uocat. Hac etate Græci Draconem, Scuti & Neapolitani, Tragum appellant, corrupte, quasi Dracenam. Secundum Pastinacam nihil in mari uenenatus: acutissimos in dorso habet aculeos, quos piscatores ab hac capto statim abscondunt. Aculeos quoq; in branchijs habet ad caudam spectantes. Iam porro cum qui ab Aristotele Araneus uocatur, multi Græci autores uenenatum esse tradunt: hunc uero omnes scriptores, atq; etatis nostræ piscatores cum à Pastinaca discesserunt, omnium marinorum uenentissimum esse asserunt, & c. plura apud Petrum Gyllium.

Scolopendra. Caput XIII.

Scolopendra in oleo decocta si illinatur, auellit capillos, sed contactu pruritus facit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Scolopendra marina, terrestri perquam similis est, quam primum ut homo contigerit, statim pruritu mordetur, & simili atque is qui ab urtica terrestri pungitur, doloris sensu afficitur. Scolopendre marinæ tactio piscatoribus quoq; infestissima est: postea enim quam hanc contigerit, nullus piscis ad hanc tam effica accedit, quod huius terro odore procul pellatur.

Scolopendra terrestris Germanis est, cuius Tossel, solum animalculum, sub lapidibus delitescens, multipes, ac uenenosum.

Torpedo piscis. Caput XIII.

Marina torpedo diuturnis capitis doloribus admota, cruciatus uehementiam mulcet. eadem apposita euerfam sedem prociuantemq; coarctet.

EXPLICATIO.

Torpedinis piscis plani & cartilaginei torporem manus sue tactione se periclitatum esse scribit Petrus Gyllius, nihil id dignum, nec tantopere sibi manum obtoruisse quam scriptores decantant, Torporemq; non modo letalem non esse, sed non ita multo post euanescere. Venerij, Ianuæ, Massiliæ, ac ubiq; putat gentium comedi. Massilienses Turpilliam corrupte uocant: Ligures, Tremorizant.

Viperæ. Caput XV.



Viperinæ carnes si coctæ edantur, claritatem oculis afferunt, neruorum uitij auxiliantur, increscentes firumas reprimunt. Ietracta autem cute, caput caudaq; quoniam carne uacant, amputari debent: quippe comentitium est, quod præcipitur, certam utrinq; mensuram præcidi oportere. reliquum uero corpus exemptis interaneis eorum dissectumq; discoquitur cum oleo, uino, salis exiguo, & anetho. Aium is qui uiperas escent, pediculos procreari, quod planè à ueritate abhorret. adijciunt aliqui longam senectutem agere, qui eo cibo uescuntur. Sal ex eis ad eadē conficitur, sed inefficacior est. uiua autem uipera in fictile nouum demittitur, adijciuntur salis caricumq; tritarum, singulatim quinq; sextarij, mellis cyathi sex: mox fictilis operculum luto oblinitur, & fornacibus inflatur, donec sal in carbones redigatur, qui postea tritus in pulueris faciem, reconditur. Plerunq; ut ori gratior fiat, ammiscetur nardi spica, aut folium, aut malabathri momentum.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græci Ophiæ. Latini uiperas. Itali Marassas. Germani Biantschlangen & Vncken appellant. apud quos tamen raro reperiuntur: caro earum siccata, ualenter digerit, mediocriter calfacit. Vis eius ad cutem proferat, & ad eam expellit corporis excrementa, à quibus in multum cacochymis ingens numerus pediculorum prouenit, ut Galenus testatur contra mentem Dioscoridis lib. 11. simpl. De his plura apud Iacobum Syllium hac tempestate medicum præclarissimum, in preparatione Theriacis.

Senecta

Senecta anguim. Caput XVI.

Senectus anguim in uino decocta dolori aurium, infusu, & dentium collutione, auxilio est. addunt eam in medicamenta oculorum, sed præcipuè uiperinam.



NOMINA ET EXPLICATIO.

Serpentis pellem Græci uocant senectam anguis. Plinius autem uernationem appellat, quod tempore ueris senectutem depellat, ac nouam induat pellem. Germanis, ein Schlangen balck.

Lepus. Caput XVII.



Lepus marinus loligini paruꝝ similis est. qui per sese tritus, aut cum urtica marina illitus, capillos euellit. Terrestris leporis inassarum cerebrum manditur, iuuandis tremoribus qui ualitudine contracti sunt. affricu aut cibo facilem infantibus dentitionem præstat. exustum caput & cum adipe ursino aut aceto illitum, alopeciarum inanitatibus medetur. Leporinum coagulum post triduum à concubitu porum, conceptum adimere, partusq; spem interceptare proditur. uulua & alui fluxorem sistit, comitiales iuuat. contra uenena ex aceto bibitur, præsertim aduersus coneretum lac, & uiperarum morsus. Sanguis eius si calidus illinatur, uitia cutis in facie, utiliginem, lentiginesq; sanat.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Lepus marinus in ceno gignitur, & sæpè unà cum Apicis capitur specie cochleæ, tegmine caudatæ cernitur. Magni maris lepus (nam qui in alio mari nascitur antè dixi) ex omni parte ad terreni similitudinem accedit, præter pilos: nam terrestris pili & molles sunt, & ad tactum haud quaquàm resistentes. Contra illius spinosi & erecti: hunc qui contigerit, læditur. sed de marino Lepore plura in sequentibus. Terrestris Leporis caro in cibus non parua laudis est etiam apud ueteres habita, ut Martialis distichon testatur:

Inter aues turdus, si quis me iudice ceret,

Inter quadrupedes gloria prima Lepus.

Leporum tria genera ferè sunt, ut tradit Varro lib. de Re rust. 3. Vnum pedibus primis humilibus, posterioribus altis superiore parte pulca, uentre albo, auribus longis. Qui Latinis lepus, Germanis, Ein Hasz. Gallicis ung lieure, dicitur. Alterius generis sunt, qui hoc ferè mutant, quod toti candidi sunt. Tertijs generis est, quod in Hispania nascitur, simile lepori ex quadam parte, sed humile, quod Latini Cuniculum, Germanis, Ein Runglin. Galli ung conin appellant. Lucius Belius putabat ab eo dictum leporem à celeritudine, quod leuipes esset. Ego arbitror à Græco uocabulo antiquo, quod cum Aëoles Bæotij leporem appellabant. Cuniculi dicti ab eo, quod sub terra cuniculos ipsi facere soleant, ubi lateant in agris. Martialis:

Gaudet in effosis habitare cuniculus antris,

Monstrauit tacitas hostibus ille uias.

De leporibus plura Plin. lib. 8. Leporum caro crassi succi est, sed in hoc à bobus & ouibus uincitur, autore Paulo Aegmeta. Verum quæ cuniculorum est, melius & facilius alit. Hippocrates ait: Caro leporina siccatur, sistitq; sed lotium mouet. Celsus leporem in media materia numerari debere dicit, & boni succi esse, aluum adstringere, & urinam mouere.

Coagulum quod Germani Lyp & Fess lyp uocant, uiscerum pars est, quæ ad densandum lac utitur, substantia & mucilago quædam superflua lacti coagulato quodammodo similis in uentribus, & certis animalium uescijs genita & appensa. habent autem ungula omnia ruminantia, & inter dentata utring; lepus. Quod uetustius coagulum est, eò præstantius. Tale profluuio alui mederi præcipuè potest, &c. Plin. uerò libro 11. cap. 41. Dasi podis coagulo hoc tantum asserit, inquiens: Coagulum inutile leporis, hoc di laudatum, præcipuè tamen dasi podis, quod & profluuio alij medetur, unius utring; dentatorum.

Pastinaca marina. Caput XVIII.

Marinæ pastinacæ radius, qui eius cauda enatus aduersis squammis reflectitur, dentium dolorem mitigat: nam eos frangit & euocat.

NOMINA



NOMINA ET EXPLICATIO.

Pastinaca piscis planus cartilagineus, radium digiti, interdum semipedis longitudine, ad similitudinem ser-
re dentatum, dentibus reflexis, in cauda habet: quo nihil usquam pestilentius mare generat. Ligures uocant
Ferrasum: Massilienses Glorinum: Siculi Bastonacem corrupte, quasi Pastinacem: detracto radio in lito-
re Ligustico ac Gallico comeditur. Alias Germanis uocatur eui Roch.

Sepia.


Caput XIX.

Sepia cocta dum estur atramentum, agre concoquitur, alium molle colligis &
testa factis conuenienter genarum scabritia perficitur, ustum in sua testa do-
nec id quod crustosum est abscedat, postea tritum expurgat uiliginis, furfures,
dentes, & uicia cutis in facie, elotum in medicamenta oculorum addi solet, contra al-
bugines, oculis iumentorum efficaciter inspiratur, pterygia oculorum absunt,
cum sale tritum & iniectum.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Sepia e piscium sanguine carentiam & mollium genere est, eiusdem similitudinis cum loligne, octonis pe-
dibus, solidum intus quoddam insertum continens, quod Sepium uocant. Sepiarum generis mares, ut Plinius
scribit, uarij & nigriores, constanti & maioris: percussa tridente foemina auxiliantur, at foemina isto ma-
re fugit. Ambo autem ubi sentire se apprehendi, effuso atramento, quod pro sanguine his est, infusata aqua
absconduntur, quod & Oppianus testatur Halieuticon lib. 3. cum ait:

Sepia.



Quin & natius fecunda est Sepia fraude.
Est liquor in tumida concretus turbidus aluo.
Qui fiscus picem superat caligine massam:
Conditus hic humor nutritur corpore, presens
Auxilium misce, subita formidine capta
Atras emittit guttas, & polluit aquor,
Obscuratq; uias ponti tenebroso cruore
Permixto sanies piscantis lumina turbans,
Auertit usum, & prospectum surripit omnem.
Hec facili cursu per timidas æquoris undas,
Effugit horrendos pisces, hominemq; sagacem,
Loligo atq; alij, qui findunt æra pisces,
Tales inuicem artes: non est liquor ater:
Illi purpureos potius de corpore fundunt
Humores: sed fraude pares astuq; putantur.

Ceterum Sepie atramentum, auctore Celso, uentrem mouet. Ipsa elixa sepia mollis est & suavis, & facilè
concoquitur, & bonam alium facit. Succus uero ipsius sanguinem extenuat & mouet per hæmorrhoidas, ut
auctor est Diphilus, referente Massario. Paulus tamen Acqua difficilis coctionis esse tradit, inquiens: Mol-
les pisces, ut polypi, sepie, lolignes duri sunt, coctioniq; renitentur, presertim polypi, atq; salum quodammodo
habent humorem. Si uero coctione uincantur, nam parum alimenti corpori præbent. Sepiam aliqui uocant
em Blacisch.

DIOSCORIDIS

A

Falcomarinus.



Est & aliud marini piscis genus, à similitudine, falco marinus, Germanice, Meer oder Seefalch / nominatum, consimile testudini, aculeatum quasi scutum tergore gerens, in uentre fuluum. alas una cum capite rubras habet, rostro ceruleo. uenter una cum cruribus pallide rubens. In tantam excrescit magnitudinem, ut duo homines terra uix attollere possint. Supine iacens egrè confurgit. Et natat, & uolat de super aqua.

Mullus piscis. Cap. XX.

Mullorum assiduo cibo aciem oculorum hebetari constat. Is marini draconis, aranei, ac scorpionis moribus medetur, si crudus atq; dissectus admoveatur.



NOMINA ET EXPLICATIO.

Mullus piscis est magnitudine modica, gemina barba inferiore labro insignitus, à qua uulgo barbum, & M. Varro Rei Rustice lib. ultimo ad finem, barbatus mullum, & Greci gneatida. quod uerò ter pariat in anno, Triglen uocant. Olim etiam in precio habitus. De quo plura apud Plinium in libro 9. & 31. cap. 8. Is etsi piscis est, haud

quaquam in uulgo ignotus, tamen in sermone Latino ignotius esset nihil, nisi Ausonius suo carminis, quod Mosellam inscripsit, illustrasset:

Tuq; per obliqui fauces uexate Sarai,
Qua bis terna fremunt scopulosis ostia pilis,
Cum defluxisti fame maioris in amnem
Liberior, laxos exerceas Barbe natatus.
Tu melior peiore euo: tibi contigit omni
Spirantum ex numero non ilaudata senectus.

B

Hippopotamus.

Caput XXI.

Hippopotami testes exiecati ac triti, contra serpentium morsus bibuntur.

Hippopotami, qui & Hippocampi quibusdam dicuntur. Capite & collo equino, & rostro oblongo sunt, ab eo umq; fronte tanquam equorum coma propendit, & eo loco quo equi iubam habent, pilis diffusiuntur. cauda draconis speciem similitudinemq; gerit.

Ligures & Massilienses uocant Caballos marinos.

Fiber.

Caput XXII:

Fiber ancipitis uitæ animal, plerumq; cum piscibus & cancri ex aqua uictum capessit. Huius testes serpentium uenenis aduersantur, sternura menta mouent, & in uniuersum uarios obtinent usus. siquidem menses ac partus ciunt, duabus draconibus cum pulgione poti. partus secundasq; eijciunt. contra inflationes, tormina, singultus, uenena, ixiamaq; ex aceto bibuntur. lethargicos, & utcumq; uetero obdormiscentes excitant infusi. cum aceto autem & rosaceo, olfactu & odoris suffitu, idem faciunt. poti & illiti profuit tremulis, conuulsionibus, & omnibus neruorum uitijis. in summa, calfactoriam uim habent. Eligi debent testes qui ex uno ortu con-

Fiber.

Lutra.



flexi sunt (feri enim non potest, ut gemini folliculi in una membrana coniuncti reperiuntur) liquore intus ueluti ceroso, odore graui, & uirus redolente, gustu acris, mordente, ac friabili, naturalibus tunicis circumdato. Quem fraude aliqui corrumpunt, conijcientes in follem gummi, aut ammoniacum cum sanguine & castorio subactum, & ita exiccantes. Vanum est quod traditur, testes ab ipsis tuelli, & à sese abijci, cum uenatu

denatu urgentur: siquidem tangi nequeunt, ita, ut in sue, substricti. Operæ autem A precium est, diuisa pelle melleum liquorem cum euescente tunica assumere, & siccatum potui dare.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Testes Castoris, seu castorium, calfacit, siccat, est tenuium ualde partium, coquit dispositiones cōsummacō & scitofas. Eligendi qui ex uno principio committuntur, & quibus est intus liquor cerofus, friabilis, odore gravis & uirus olente, gustu acri & mordaci. Ex quibus duobus suspicari possumus, substantia nobis esse aduersissimos, nalli autem uel admotum uel sumptum est perniciosum castoreum. Pontici Castores sunt præstantissimi, quod & Virgilius meminit lib. 7. Georg.

Nec inepti qui ad Matronam, uulgo la Merne, Gallie fluuium, crebro capiuntur, mirabili spectaculo animalia, cauda piscosa, soleæ & mula, pilo supernè canino, alibi lutæ, pedibus anterioribus anseris, sed uncais, simia posterioribus, auribus minimis, rotundis, dente ualidißimo, adusco, præ longo, seta oris cornes, architectura in fossa sua mirabili.

Castoreum nigrum, fetidum, rancidum, die uno necare affirmat Auicenna. Castoreum & Perside ferre ad nos deferitur: Juncum enim tanta ui odoris est præditum, ut olfacienti uesciam castorei, sanguinem & naribus eliciat. Seruatur annis decem.

Germanis, Em Byber. Gallis Biare. Fiber metabesi dictum.

Latre animalis fibro similis testis idem pollere addit Hermol.

Mustela.

Caput XXIII.

Mustela quæ in domibus nostris oberrat, ambusta exenteratur, & inueterata sale, in umbra siccatur. Ea binis drachmis cum uino pota aduersus omnia serpentium uenena præsentaneo est remedio toxico, simili sumpta modo, resistit. eius uenterculus coriandro factus inueteratusque, percussis à serpente, & comitialibus potu auxiliatur. cremata in fictili podagricis confert, cinere ex aceto illito, sanguine peruncta strumæ iuuantur, comitialibus etiam prodest.

Wisel.

Htis.

Mardes.

B



Mustela nomen πολύσμερον est, quæ πολυσκέλα magni nominis uiros decepit. Plinius appellatione Mustele, & Galen. istida completitur. Nam quod Aristoteles scribit, ἡ γὰρ ἰστίδα ὅταν ὀρεῖται καὶ τὸ πρὸς τὸν ὄρον, hoc Plinius penè ad uerbum transtulit, cum ait: Mustella cum serpentibus dimicatura, tantum ore gerit. & lib. 29. cap. 4. quas Aristoteles istidas uocauit, has ipse quoque Mustellas uocat. Ita enim scribit: Mustellarum duo genera, alterum syluestre, distans magnitudine. Greci uocant istidas. Ex his locis iam citatis, satis liquet Mustellam esse Plinio generale nomen, & Latini Mustellam dici animal, quod Grecis γάλα & γάλας dicitur. Mustellas uero illas quas Greci γάλας uocant, opinor à uulgo appellari Vuisellas, Herminas, seu Hermellas. Galli penè eodem nomine dicunt Herminas, Vuisellas autem fouinos appellant seu Marturellos, à quibus etiam Frette intra Galas ponuntur. Nam Frette sunt opinor illa animalia, quæ Galli Farones uocant, & Latini uiueras. Pueri uiueris utuntur ad extrahendas de parietum nidis auiculas. Immittuntur & in caua arborum, & inde auiculas unguibus referunt. Præterea in uenatione cuniculorum utitur Viueris, ut Plinius refert, qui ita scribit: Magna propter uenatum corum Viueris gratia est, immituntur eis in specus, qui sunt multiformes in terra. Vnde & nomen animalis, scilicet cuniculo. Gale igitur genus esse constat. Vuisella, Hermella, & Viueria Galorum species, sed Vuiselle sunt domesticæ Gale, Hermelle uerò & uiueræ syluestres. Cæterum istidum duo genera sunt: alterum Galli pariter Germanis uocant Mardam, alterum genus Germani Htis dicunt, uoce nō fallor à Greco nomine deriuatā, Htis, conuerso e, in I. fit Htis, & Galli hoc genus uulgari lingua uocant ung putois, quod uidelicet hoc animal puteat. Quod uerò Mustella nomen tam latè pateat, ex etymologia uocabuli accidisse puto. Nam apparet Mustellam esse nomen cōpositum ex nomine Mūs, id est, mus, & ἰστίδα inde ἰστίδα, id est, surripio, ut dicatur mustella, quasi murium fur, seu raptor. Germanicè, ein Meusdieb. Mustella quoque uocatur auis quæ mures uenatur, & mustella piscis est, quem Greci γάλας, uulgo Lampetram & Lampredam corruptè uocant, quia perinde, atque gale serpentes persequitur, ita & galei piscis ueneratūm piscem Patinacā dictū persequitur. Et

Carolus Figulus.

Hermella.

A quidam recentiores viri, citra controuersiam doctissimi, mustellam pro sele usurpant, inter quos est Marcellus Virgilius, Dioscoridis interpres et commentator, is enim scribens in caput presens, satis indicat se per Mustellam domesticam, intelligere feles seu catts, cum totum hoc caput non ποδὶ τῆς αἰλῶνος, ἀλλὰ ποδὶ τοῦ γαλῆος, intelligi debeat. Quod autem Virgilius Marcellus Mustellam et selem promiscue usurpauit, indicio esse poterunt ipsius annotationes in caput de lychnide. Nam inibi multa narrat de felibus, et postea addit se de felibus copiosius scripsisse in hoc secundo uolumine, presenti capite, ubi de Mustellis agitur. Idem in capite de Ruta uertit, ut debuit, αἰλῶνος, feles. At Aristoteles ait, Acluros et galas esse diuersi generis animantia. hic uero tam fœdus error ex eo manauit, quod plerique arbitrati fuerint γαλῶς esse feles seu catts, et cum legebam presens caput in Dioscoride de domestica Mustella, imaginabantur esse selem siue cattum. Et Erasimus multis in locis γαλῶν uertit selem, utpote in prouerbio: γαλῶν τὰς φωνὰς, id est, feles Tartarica. Et in prouerbio: γαλῶν κροκῶν. Feli crocoton. Ipse tamen ingenuè fatetur, se dubitare an rectè uerterit. Verba Erasmi sunt hæc in prouerbio suprâ citato. Porro uox hæc γαλῶν, selemne significet an Mustellâ, an quem uulgo cattum appellant, quoniam inter eruditos controuersum est, relinquo alijs iudicandû. Hic Erasimus uidetur innuere aliud esse selem, aliud esse Mustellam, et aliud esse cattû, et sequitur fortasse hæc in re Colymbellam, cui felis est bellua illa quam suprâ diximus Fouinum appellari, mustellam autem forsitan caput pro istide. Nec dubium est, quin felis sit animal quod Greci αἰλῶνος, et quod uulgo ab astru, cattum nominant, et c. Sit igitur cattum post hæc, Galem et istida esse mustellam, et alurum esse selem seu cattum, uulgo ein Meuser/oder Rag.

Rana.

Caput XXIII.

Contra omnium serpentium uenena pro antidoto sunt ranæ, si ex sale & oleo decoctæ edantur, iusq; earum itidem sorbeatur contra inueteratos tendinum rigores pollent. illitus earum cinis, profluentis sanguinis impetus sistit. explendis alopeciarum inanitatibus ex liquida pice illinitur. uiridium ranarum cruor auulsos genis pilos renasci prohibet, in uestigia euulforum instillatus. decoctæ in aceto & aqua, dentium dolores collutione leniunt.

Rana.

Bufo.

**B**

NOMINA ET EXPLICATIO.

Ranarum plura genera: alia est rana que dicitur phrynos, hoc est rubra; perniciofa item chersidros, cunctarum grandissima. Bufo quibusdam dicta, Germanis ein Kröte et pogg. Apocynon quoque dicunt, quod canem impetus cohibeat: aliud genus dictum Calamites. Est et palustris rana, dicta elobatrachon Grecis. Germanis, ein Frosch. Gallis ueraine, et une grenouille. Aristoteles, ranas omnes telmaticos dicit, aut hynæos.

Hodie passim ex ranis palustribus oleum parant officine. Podagrae calenti admovent quidam, sed nullo fructu. Neq; enim frigidas in eo magna esse potest a ranarum capitibus, coquendo coctione tam longa, et ea in oleo esamino, alteratis. Rectius meo iudicio rana uirides in syluis crebre, unguibus reptantes in altissimas quasq; arbores, et sub noctem brexantes (uox enim earum unica est, brex) oleo uiolato, uel omphacino, ad hos usus incoquerentur. Quas manibus uiuas hodie ex more tenent ad refrigerium febre acuta aliqui ad dentes, croisser Gallis. Germanis, Laubfrosch dictas, quarum meminisse uidetur Galenus lib. 10. simpl.

Silurus.

Caput XXV.



Silurus recens in cibo nutrit, & facilem præbet aluum. sale uerò conditus, minimum suppeditat alimentum. arteriam expurgat, & uocem expedit. illicita saliti caro, aculeos & infixæ corpori spicula extrahit. muria eius incipientibus dysenterijs prodest, si in defidentium fatus adijciatur: fluxiones siquidem ad summa cati elicet. ischia diuis infusa medetur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Silurus piscis in fluminibus, priuatimq; in Nylothynnos, in mari præcipua magnitudine æquans. Hunc quidam Sturionem, Germanis, ein Stör, dictum esse putant, sed falsò. Silurus enim maleficus et dentatus est: cum sturio neq; dentatus neq; maleficus sit. Plin. lib. 9. ait: Silurus grassatur ubicunq; est, omne animal appetens, equos innatantes sæpe demergens, præcipue in Mæno Germaniæ anne prope Lisboun. in cibo alius mollit silurus è iure eodem Plinio autore lib. 32. Mem cum ceteri omnes mares suis foeminis sunt præstantiores, Silurus foemina præstat suo mari.

Smarides.

Smarides. Caput XXVI.

A

Smaridis piscis caput exustum, excrecentes ulcerum oras puluillosq; reprimat. nomas cohibet. thymos clauosq; absumit. caro non secus atq; balsamentū prodest à scorpione percussis, aut à cane demorsis.

EXPLICATIO.

Vide annotationes nostras ex Petro Gyllio, in cap. 27. proxime sequens.

Mæna. Caput XXVII.

Mænarum ex capitibus cinis si illinatur, callosas sedis rimas abolet. eius etiam garum oris putrilagine collutione sedat.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Mæna pisciculus, hyberno tempore candidus, æstiuo cerulea uarietate pictus. Lignres Mænulum, Mafsilienfes Medolam uocant, neq; modò speciei uerumetiam generis nomen esse ex eo conijcio, quòd uarium & multiplex est earum genus, aliæ in utroq; latere nigram maculam orbiculatam habent, quas ij qui Adriaticum sinum accoliunt, uulgo Mænas Selanas appellant: aliæ Leucomandes, hoc est, albæ Mæne, à Græcis Smaridas uocant. Mafsilienfes, Gerres: Neopolitani Cerres, per e. quos Theodorus secutus Smarides cerros uidetur conuertisse, non Gerres, de quibus Martialis, ueluti uilibus piscibus, ita ait:

Alce.



Fuisse Gerres, aut uitiles Mænas. Theodorus Mænidæ, in Aristotele Mænas & Aleces, & Mænidæ, id est, Mænas paruas Aleculas appellat, ut Alecula nomen generis sit, hoc idem Latine significans, quod Græcè, ut Hermolaus putat, Anthracides, hoc est, pisces qui succensis carbonibus commode coqui possunt, cuiusmodi sunt Smarides & Mæne: Equidem ipse generatim pisciculos ignobiles significari, ex Columella arbitror, qui Aleculas riuales pisciculos ignobiles uocauit, atq; alios pisces sale exesos, Areneos nuncupatos, Thrysis similes: itemq; sunt Mæne Boopes appellatæ, quas Græci adhuc rectè Boopæ uocant. Lignres & Mafsilienfes, Bogas corruptè nominant.

Gobius. Caput XXVIII.

B

Gobius recens in suillum uentrem coniectus, si consuta rima in duodecim aquæ sextarijs, donec duo super sint, decoquatur, excolatus & sub diuo refrigeratus, potui datur, alius sine molestia dēscitur: illitus contra serpentium canumq; morsus auxilio est.

Gobiorum multiplex est genus: alij palustres, alij saxatiles, uulgo Goace uocati, quos Cothonas, sicut Nicander inquit, Siculi appellant: quosdam alios Gobioni saxatili propemodum similes, Aristoteles Cortos nominat, quos adhuc nonnulli Coranos nuncupant.

Thunnus. Caput XXIX.

Conditanei thunni caro, quam omotarichon uocant, sumpta ijs auxiliatur, quos uipera, nomine prester, momorderit. sed oportet uinum quàm plurimum subinde cogantur haurire, ita ut uomitione reddatur. contra acrimonias esitatorum maxime ualeat. canum moribus utilissimè illinitur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Thynni pelamidum generis esse uidentur, nam ut Aristoteles lib. 6. de Historia animalium ait, Limarijs Thynni prociore ætate, anno esse putantur uno. Et Plinius lib. 9. Pelamides, inquit, cum annum excessere tempus, Thynni uocantur, quod falsum esse, nec ex Pelamidibus unquam fieri Thynnos, sibi piscatores Lignres & Mafsilienfes aperte ostendisse scribit Petrus Gyllius, harum rerum peritissimus, quarum rationes in aliud tempus reijcit, lib. de Gallicis nominibus piscium. Est item thynnorum generis, qui uocatur pompylus, tunc Mafsilienfes piscatores haud ignorantes, corruptè Pampalum uocant.

Garum. Caput XXX.

Garum omne, quod ex piscibus carnibusq; sale maceratis liquamen est, si ex eo foras fiat, depascentia ulcera sistit. morbis à cane medetur. dysentericis atque ischiadicis infunditur: nonnullis, ut exulcerata adurat: alijs autem, ad laceffenda quæ ulcera non senserunt.

A

NOMINA ET EXPLICATIO.

Gari confectio. Quid sit garus siue garū, docet nos Plinius naturalis historie lib. 8. cap. 7. ubi inquit: Aliud etiam illi-
quoris exquisiti genus est, quod garon uocauere, quæ intestinis piscium ceterisque abijcienda essent, sale ma-
ceratis, ut sit illa putrescentium sanies. Hoc olim conficiebatur ex pisce, quem Græci garon uocabant. Nunc
scombro pisce laudatissimam in finibus Carthaginis, Spartariæ & Ceterijs, sociorum appellatur. Nec liquor
ullus penè præter unguenta maiore in precio esse cepit, nobilitatis etiam gentibus: fiebat etiam ex alijs pi-
scibus, ut plura apud Plinium loco iam citato. Sum item qui coctorum piscium ius garum uocant, & ita, ut in
uetusso quodam manuscripto codice, sed ineerto autore, reperi, confici præcipitur. Confectio gari: Sane pi-
sces minores salsos, aut si salsi non fuerint, saliantur parco sale, & mitte ex illis sextarium unum, & de bo-
no uino sextarios tres, & coque in æreo uase, usque dum due partes consumantur, & tertia remaneat, tum
cola per saccum usque ad claritatem, & refrigeratum mitte in uitream ampullam, & utere. Ceterum ex silu-
ro pisce aliquando etiam fieri solitum, testatum reliquit Celsus Aurelianus medicus, Chronicæ, siue tardari-
passionum lib. 2. cap. 1. de paralyti, cum ait: Garum quod appellamus liquamen ex pisce siluro confectum. Deo-
rum quæ muis liquaminis uocabulo garum intelligit Apicius, Latino tamen nomine aliquando caruisse testis
est Ausonius in epistola ad Paulinum, his uerbis: Scis autem me ad nomen murie, quod in usu uulgæ est, nec
solere, nec posse dicere, cum scientissimi ueterum, & Græca uocabula fassidientes, Latinum in gari appella-
tione non habcant, sed quocumque nomine loquar, liquor iste sociorum appellatur. Quod reliquum est, non
modò ex piscibus, & eorum exis, sed ex animalibus salsis fiebat garum, liquor scilicet ex salsura eorum exu-
datis fluens, & aque modo supernatans, ut hoc loco Dioscorides tradit. Differt autem ab Alece garum, quod
alex imperfecta nec colat a se est. Horatius: Quo sece primus & alex.

Halme. Differt item ab Halme, id est, muria: quod garum sanies intestinorum piscium est: Halme uero muries &
salsugo piscium inueteratorum, hoc est, ius salsum, in quo seruantur, Germanis Lac dictum. M. cmmut utri-
usque, Martialis, murie quidem hoc disticho:

Antipolitani, fæcor, sum filia Thymini,
Essen si Scombri, non tibi missa forem.

Gari uero sociorum hoc altero:

Expirantis adhuc Scombri de sanguine primo

Accipe serosum munera chara garum.

B

Ius piscium. Caput XXXI.

Recentium piscium ius, modò per se, modò ex uino potum, aluum subducit,
priuatim ad hunc usum conficitur è phycidibus & scorpionibus, & iulide, è
percis, & recentibus alijs saxatilibus, nec uirus respicientibus, simpliciter cum aqua,
oleo & anetho.

Zomos, id est, piscium ius, conficitur apud Paulum lib. 7. ex his qui testacea cute integuntur, tellinis, hia-
tulis, & conchulis, ius quoque ueteris galli (apud eundem) cum sale diutissime excocti, uentrem subducit, è con-
trario gallinæ ius comprimit.

Cimices lectularij. Caput XXXII.

Cimices, qui in cubilibus enascuntur, cauis fabarum inclusi, si ante februm si-
gnificationes septeni deuorentur, quartanis auxilio sunt, & citra fabas sum-
pti, percussis ab aspide profunt. uuluarum exanimationes olfactu reuocant. poti-
um uino aut a ceto, adherentes sanguifugas abigunt. triti & urinariæ fistulæ impo-
siti, urinæ angustias leuant.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Cimices Germanis Wanzen. Gallis à tetro odore, punaises dicuntur, foedissimum animal, hostis noctur-
nus, nam in lectis quietem dormituri adimit, & putridum odorem ingenerat tangentibus cum. Esti tamen foe-
dissimum animal sit, non tamen ui medica caret, ut apud Plin. lib. 29. cap. 4. traditur.

Millepeda. Caput XXXIII.



Millepeda, quæ sub aquario uase stabulantur, animalia sunt mul-
tis pedibus nitentia, quæ contacta manu contrahuntur in or-
bem, hæc ex uino potæ difficili urinæ, & regio morbo auxiliatur. mil-
lepedas illini anginis cum melle utilissimum, trita, & in cortice mali
punicæ

punici calfactæ, doloribus aurium, addito rosa ceo, conuenienter instillantur. A

NOMINA ET EXPLICATIO.

Animalia que Grecis *ὄντες*, & *ἰνκνός*, & *πρόδ' ὄντες*, hoc est, aselli, & Latinis millepede ac multi-
peda, Germanis *Esel*, appellantur, satis nota sunt, ut que non solum sub hydryis & aquariis uasis, uelut hic
ait, nascuntur, sed ubiq; in locis humectis, uelut cellariorum parietibus & fenestris, pluuia aut tempestate ma-
defactis proueniunt, itemq; in sterquilinijs generantur, & ad contactum mares se in globum contrahunt, co-
loris alias fusci & ad gryseum declinantes, Dioscorides etiam hoc loco *καυκνοῦ δ' αἶμα* appellat, Galenus
καυκνός, id est, fabas a similitudine Asianas uocari dicit. Marcellus uero Cutiones, ob cutis, ut uidetur, duri-
tiam & soliditatem, cap. 8. & 9. nominat. Et Plinius 29. cap. ult. Millepeda, ab alijs centipeda aut multi-
peda dicta, animal est uermibus terre, pilosum, multis pedibus armatum, repens, tactuq; contrahens se, omi-
scum Greci uocant, alij tilon. Quare manifestarium incurritur errorē, qui *ὄντες* uermes terrenos esse cra-
dunt, quod hi in Italia Nisculi, quasi corrupta ex Græca uoce, uulgo appellantur, quum uermes terreni longē
alia animalia sint, &c. de his plura infra cap. 59.

Blatta pistrinaria. Caput XXXIII.



Blattæ eius quæ in pistrinis inuenitur, interanea trita aut cū
oleo decocta, aurium dolores instillatu mitigant.

Plin. lib. 29. cap. ult. blattarū tria genera facit, his uerbis: Hoc quoq; animal inter
pudēda est, inquit, sed propter admirationem nature, priscorumq; curæ, totum in hoc
loco explicandum. Plura earum genera ferunt. Molles quas in oleo decoctas, uerrucis ef-
ficaciter illini experti sunt. Alterum genus Mylocion appellauere, circa molas frere na-
scens. Has capite detracto attritas, lepras sanasse, Musa & Picton in exemplis reliquerunt. Tertium genus
& odoris tædio inuisum, ex acuta clune, cum piscalco sanare ulcera alijs insanabilia, &c. Germani, *Gryl-
len* & *Reymichen*, appellant.

Pulmones. Caput XXXV.



Podagras pernionesq; emendat pulmo marinus recens tri-
tus & illitus. Suillus & agninus urinusq; pulmo impositu,
attritus a calcementis contractos, ab inflammatione tuerur.
Vulpinus uero si arefactus bibatur, suspiriosos adiunat, adeps
quoq; liquefactus, infususq; auris dolorem finit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Pulmones marini sua sponte nascuntur, cūm natant, Cirros ex imo, more polypi, emittunt: quod autem
speciem quandam mulieris uulue representant, tota iccirco Italia eos turpibus nominibus appellat, ut nulla
ratione crispis honestè mandari queant. Ligures nominant, Capellos marinos: Massilienses, Carneos pile-
os: cum iacent omaso similes sunt: cūm criguntur, pulmones uidentur: Adcō omnino lucidi & uitrei sunt,
ut sine sectione interiora omnia uidere possis: ac quamuis fluctibus in litus expulsi, nullo negotio capiuntur:
tamen cū non sine esculentis, a prætereuntibus præclarè contemuntur.

Pulmonem uulpis siccatum potumq; asthmaticis Galenus, phthisicis uero ob eandem totius substantiæ fa-
miliaritatem salsum, omnes propè practici inculcant.

Genitale cerui. Caput XXXVI.



Genitale cerui tritum & in uino potum, à uipera demorsis au-
xiliatur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Cerui genitale, Asininum uerur, ungula asini, lichenes equorum (Germanicè, *Dee
Famp*) ungule caprarum, iecur caprinum, apri, canis rabiosi, ueteres solea uetera-
mentariorum, nota omnia nulla explicatione opus habent.

Ungula asini. Cap. XXXVII.



Ungularum asini cinis per dies multos binis
cochlearibus potus, proditur comitiales ad-
iuuare. eadem oleo subactæ strumas discutunt, &
illitæ pernionibus medentur. Caprarum ci-
nere perunctæ ex aceto alopecie sanantur.

DIOSCORIDIS

Lichenescquorum. Caput XXXVIII.

πικτ' ἐπιγνα-
φω, non ἐπι-
γνωφω.



Lichenes sunt in equorū genibus, & * super ungulas in flexu hū-
rum partium indurati calli. qui triti & in aceto poti, comitiali-
bus mederi traduntur.

locinera.

Caput XXXIX.



A Sini iecur inassatum esu comitialibus prodest. ueruntamen
ieiunis edendum præcipitur. Capræ uerò inassati decidua
sanie, inungi lusciosos prodest, & dū coquitur, apertos oculos ha-
litu eius uaporari. prodest in cibo tostum ad eadem. Tradunt hirci-
ni iecinoris cibo comitiales deprehendi.

Aprinum recens si arefactum teratur, ex uino potum contra serpentium uolu-
crumq; morsus auxilio est. Iecur canis, qui rabie exagitur, tostum & in cibo ab
emorsis sumptum, ne tententur metu aquæ tueri creditur. Utuntur autem ad arcen-
dos aquæ pauores dente eo, qui caninus dicitur. hunc à canē qui momordit exem-
ptum, & folliculo inditum, pro amuleto brachio adnectunt. Inueteratum autem sa-
le mergi iecur, ex hydromelite binis ligulis potum secundas pellit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Caput extorum iecur est. dextra in parte situm. Aegrè concoquitur, crassos generat humores, appetenti-
am tollit, lactentium tamen locinera minus insalubria putantur, & adhuc minus gallinacea & anserina, ana-
tumq; & porcina. Paulus Aegnetæ: Cor & iecur crassi succi sunt, coctu difficilia, & tardè transmittuntur.
Sed suillum iecur bonitate cæteris præstat. Celsus tamen libro secundo, omne iecur boni succi esse dicit.

Iecur lupi in medicamentum ex capatorio hepaticum sæpe indidi, nec multò efficacius ob id compertum. He-
paticos tamen ipsum tota substantia iuuare, sufficientem se habere experientiam scribit libro octauo compo-
pharma. part. Gale. Pulcrem quoq; ex eo in hydropse cum uino albo in dies aliquot manè potum, inter secre-
ta quædam remedia reponunt nonnulli. Hepar tamen uulpis aridum ex oxymelite potum, splenicis imponit Ar-
chigenes apud Galenum lib. 9. compo. pharma. part. Hepati calido sicco salubre existimo hepar raiæ, ciithæ
Bri, id est, rouffete, & hepatis id est, aquile maris, & si quæ sunt alia in piscibus similia.

Coria ueteramentaria.

Caput XL.

Veteris corij cremati illitus cinis ambusta igni, intertrigines, necnon calceame-
torum attritus sanat.

Gallinæ.

Caput XLI.

Gallus.

Gallina.

Caput.



Difsectæ gallinæ, & adhuc calentes appositæ, serpentium moribus auxiliantur.
sed idem tamen alias sufficere oportet. Earum cerebellum in uino bibendum
datur contra serpentium morsus. sanguinem à cerebri membrana profluentem si-
stet. Quæ interiore uentriculi galli sinu residet membrana, secti in laminas cornus
specie similis (ea uerò inter coquendum abijci solet) siccat, tritaq; in uino conue-
nientissimè stomachicis datur in potu. Ius è uetere gallinaceo aluum detrahit. abie-
ctis itaq; interaneis salem coniici oportet, & consuto uentre decoqui in uiginti sex-
taris aquæ, donec ad tres heminas redigantur. totum id refrigeratum sub diuo, da-
tur. Aliqui incoquant olus marinum, mercurialem, cnicum, aut filiculam. Crudos
humores crassosq; atram bilem, & strigmenta elicit. prodest longis febribus, suspi-
rijs, articularijs morbis, & inflationibus stomachi.

NOMINA ET EXPLICATIO.

V4770

Varro Rei rustice libro 3. cap. 9. ait, ē gallinarum generibus proprio nomine uocantur foemine, quae sunt A
uillatice Gallinae, Germanice, Gennen. Gallicē geline: mares Galli, Germa. uerō cin. Dan. Gallicē ung coq: capi seminares, quod sunt castrati, German. ein Capaun, Gallicē ung chapou. Et Columella libro octauo, capite secundo ait: Cohortales foeminae proprie appellantur gallinae: mares autem galli: seminares capi, qui hoc nominae uocantur, cum sine castrati, libidinis abolendae causa, nec tamen id patiuntur amissis genitalibus, sed ferro candente calcarihus inuistis, quae cum ignea ui consumpta sunt, facta ulcera dum cōsuecant, frigida ereta liniuntur. Capi caro laudabilis est, temperata, boni alimenti, et sanguinis generatiua. Horum testiculi nunquam improbantur, cum aliorum animalium sine indigestibilibus et cacochymi, digesti autem bene nutriendi. Gallorum autem optimi, praesertim saginatorum, qui et suaves sunt, et probum alimentum corpori praebent, autore Paulo Aegnetia.

Oorum natura.

Caput XLII.



Ouum molliculum plus alit forbili, & durum plus molli. Luteum oui, contra oculorum dolores utile est. in assati sedis inflammationibus prodest, cum croco & rosaceo: & con-
dylomatis, cum meliloto. cum uua autem fructus eius, quem rhoa dicunt, aut galla, in patinis frigitur, ut cibo aluos lutat, per se etiam offerri solet. Candidam oui crudum refrigerat. Spiramenta cutis ocludit. inflammationes oculorum infusum lenit. ambusta, si statim eo perungatur, pustulas non sentiunt. faciem a solis adustione tuetur. fronti impositum cum thure fluxiones arceat, avertitque inflammationes oculorum lana exceptum, addito rosaceo, melle & uino, mitigat. utiliter contra hemorrhoidis serpen-
tis morsus crudum sorbetur. summē tepidum, prodest uesticae rosionibus, renum ex-
ulcerationibus, gutturis scabritia, reiectionibus sanguinis, defillationibus, & tho-
racis rheumatismis.

EXPLICATIO.

Dum de ouis loquimur, gallinarum oua potissimum intelligimus, quae gratioris saporis in communi cibo-
rum usu sunt, et de quorum ad ganeam delectu sic praecipit Horatius:

Longa quibus facies ouis erit, illa memento

Vi succi melioris, et ut magis alba rotundis

Ponere: namque marem cohibent callosa uellum.

Cibos quot modis luuere, notum est. Nullus alius cibus, ait Plinius, qui in egritudine plus aliat, neque omeret: simulque uinum et cibi habeat. Ouum durum, inquit Celsus, ualentissimae materiae est: molle uero uel sor-
bile, imbecillissime.

Et Dioscorides quoque hoc loco molle magis nutrire quam sorbile testatur, et mollitursum quod durum est. Sed de ouis quid sentiat Paulus, uide lib. 1. Seruari oua in tomento, aut hyeme in paleis, et state in surfuribus
utilissimum tradit Plinius. Sale exinaniri creduntur. Et inter alios custodiendi modos dicit Columella nonnul-
los solidos, multos etiam fresa faba coaggarare. Germani ouum ein Ey, Galli ung ocaf, appellant.

Cicadae.

Caput XLIII.

Cicadae quae inassatae manduntur, uesticae doloribus prosunt.

Cicadae nostrae Germaniae peregrina ac incognita animalia, haec uero omnino in animalium genere
ore carent prolixum quiddam compactum, induratumque gerunt, simile ei quod linguae speciem refert, in ijs qua-
bus aculeus in ore, coque ipso rorem hauriunt, alimentum unum et peculiare. Excrementum cicadis nullum in
alio reperitur. Plura earum sunt genera, quae magnitudinis modo differunt, ut Aristoteles lib. de historia ani-
malium copiosius tradit. Cor dus ait in Italia reperiri in ficum arboribus.

Locustae.

Caput XLIIII.



Locustae odoris suffitu urinae difficultates adiuvant. praesertim quae foeminas male habent. earum carnes nullo sunt in usu. Est & quoddam genus locustae, quae asiracos aut oncos dicitur, sine pennis, praeter longis cruribus. exsiccata autem si ex uino bibatur, contra scorpionis morsus magnopere proderit, haec abunde uesteuntur Aphri, qui Lepsin incolunt.

Locusta.

A Locustæ Germanis, Zewschreden. Gallis sauterelles dicuntur.
Locustæ est insecti generis, uolucæ animal. italis uulgo Caballeta dicta, quæ pedes ultimos habet longissimos, & cetera.



Ossifragus. Caput XLV.

Venter eius auis quàm Latini ossifragum appellant, particulatim potus, calculos cum lotio pellere proditur.
Ossifraga auis ex genere aquilarum, Germaniæ peregrina est, hanc quoque uis quam illi Dioscorides attribuit, nostri medici motacilla adscribunt.

Galerita. Caput XLVI.

Alauda.



Galerita auicula est parua, apicem in uertice, pavonis modo, gestans. quæ assa in cibo sumpta, celiacos adiuuat.
Galeritam alij alaudam, Germani uerò, Ein Waldlerch uocant, hæc auis Romani legioni nomen dedit: nam apud Romanos alauda dicta est. Galli galeam siue galeritam, alaudam uocant, quare milites galeati à Romanis dicti alaudæ. Itaq; cum Cæsar ex Gallis conscriberet legionem, alaudam appellauit. Omnia uerò quæ hoc capite Dioscorides de alauda scribit, illud falsò attribuit Serapion Arabs upuæ.

Hirundines. Caput XLVII.



Dissectis crescente luna pullis hirundinis, qui primo partu exclusi sunt, in uentre eorum lapillos offendens: è quibus duos, unum colore uarium, alterum purum eximes. si priusquam terram attigerint, in iuuicæ corio, aut cernina pelle brachio aut collo adalligati, comitialibus proderunt, & sæpe prius eos re creabunt. Hirundines, uti ficedulæ, in cibo, aciei uisus medicamentum præbent. tam pullosum quàm matrum in fictili olla crematarum cinis cum melle oblitus, oculis claritatem adfert. anginæ eo commodè perunguntur. uix & tonsillarum inflammationibus hoc cinere succurritur. & ipsæ & pulli exiccati, si dra chmæ pondere ex aqua bibantur, hos iuuant qui anginæ morbo constictantur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Cinis recens hirundinum in diabesasa recipitur. Pulli hirundinum cum primis in fictili super prius uisum, diachelidonum stomachicū ad Anginas Andromacho faciunt, apud Galenum. Hirundinum sterces acæ, & digerens, ut aliorum animalium magis, minus.

Aristoteles ait in Samo albam nasci Hirundinem, cuius oculos si quis pupugerit, statim quidem excæcatur, post uerò uisum recipit, & sicut ille dicit, sic acutè quemadmodum à principio uidet.

Cinis pullosum hirundinum medetur anginæ, ut hoc loco Dioscorides testatur, & Celsus lib. 4. scriptum reliquit. Hirundinis cerebrum ex melle illitum ad suffusiones facit.

Hirundo Germanis, ein Schwalb, dicitur.

Ebur. Caput XLVIII.



EBoris scobe illito paronychia sanantur. Vim adstringendi ebur obtinet.

Ebur tota substantia cor roborare, & conceptum iuuare, practici scribitur, frigidè sicum primo gradu. Germanis, Eßlfantbeyn.

Suillus talus. Cap. XLIX.



Svis talus comburitur, dum è nigro albescat, qui tritus & potus inflationibus coli, longisq; torminibus medetur.

Ceruinum cornu. Caput L.

Cervinus



Ceruini cornus cinis elotus, binis ligulis **A**
Cepotus prodest dysentericis, excreantibus sanguinem, cœliacis, regio morbo, & uescicæ doloribus cū tragacantha. sceminis fluxione uulæ laborantibus, cum liquore huic res ac commodato. Cerui cornu contusum, crudo fistili luto circumlito, & in furnum indito: uritur donec albefcat. id cadmiæ modo elotum, ulceribus oculorum & defluxionibus salutare est, infrictum dentes expurgat. crudi cornus suffiti nidore serpentes fugantur. feruefactum in aceto, si eo gingiuarum colluantur, maxillarum à dentitione dolorem adimit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Cornibus cerui & capræ usitis, & (si opus est) lotis utimur ad dentium candorem, gingiuarum mollitiem, fluxiones in oculos, oculorum ulcera, quia tergens sine rofione: tamen nec dolorem leniunt, nec coquunt, quia frigida siccæ.

Ceruini cornu, Germanis Hirschhorn. Gallis corne de cerf.

Eruca. Caput LI.


Erucis quæ in oleribus gignuntur, cum oleo perunctæ, à uenthatibus bestiis feriri negantur.

EXPLICATIO.

Eruca uermes sunt frondes arborum erodentes, quare ab erodendo erucæ dictæ uolunt: aliqui Grecorum erucam Chrysidem uocant. Germani ein Raup/ & Holzwurm.

Cantharides.

Caput LII.



Efrumentis cōgestæ cantharides ad **B**
recondendum idoneæ sunt. quæ fistili uase non picato conduntur, & raro linteo obligato ore, & deorsum conuerso suspenduntur super aceti feruentis quàm acerrimi halitum, donec æstu exanimentur, postea lino transfixæ reponuntur. Potentissimæ omnes uariæ, luteis liliacis, quas in pennis transuersas habent, promissioq; corpore crassæ, ac blattarum modo perpingues. sed inertes ac imbecillæ, quæ unius sunt coloris.

EXPLICATIO.

Totius utitur Galenus ad psoras, lepras. Hippocrates caput & pedes auferit, lib. de sceminarum morbis. Rheumaticam ulcerant sole, ureticis autem salubriter miscentur.

Buprestes, & pinorum erucæ.

Caput LIII.



Simili modo reconduntur buprestes, genera quædam cantharidum, & pinorum erucæ, quæ supra cribrum suspensum feruenti cinere paulisper intostæ, reponuntur. uis omnium communis erodere, ulcerare, calorem elicere. qua de causa admiscetur medicamentis, quæ lepras, ferasq; lichenas & carcinomata sanant. mentes ciunt pelsis emollientibus additæ. Aliqui cantharidas antidotis impostas, aquæ subter cutem auxiliari prodiderunt: argumento, quod urinam moueant. Alij pennas pedesq; contra potarum ueneficia remedio esse tradiderunt.


NOMINA ET EXPLICATIO.

Buprestes uulgo ein Knölster/ quod boues rumpantur hoc animante, sic dictæ. Pini erucæ, Die wirm von Sichteen/ appellatæ, non ut cæteræ, pini frondes, sed ipsum lignum sub cortice erodunt. Lusitanijs grauisimus cibus.

Salamandra,

A

Salamandra. Caput LIII.



Salamandra lacertæ genus est, iners, uarium, quod frustra creditum est ignibus non uri. Vim habet erodentem, calfactoriam, exulcerantem. additur, ut cantharis, in medicamentis, quorum uis est exesse, & lepras abolere, similiq; modo reconditur. liquefacta * in oleo pilos euellit, exenterata, detractis pedibus & capite in melle seruatur ad eundem usum.

* Alij, cremata cinis.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Salamandra non continuo, nec semper in igne uiuit, ut hoc loco Dioscorides quoq; testatur, sed aliquantulum in co durare potest, nec est adeo ignotum animans: Imò illud, quod Germanicè ein Olm, uel Moll, cuius picturam damus, appellatur. Et falsum est ex eius pilis, quos nullos habet, inextinguibilem telam fieri. Nam huiusmodi materia est uel ex Amiantho lapide, uel ex quodam apud Plinium lini genere, si non et id Amiantho lapidi idem fuerit.

Araneus. Caput LV.



Araneus, quem holcum, alij lycon, id est, lupum uocant, subactis cum splenio, & linteo illitus, prolatusq; utrisq; temporibus aut fronti, tertianos circuitus per sanat. tela eius imposita sanguinem sistit, uulnera quæ summam cutem occuparunt, ab inflammationis iniuria uindicat. Est & alterum aranej genus, qui candidam, tenuem, densamq; telam orditur, quem in aluta ligatum, & lacerto appensum, quartanis circuitibus mederi narrant, decoctus ex rosaceo & infusus, aurium doloribus auxiliatur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

B Græcè, Αράχνη. Latine, Araneus. Germanicè, ein Spinn.
Araneorum plura genera uide apud Hermolaum Barbarum, in Coroll.

Lacerta. Caput LVI.



* Alij, clauos.

Lacertæ caput intritum & appositum, aculeos & omnia corpori infixæ extrahit, uaros*, formicantes uerrucas, & penfiles, quas acrochordonas uocant, tollit. Ie cur exesis dentibus eductum dolores finit. si diuulsa admoveatur, ictis à scorpione leuamentum præstat.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Lacertum et lacerta, utroq; genere dicitur. Inuamenta eius lege apud Plinium lib. 8. cap. 39. Græcè οὐρογὰ. Germanicè, ein Eydech, dicitur. Quanquam est et genus herbe Sauræ Plutoni sacra, de qua in Nicandro.

Seps. Caput LVII.



Seps, quam aliqui lacertam chalcidicam uocarunt, in uino pota morsus suos sanat.

EXPLICATIO.

Seps ideo etiam Chalcis appellatur, quod à quibusdam lineis, æris speciem, similitudinemq; gerentibus, eius dorsum distinguatur. Itemq; ad octo palmorum longitudinem accedit, tum in Syria, et Libya, et Cypro nascitur, in saxis domesticam sedem solet habere.

Scincus. Caput LVIII.

Scincus aut Aegypti, aut Indiæ, aut rubri maris alumnus, quamuis inueniatur in Lydia Mauritaniæ. Est autem terrestris crocodilus sui generis. Sale inueteratus cum nasturtio, aiunt carnes, quæ renes amplectantur, id sibi uirium uendicasse, ut si drachmæ pondere bibantur, uenerem accedant, uerum decocto lentis cum melle aut

aut semine lactuæ cum aqua potio, ueneris cupiditates inhibentur. additur in an- A
tidota.

Scincus, siue Crocodilus terrestris.



Stinci Officinarum.



NOMINA ET EXPLICATIO.

Recens scincorum, crocodilorum terrestrium, tanquam pudendum ad uenerem intendentes quidam bibunt: alij sumen quoque et caudam assumunt: unde compositio est Astuario diascincu. Offici-
ne corruptè stincum marinum uocant, et aliud genus lacerte ostendunt in paludibus et ceno uiuens,
a uero crocodilo longè diuersum.

Terreniuermes. Caput LIX.

B

Terreni uermes impositi, præcisos neruos glutinant, tertianas discutunt:
decocti cum anserino adipe, infusi, affectis auribus medentur. cum oleo au-
tem decocti, si in contrariam aurem instillantur, dentium doloribus præstant
auxilium. triti in potu ex passo urinam ciunt.

NOMINA ET EXPLICATIO.

τῆς γῆρας, hoc est, intestina terra, Græcis, Plinio autem et Latinis uermes terreni. Germanis
Regenwürm dicuntur. similes sunt lumbricis, qui aluo et intestinis innascuntur. *ἑλμύθες σπογγύλας*,
id est, rotundi Græcis appellati, quare permiserunt sibi etiam uermes terrenos lumbricos appellare, magna
errore si quis in rei medicæ usu, pro uerme terreno lumbricum ex aluo humano adsumat, quum uermes terre-
ni exigendis ex aluo lumbricis, in potu ab Aëtio præbeantur.

Mus araneus. Caput LX.

Mus araneus dissectus et impositus, sui morsus ueneficia luit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Mus araneus, qui Germanicè *Ein Spinnmauß*, dicitur, si in orbitam incidit, tanquam uinculis capitur
ac moritur: ei qui ab eo sit morsus remedio est, ut Dioscorides tradit, terra ex orbitarum transitu sumpta
eag, simul ut uulnus aspersum sit, statim sanatur.

Mures. Caput LXI.



Mvres, qui in domibus oberrant, concisos
scorpionum plagis utilissimè imponi,
in confesso est. si inflatos infantes ederint, oris
saluam exiccari promittunt.

NOMINA ET EXPLICATIO.

K

A Plura esse murium genera liquet, ut Pontici, alpini, herinacci pungentibus pilis. Omnium autem naturæ murium Aristot. sexto naturæ animalium meminit his: Murium mirabilis est præter cetera animalia, ceterum numero, tum celeritate. Iam enim femina prægnante in uase miliario aliquando occupata, paulò post refoiato uase, musculi numero uiginti & centum reperti sunt. Hæc ille, & multa id genus: qui plura uolet, locum habet quem adeat.

Murium capitum caudarumq; cinere ex melle inunctis, claritatē uisus restitui dicunt, multoq; magis gliris aut muris sylvestris cinere.

Lac.

Caput LXII.



Lac generatim omne boni succi est. corpus alit. alui emollit. stomachum & intestina inflatione uexat. uernum tamen dilutius assiuo habetur. & uiridi pabulo aluum magis emollit. Probatum autem candidum, & quali crassitudine, quod ungui instillatum cogitur. alui minus tentat caprinum, quoniam pecus hoc adstringentibus pabulis, robore, lentisco, & oleaginis frondibus, & terebintho magna ex parte uestitur, inde stomacho accommodatissimum reddi solet. ouillum autem dulce, crassum, & præpingue, non usq; adeo utile

stomacho. Bubulum tamen, asininum, & equinum, ventri magis idonea, sed ipsum turbant. Quibus in locis pecora scammoniam, ueratrum, clematidem, aut mercurialem pascuntur, lac omne uentrem & stomachum subuertit: quale in Iustinis montibus esse, à nobis proditum est. Siquidem capræ quibus candidum ueratrum pabulo fuerit, primo foliorum partu euomunt, & eorum lac haustum nauscam creat, & stomachum in uomitiones effundit. uentrem adstringit lac omne decoctum, præcipueq; candentibus calculis marinis exustum: & in summa, omnibus auxiliatur internis exulcerationibus, præsertim faucium, pulmonis, interaneorum, uesicæ & renum: foris

De hoc supra
lib. 1. cap. 9.

B uerò contra pruritum cutis, eruptiones papularum, & uiriatos corporis succos, recens cum melle crudo, addito sale, datur exigua aqua dilutum. minus inflat quodcumq; semel seruatum. decoctum cum calculis marinis ad dimidias, ulcerosas uentris fluxiones adiuuat. Lac quodcumq; serum continet implicitum: quod ubi discessit, à lacte, multo potentissimum ad purgationes redditur. datur quibus sine acrimonia uolumus deiectionem moliri, ut melancholicis, comitialibus, lepris, elephantijs, & erumpentibus toto corpore papulis. Ex omni lacte fit, quod schistum, id est, scissile, appellatur. Lac autem fictili nouo feruet, rathoq; ficulneo recenti mouetur, insparfis, postquam bis aut ter effuerit, totidem acetum mulsi cyathis, quot sunt hemine lactis. ita enim lerefcens liquidum ab eo diuiditur, quod in caseum concreuit. sed cum feruet, ne superfundatur, conueniet spongia ex frigida continuo fictilis labrum detergere, sextariumq; argenteum frigida aqua plenum dimittere. Bibitur heminis per intervalla singulis, usq; ad quinas, ita ut intercedentibus spatijs potantes ambulent. Lac autem recens efficax est contra rofiones uisionesq; ab exitalibus medicamentis factas, uti à cantharidibus, aut salamadræ, bupreste, aut pinorum eruca, hyoscyamo, dorycnio, aconito, aut ephemero: præsertim bubulum ad id eximie confert, gargarizatur autem exulceratis faucibus, tonsillisq;. Asininum peculiariter collutos dentes gingiuasq; stabilit fluxiones alui, si ulcera sentiantur, tenefmosq; ouillum, bubulum aut caprinum cum marinis lapillis decoctum, sistit per se autem & cum hordeaceo, pituita aut halica ceo cremore infusum magnopere intestinorum rofiones mitigat. exulceratæ uulvæ immittitur. Humanum lac dulcissimum est, & maxime alit. mammis autem exuctum, prodest tibi, & stomachi rofionibus. contra haustum leporem marinum præsidio est. oculis cruore ex ictu suffusis, cum thuris polline instillatur: podagricis utile est cum meconio & cerato illitum. Lac omne respuendum splenicis, hepaticis, comitialibus, uerriginosis, & neruorum uitio laborantibus, febriculosis, & capite dolentibus: nisi quis interdum purgationis gratia, ut ostendimus, schistum præbeat. Primiparæ canis lacte perunctos narrat glabrescere, potum contra uenena antidoti uicem obtinet. abortus mortuos expellit.

NOMINA

LIBER SECVNDVS.
NOMINA ET EXPLICATIO.

Lac lauat, terget sero emplasticum est butyro & caseo: ob hec acres & mordaces fluxiones obdundit, recens utendum.

Caseus. Caput LXIII.



Caseus recens sine sale sumptus alit. stomacho utilis est, & facile in membra delegatur, corpus auget, aluum modicè emollit: alius tamen alio præstantior, pro natura lactis à quo conficitur: decoctus autem & expressus, deinde inassatus, aluum sistit, illitus, oculorum inflammationibus & fugillaris prodest. Qui uerò recens salitus est, minus alimenti præbet, corpus aptè minuit, stomacho aduersatur, negotium uentri interaneisq; exhibet. uetustiore sistitur aluus. Sero quod à caseo manauit, quamoptimè canes aluntur. Quod hippacem uocant, caseus est equinus. ea uirus redolet, magnoperè alit, bubuloq; proportionē respondet. Nec defunt qui hippacem, equinum coagulum appellarint.

Caseus recens refrigerat, repellit, siccat, uulnera etiam magna glutinat. Ex uetustate uerò acer, cum perne decocto subactis, topicos eliquat & aperit.

Butyrum, & eius fuligo. Caput LXIIII.



Elacte pinguisimo probatum fit butyrum, quale ouillum est: fit & ex caprino, agitato in uasis lacte, donec pingue separetur. Butyrum natura oleosum est & emolliens: ^{* Alias, lactis sui facultate præditum.} unde largius epotum, uentrem resoluat, prodest, ubi oleū non adfuerit, contra uenena. cum melle si infricetur, dentitiones adiuuat. gingiuarum pruritus, & oris ulcera infantibus emendat. illitum foris capaciora alimenterum facit corpora, & ab albidis pustulis per summa scatenitibus assertit, contra inflammationes & duritias uulue, quod nec uirus respicit, nec **B** uerustatem sentit, butyrum efficax est dysentericis, & coli ex ulcerationibus infunditur. in medicamenta addi solet quæ pus mouent, utile præsertim cum nerui, aut cerebri membranæ, uesicæ, ceruix, uulnera acceperint. id autè purgat, replet, carnem creat. ab aspide percussis utilissimè imponitur. recens obfoetis additum olei uicem pensat. & adipis uice fungitur in bellarijs. Colligendæ ex eo fuliginis ratio hæc est: Butyrum in lucernam nouam ingestum accenditur, fictiliq; operculo quod superne in siphunculi speciem desinat, & infima parte cuniculos clibani modo habeat, crematur, & subinde aliud in absumpti locum sufficitur, dum coaceruetur fuliginis modus, quem facere institueris. penna post deraditur ad usus. Eius effectus est in medicamentis oculorum, exiccare & adstringere. fluxiones cohibet, & ulcera celeriter ad cicatricem perducit.

Butyrum Germanis Butter, & Aindem. Gallis buyre. Hispanis manteca dicta, minimum terget, ut decoctum Glycyrrhizæ: coquit item & digerit, bubonas, parotydes, oris phlegmonas in pueris & mulieribus, gingiuas puerorum cum dolore denticulorum crebro illitu tenuat, quantum mel: idem lacti canino, & leporis cerebello tribuit Archigenes. Exputionem Butyrum promouet (maximè cum melle aut Saccharo) in pleuritide & peripneumonia, quos affectus etiam coquit.

In unguentis potissimum fuliginis usus est. Fumi par est, quæ parietibus inhaeret: quippe fuliginem summam crassiorē condensatam uocamus, Germani Riß.

Medicina lanarum. Caput LXV.

Secidæ lanæ molles, è collo fœminibusq; laudatissimè habentur. Subueniunt inter initia uulneribus, percussis, desquamatis, liuidis, ossibus fractis, aceto, oleo aut uino imbutæ. siquidem facile succos combibunt quibus immerguntur. & ob peccudum sordem, si enim æsypum uocant, emolliūt. capitis, stomachi, aliarumq; partium doloribus, cum aceto & rosaceo efficaciter imponuntur. Crematarum lanarum cinis crustas obducit, excrecentias in carne cohibet, & ulcera ad cicatricem

DIOSCORIDIS



perducit. Mundæ autem & carptæ, in fictili crudo, cæterorū more, uruntur. Nec secus fimbriati marinarum purpurarum flocculi cremari solent. Aliqui cum sordibus lanas carpunt, & melle irrigant, eodemq; modo urunt. Alij in fictili oris patuli, verucula inter se distantia componunt, & conceptas carminatasq; lanas oleo ita suffusas, ut ne stillare quidē possint, assulis tedæ subiectis, & eisdem lanisq; permutatim interstratis, leuiter succendunt, & usas tollunt. quod si ē tēda pix, pinguitudine ulla profluxit, collecta reconditur. Lauatur ad oculorum medicamenta. cinerem in labellis, aqua addita, manibus confricant, & confidere patiuntur: idq; sæpius, mutantes aquam donec linguam adstringat, nec mordeat.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Conferunt humano generi lanæ, tum ad tuendum corpus à frigore, tum ad sanitatem ualent, potissimum succidæ: quas ita describit Varro libro Rei rusticæ, cap. ult. Tonsuræ tempus inter æquinoctium ad uernū & solstitium, cum sudare inceperint oues, à quo sudore recens lana tonsa, succidæ est appellata; Germanicè Schmutzig wollen/robe vngewaschen wollen/ & c. Lanæ igitur huiusmodi plurima præstant remedia ex oleo uinoq; aut aceto, prout quæq; mulceri, moderari opus sit, & astringi laxariue.

Lanæ succidæ & sordida contritis uuluis ob ophthalmum: lota uerò est uice linamenti capiti: usita autē acris, calida sicca, tenuium partium.

Oesypum.

Caput LXVI.

Oesypum uocant Græci, succidarum lanarum pinguitudinem, Cuius parandi ratio hæc est: Succidæ molles, radícula nō curatæ, calida aqua lauantur, & quibusq; sordibus expressis, & in labellum oris ampli coniectis, aqua infunditur; magnoq; impetu ligula, uti respuiet, agitur, aut lignea rude ualidiusculè conturbatur, quò largius tordida spuma colligi possit. deinde marina respergitur. & confidente pingui quod supernatabat, collectoq; in altero fictili uase, denuò aqua in labellum sua agitur. spuma iterum mari perfunditur, & demum eximitur. hoc tantisper fieri solet, dum consumpta pinguitudine nihil prorsus spumæ extet, collectū oesypum manibus emollitur, & si qua insedit spurcicia, confestim demitur: exclusaq; sensim omni aqua, recentiq; affusa, manibus misceatur, donec admotum lingue oesypum, astringat leuiter, nec mordeat, atq; pingue candidumq; spectetur, tum in fictili uase conditur. Verum omnia seruido sole fiant. Nonnulli ex colatum pingue frigida aqua eluunt, & manibus, non secus atq; ceratum mulieres, confricant: ita enim candidius redditur. Alij elotis lanis & sordibus quibusq; exemptis, à lento igni in æneo uase ex aqua decoctis, pingue quod supernatat collectū, aqua; ut diximus, lauant: colatumq; in fictilem patellam, quæ calidam aquam contineat, limbo operiunt, atq; soli mandant, donec candidum fiat, & satis crassum. Alij bidui spacio aquam effundunt, nouamq; adijciunt. Melius est lęue, radícula non curatum, quod succidarum uirus oleat, & si manu in concha fricetur cum aqua frigida, albescat, nihil in se duri aut concreti habens, ueluti quod ceratò aur adipe adulteratur. Oesypum ex calfacit, explet ulcera, & emollit, præsertim sedis ac uulue, cum meliloto & butyro. in uellere appositum, menses & partus euocat. ulcera non aurium modo sanat, sed & genitalium cum arserino adipe. contra erosos angulos oculorum, scabiososq; genas quæ occalluerunt, & ciliorum defluuia, efficax est. In testa noua torretur, donec redactum in cinerem pinguitudinem amittat. Ex eo etiā fuligo colligitur, uti demonstrauimus, quæ in oculorum medicamenta commodè addi solet.

Oesypus est succidarum lanarum pinguetudo, ut Dioscorides præsentī capite docet: ὄσος, & ὄσος, ὄσος ὄσος apud Paulum aliquoties legitur, unde opinor practicā consuetudo appellandi hyssopum humidū, pro oesypum, uolentibus ab hyssopo herba separare: ὄσος, & autem Galeno cum Dioscoride semper dicitur.

Coagulum,

Caput LXVII.

Leporis

Leporis coagulum tribus obolis ex uino, uenenatorum moribus, cœliacis, dysentericis, & fœminis fluxione uulvæ laborantibus, ac reiectionibus à pectore, auxiliatur. sanguinem in grumos concretum discutit. post menstruas purgationes appositum uulvæ cum butyro, præstat mulieribus ut concipiant. potum uerò partus enecat, & à puerperio, pariendi spem adimit. Equi coagulum, quam hippacem aliqui uocant, priuatim cœliacis dysentericisq; conuenit. Hærdi, agni, hinnuli, capræ laticornis, & dorcæ, apri, cerui, uituli, bubalique coagula similes naturas sortiuntur. contra aconiti potum in uino, & concretum lac in aceto, conuenienter assuuntur. Hinnuli priuatim triduo à purgationibus admotum, partus spem intercipit. Vituli marini, castorei uires repræsentat. comitialibus, strangulatis uuluis, potum cōferre existimatur. Sed si sit uituli marini, hoc experimentum est: aqua inspergitur, quæ paulisper cum alterius animantis, tum præcipuè agni coagulum, maduerit, nam si erit syncerum, statim liquefit in aquam: sin minus, consimile permanet. Excipitur autem catulis, qui nondum natare possunt. in summa, coagulum omne dissipa cogit, & coacta dissoluit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Coagulum omne, Germanis *Bymn*, *lypp*, & *lâß* *lypp*, appellatum, ex lactis in uentriculo primo corruptione acre, digerit, siccat. Lac aut sanguinem in uentriculo coagulatum dissoluit: leporinum omnium est præstantissimum. Qui igitur menses immodicos cum Practicis & Medicorum uulgo queat sistere, cum calidum sit uitandum, ubi sanguine fluit, aut fluxurus est?

Adeps. Caput LXVIII.

Adeps anserinus aut gallinaceus recens & sine sale conditus, ad uulvæ uitia proficit. sale inueteratus, & qui temporis spacio acrimoniam cōcepit, uulvæ inimicus est. Recens exemptis membranis in fictilem ollam demissus, quæ altero tã toperè capax, ior sit, quantus sit modus adipis, quem curare institueris, obstructo diligenter uase, flagrantissimo soli exponitur, eliquescens inde humor in fictile alterum excolatur, donec adeps omnis absumatur, mox loco uehementer frigido receditur, & ad usus digeritur. Alij fictile fulciunt super aquam calidam, aut tenuem & elanguidam prunam, quæ solis uicem penset. Est & alia curandi ratio: Exemptis membranis teritur, coniectusq; in ollam eliquatur, adiecto minuti salis momento, mox lineo colo transfusus reponitur. Vtiliter in medicamenta additur, quæ lassitudines & fatigationes leuant. Suillus adeps & urfinus hoc curantur modo: Recens, præpinguis, renibus potissimum detractus, in largiore aqua cœlesti & quàm frigidiissima, exemptis tuni cis, diligentissimè manibus confricatur, & exprimendo ferme siccat, subindeq; noua aqua abluitur. cæterum fictili capacitatis duplè inditus, in aquam demergitur, & subditis leuibus prunis spatha mouetur, eliquatusq; colo transfunditur in aquam: ubi uerò refrixit, & guttatim aquam omnem excludit, in prælotum fictile demittitur, & infusa aqua leniter eliquari debet, & manu deprimi, quò facilius fæculentum uirus pessum eat: postea in pilam spongia madefactam transfunditur: ubi coire cœpit, residens in imo sordes eximitur. tertiò citra aquam eliquatur, repurgatusq; fictili bene operculato, per quàm frigidis locis reponitur. Hircinum seuum, ouillum, ceruinumq; ita curato: Elotum ex his quodcumq; tuni cis, ut in suilli mentione dictum est, exemptis, pilæ emolliendum tradito, ac manibus fricato, affusa paulatim aqua, donec ne amplius quidem cruentum uirus excernatur, aut pingue aliquid innatet, sed nitida spectetur. deinde in ollam fictilem conijcito, & adiecta aqua ut superemineat, leui pruna liquefacito, & moueto, atq; in aquam colato: cumq; refrixerit, iterum in loro fictili eliquato, & quæ antè diximus facito. tertiò sine aqua liquefactum, in persulam liquore pilam colato, refrigeratūq; ut in suilli ratione diximus, recondito. Bubulum autem seuum, renibus maximè detractum, exemptis membranis, aqua marina ex alto petita eluendum est, mox in pilam tundendum diligenter, affusa maris aqua: cum uerò dissolutum fuerit, in fictilem ollam conijciendum, & marina aqua, quæ non minus do-drante superemineat, proluendum: decoquendum donec omnis aboleatur odor, additis ad singulas seui Atticæ minas, quaternis Tyrhænicæ ceræ drachmis: excolatumq; detractis quæ pess-

Asumierant sordibus, in nouo fictili reponendum, oportumq; soli interdiu credendum, ut ad candorem reducat, & odoris uirus euanescat. Priuatim taurorum pingue sic curari debet: Renibus euulsum pingue profluente amnis aqua abluito, detractisq; tunicis, fictili nouo postquam exiguum salem insperferis, liquefacito, dein in nitentem aquam excolato, & ubi condescere cepit, manibus iterum confricando uehementer lauato, aqua saepius infusa, refusaq; donec quamoptime elotū uideatur. rursus in olla cum pari modo uini odorati decoquito, & cum iterum efferbuerit, dempto ab igni uase, ibidem finito pernoctare, postridie si grauiter adhuc oleat, noua olla reperitum, uino odorato perfundatur. eadem quæ prius fiant, dum omne uirus euanescat. Colliquatur & sine sale, præsertim affectionum earum causa, quibus sal aduersari solet, sed ita paratum non magnoperè albescit. Eodem modo par-

** Quidam addunt: suis agrestis, camelorum, & si malis.*
dorum ac leonum* pingua curari oportet. Taurinum autem & uitulinum pingue, necnon ceruinum, atq; etiam huius animalis medulla, odoramentis imbuitur hac ratione: Pingue quod odoratum reddi debet, demptis, quo diximus modo, mēbra- nis, elotum & uino quàm odoratissimo, nulla maris aqua diluto, feruefactum, pernoctare finitur: alterum id genus uinum eadem mensura infunditur, colliquatur, & exquisitè colatur, nouemq; eius heminis, iunci Arabici septem drachmæ adijciuntur. Quod si ipsum odoris fragrantioris fieri uoles, quadraginta floris eiusdem drachmæ, cum paribus palmæ, calami, & casie modis adduntur, & xylobalsami, aspalathi singulæ drachmæ, cinnamomi, cardamomi, & nardi, singulæ uncia. omnia exactius tunduntur, & affuso uino odorato, in uase operto, quod supra carbones firmiter collocatum sit ter effuerescit, & semoto ab igni uase inibi pernoctant. postridie uinum effunditur, aliudq; generis eiusdem adijcitur ter similibus bene cōferuescat, deinde matutinis exempto adipe uinū effundatur, & abluto uase, si quid imo subfidens hæsit, detergatur: postremò eliquatum pingue & excolato, ad usus reconditur. Hoc autem modo odoramentis imbuitur, quod antea curatum est, uerū antè dicta prius inspissari solent, quò facilius sibi odoramentorum uires adfiscant.

BItaq; assumens quodcunq; horum uoles, cum uino feruefacito, impositis unā myrti ramulis, serpyllo, cypero, item aspalatho plenius tuso, aliqui tamen ad hunc usum, uno duntaxat horum contenti sunt. cum autem ter efferbuit, exemptū leniter, & linteo colatum, aromatis, uti expositum est, imbuitur. Adipibus spissamenta sic fiunt (quemcunq; acceperis, oportet ut recens tundatur) Syncerus & sanguinis expers adeps, reliquas habens notas, quas sæpe retulimus, in ollam nouam demittitur, infuso uino albo, uetere, odorato, quod semipedis altitudinem superet. lento igni feruescat, dum uerna culus odor aboleatur. planèq; uinum redoleat. at ubi depositu uase refrixit, duæ adipis minæ in ollam mittuntur, & duo uini eiusdem sextarij, & seminis Loti, eius inquam, culus è ligno ludicæ tibie factitantur, tusi minæ quatuor adijciuntur, lento igni subinde miscendo decoquuntur, cumq; odoris uirus euauerit, excolatusq; adeps refrixerit, una contusi aspalathi mina, cum amara cini floris minis quatuor, & uetere uino subigitur. nocte una hæc odorem rapiunt, combibunt. ue. postridie in fictilem ollam tricoglaem ea omnia cum adipe iniecta. additis sextarijs tribus uini unā feruescunt, quousq; & uim & odorem spissamentorum adeps ipse contraxerit, qui eliquesens colatur, & reponitur. Quod si maiorem odoris fragrantiam efflagites, drachmas octo quā pinguisimæ myrrhæ uino macerate, quod multos in annos asseruatum est, misceto. Gallinaceus anserinusq; sic odoribus imbui solent: Cuiusuis eorum percurati sextarij duo fictili olla excipiuntur. erysiceptri, xylobalsami, palmæ elatæ, & calami planè contusi, singulorum sescuncia admiscetur. uini Lesbij ueteris cyathus unus adijcitur, ea ter effuerescunt prunis, mox uase sublato ab igne, die noctuq; refrigerantur. postridie liquata per lintecum crassum, mundum, in uas excolantur. ubi uerò adeps coierit, concha excipitur, fictiliq; nouo dēsius aperto perfrigidis locis reponitur. Hyberno tempore id instituire oportet, æstate siquidem pingua non coguntur. Nec desunt qui Tyrrenicæ ceræ momentum adijciunt, quò facilius in unum corpus omnia coalescant. Eadem ratione suillus adeps & ursinus, cæteri q; id genus, odoramentis imbuuntur. Verū sampsuchi odorem adeps ipse repræsentabit hoc modo: Curati quamoptime adipis, præsertim taurini, mina una, tempestiuq; sampsuchi exquisitè confracti sesquimina miscuntur.

scuntur, & insperso largiore uino digeruntur in offas, quæ in uase cooperto nocte A
quiescunt. matutinis in fictili olla leuiusculo igni, affusa aqua, leuiter coquuntur,
dumq; suum adeps odorem exuerit, defæcatus ac bene opertus, nocte tota permanet:
postero die deterfa sorde quæ pessum ierat, sampsuchi, ut dictum est, cōtusi iterum
lesquimina priori pastillo adiicitur, eodemq; modo in offas cogitur: alijs quæ
diximus peractis, decoquitur & colatur, & si qua fundo hæsit spurcitia, deraditur,
& rigido loco reconditur. Si quis tamen in curatum adipem anserinum, gallinaceum,
aut uitulinum, à putredine tueri uelit, ita faciendum est: Quemuis adipem diligenter
elotum & siccatum in umbra super cribrum, per lintea munda manibus uehementer
exprimat, linoq; confutum umbroso in loco suspendat, & post multos dies noua
charta inuolutum, frigido loco recondat. Pinguia autem indito melle uindicantur
à putredinis uitio, uis omnium est exalfacere, mollire, rarefacere. Taurinus adeps,
bubulus & uitulinus aliquantum adstringunt earundem uirium compos leoninus,
nam resistere eum aiunt ijs, qui insidias moluntur. ceruino, elephantinoq; per
unctos, serpentes fugiunt, adstringentior est caprinus, qua ex causa decoctus cum
penta, rhoë & cafeo, dysentericis datur, & cum prisanæ succo infunditur. ius decocti
phthificis in sorbitionibus prodest, datur quoq; utiliter ijs, qui cantharidum uenena
hauserunt, hircinus, ut ualidissimè discutiat, podagricis auxiliatur, cum fimo capræ
& croco impositus, huic proportionem respondet ouillus. Suillus uerò contra
uulnæ & sedis uitia idoneus est ambustus igni medetur, è sue uetustissimus quisq; sa
le conditus exalfacit, & emollit, elotus uino pleuriticis prodest, cinere aut calce ex
ceptus in inflammationibus, fistulis, ac tumoribus succurrit. asininum tradunt cicatri
ces corpori concolores reddere. anserinus gallinaceusq; conueniunt muliebribus
malis, & ad labiorum rimas, ad mangonizandam faciem, & contra aurium dolores,
ursinū constat raptos uitio alopecie capillos restituere, pernioibus subuenire, uulpi
nus medetur aurium doloribus. Fluuiatilium piscium pinguia perunctis oculis
claritatem afferunt, si in sole liqueant, & melli admisceantur, uiperæ adeps contra
oculorum hebetudines suffusionesq; efficax est, addita cedria, melle Attico, & pari
oleo uetere, pilos alis euulsos perunctis radicibus recis & per se illitus oblitterat, B
atq; renasci non patitur.

Adeps seu pinguedo, Germanis *Feyt*, *FettigFeyt*, & *Schmalz*. Gallis *de la gresse* appellata, calefacit,
humeat magis uel minus, pro uaria animalium natura. Leoninus calidissimus, id est, minimum hu
midus, potentissimè omnium digerit, ob acrem multamq; caliditatem, & partium tenuitatem, ob id scirrhis et
mucteratis tumoribus tantum aptus. Pardinus ei proximus, pardino ursinus, taurinus ursino uicinus, sed ta
nto quam suillus calidior siccior, quanto minus leonino est calidius siccior: ab utroq; enim ex æquo distat, in
amborum medio constitutus.

Suillus autem omnium propè humidissimus. Caprinus, præcipuè hircinus, crassior taurino, ob id celerri
mè conerescit.

Inter taurinum & suillum fuerint uulpinus alopecias sanans, caninus, melinus, felinus, cuniculinus, equi
nus, uaccinus, camelinus, uitulinus.

Anserinus maximè tenuium partium, ob id in uolucrum genere præstat ad scirrhi curationem: Gallina
ecum illi proximus. Adeps humanus omnium est temperatissimus. Idem uetustate calidiores & siccio
res euadunt ut oleum, mel, uinum.

Reponitur autem incuratus, lotus, siccatus in umbra, uel exemptis pelliculis fusus sole uel igni in uase dupli
ci. Adeps cerui nullo medicamentorum mollientium est inferior.

Medulla.

Caput LXIX.

Laudatissima est ceruina, mox uitulina, post hanc taurina, dein caprina, & o
uilla. Colliguntur æstatis exitu, cum appetit autumnus: quippe cum alijs anni
temporibus concrementum sanguinis, & ueluti caro friabilis, in ossibus inuenia
tur, nec faciliè cognosci potest, ni quis eam ossibus extrahat & recondat. Omnes me
dullæ molliunt, calfaciunt, rarefaciunt, ulcera explent. ceruina perunctos uenenata
fugiunt. Curantur recentes, adapis modo, aquæ resperfu tubæ, selectisq; ossibus
tantisper elotæ, & in linteum expressæ, donec aqua sincera emanet: & deterfa sor
de pinna, si qua innatet, liquatæ in duplicato uase in pilam exprimuntur, & ubi coie
re, omni fece, quæ ad ima sidit, derasa, fictili nouo reponuntur, quod si libet incuratas

A reponere, facito omnia quæ de anserum & gallinarum adipe demonstrauiamus.

Medulla Germanis *Marck*. Gallis de la moelle dicitur: calfacit, rarefacit, emollit scirrhus quarumvis partium, præcipue ceruina, & post hanc uitulina. Taurina, hircina acrior & siccior est. Loco sicco & edito septentrionem spectanti reponitur, cum folijs lauri siccis, ne putrescant, aut situm ducant: quæ iniuriis in locis humidis meridiem spectantibus eis accidunt: sunt qui reponant bisariam adipum modo.

Fel.

Caput LXX.

FEl omne curatur hoc modo: Recens præligato ore folliculi lino tandiu demissum in feruentem aquam, dum quis spacium trium stadiorum percurset, mox exemptum siccatur umbroso loco, asperginem non redolente. Sed quod ad oculorum medicamenta adhæci solet, ligatum lino in uitreum uas, quod mel habeat, immititur, circumuoluto ad os uasis lini principio, & aperto uase reconditur: est enim uis omnium acris & ex calfaciens. Intensis tamen & remissis uiribus differunt, siquidem præstantius in effectu esse uidetur uel marini scorpionis, & piscis qui callionymus appellatur, marinæ testudinis, hyænæq; item perdicis, aquilæ, gallinæ candidæ, & syluestris capræ, quod priuatim prodest contra suffusiones incipientes, & oculorum caligines, argemas, & genarum scabritias, ouillo, suillo, hircino, atq; urfino, taurinum multo efficacius. Felle omni perfacilem, præsertim infantibus, deiectionem quis molietur, si intinctum eo tomentum aut fimbriam sedi subiciat. priuatim taurino angina cum melle perunguntur, sedis ulcera sanat, & ad cicatricem usq; perducit. idem auribus fractis & purulentis cum muliebri lacte aut caprino instillatum medetur, & sibilo earundem ex porri succo, admisceri insueuit, uulnerarum emplastris & circulinitionibus, quæ contra uenenata parantur, phagedænicis ulceribus, colicis & scroto doloribus, ex melle prodest, lepras, furfures cum nitro & terra cimolia quam optime purgat, ouillum & urfinum contra eadē pollent, uerum inefficacius hæc præstant, urfinum eclegmate comitiales adiuuat, fel testudinum anginis, & in ore infantium nomis, prodest, naribus inditum comitiales erigit, syluestrium caprarum felle peculiariter peruncti lusciosi sanantur, hircinum idem obit munus, thymia abolet, & luxuriantes elephantincorum extuberationes illitu reprimunt. suillum autem contra aurium ulcera, reliquaq; omnia, magno usu assumitur.

Felle animalium, ob acrimoniam & calorem, solouit utimur, præterquam ad aperiendas hæmorrhoidas, sed collyrijs, trochiscis, alijsq; remedijs miscemus.

ib. Tobie. Fella piscium oculis sunt tutiora, ut eorundem hepata sicco hepati salubriora.

Sanguis.

Caput LXXI.



Sanguis anseris, anatis & hædi, utilissimè in antidota miscentur. Palumbi autem, turturis & columbæ, ne hon perdicis, oculis cruore suffusis, & recitibus eorum uulneribus, lusciosisq; illinuntur, peculiariter columbæ sanguis, cruorem membranæ cerebri erumpentem inhibet. Hirci, capræ, cerui & leporis sanguis in assa tus sartagine, dysenterias & celiacorum profluvia sistit, in uino potus contra toxica efficacis est. Leporinus sanguis ita ut tepet illitus, uitia cutis in facie, lentiginēsque emaculat. Caninus commodè ab his bibitur, quos

efferrata in rabiem bestia momorderit: contra epotum toxicum auxilio est. Testudinis terrestris sanguinem epotum tradunt prodesse comitialibus. marinæ autem testudinis cum uino & leporis coagulo cuminoq; contra serpentium morsus, & hausta rubetæ uenena, conuenienter bibitur. Taurinus cum polenta illitus, duritias discutit, emollitq; Sanguis equarum* quæ admissuram expertæ sunt, in medicamentum additur quæ erodunt, septica uocant, sanguine chamæleonis genarum palpebras euelli creditum est. Hoc enim uiridium ranarum sanguine præstat. Menstrua sanguis fceminarum, circumlito conceptum inhibere existimatur: aut si omnino mulier menstrua supergrediatur. Leuat podagræ dolores, & ignem sacrum illitus.

Sanguis hirci quadrimi, bene habitus, aliquandiu nutriti uino albo, fœniculo, fesculo, lauro, & ceteris, edendum

* Alij, equorum adnussariorum.

lum frangentibus, Augusto mense iugulati, medius effluens (nam primus tenuior, postremus crassior putatur) uase uitreo receptus, tectus linteo raro, sole siccatus, etiam cum myrrha, folijs lauui, & similibus, calculum potenter frangere dicitur. Tralliano, Auicenna, & ceteris practicois. Huic quandiu ab animali calet coquendi abscessus uim tantum tribuit Galen, lib. 10. simp. qualem caprino, taurino, & ceteris calidis humidis modice.

Quod si hircinus sanguis adamantem frangi, sed calidus tantum ab animali: sic lapidem calidus tantum epotus frangat. Quod & sanguinem uulpium ex uena secta potum praestare audio. Ne autem coaguletur, Xenocratis exemplo, miscere possis acetum feruifacium, aut coagulum.

Hirci quoque, capri, cerui, leporis, sanguinem sartagine fixum, dysentericorum & coeliacorum profusum sistere tantum hoc capite docet Dioscorides, non addit calculum frangere, quæ uis tenuibus conuenit, cum dicitur animalium sanguis substantia crassa & terrea, & cum calore siccatorio, dysenterias sanat.

Sanguis ex secta uena sinistra profusus licni affecto infricatur Archigeni, lib. 9. comp. phar. part.

Antidotum de sanguinibus quomodo parari debeat, uide apud Mazaridum.

Fimum.

Caput LXXII.

Armentariæ bouis fimum si recens admoveatur, uulnerum inflammationes mitigat, folijs autem inuoluitur, & calfactum cinere feruenti superponitur coxendicis cruciatus fotu compefcit. illitum ex aceto duritias, panos & strumas discutit. priuatim suffitu fimi, quod à masculo boue redditum est, procidentes uulvae reprimuntur, accensi nidore culices abiguntur. Fimum caprarum, praesertim in motibus degentium, porum in uino, regium morbum emendat. menses cit cum odoramenti haustum, & partus euocat tritum in farinam, & impositum lanis cum thure, fecminarum profusum sistit. ceterosque sanguinis impetus ex aceto cohibet. medetur alopecij exustum, & cum aceto aut oxymelite illitum. cum axungia uero impositum, his qui podagra tentantur, auxilio est. Caprillum in aceto decoctum imponitur serpentium moribus, ulceribus quæ serpunt, igni sacro, & parotidibus. Vilem ischia dici usionem hunc in modum accipiunt: In eo interstitio ubi pollex brachia li committitur, caua ueluti lacuna subsidet, in qua lana oleo imbuta subternitur, deinde sigillatim feruentes stercores caprini pilulae imponuntur, dum uapor per brachium ad coxam sentiat peruenire. & coxendicis dolorem mitigare. adustum id genus Arabica appellatur. Ouillum illitum sanat epinyctidas, clauos, peniles uerrucas, thymos, & ambusia ex aceto igni, rosaceo cerato exceptum. Fimum suis syluestris aridum, in aqua aut uino potum, reiectiones sanguinis sistit. uetustil lateris dolorem mulcet. ad rupta & conuulsa ex aceto bibitur. luxatis cum cerato rosaceo medetur. Tam asinorum quam equorum fimum siue crudum siue crematum, addito aceto, sanguinis eruptiones cohibet. armentarij, qui herba pascitur, sic cum fimum liquatum in uino, mox potum, contra scorpionum ictus magnopere auxiliatur. Columbinum uehementius & excalcacit & urit. cum hordeacea farina mixtum strumas ex aceto discutit. carbunculos emarginat, tritum cum melle, lini semine & oleo, ambustis igni medetur. Gallinae uero omnia eadem, sed efficacius praestat. priuatim tamen contra uentena fungorum, & coli cruciatus ex aceto aut uino bibitur. Ciconiae fimum, si ex aqua hauriatur, comitialibus prodesse credunt. Vulturini fimi nidore partus excuti produntur. Murinum detritum cum aceto, & illitum, alopecij medetur. cum thure & mulso calculos expellit. subditæ infantibus muscerde, alui deiectionem promouent. Caninum quod flagrantissimo canis sydere fuerit exceptum, cum uino aut aqua potum, sistit aluum. Humanum sterces illitum, uulnera ab inflammatione uindicat, & obiter intumescere non patitur, sed ea statim glutinat. sicco ex melle anginae perungi commodissime traduntur. Tetrastiris crocodili fimum, crocodileam uocant, quæ mulieribus colorem nutrit in facie, nitoremque seruat. Optima est candidissima & friabilis, amyli modo, minimè ponderosa, in humore statim eliquescent, quæ cum teritur, fermenti acorem quadam tenus refert. Adulterant eam sturnorum fimo, quos captos oryza pascunt, ipsumque non dissimile uendunt. Alij amyllum aut cimoliam miscant, & adscito anchusæ colore per rarum cribrum paulatim exprimunt, ut se contrahat in uermiculorum speciem: qui siccati pro crocodileæ ueneunt. Inter omnes conuenire inuenio, humanum sterces caninumque gutturi impositum, anginis auxiliari.

Tri4

A Tria genera fimi Columella secundo libro memorie mandauit esse: quod ex anibus, quod ex hominibus, quod ex pecudibus fit, ubi de hac re plura. Item apud Plinium lib. 17. cap. 10.

Vrina.

Caput LXXIII.



Humanam urinam suam cuique bibere, contra uiperæ morsus, ac uenena, incipientemque aquam intercutem proderit. scorpionis, uiperæ marinorum, draconisque morsus ea conuenientissime fouentur. Canina ad perfundendos canis morsus idonea est. pruritus & lepras nitro addito expurgat. sed uetus, ulcera capitis manantia, furfures, pforas, & feruidas eruptiones, multo magis abstergit. nomas, & præcipue genitalium, cohibet. auribus infusa manans pus supprimit: decocta quoque in calyce mali punici, earum uermiculos abigit. Pueri impubis resorpta urina, orthopnoicis auxiliatur. decocta in æreo uase cum melle emendat cicatrices, artemisia, caliginesque ex ea & cupro idoneum auri ferrumen conficiunt. Quod in urina subfudit, illi ignem sacrum mitigat, feruifacitum cum cyprino, inditumque, uulnæ dolores mulcet. strangulatus leuat. genas deterget. oculorum cicatrices expurgat. Taurina, si cum myrrha instilletur, aurium dolores lenit. Aprina uiribus eisdem prædita est. priuatim comminuit uesciæ calculos, & potum expellit. Caprina ad aquam quæ cutem subijcit, cum nardi spica quotidie binis cyathis cum aqua bibitur. urinamque per aluum extrahit. aurium doloribus instillata medetur. Asinina traditur renum uitis mederi. Lyncis urinam, quam lyncurium appellant, simulac excernitur, glaciari coire uel in calculi duritiam, uulgo creditum est. quare quod de ea proditum est, uanum esse conuincitur. est enim quod à nonnullis uocatur succinum pterygophoron, ideo dictum quod pennas ad se alliciat. Id potum ex aqua, stomacho alioque fluxione laboranti conuenit. Asinina urina potum renum uitia sanari traduntur*.

* Hæc clausula abundat.

B Galenus huiusmodi impura medicamenta stercoris & urine, ut ingenue & honestate mundiciei studio, si uero merito abominanda improbat: præsertim circa caput & faciem adhibenda, quo magis indigne ferendus est aliquarum urinarum, uel etiam humanarum potus, ex quo tamen pestilentia grassante in Syria, quidam conualuisse uidebantur, Galeno tradente ac asseuerante: item orthopnoæ gratia, pueri urinam bibere, non est necesse, quum alia sint multa pharmaca huic malo commoda, & quidam etiam eo potu opem non senserint. Verum tam abominanda medicamenta etiam hodie durant apud aniculas quasdam, & uulgo forte potioribus & purioribus indignum, non modò in peste, & orthopnoæ, ac anhelosis, uerum etiam in alijs tum uetris, tum intestinorum morbis, & præsertim in doloribus coli, utpote quod uomitus irritando, & diæticiones concitando, omne uitium ualenter expurgent, uelut etiam Marcellus cap. 27. testatur.

Mel.

Caput LXXIIII.



Prinicipem locum obtinet mel, quod Atticæ regionis est, præcipue ex Hymetto, mox Cycladibus insulis, & à Sicilia, cognomine hybleum. Magis probatur dulcius & acre, odorati, subflauum, nec humidum, graue, & minime fluxum, quod ob sequacilentiam non facile abrumpitur, tractumque resilit in digitos. Mel abstergendum habet. ora uenarum aperit. humores euocat, qua ratione in sordida ulcera finusque commodissime infunditur. decoctum atque impositum, abscedentem carnem glutinat. medetur impetigini coctum cum liquido alumine, & illitum. item aurium sonitus & dolori, cum solis li* sale trito, tepidum instillatur. lentes & sæda capitis animalia illitum* necat. nudæ glande recutitis operit, præsertim quæ circuncisione aperta non est. si melle præputium à balneo triginta diebus emolliatur. oculorum caliginem discutit. faucibus, terribilibus anginae collutum gargarizatumue medetur. urinam ciet. auxiliatur tussi, & à serpente percussis. contra haustum meconium, cum rosaceo calidum assumitur. aduersus uenena fungorum, & rabiosi canis morsus linctum aut potum proficit. crudum tam

* Quidam, cremato.

* Collutum, alij.

aluum

aluum inflat, tussim lacefsit, & ea de re despumati usus aptior est. Primatum tenet in A mellis genere uernum, deinde aestiuum: hybernū uerò, ut potè quod crassius confect, deterrimum reputatur, ceraginis halitum expirat: * Quod in Sardinia gignitur * Alij, ceragm mel, amarum est, quoniam apes inibi abfinthio uescantur: quo uitia cutis in facie & facunde idomaculæ aptissime perunguntur. Heraclia in Ponto quibusdam anni temporibus, neum, propria quorundam florum dorè, mel conflatur, quod qui edere, mente abalienatur, ac sudore diffuunt. Remedio sunt, elirata ruta, & fassamenta, aut eporum multum, resumpta quoties uomitione reijciuntur. acre autem est, & olfactu sternutamēta mouet. Quod cum costo illitum, sceminarum cutem emendat, & cum sale sugillationes rapit. Est & aliud concreti mellis genus, quod saccharon nominatur. In India uerò & felici Arabia in arundinibus inuenitur. salis modo coactum est, dentibus, ut sal, fragile, aluoidoneum, & stomacho utile si aqua dilutum bibatur, uexata uescia renibusq; auxiliatur. Illitum ea discutit, quæ tenebras oculorum pupillis offundunt.

Mel Germanis Honig, Gallis du Miel dicitur, in succorum censum referri potest: quod autem est calidum, sic cum ordine secundo, ut medicamentum: ut alimentum uerò, & dum actu nutrit, calidum humidum libratertio com terget, alit, coquit, putredini resistit, ut uinum, non cogendo substantiam corporum, quibus exhibetur, uti sal, sed siccando, tergendo, ora aperiendo, transitus purgando. Vrinæ mouet, stomachum subuertit, ob id non miscendum remedijs uomentum: intemperies frigidas humiditas tute sanat, calidis siccis seu biliosis est aduersissimum, sinuosa ulcera glutinat. Coctum & despumatum minus acre, & tergens redditur, sed magis nutrens. Mel medicamentis miscetur, uel crudum, uel coctum, uel solum despumatum, uel cum his coquendum, aut solum despumandum, aut ut crudum maneat. Cum autem despumandum est, coquitur supra prunas aut flammam lig uorum aridorum, & sine fumo.

Mel optimum sit purum adeò, ut totum perlucet, odorum, flauum, acerrimum, dulcissimum, gustanti iucundum, consentientia nec crassa, nec liquida: sed tam sibi coherens, ut continuatam suam quasi lineam longissima non inter cism seruet, si digito attolliat. Idem coquendo paucam spumam remittit, nec thymum improbe olet. Album etiam ex Gallia Narbonensi præstantissimum affertur, & pallidum magis est primo apum mellificio. Sacchar autem, ut uocant, & ipsum mellis species, ex India, & felici Arabia aduectū, in calamus, (ut hoc loco Diosc. tradit) conerescit, minus dulce quam nostras: similiter tamen terget, siccatur, digerit, nec in micum stomacho est, nec sitim affert, ut nostras: quæ res ipsum à melle substantia differre ostendit. Idem sal Indus quibusdam dictus uidetur, uti solis gutta extra camas extracta & densata.

Idem zuchara Arabum re ipsa esse apparet, solo differens compositionis modo per coctionem & expressio nem: noto quidem Varro & Strabonem, ignorato autem Dioscoridi, Galeno, Plinio Nec tibi difficile fuerit rationes eluere eorum, quæ Saccharum Græcorum à zuchara Arabum diuersum contendunt. Actuarius Sacchar ubiq; scribit pro Arabum zuchara, uoce ab his suo more ex Græcis deprauata: aut fortasse cōtra, cū res ea fuerit Arabica, Græci ex his nomen mutati sunt. Saccharum rubrum est ipsa uelut spuma sacchari, spurcitiem coctione depōnentis, calidius & acrius saccharo, uti spuma mellis, melli. Germani zerfallen zuckex Galli Cassonade, appellant.



Cera.

Caput LXXV.



Cera optima est subfulua, subpinguis, pura, odorata, & hallitum quadam tenus melleum referens, natione Pontica, aut Cretica, secundum locū obtinet candicans, & suapte natura pinguis. Candida fit hoc modo: Ex ea radunt album syncerumq; atq; transfundunt in uas, quod satis habeat marinæ ex alto petita, insperfoq; nitri momento decoquunt, cumq; iterum terriue inferbuit, separatim uas refrigerant, ac ceræ pastillum eximunt, deterfa sordē, si qua fortè adhæsit, tum denuò indita noua maris aqua feruet, uti retulimus, & uase dempto ex igne, fundum ollulæ nouæ aqua frigida madefactum, in ceram summam suspensa manu intingūt, quò celerius concreseat, & quàm minima portio extrahatur, suscepto primo ceræ orbiculo, iterum uasis imum aqua refrigeratum, tantisper in ceram immitti debet, dū tota excipiat, orbiculi lino cōfuti, interuacatē spacio, suspē-

A suspenduntur, & interdiu, continuo sub sole, noctu sub luna asperguntur, usq; dum perfecte albescant. uerum si eximius ille candor desideretur, eadem facituri, & idem inde recoqui opera precium est. Nec desunt qui pro marina, in muria quam acerrima semel aut iterum excoquant, dein laguncula tenui, rotunda, ansam habente, extrahunt, postea orbiculos, substrato affiatum cespiti herbofo, insolant, donec candorem summum contraxerit. Præcipiunt hoc obeundum munus uere, cum sol remissa uehementia humorem pariat, ut non facile liqueatur. Cera omnis mollit, calfacit, modicè explet corporea. datur in sorbitione dysentericis. ac milij magnitudine, decem grana ceræ hausta, lac in nutribus non patiuntur coagulari.

Cera calidi frigidi, humidi sicci quodammodo media, crasse essentie, emplastica, debilitè coquit admota, habet paulum quiddam digerentis calidèq; potentie, que melli plurimum inerat. Materia ob id est aliorum medicamentorum, & refrigerantium. Ea aut lutea est, aut fusca, aut alba: & hæc aut natura, ut Pontica apertè acris, aut ablutione, ut Tyrrhenica, & nostra acrimoniae expers. Ceteri colores sunt asciij, ut uiridis ab ærugine, ruber ab anchusa uel cinabrio uulgari, nigra à fuligine tede, charta usita, aut atramento, à quibus mistis uires mutatur. Germani Wachse Galli de la cire appellant, & quædam sunt id est, cera stacte, & stillatiua, initio lib. 2. comp. pharma. gen. legitur.

Propolis.

Caput LXXVI.



B ea in alueariorum foribus cerosæ naturæ inuenitur.

Propolis Germanis Vorstoss, uel bett. Est enim, quo apes in nouis aluearib. primum asperas partes & rimas oblinunt. unde Varro tertio rei Rusticæ Propolim uocat, quod apes faciunt ante foramen introitus porrectum in alueum, maxime æstate, fauorum stabilimentum, quo omnes frigoris, aut iniuriæ aditus obstruuntur. magis ad medicamina usus.

Triticum. Cap. LXXVII.

Optima è tritici generibus ad secundæ ualitudinis usus habentur, quæ recentia & iam perfecte adulta, colorem luteum referunt. dein sequuntur trimestria, quæ nonnullis sitiantia nominatur. Itaq; eruda in cibis teretes tineas gignunt. canum moribus profunt, mania & imposita. confectus eorum simlagine panis, plus alit quàm cibarius. è trimestrium farina panis leuiorem cibum præbet, & qui facile in membra demandetur. farina eorum cum hyoscyami succo illinitur aduersus neruorum fluxiones, quas Græci rheumatismos uocant. item contra interaneorum inflationes. lentigines ex aceto




aceto mulso tollit. furfures autem in acri aceto decocti*, turgentes mammas sedat. A
uiperarum ictibus auxiliatur, & torminosis prosunt. Farinaceum fermentū cal-
faciendi extrahendiq; vim habet. priuatim callos pedum, clauosq; extenuat, & cate-
ra tubercula furunculosaq; ex sale concoquit, & aperit. Sitianorum farina contra ue-
nenatos ictus cum aceto aut uino commodissime illinitur. eadem si decocta in glu-
tini modum delingatur, cruentis excreationibus proderit. contra tulsim & exalpe-
ratas arterias, cum mentha & butyro decocta, efficax est. Tritici pollen si ex aqua
mulsa, aut hydrelæo decoquatur, omnem discutit inflammationem. Panis & cru-
dus & coctus cum aqua mulsa inflammationes omnes illitu mulcet: cum emolliat,
& quadam tenus refrigeret: sed herbis succisue huic rei accommodatis admiscea-
tur. Vetus panis aridus, adiectis conuenientibus, citam aluum cohibet. recens, mu-
ria maceratus, illitu uetustas impetigines sanat. Glutinum ex similagine & polline,
quo chartæ glutinantur, sanguinem excreantibus prodest, si liquidum ac tepidum
cochlearis mensura detur forbendum.

Græcè, Τriticόν. Latine, Triticum. Germanis, Weysen. Gallicè, Ble. Fourment.

Triticum plures includit differentias, ut robum, silignem, sitanum. Triticum uero dicitur, quod tritum
ex spicis sit, ut autor est M. Varro.

Triticum quod cibarium aut panificij gratia agricole serunt, huius plura sunt genera, quæ gentes fece-
runt, à quibus nomen acceperunt, ut Italicum, Siculum, Aphricum, & alia, sed qui scrupulose obseruare, tria
statuunt genera. Primum Robus, Latine: Græcè ῥόβος, πύρος, & ῥόβος. Germanicè, Weysen. Rubus
ste uolleson est weysen, dicitur, quia pondere & nitore præstat. Secundum genus, Latini trimestre, Gre-
ci, Τριμῆστρον, & ῥόβος, uel ῥόβος, quod post sationem tertio mense maturæcit, & metitur. Dici-
tur & de hordeo, & de farre. Inueniuntur autem bimestria, sed circa Thracium sinum, quæ quadragesimo
quàm sata sunt, die metuntur. Eorum autem postremorum agricolis usus gratissimus est. Nam ubi propter
aquis aliæne cassam maturæ satio est omiſsa, præsidium ab hoc petatur. Hoc tritici genus Germani Dima
mellhorn, fortè ab amylo, quod inde fit præstantissimum. Galli Martium uocant, quod à Martio in quo satum
est, tertio inde mense maturæcit. id quod tamen in nostro orbe non fit, in quo Martio mense satum, quinto tan-
dem, hoc est, Iulio mense metitur. Tertium tritici genus non undiquaq; notum, Germanis, Weysen. Weysen
sen, & Weysenfolb, dicitur, in Asia copiose gignitur. Sunt qui hoc frumenti genus Columelle & Plinij
silignem esse putant, diuersum tamen à Laconica siligne, quæ sine crista est, rectam habens spicam, nunquā
maturæscens, iumentorum pabulum, &c.

Hordeum. Caput LXXVIII.



HOrdeum optimum est candidum purumq;. id minus
quàm triticum alit. Præstana tamen ob cremorem in de-
coctione redditū, plus alimenti præbet, quàm polenta ex hor-
deo facta. contra acrimoniaſ atq; gutturis scabritias, exulce-
rationesq; pollet. quibus etiam triticea pituita præsidio est.
sed plus alit, magisq; urinam mouet. lac abundè suppeditat, si
cum fœni culi semine decocta torbeatur. Hordeum abstergit
urinam ciet. inflationē parit. stomacho aduersatur. tumores
concoquit. Farina hordeacea decoquitur in mulsa aqua cum fi-
co, ut inflammationes collectionesq; discutiat. durities cum
resina & fimo columbarum concoquit. cum meliloto autē &
papaueris calyce dolores finit, qui latus excruciant, aduersus
intestinarum inflationes cum lini semine, fenogrecæ, & ru-
ta illini iuuat. strumas cum pice liquida, cera, oleo, & impu-
bis pueri urina, ad concoctionem perducit. Et cum myrro
aut uino, aut malicorio, aut syluestribus pyris, aut rubo, alui
profluvia sistit. podagricis inflammationibus, cum cotoneis
aut aceto prodest. decocta in acri aceto, modo quo hordeace-
um cataplasma, & calida imposita, lepris medetur. Cremor
uero farinæ ex aqua, atq; cum pice & oleo decoctus, puri mo-
uendo est. cum aceto subactus itidem & cum pice contra arti-
culorum fluxiones prodest. Farina ex his aluum cohibet, in-
flammationesq; mitigat.

DIOSCORIDIS

NOMINA ET EXPLICATIO.



Grecè, *ῥοζὸν ὑγρόν*. Latine Hordeum Cereale. Officinis antiquum nomen retinuit. Germanice, Gersten. Gallice, Orge, dicitur.

Hordeum in duo genera distinguitur: *ῥοζὸν ἑστύγιον*, quod & Cantherinum uidetur dictum, quia folliculo castratum nascitur. Germani, *Groß gerst*. Galli mundum uocant hordeum, non sponte granum gluma concidit. Alterum genus hordei *ῥοζὸν ἄστύγιον*, id est, hordeum distichum & Galatinum. Germanis, *Klein gerst*, & *Aleyn gerst*. Gallis orge, dicitur, ponderis et candoris eximij, adeo, ut tritico mixtum egregia cibaria familie prebeat. Est et hordeum trimestre, *ῥοζὸν τριμῆρον*, Summer gersten, & secenrgeon, quasi succursus gentium, Gallis dicta.

Hordeum quod tundendo deglubitur, ac suo cortice castratur, mundatum hordeum Officinis, Germani, *Gerolte gersten*, uocant: tunditur enim hoc, nec molitur.

Zythum. Caput LXXIX.



Ex hordeo potus fit, cui Zytho nomen est: is urinam citrenes & nervos tentat. membranis, praesertim cerebrum uellicentibus, officit. inflationem parit. uitiosum succum creat. elephantiasin gignit. perfusum Zytho cibum, obsequiosum & operi tractabile redditur.

EXPLICATIO.

Ex hordeo & hodie passim potio conficitur, in quibus regionibus uini penuria est, quem Dionysium apud Aegyptios primum inuenisse ferunt. Quae de causa apud Poetas Pelusianus potus nuncupatur. Est autem ueluti uinum quoddam, sed factitium. Suidas Zythum uinum relictè hordeaceum nominat, quod sit ceruisia ex hordeo cocta, uicem uini natui gerens. Sophocles autem & Aeschylus id genus uini ex hordeo factum, non Zythum, sed *ῥοζὸν* uocant. Quod rursus Hellenicus ex oryza fieri commemorat. Hispani Ceriam, Germani *Byer*. Galli Berium, uocant.

Dicoccon.



Curmi. Cap. LXXX.

It & ex hordeo potus, quem curmi nominant, eoq; saepe potu pro uino utuntur: uerum dolorem capitis mouet, malum succum gignit, neruis nocet. Consimilia etiam potus genera ex tritico fieri solent, in Iberia, quae occidentem spectat, & Britannia.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Hoc item fortasse sit hordeacea ceruisia. Posidonius homo Stoicus, non curmi, sed corma maluit appellare, à curmite trahit. Dioscorides addidit, Hispaniam quoque occidentalem & Britanniam, ex tritico similes potus excogitare, Germani, *Weyssen bier*, dicti bier, appellatur. Nec alios ex fruge fieri, nisi supradictos inueniat, qui nationes has exactè consulerit.

Zea, seu semen. Caput LXXXI.

Ea duorum generum est. una simplex, altera in geminis putaminibus grana bina iuncta gerit, ob id *dicoccon* appellatur. plus quam hordeum alit, ori grata, digeritur in panificia, minus quam triticum alens.

NOMINA

LIBER SECVNDVS.
NOMINA ET EXPLICATIO.

123

Græcè, ζέα. Latine, Zea.

Germanis, Tündel / quod Græcè *μυρόκοκκος* & quod *σπικκος* & Græcis, Germa. Spelz / S. Peters Korn / Rintorn. Galli Espeltra, & de l' espeautre appellatur. Apud Campanos priuatim semen uocatur, ubi bis anno feritur. Hanc Homerus non parum illustrat, quando aruum *σπιδ' αραρ* nominaret, quod nonnulli quasi uitam donans, latinitate donarunt, sed iidem à Plinio non probantur. Ceterum eadem sepe simplex est propter unum granum, sepe *διπλόκος* propter duo grana, siue geminum granum duobus utriusque coniunctum, ut hoc loco Dioscorides testatur, ex qua olim alica fiebat, sicut post ex hordeo.

Crafsior farina. Caput LXXXII.

Crimmon crafsior est ex zea triticoq; farina, ex qua pultem faciunt. Abundè calit, facile * conficitur. alium uehementius astringit, si zea, ex qua fit, prius tor * Aliis, agre. reatur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Crimmon hoc loco Dioscoridi pars est crafsulenta farinæ, tritici atq; zea. Sunt qui sufficentur crimnum Crimmon. farinæ cremorem esse, ut succus à cremore differat sola crafsitudine. Cornelius Celsus cremorem ferè pro succo usurpauit. Crimmon hordei genus est Photoni, & cyconis Homericæ liquamentum. Hippocrates crimmon deras urinas, pro crafsis, & ad similitudinem farinæ tritici corpulentis accepit, ut Galenus testatur. Germani Crimmon uoce parum mutata, Kriesß, siue Griesß, appellant.

Siligo. Caput LXXXIII.

EIdè generi siligo adscribitur, sed minus aliquàto nutrit. in panes, ut zea, cogitur. Fit quoq; è siligine crafsior farina, quam Græci crimmon uocitant.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Plin. lib. 18. de siligne ait: Silignem dixerim propriè tritici delicias, cador est, & sine uirtute, & sine pondere. Et mox post ait: E siligne laudatissimus panis, pistinarumq; opera laudatissima. Præcellit in Italia, si Campana pisis nate misceatur. Russior illa: at Pisana candidior, ponderosior uerò Cretica. Panis siligneus, quem silignem Græci uocant, omni alio magis alit, ut autor est Paulus Aegnetæ. E quibus omnibus facillè apparet, silignem hanc à ueteribus celebratam longè aliud esse à frumento, quod nostra ætate silignem, Germanicè Roden, uocamus, ex quo panis conficitur niger & plebeius. Et ab aliquibus Tephra, ab alijs olyra creditur. Cum tamen id genus frumenti sit, quod secale & farago Plinio dicitur lib. 18. cap. 16. Cuius pictura hæc est.

Athera. Caput LXXXIII.

Athera ex zea fit tenuissimè molita. est autem sorbitio, quasi liquida pultriciula, infantibus conueniens, & cata plasmatis effica.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Atheram è zea fieri tenuiter emolita hoc loco Dioscorides asserit, & in sorbitiones decoctum pultriciule dilutioris modo, infantibus uile, unde Germanis Bunderbapp dicitur. Aëtius ex Amylo constare prodit. Iulius Pollux Atheram uocat pulcem è melleacea farina. Est autè puls, quod Germanicè, Etein müss oder bappen, appellamus, cibus ex farre in puluerem & farinam redactio factus, de quo Plin. lib. 18. capit. 8.

Tragos. Caput LXXXV.

Tragos quandam halicæ frugis figuram gerit, multò minus quàm zea nutrit, quod multū acris habeat: quare ægius conficitur, aliumq; magis emollit.



A Samelkorn.



DIOSCORIDIS

NOMINA ET EXPLICATIO.

Tragus cerealis, ut ab herba distinguatur, frumenti genus, aspectu similis alicui seu chondro: granum eius compluribus glumis uestiri refert Galenus, & ob id minus zea nutrire, egrè in uentriculo conuinci, & aluum magis emollire.

Græcè, Τράγος.

Latine, Tragus cerealis.

Germanicè, Samelkorn.

Gallicè, double turguet, dicitur.

Avena. Cap. LXXXVI.

Avena genicula quædam habet. folio & stipula triticum imitatur, & in cacuminibus dependentes paruulas ueluti locustas bipedes gerit, in quibus semen continetur, utile ad caraplastmata, uti hordeum. pulte huius aluus sistitur. prodest tussientibus in sorbitione succus.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Avena genus est, cuius duæ referuntur species: quarum una folio & stipula triticum imitatur, in cacuminibus semina habet ampla, alba & ualde pilosa, ex quibus


Bromos,

Aegilops.

B



Avena.



binæ crustæ nigrantes produnt: ea uidetur esse, quam Theophrastus αἰγίλωρα, appellauit. Germani A
Weiß habet/ & Tiderlindisch habet/ uocant. Altera est, quæ ab hoc βῆμα, & ab alijs αἰγίλωρ di-
cta Germanis Schwarz habet/ Aleyn habet/ superiori non dissimilis folio, stipula & semine, quod huc
minus est, neq; ita pilosum & uber. Apud nos iumentorū pabulo potius quàm hominum cibo nascitur, Cogi-
tur tamen in panes, quando extrema urget fames. Videtur tamen Plinius Germanos nommihl notare barbari
ei propter pulcem, quam nominamus auenaceam, cuius & Dioscorides hoc loco meminit, Germani uocant
Ein haberniß, & haberbiet.

Oryza.

Caput LXXXVII.



Oryza frugum generis est, in palustribus riguisq;
nascens Mediocrimalit, sed aluum supprimit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, ὄρυζα. Latine, Oryza.

Officinis & uulgo Risum. Germanicè, Reiss.

Gallis Ris, appellatur.

Frumenti genus est notum, non pauci usus in cibo. Ex hoc ptissana
etiam conficitur. Vnde illud Horatij: Sine hoc ptisanarum oryzae.

Plin. lib. 8. italei, inquit, maxime oryza gaudent, ex qua ptisanam con-
ficiunt, quam reliqui mortales ex hordeo. Oryza egrè concoquitur, aluum supprimit, & modicas in nutrien-
do vires habet, ut hoc loco Dioscorides testatur, & Paul. Aegnetæ tradit, Celsus inter res boni succi, & que
erassiorē pituitam faciunt, enumerat, & his que imbecillis materis sunt, innumerari posse dicit. Est & al-
terum genus oryzae, quod oryza minor, Germanicè, & melior, & Schwaden dicitur.

Halica.

Caput LXXXVIII.

Halica fit ex zea, quam dico con appellauimus, plus alit quàm oryza, aluū ma-
gis cohibet, itomacho longè utilior, decocta in aceto illitq; lepras tollit. un-
guum scabritias extricat incipientibus ægilopijs medetur, decoctum dysentericis, B
quos excruciat dolor, infusum, idoneum est.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Alica siue Halica, nunc frugis genus est, nunc ex fruge facta farina, & inde pulicula uel sorbitio. Pro su-
ge accipitur à Plinio, lib. 18. cap. 7. ubi de frumento per tempora satis agens, inquit: Aliqui uerna, milium, pa-
nicum, lentem, cicer, alicam appellant. Et non longè post ait: Tunicæ frumento plures, hordeum maxime nus-
dum & alica, Celsus item lib. 1. cap. 17. Cumq; panificia, inquit, omnia firmissima sint: elota tamen quædam
genera frumenti, ut alica, oryza, ptisana, uel ex eisdem facta sorbitio, uel pulicula, & aqua quoq; madens pa-
nis, imbecillissimis annumerari potest. Item cap. 19. Boni succi sunt triticum, siligo, alica, oryza, amyllum. Et
iterum cap. 29. Pulicula uel ex alica, uel ex panicula, uel ex milio, itemq; ex hisdem sorbitio. Est autem faris
adorei genus, quod Halicastrum etiam, ut putamus, uocat Columella lib. 2. cap. 6. ubi de faris generibus a-
gens, sic scriptum reliquit: Adorei autem plerumq; uidimus in usu genera quatuor. Far, quod appellatur Clu-
sinum, candoris nitidi. Far, quod uocatur uernunculum rutilum, atq; alterum candidum, sed utrumq; maioris
ponderis quàm clusinum. Semen trimestre, quod dicitur halicastrum, idq; pondere, & bonitate est præcipu-
um. Et hoc alicam esse uolunt, Græcorum χονδροΐαυδ absimilem, teste Paulo Aegnetæ, qui lib. 1. cap. de fru-
mentaceis ait: Alica in reliquis quidem χονδροΐαυδ absimilis est: sed aluum magis supprimit. Denum ha-
lica pro pulte etiam accipitur à Plinio & alijs, quæ in sanitatis usu & medicina locum habuit, sed diuersis
locis diuersimode præparata, eui ex Plinio lib. 18. cap. 11. patet, ubi uaria eius genera & conficiendi modos
ponit, & è zea, quæ semen dicitur, fieri tradit, quemadmodum & hoc loco Dioscor. Fiebat etiam ex hordeo,
cuius conficiendi ratio docetur ab Apicio, quæ tamen facilius est, & paratior, quam in Iunio mense docet Pal-
ladius, bis uerbis: Hordeum seminaturum, cui adhuc superest aliquid de uire, per manipulos ligabis, & tor-
rebis in furno, ut si cile motu possit infringi, & in modio uno satis aliquantum dum molitur, misceri curabis,
ac seruabis.


Milium.

Caput LXXXIX.

Milium in panes coactum, minus cæteris frugibus alit, sistit pulte sua aluum. Vri-
nam cit. Torretur miliū, seruensq; in sacco ponitur, ut torminibus, reliquisq;
doloribus, si foueatur, auxilio sit.


A

Sorg.



B

Miliun.



NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè κίχρη. Recentioribus Græcis κίχρη. Straboni
κίχρη. Hippocrati κίχρη.

Latinis Milium, à miliaria summa.

Germanis, Hysen.

Gallis du millet, appellatur.


Ex milio quoque p. nem fieri Columella testatur, qui priusquā
refrigescat, sine t. & dio potest absumi: quo non parum se oblectant
Campani. Plinius rursus Sarmatarum gentes tradidit maximē
pulte miliacea ali, que & Germanis hodie usitatissima est, adeoque
penē in pauperū culina quotidiana, quemadmodum Rugis, quos
sub Pomeranorum uocabulo complectimur (Germanice die Ru-
gioner) puls auenacea. Illius autem purgamentum sicut & pa-
nici & sesami applauda, dicitur non aliter in frumento palea, ap-
ud Plinium lib. 13. cap. 10.

Milium Indicum,



Milium Indicum in Italiam Neronis principatu conuectum,
nigrum colore, amplum grano, aridum culmo, Adolefca ad
pedes

Panicum.



pedes altitudine septem, prægrandibus culmis, lobas vocant: omnium frugum fir-
tilissimam, ex uno grano terni sextarii gignuntur. Hodie apud nos passim in hor-
tis ostentationis gratia serunt, grano pisum æquante, atra, stipula arundinea,
quoniam apud nos seminatur pedum proceritate, & frumentum Sarracenicum,
Germanicè, Tärckisch Korn, uel Indisch Korn appellum. Græcè uerò κίχρις
indicos, cuius pictura hæc est.

Quatuor huius milij indici genera reperiuntur. Quoddam enim grana rufa,
quoddam uerò purpurea, aliquod subcandida grana profert. Spicarum siue pani-
cularum etiam in ijs est diuersitas: ceterum omnes murice sine, tamen alia candi-
dos, alia luteos, alia purpureos, prout scilicet grana colorata erunt, flores obti-
nere. Alias quod ad formam attinet, in ijs nulla est differentia.

Panicum. Caput XC.

Panicum frumentaceis seminibus annumeratur, milio si-
mile. eodemq; modo in panes subigitur. eisdem habet
usus. minus tamen & nutrit & stringit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè δὲ κίχρις. Latine, Panicum, à paniculis, in quibus semen est.

Germanicè, pfendy, & Juchschwang. Gallicè Paniz, dicitur.

Panicum milij similitudine profert, dens ut plurimum fuisse luxurians, ulma
penè in surculum extenuato, nutante, rubido paniculorū fastigio, præ densis ac
natis graminibus, aliis purpureis, aliis rufis, aliis nigris, item & candidis.

Sesamum.



Sesama. Caput XCI.

Sesama stomacho inutilis cibus. ha-
lius grauitatem facit, quoties inter
mandendum commissuris dentium in-
haere. neruorum crassitiem illitu discu-
tit. medetur auribus fractis, ambustis,
inflammationibus, coli doloribus, & ce-
rasta moribus. capitis dolores, qui æ-
stuatione concitantur, ex rosaceo lenit.
eadem efficit herba decocta in uino.
præsertim inflammationibus oculorū
doloribusq; prodest. ex ea fit oleū, quo
Aegyptij utuntur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Σάμαρον.

Latine, Sesamum.

Officinae sesamum uocant.


Germani, Leindotter.

Gallicè du sesama, de la ingoline.

Sesamum nunc penè intercidit, quod multis in
vicis ignoratur, quod tamen Columella & Plinius,
ex ædicis Galenus, et ante hunc Dioscorides capite

A presenti collaudant. Veteribus sanè omnibus, ut plerq; alia, notissimum erat, ut ipse Dioscorides, qui in herbarum pictura diligentissimus est, ista ipsa *γῶμα*, id est, nota indicat. Ideo talium historiam præter morem plerunq; neglexit, ex qua colligeremus, quodnam certum esset seminum genus. Sunt enim pauca seminum cerealium notæ, aut sæpe nulla, quibus dinosci possint, adeò ut frugem ipsam non certo uocabulo nominare liceat, ex qua panis quotidianus conficitur. Ita uidemus in plerisq; sola nomina nobis reserare: ut suprâ quoq; ostendimus.

Lolium. Caput XCII.



Lolium quod inter segetes nascitur, molitum, illitu nomas, putrescentia ulcera, gangrænasq; emarginat. sanat cum raphanis, sale & aceto feros lichenas: & ex aceto & sulphure uiuo, lepras, strumas quoq; discutit, cum fimo columbino & lini semine decoctum in uino, rumpit quæ ægrius ad coctionem perducuntur. decoctum ex aqua mulsâ utilissimè ischiadicis illinitur, si cum polenta, thure, myrrha, aut croco suffiatur, conceptionem adiuuat.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis, *γῶμα*.

Latinis, Lolium.

Germanis, *Ährweyssen* / *Lulch*.

Gallis, *luayra*, *yuroie*, *teuille*, *gasse*, dicitur.

Lolium fit ex corruptis seminibus tritici & hordei, inebriat & vertigines facit, ut de prouerbio: *Lolio uicitat*, quod Plinius inter frugum morbos potius quam terræ pestes numerat. à nonnullis *xizanion* appellatur.

Amylum. Cap. XCIII.

B

Amylum ex eo appellatum est, quòd sine mola fiat. Optimum ex trimestri, natione Creticum aut Aegyptium. Ratio faciundi amyli hæc est: Purgatum trimestre triticum madescit quinque die, & si fieri potest, nocte: cum emollitum fuerit, effunditur sensim, sine agitatione, aqua, quò minus cremor utilis unâ excludatur: ubi mollissimum esse uidetur, murata aqua pedibus calcari oportet: rursus infusa, teri: tum demum enatantes ibi fursures in cerniculo eximendi, reliquumq; quallo sportisq; siccatum tegulis nouis confestim torreatur flagrantissimo in sole. namq; si paulisper udum maneat, acorem concipit. Contra fluxiones oculorum, pustulas, cauaq; ulcera efficax est. sanguinis reiectiones potu cohibet. Exasperatas fauces lenit. lacti atq; obsonijs admiscetur. Fit etiam amyllum ex zea, quæ maceratur ac eluitur uno aut altero die, & subactæ farinæ modo manibus subigitur, pressaq; feruentissimo in sole, ut antè retulimus, exiccatur. nullius in medicina usus, ad alia tamen conueniens.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Amylum factitium est & frumenti medulla, arte præparata, appellatum ab eo quòd sine mola fiat, sitq; ex omni tritico & siligne, optimum autem ex trimestri, ut Dioscorides tradit. Inuentio eius Chio insule debetur, ut lib. 18. Plinius tradit, unde & laudatissimum. Post quod maximè laudatur Creticum, mox Aegyptiacum probatur leuitate, leuore, candore, atq; ut recens sit. & siligne quomodo fieret, docet Cato libri sui cap. 87. Conficitur item ex zea, ut hoc loco Dioscorides testatur. Est item frugis genus aliquando significans amyllum, ex quo fit illud factitium. In qua significatione Celsus accipit lib. 2. ubi id cum alijs quibusdam inter ea, quæ boni succi sunt, & stomacho aptissima, commuenerat. Germanicè *Ämidum* / *Ämlung* / & *Brassimel*. Gallis quoq; *amydum* dicitur.

Fœnumgræcum. Caput XCIII.

Fœnigræci farina uim habet emolliendi discutiendiq; in aqua mulsâ decocta aduerfus tam internas, quàm externas inflammationes efficaciter illinitur. lie-nem cum aceto & nitro extenuat, succus decocti eius forminarum malis subuenit: &

Fœnugræcum,

Fœnugræcum sylvestre.



& siue tumor, siue A
præclusio fit uulvæ,
fouentur, & infidēt.
Fœnigræci in aqua
decocti cremor ex-
pressus, capillos, fur-
fures, & manantiâ ca-
pitis ulcera purgat.
locos dilatat & emol-
lit, si cū anserino adi-
pe pessi uice subiiciā-
tur, uiride cum aceto
utilissimum imbecil-
libus locis, & ulcera
sentientibus. deco-
ctū eius prodest ad-
uersus tenesmos scer-
tidamq; dysenterico-
rum proluuium. Ole-
um quod eo exprimi-
tur, & myrto, capil-
los & genitalium ci-
catrices abstergit.

NOMINA ET
explicatio.

Græcis Τάρις, κισσός
Τις, αζρόκη & βόκκος.
Fœnugræcum, Lati-
nis & Officinis. B

Germanis, Fenigree, & Bockshorn. Gallis fenigrec, & fenegreue, dicitur.
Fœnum Græcum inter fruges est. Plinius & Varro Silicam, & Siliculam dici testantur: Columella sili-
quam simpliciter uocat. Vis eius siccare, mollire, dissoluere, testante Plinio libro 24. ad finem. Nec dubita-
tur quā decoctum eius utilissimum sit uuluis, inter aneisq; exulceratis: sicuti semen articulis atq; præcor-
dis sumitur & sorbitio & farina ad pectus exulceratum, longamq; tussim. Diu decoquitur, donec amaritudo
desinat: postea mel additur. Siccum primo gradu, calidum secundo, lib. 8. simpl. calidum autem mediocriter,
ob id digerere dicitur, lib. 1. comp. pharm. part. Nam is gradus est medius inter summum & omnino tempe-
ratum, quod nec calidum absolute, nec frigidum iure dixeris: phlegmonas ardentes irritat & exacerbant, mi-
nus calidus & duras digerendo sanat. Paulus Aegineta lib. 1. calfaciendi, uentremq; subducendi um illi tri-
buit, si ante alios cibos sumptum fuerit.

Est & Fœnigræci sylvestre genus quoddam, quibusdam Trifolium minus, siue lotus sylvestris dictum.
Germanis, Wild fenogree, uel Steyn wicken, nominatum. Folijs trifolij utrinq; obtusum, humi recumbens,
flosculis albicantibus, ad similitudinem orobi, & quibus folliculi incurui, oblongi sunt, semen continentes angu-
latum, fœnigræci modo, gustu orobi. Inascitur ueribus montibus, & iuxta uias. Vim habet, uti alia trifolia
& linum, molliendi, reperiendi, ac sedandi dolores apostematum.

Linum.

Caput XCV.

Linum uulgo notum est. cuius semen easdem quas fœnugræcum uires ha-
ber. discutit & emollit omnem intus forisq; inflammationem, cum melle,
oleo, exiguaq; aqua decoctum, aut melle cocto exceptum. uiria cutis in
facie uariosq; crudum tollit. illitum cum nitro & ficulneo cinere, parotidas
duritiasq; discutit. ulcera quæ serpunt, fauosq; cum uino decoctum expur-
gat. ungues scabros eximit, cum pari modo nasturtij & mellis. uiria pectoris
extrahit, si ex melle in eclegmatis uicem substituat. rufsim lenit. uenerem
stimulat, si farina piperis & melle exceptum, pro placenta largius adsumatur.

Huius

A

Linum.



Huius decoctum interaneorum uulnūq; erosionibus immittitur. alui excrementa euocat. ad uulnū inflammationes in de-
fessionibus perquam utile.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Linum Λίνον.

Latinis & Officinis linum.

Germanis, Lein, & Flachs.

Gallis du lin, appellatur.

Λίνον αἰσχρογόνον, id est, lini semen, Germanicè Leinsamen / humido & sicco quodammodò temperatum, calidum autem quodammodò ordine primo: flatu-
sum est etiam si frigatur, adeò plenum est humiditate recrementitia. Quia igitur
calidum, humidum, flatuosum, semen homini generat. Lini semen torrefactum
terget, ut ptisana & farina fabarum, lib. 7. comp. pharma.

Lini semen tepidè calidum, ut chamamelum. Lini semen in aqua coctum
refrigerantem succum gignit. Linofermon & succus rosarum frigidioris me-
dia temperie sunt naturæ, sed non ita multò, quum potius caloris sunt tepidi.

Lini semen refrigerat, siccatur. Linofermon tanquam frigidissimum uitian-
dum asthmaticis censet Galenus, ut meconium. Mandragoram, hyoscyamum, ci-
cutam, psyllium. Linofermon urinas exigue mouet: fixum autem ureticū
magis fit, & aluum magis sistit esu.

Cicer.

Caput XCVI.

Album.

Rubrum.

B



Cicer satium aluo idone-
um est. urinam ciet. in-
flationem parit. colorem cō-
mendat. menses ac partus ex-
pellit. lac auget. cum eruo de-
coctum illinitur ad inflamma-
tiones testium, uerrucosas in-
formicationes, ad scabiem, ul-
cera capitis manantia, impeti-
ginesq; contra carcinomata,
& ulcera quæ cacothæ uocan-
tur, cum melle & hordeo pro-
dest. Alterum genus arietinū
nominatur. utrunq; cit urinas,
dato cū rore marino, hydro-
pici aut regio morbo laborā-
tibus, eorum decocto. Lædūt
ea exulceratam uescicam, & re-
hes: in uerrucarum formican-
tium pensiliumq; genere, pri-
ma luna singulis granis singu-
las tangunt, eaq; grana linteo
lo deligata abijci post se præ-
cipiunt, ita decidere eas arbi-
trantur. Syluestre cicer folijs
satium simile est. odore acris,
sed semine discrepat. idē quod
satium præstat.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Cicer legumen est, cuius differentie plures, magnitudine, figura, colore, sapore. Est enim arietino capiti
simile, unde ita appellatur, Græcis κίς, Germanis Bichern / Bichererbs / Bisserebs. Gallis Ciche, uel pois
cices.

cices, dictum, album nigrumq; est. Et columbinum, quod alij Venerum, Columella Punicum vocat, candidū, rotundum, leue, arietino minus, quo religio peruijs adhibet. Est et cicercula, Græcis δ' ἀδύρε, ut Theodorus ē Theophrasto reddidit. Columella tamen eandem ciceram et cicerculam vocat, Gallis cerre, uel pisa cerra. Quinquam et aracum sic uocant. Martinus Gregorius interpretatur iesse: inæquales angulos habens, ueluti pisum. Dulcissimum autem id quod eruo sinuillimum, firmissq; quod nigrum et rufum, quāvis quod album: autor lib. 18. Pl. Paulus Aegneta lib. 1. de his sic tradit: Cicera inflant, abstergunt, genit ale semen augent, Venerem stimulant, calculum terunt. At fricta statim quidem emittunt, sed difficulter concoquantur.

Faba.

Caput XCVII.



Faba inuersa.



Faba.

Faba inflationem excitat, agrē concoquitur, tumultuosa somnia facit, tulusi confert, carnem gignit *, media calidi frigidique natura decocta in posca, & cum tuo cortice chitata, dysenterias & coliacorum profluuia sistit. contra uomitiones conuenienter manditur. inflatione leuior contrahitur, si aqua prior inter coquendum abiciatur. viridis plus negotij stomacho exhibet, maioremq; statum parit. Lomentum eius & per se, & cum polenta illitum, inflammationes quas uulnus excitauit, mitigat. cicatrice concolores facit, turgentes grumoso lacte mammas, etiam si inflammatione tententur, adiuuat. lac restinguit, furunculos, sugillata, parotidasq; cum foenigraci farina & melle discutit. cum rosa autem, thure & oui candido, procidentes oculos, tumores, uasq; reprimt. subactum uino, suffusiones & ictus oculorum recreat. Manducata sine cortice faba, ad auertendas fluxiones fronti illinitur. decocta in uino restium collectiones sanat, quod tardius

* Hoc quidam
carent.

us pubes erumpat, pueris imo uentri illinitur. utiliginem purgat. Fabarum cortice illiti capilli, qui post euulsionem renascuntur, gracilescunt, & minus alimenti capessunt, cum polenta, scisso alumine, & uetere oleo impositi cortices, strumas discutunt decocto earum lanæ inficiuntur. Faba dempto cortice in illas parreis diuisa, in quas suapte natura scinditur, imponi solet sanguinis defluxionibus ab hirudine concitatis: namq; eas supprimit, si semisecta apprimatur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Κόρα. Latinis et Officinis faba.

Germanis, Bon. Gallicè fève, dicitur.

Faba nostris non ita damatur, quemadmodum olim à Pythagora, maxime cum fresa fuerit, hoc est, que mola leuiter confracta et decorticata fuerit. Altera enim solida dicitur, que adhuc integra et cum cute est. Fabalia uero sunt cortices et silique, de quibus Columella inquit, se audisse ueteres rusticos malle maturas fabas. Fabalia, quāvis fructum trimestrem, cuius ratio ex Plin. colligitur. Nam silique cauleq; gratissimo sunt pabulo pecori. Folliculi uero eius apud Festum ualuuli dicuntur, sed quod in summo fabæ nigricat, hilum est.

Faba inuersa, que uocatur Germanis Gewandbonen, uel Baumbonen, quasi uirgultis innascitur: folijs trifolij. Altero anno fructificat.

Faba Aegyptia.

Caput XCVIII.

Aegyptia

A *Aegyptia faba*, quam aliqui Ponticam uocant, in Aegypto plerumque prouenit. in Asia etiam Ciliciaeque la cubus inuenitur. Folia habet ampla, etiam si arborum frondes* comparentur: caulem cubitalem, digiti crassitudine: florem roseum, dupla papaueris amplitudine. & ubi flore exiit, fert folliculos uesperum fauis similes, in quibus faba supra operculum, bullantis ampullae modo, prominet. Ciburion ideo nominant, id est, arculam, quoniam feratur ipsa, humenti glebae mandata, & ita in aquam demissa. Radice firmatur harundine crassiore, quae cruda coctae estur, et Colocasiae nomen est. Faba uirens mandatur, & exiccata nigrescit. uulgarem magnitudine superat. Adstringendi facultatem obtinet, & stomacho utilem. dysentericis, celiacisque prodest, insparso, polente uice, lomento. datur quoque in pulte. Cortices in uino mulso decocti, si terhi inde cyathi bibantur, magis proficiunt. Facit ad aurium dolorem, quod in earum medio uiride spectatur, gustu amarum, si tritum & cum rosaceo coctum instilletur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Colocasia. Plinius totam plantam Aegyptiae Faba colocasiae nomine intelligit: quam lib. 21. sic depingit: In Aegypto nobilissima est colocasia, quam cyamon uocant aliqui. Hanc à Nilo metunt: caule cum coctus est harenoso in mandendo. Thyrsus autem qui inter folia emicat, spectabilis, folijs latissimis, etiam si arbores comparentur, ad similitudinem corum quam personatiam in nostris annibus uocamus: ad coq. nihil suis dotibus gaudet, ut implexis colocasiae folijs in uariam speciem uasorum potare gratissimum habeant, unde illud Horatij: Ciboris exple. Et Strabo geographiae lib. 17. ait: In Aegypti lacubus ac paludibus bibulus nascitur, et Aegyptia faba, ex qua Ciburium fit (et paucis interpositis ipsam describentibus uerbis ait): oblectantur autem mirum in modum scaphis Thalannegeis densissima fabeta subeuntes, et eorum folijs lumbrati, quae adeo magna sunt, ut poculorum et catinorum usum praebent. Habent enim concanitatem quandam ad id idoneam: unde Alexandriae officinae ijs plene sunt, et ut uasis utuntur.

Faba et semen ipsum quod amarum est, uiride aegre concoquitur, exigui nutrimenti est, et inflat. Siccatum tamen minorem inflandi vim habet, autore Theophrasto et Athenaeo.

Lens. Caput XCIX.



* Alij, emollit.

Lens frequenti cibo aciem oculorum obtundit, aegre concoquitur, stomachum male habet, eumque & intestina inflat, sed aluum cum cortice cocta sistit*. Praestat in cibo quae facillime coquitur, nihil atri in maceratione reddens. uim habet adstringendi, quae ex causa aluum cohibet, si detracto antea cortice discoquatur accurate, primaeque aqua inter coquendum effundatur (quippe primum id decoctum uentrem resoluit) somnia tumultuosa excitat, capiti, neruis, ac pulmone inutiles. melius suo fungetur munere contra alui fluxiones, addito cum aceto intybo, aut portulaca, aut betula nigra, aut bacis myrti, aut putamine punici, aut aridis rosas, aut mespilis, sorbisue, pyris Thebanis, aut malis cotoneis, aut cichorio, aut plantagine, aut gallis integris, quae post decoctionem adijciuntur, uel uuarum rhois, quae obsonijs insparguntur. uerum acetum cum eo diligenter percoqui debet, alias aluum conturbat. Contra subuersionem stomachi, triginta grana lentis delibata deuorari proderit. decocta cum polenta, & illita, podagras lenit, sinus cum melle glutinat, crustas rumpit, ulcera purgat: decocta in aceto duritias & strumas discutit. cum cotoneo aut meliloto medetur inflammationibus oculorum, sedisque, addito rosaceo: sed in amplo sinu aut inflammationibus

tionibus sedis, quæ maius remedium exigunt, cum putamine punici, ac siccis rosis, A
adiecto melle, decoquitur. nomis quæ in gangrænam euaserunt, adiuncta maris a-
qua, pustulis, & his quæ serpunt, igni sacro, per nionibusq; ut antea dictum est. con-
tra mammas in quibus lac in grumos coit, & præ nimia sui copia profunditur, co-
cta in aqua maris, & illita auxiliatur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Lenticula, quæ & lens, Germanis, Linsen. Gallis Lentile.

Græcis uero, quia edendo est, φαγός ἐδίομεν, dicitur, leguminis genus est, cuius duo genera in Ae-
gypto dicit esse lib. 18. cap. 12. Plinius. Alterum rotundius, magisq; : Alterum sua figura. Vnde uario usu trās
latum est in lenticules nomen. Inuenio apud autores æquanimitatem fieri uescentibus ea. Laudatur maximè
quæ apud Pelusium nascitur oppidum. Vnde illud Verglij : Nec Pelusiæ curam aspernabere lentis.
Et Ausonius in monosyllabis ait : Et Pelusiaco de semine planta, teres lens. Martialis item : Accipe Nilia-
cam Pelusia munera lentem. Vilior est alica, carior illa faba. Optima ut Plin. lib. 22. cap. ultimo tradit, quæ
facillimè coquitur, eaq; quæ maximè aquam absorbet. Aciem oculorum & stomachum inflat, sed aluum fistis
in cibo, magisq; discocta aqua coelesti. Eadem soluit minus percocta. Propter dissolutionem stomachi. 30. gra-
na lentis deuorantur. Celsus ipsam inter ea quæ aluum adstringunt, enumerat, his uerbis : Lenticula cui uel Be-
ta uel intubus, uel ambubicia, uel Plantago adiecta est : magisq; etiam si illa antè fricta est.

Phasioli.

Caput C.



Phasioli inflant. spiritus cient. & grè coquuntur. ui-
rides cibo aluum emolliūt, ad uomitiones idonei.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Phaselus differt à phaseolo, & phasiolo, ac ochro, quem Gaza nunc
ciceram, nunc eruiam transiit, super quo multum hodie inter claris-
simos Medicos controuertitur. Annumerantur autem non tam legumi-
nibus, quàm iumentorum pabulo. Ea igitur uisa est mihi ratio, cur uilem
Verg. nuncuparit. Editur tamen in quibusdam regionibus in modū pha-
copisana, id est, Eresorum cremore, cuius & Plinius meminit.

Eruum satium.

Eruum. Cap. CI.



Eruum paruus frutex omnibus co-
gnitus, angustio folio, tenuis, femi-
na in ualulis habēs, è quibus farina fit,
nomine eruina, ad medendi usus conue-
niens: eruum capiti onerosum est. aluum
esuturbat. sanguinem per urinam extra-
hit. elixo boues saginantur. Parandæ fa-
rinæ ratio hæc est: uberiora grana can-
didaq; deliguntur, permiscendoq; aqua
resperguntur, donec sufficienter combi-
bant: postea torrentur, usq; dum hians
cortex disrumpatur: molitaq; farinario
cribro incernuntur: postremò farina re-
conditur. Hæc aluo utilis est. urinā ciet.
meliozem colorem efficit. sanguinē per
uesicam aut aluum cum torminibus eli-
cit, si largius in cibo aut potu assumatur.
ulcera cum melle purgat. lentigines &
uitia cutis in facie, & maculas, totumq;
corpus emendat. nomas, gangrænas, du-
ritiasq; serpere non patitur. mammarū
duritias emollit. atra ulcera quæ therio-
mata uocant, fauosq; emarginat. carbū-
culos rumpit. cū uino subacta illitu mor-

A sibus uiperarum canum hominumque medetur. urinæ difficultates, tenesmosque ex aceto mitigat. Eruum tabidis, qui alimentum non sentiunt, tostum, & ad nuci magnitudinem melle exceptum, sumptumque conuenit. Eius cremor perniones, & pruritus in toto corpore, sanat fouendo.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis, ἔρυν. Latini & Officini, Eruum, ab eruendo dicitur.

Germanis peregrinum. In Gallia Narbonensi, ers.

Eruum calidum primo ordine, sicum secundo, amarum proinde, incidit, terget, obstructions liberat, lumborum sanguinem per urinas euocat, praesertim rufum. Nam Eruum non candidum, sed rufum uehementer amarum est, candidum dulcius, lib. Amido.

Lupini.

Caput CII.

Satius lupinus notus est. Cuius farina cum melle delin-
ctu, aut potu, uentris animalia expellit. ipsi quoque mace-
rati, & cum sua amaritudine citati, eadem efficiunt. Deco-
ctum eorum idem munus praestat, cum ruta & piperi positi.
quare lienosis prodest. eodem ulcera tetra, quæ theriacaliter
uocant, gangranas, incipientem scabiem, eruptiones pustu-
larum, ulcera in capite manantia, uiriliginis, maculasque fo-
uere utilissimum, menses & parus extrahit, cum myrrha
& melle subditum inuellere. Eorum farina cutis liuoresque
corrigit. inflammationes cum polenta & aqua mitigat. tu-
bercula, & coxendicem cruciatus ex aceto lenit. strumas in
aceto cocta illitaque dissipat. carbunculos rumpit. Decocti
celestis aqua, donec in cremorem lentescant, faciem abster-
gunt. medentur pecorum scabiei, cum radice nigri chamae-
leontis, ita ut tepente decocto abluantur. Citum nam radix
cum aqua cocta. Lupini triti, ubi macerati dulcescere corpe-
runt, cum aceto potui, fastidium detrahunt, & cibi audiatif-
faciunt. Gignuntur & syluestres lupini, fariis similes, sed
omnino minores, qui eadem quæ fariis, faciunt.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis, βέποι. Latini Lupini, quod instar lupi terra sita
tens: ad quod & nomenclatura Germanorum alludit.

Officina genuinum nomen retinere. Germanis, Feigbonen/Wolffes
schoten/Wickbonen. Galis Lupini, dicuntur.

Lupinus est satius, idemque uel dulcis, uel amarus: agrestis uero minor,
sed amarior, & ad omnia ualentior domestico, terget, tenuat, incidit, dige-
rit, siccatur sine morbo: uiriliginis, sporas, achoras, ulcera cacoethes sanat, lum-
bricos necat sumptus & ad motus, iecur & lienem purgat, phymata, chera-

das, liuida ex aceto uel posca, uel oxymelite, pro agri natura, & affectus uarietate, coctus digerit.

Rapum.

Cap. CIII.



Omnia quæ melle
remittuntur.

Decocta rapi radix alit. inflammationem parit, humentem
ac fluxam carnem creat. uenerem stimulat decocto po-
dagra, pernionesque fouentur: contritoque rapo atque in po-
sco iuuantur: si excavata radici rosaceum ceratum adiga-
tur, & feruenti cinere eliquescat, exulcerans pernionibus
proficiet. Cymæ eius decocta manduntur, & urinam ciunt.
Iemen antidotis & theriacis, praesertim quæ sensum doloris
auferunt, anodyna uocant, idoneum est potum contra uene-
na salutare est. Venerem concitat rapum. muria conditum,
minus alimenti sufficit, sed multo magis appetentia recreat.
Syluestre



Sylvestre rapum in arvis nascitur, fruticosum, in cubiti altitudi-
nem assurgens, ramosum, laue. in cacumine folia fert laeua, digi-
tali latitudine, aut maiora: & fructum in siliquis calyculatis.
cumq; eorum inuolucra aperiuntur, alia intus siliqua specta-
tur, quæ quandâ capitis speciem præbet, in qua semina parua-
la concipiuntur, foris nigra, intus alba. Additur in medicamēta
quibus ad detergendâ cutē in facie, toroq; corpore utimur, præ-
sertim quæ ex lupini aut erui, tritici aut lolij farina, fieri solent.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis, ῥαπὺν, ῥάπυς. Latinis & Officinis Rapum, uel Rapa.
Germanis, Rüben. Gallis ung. nauea.

Rape notæ sunt & in cottidiano cibi usu. Quondam ut alia salgama etiam cō-
diebantur: quarum condendarum modum unum tradit in Decembri mense Palla-
dius. Alium etiam modum habes apud Columellam lib. 12. cap. 54. Apud nos nunc
integra, ressecta herba in fossis subterraneis, substratis nuncum aut aliarum arbori-
um folijs, & cooperitis adseruantur: aut integra & detergâ, leuiterq; cocta cum alijs
oleribus ac pomis ac pyris in maria infusa, in uasis seruantur, pondere imposito ut
ius supernatet. Interdum etiam leuiter cocta et munitissimè concissa, saleq; plurima
aspergâ, in doliolis seruantur.

Rapum sylvestre, quod Græcis ῥαπὺν, ῥάπυς, Germanicè, Rapunglen.
Gallis Raponen, appellatur. Describitur enim cubitali altitudine consurgere, fru-
ticosum, in cacuminibus leue, folio glabro, longitudine digitali, aut interdum maio-
re. Fructum fert in siliquis calyculatis, dumq; seminum inuolucra dehiscunt, alia in-
tus capitula a continetur siliqua, in qua paruula semina concipiuntur, foris nigra,
sed quæ fracta candicem.


Napum.

Caput CIIII.


Rauē de sanoye.

Napus buniat.

Napus bunias sylvestris.



Rauē de Lymosin.



M

A Cocta napi radix inflat, modicum alit. semen eius potum uenenorum vires cheberat: antidotis admiscetur. Conditur sale radix.
 *Potius, Napis
 et eius radix
 cocta.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Grecis, Βαρυίς. Latinis & Officinis, Napis. Germanis, Steckrüben/satiuus, Trucl'en steckrüben/sylvestris, Wast' steckrüben. Gallis, Rouomete, naucan, Raueronde de sauoie, ou de Limosin.

Easdem quas rapa vires obtinent. nam congeneres sunt rapis, à quibus longitudine imprimis differunt. Plura eorum genera. Palma Romæ, ut libro 19 scribit Plinius, Aniternis datur, deinde Nursinus, tertia nostratibus. Hinc illud Martialis de naps: Hos Aniternus ager felicibus educat hortis, Nursinas poteris parcius esse pilas. Condiuntur etiam raparum modo, condituræq; rationem docet Col. libro 12.

Radix.

Caput CV.

Raphanus sylvestris.



Radix, quæ Grecis raphanus dicitur, exaltat. flatu gignit. ori suavis est, sed stomacho aduersatur. ructus ciet. urinam pellic. aluo aptior. summo tamen cibo sumi debet, quò magis eius distributionem adiuuet. cum autem præsumitur, cibum suspendit, quare uomituris commodissime datur ante cibum sensuum aciem excitat: decocta contra uterum tutissimam, & pituitæ crassitiem in pectore, efficax est. cortex ex aceto mulso, celerius uomitiones mouet. hydropicis commodissime illinitur. lienosis utilis sugillata cum melle rapit. & nemas amolitur. contra uiperarum ictus auxiliatur. alopecias ad pilum reducit. lētignes cum loliacea farina emendat his qui fungis strangulantur, tamen cibo quam potu salutarius est. Semen uomitiones facit, urinam mouet, menses cit, lienem extenuat, cum aceto illitum gangrenas ualidissime emarginat, coctum cum aceto mulso, anginis perquam utiliter gargari zatur. contra cerastis morsus, potum ex uino, auxilio est. Sylvestris raphani, quæ Romani amoracia uocant, folia satiuo similia, sed magis lampsanam imitantur: radix gracilis, tenera, subacris. Tam solum

quam radix in olera recipitur. sed hæc excelsa cit, urinam concitat, æstiuosa est.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Grecis, βαρυίς, ἄ. Latinis & Officinis Radix, Raphanus. German. Rātid, Gallis, Refort. quasi radix fortis dicitur. Raphanus apud antiquiores Græcos pro Cratibe, id est, brassica accipitur, apud postiores uero cum Græcos cum Latinos radicem significat, quæ comeditur, & quæ radicula uocat Celsus. Cui amritudo est plurima, ut inquit lib. 19. Plin. & uis mira obligandi spiritum, laxandiq; ructum, ob id cibis illiberalis utiq; se proximè olus mandatur. Aegypto mirè celebratur propter olei fertilitatem, quod de semine eius faciunt. Frigore adeò gaudet, ut in Germania, præcipue in agro Argentineni, insantius puerorum magnitudinem æquet. Viliissimi in cibis hyberno tempore existimantur: iidemq; detibus semper iuuenti, quoniam atterant. Mirumq; omnibus uehementiam saporis inesse, Cesar de agricultura lib. 12. cap. 22 ex Florentino. Succus ipsorum ex aqua acceptus, boletis & uenenis resistit. Si uero raphani succo quis manus suas probe illinat ac conficit, inatrepide & citra periculum reptilia ac serpentes apprehendet. Dulces erunt, quorum semen in uino, aut uisurarum passerum succo fuerit maceratum. Raphanus sylvestris, cuius pictura hæc est, Grecis Xegia, ἄ. ἡ γὰρ βαρυίς ἄ. Latinis, Amoracia. Germanis, Hederich, dicitur.

Siler.

Caput CVI.

Siler

Sifer.

Sifer uulgo cognitum. Cuius radix decocta origrata est, A
& stomacho utilis. urinam ciet, & appetentiam inuitat.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Zizagop.

Latine, Sifaron & Sifer.

Germanis, Geitlin & Stigelin.

Gallicè, Cheruy.

Plinius libro 19. mox post pastinacæ genera sic scribit : Sifer & ipsum
Tiberius princeps nobilitauit, flagrans omnibus annis è Germania. Geldu-
ba, appellatur Castellum Rheno impositum, ubi generositas præcipua. Ex
quo apparet frigidis locis conuenire. Inest longitudine neruus, qui in decoctis
extrahitur, amaritudo tamen magna parte relicta, quæ mulso in cibis tem-
perata etiam in gratiam uertitur. Et lib. 20. idem ait : Stomachum excitat, si
lidium absterget sifer.

Lapathum, siue rumex. Cap. CVII.

Lapathum acutum.



Oxalis.

B

Ex generibus rumi-
cis, oxylapathum
nocant, quod in acutum
rendit, prædura habens
extrema, non nisi palu-
stribus nascens, alius est
fatiuus, illi dissimilis.
tercium genus sylvestre,
paruum, plantagini pro-
ximum, humile & tene-
rum. quartum est, quod
alijs oxalida, alijs anxuri-
da, aut lapathon uocant.
folia eius sylvestri ac exi-
quo rumici similia, caule
non magno, semine sub-
acuto, rubente, acri, in
caule & agnatis appendicibus emicante. Omnium decocto olere alius emollitur.
crudi illi melicerides, rosaceo aut croco adiecto, discutiuntur. Sylvestris & oxy-
lapathi, & eius quam oxalida nominant, semen ex aqua aut uino utiliter bibitur cō-
tra dysenterias, & celiacorum affectus, stomachi fatidia, scorpionum ictus. quod
si quis in potu præsumat, nihil molesti ex ictu patietur. Radices ex aceto coctæ aut
illitæ crudæ, lepras, impetigines, & scabrosos ungues perfrant. sed antea locus a-
ceto & nitro in sole perfricandus est. pruritus corporis decoctum earum sedat, si fo-

M 3

DIOSCORIDIS

Aueatur, aut in folijs balnearum confricetur. coctæ in uino & instillata, aurium don-
tiunq; dolorem mulcent. strumas parotidasq; discutunt. lienum cum aceto extenu-
ant aliqui amoliendis strumis radicem gestamine utuntur, eas collo appendentes
tritæ & admodum feminarum profluuia sistunt. cum uino autem potæ, regio morbo
medetur. calculos uesicæ comminuunt. menses cient. scorpionum ictibus auxilian-
tur. Hippolapathon olus est magnum, in paludibus nascens. easdem habet uires,
quas supradicta rumicis genera.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Lapathi siue lapatis (utrunq; enim dicitur) plura sunt genera: Vnum quod oxylapathon, quasi acutum la-
patium, uocatur. Germanis, Lende wurz, Mengel oder Menbel wurz. Gallis, Herbe aux trigneux.

secundum genus est hortense, Ἀγροδον κεντρίον Græcis. Ἰανὴ Lendenkraut, Germanis. de Lampe
apud Allobroges dictum priori omnino dissimile, folia habens lata, similia betæ.

Tertium genus est agreste, Græcis Ἀγροδον ἄγριον. Germanis, Dreyt Sauampffer, breue. plan-
tagini simile, molle, & in terra iacens.

Rhabarbara monachorum.



Quartum postremo est, quod quidam ab aciditate &
potius oxalida appellam, alij amaxyrida, aut agreste la-
pathum.

Græcis ὀξυλίς.

Officinis acetosella. Eretes oxymida uulgo dicunt.

Germani, Spießampffer dicunt, cuius folia tertio
generi similia sunt, & eius caulis non adeo grandis est,
semen acuminatum, colore rubro, sapore acri, quod in
caule & adnatis nascitur.

Est & quod Hippolapathon, id est, grande lapa-
thum à Græcis uocatum, grande olus in palustribus na-
scens.

Sunt quæ Monachorum Rhabarbarum, sic hodie tan-
quam peregrina & incognita res, appellatum. speciem
Rumicis siue Lapathi esse contendunt, cuius pictura su-
pra. Plinius hæc genera aliter tradere uidetur libro
20. cap. 2. Lapathum digerit modicè, oxylapathum di-
gerit, & repellit, utriusq; semen leuiter astringit, unde
dysenterias & diarrhas sanat, præcipue oxylapathi.
Hippolapathum, quod in aquis omnino nascitur, eadem
præstat, sed imbecillius: idem uerò ualentius fuerit in
hortis hodie transtatum.

Lampfana. Cap. CVIII.

Lampfana syluestre olus est. plus alle-
quàm rumex, & stomacho utilius, cu-
ius folia caulesq; coquuntur in cibo.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Ἀμφύλην. Latine, Lampfana, holus syluestre.

Germanis, Wild Fisl/Wild senffer aut/Weiß Heyderich.

Rura Gallie Sanuas albas, quasi syluestres napos uocant, de sanues blanches.

Bunium.

Caput CIX.

Bunium caulem emittit quadrangulum, & in eo foliosos ramulos, senues, præ-
tenuibus foliolis & flosculis scatentes, longitudine digitali: folia propter ra-
d. cem, apio similia, sed multò tenuiora, & quæ modo quodam folia tribuli imitem-
tur.



tur. flores anethi semen odoratum, minus hyoscyama
mo. Excalfacit bunium. urinam ciet secundas de-
trahit. lien, renibus & uescicæ utile. eo humenti ari-
dité utuntur, exempto radice & caulibus succo, ex
aqua nulla.

NOMINA ET EXPLICATIO.


Græcè, Βώνιον. Latine, Bunium.

Germanus, S. Barbaren Kraut.

Gallis herbe au charpentier, dicitur.

Vulnerariam herbam esse, & temperamentum eius & experien-
tia docet. His uero potissimum ulceribus medetur, quæ impura
sunt, & in quibus caro supercreta fuerit: nam quia ualenter sicc-
cat, ideo sordes extergere, & carnes minuere potest.

Blitum. Caput CX.



Blitum estur oleris modo. alio utile
est. nullius in medicina usus.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis, Βλίτον, ἢ Βλίτρον.

Latine, Blitum.

Officina cum beta confundunt.

Germanis, Mayen.

Gallis Porree rouge, Tourgon in Narbonensi agro,
dubitat, breyon apud Sabaudos.

Blitum imbecilliter refrigerat & humectat, libro

2. comp. pharma. in secunda recessu à temperatis, lib.

6. simpliciam uulgare est.

Malua. Caput CXI.

Malua sariua cui longè aptior syluestri. stomacho aduersatur. aluum inuata
sed multo magis caules. interaneis & uescicæ utilis. cruda folia cum salis exi-
guo manducata, erysipelas ex melle sanant. uetum cum cicatricem trahere ceperint,
sa demum citra salem utendum est. contra aculeatos apium uespriumque ictus, illita
efficax est. eadem cruda cum oleo trita peruncti, non feriuntur. ulcera manantia in
capite, furfuresque cum urina sanat sacris ignibus & ambustis decocta folia, itaque
utilissimè ex oleo imponuntur. Eius decoctum uulua in fessione mollior. prodest
erosionibus uescicæ, & intestinorum, uulua, si disque clystere infutum. ius deco & a cū
radice sua, contra omnia uenena auxiliatur, si continuo à bibentibus reuomatur.
contra phalangiorum morsus remedio est. lac euocat. semen in uino potum, addito
loti syluestris semine, uescicæ cruciatus lenit.

A



Malua sativa.

Malua arborescens.



B

Malua minor.
Braun GensbappelNOMINA ET EX-
plication.

Que maiores, aut minores dicantur malua, satis ex Plinio lib. 20. capit. 21. colligere licebit, ubi de maluis et carum generibus agens, sic scribit: In magnis laudibus malua est utraq; & sativa & sylvestris. Duo genera carum amplitudine folij discernuntur. Maiorem Greci Malopen uocant in sativis, alteram ab emolliendo uentre dictam putant malachen. Et sylvestribus, cui grande folium & radices albae, althea uocatur, ab excellentia effectus a quibusdam aris stalthea. Ex quibus Plinij uerbis colligitur, maluas bifariam inter se diuidi: suntq; prima & praecipua illarum genera duo. Sativa sine hortensis, Graecis Μαλὰχ

Malva γρηναία: Germanis, Römisch bappel, dicta, & sylvestris, Μαδαργρηναία. Germanis, **Ge** A
meyn bappel, appellata. Quorum utraq; iterum in alia duo secerunt. Prior quidem illa in sativam & hor
ensem, quae in hortis ad ciborum usum secebatur, & qua pro oleo utebantur: & in eam quae locis incultis
nascitur sylvestris, quae etiam edendo fuit, sed minus quam alia. Posterior autem quae sylvestris est, duabus il
lis indig; procerior, & altius à terra erigitur: & in hortis crassior arborescit, unde à Galeno ànadendro
malache, quasi arborea seu arborescens malua, Germanis uerò, Entosen / & Berbstosen uocatur.
Quartum malua genus, quod itidem sylvestre est, Germanicè Roßbappel dicitur. Galli malua Maule, ap
pellant, arborescentem uerò roses doultre mer, id est, rosas ultramarinas.

Malua aluum mollire, testatur etiam Martialis, hoc disticho:

Vitae lactucis, & mollibus utere Maluis:

Nam faciem durum Phoebe cecantis habes.

Et Paulus Aegnetia lib. i. inter olerasculentia non connumerat, & aluum subducere testatur, cum ait:

Malua refrigerat quidem, sed obscure, magis uerò humectat, atq; ob usositatem aluum ducit.

Nec his tantum contenta est dotibus, sed dici horas insuper nobis ostendit, ad solem circumagendo folia,
anti testatur Theophrastus & Columella. Quam ob causam etiam ab aliquibus heliostrophos uocata est, ut re
fert Apulius.

Atriplex.

Caput CXII.

A Triplicem aliqui chrysolachanon uocant, cognitū olus
est. Duo eius genera: sylvestre & sativū. coctū est ut
olus. alium mollit, panos discutit, siue crudū, siue coctū illi
natur. semen cum aqua mulsa potū, regium morbum sanat.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis, Ατρίπλεξ, ἡ τριπλὴ καὶ ἡ τριπλὴ.

Latins, atriplex, Vteribus Atriplexum.

Germanis, Durtshart / Sam milten.

Gallis bonnes dames arroches, bonnes femmes, follette, à grāu insipido.

Sylvestris atriplex, ἀτρίπλεξ ἡ τριπλὴ Græcis.


Germanis, Durtshalt / Wilden Durtshalt / Miltmilten / dicitur.

Non parum miror, Bertrutium Bononiensem ut doctiss; ita etiam accuratissi
mum in docendo uirum, in numerum laudatarum herbarum recensuisse. Atri
plex, quam adeo parum commodū sit stomacho, ut non contentus Galenus hanc
herbam cum oleo & garo miscuisse, ob eam causam acetum quoq; addat, quōd
citius citiusq; secedat à stomacho. Eadem ille gratia blitum quoq; condit ob hu
morem aqueum utriq; familiarem. Atriplex tamen in maiore neglectu fuit olim,
si fides habenda Plinio est, quippe accusatum à Pythagora fuit olim, tanquam
ceret hydropicos, morbumq; regium, & pallorem: coqui præterea difficilime,
& in hortis nihil nasci iuxta id, nisi languidum, culpaui. Addidere Dionysius
& Diocles, plurimos ex eo gigni morbos, nec nisi mutata sepius, aqua coquen
dum stomacho contrarium esse, lentigines & papulas gignere, &c.

Brassica.

Caput CXIII.

Brassica fœtilis.



B Brassica sativa aluo est idonea, si modò leuiter feruefacta
bedatur: nam percocta aluum sistit, sed multò magis his
cocta, aut quæ in lixiuio coquitur. Stomachum autem malè ha
bet. acrior est æstiuā. in Aegypto propter amaritudinem non
estur. cæcutientibus & tremulis esse prodest summo cibo sum
pta crapulam discutit, & uini noxam restinguit. melior stoma
cho cyma: sed acrior, & ad ciendam urinam ualidior. ea con
dita stomacho inimica est. aluum conturbat. Crudus succus
cum nitro & iri deuoratus, aluum emollit. cum uino quoq; e
potus uiperarum moribus auxiliatur. cum fenigraci farina,
litus, caput purgar naribus infusus, menses extrahit, cum loliacea farina inditus. Fo
lia per sese illita, aut cum polenta trita, conferunt inflammationibus, tumoribusq;
epinyctidas.

A

Crambe.



Brasica crispa.



epinyctidas, ignem sa-
crum, leprasque sanat.
carbunculos ex sale
rumpunt. fluentes ca-
pillis retinet. cocta,
addito melle, aduer-
sus depascentia ulce-
ra, gangranasque ua-
lent. lienosisque ex ace-
ro cruda profunt. ma-
sa, deuorato succo, re-
tusam uocem instaur-
rant. Decoctum eius
potu, aluum & men-
ses ciet. Flos post con-
ceptionem in pectore sub-
ditus, partum abor-
tu uitiat. Semen eius,
praesertim quae in Ae-

gypto nascitur, potum tineas repellit. in antidota
theriaca additur. faciei cutem lentiginis expur-
gat. Virentes cauliculi cum radice cremati, & adipe
porci uetusto excepti, diuturnos laterum dolores
mitigant.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Brasica, ut Cato dicit, antistat, & ad salutem tempora comest. a
sepe semper cum calore, & rigore arido, simul & humido, & dulci,
& amaro, & acri. Quatuor earum genera. Prima est leuis, quae no-
minatur *lata*. Germanice, *Breyter Fol*, grandibus & latis folijs, cau-
le magna: ualidam haec habet naturam, & uim magnam. Altera est
crispa, quae a similitudine apij, *σέλινος* a Graecis, Germanis
Branser Fol, uocatur: haec est & aspectu & natura bona ad cura-
tionem, ualidiorque est quam quae supra scripta est. Item est tertia,
quae *negelich*, uocatur, minutis caulibus, tenuioribus folijs, ob id Ger-
manis, *Kleiner Fol* dicta, acerrima omnium est istarum, tenui succo
uehementissima. Est & quartum genus, Graece *κράβη* *κράβη*
λωτή. Latine Brasica lacuturris, uel tertia, aut scabula, sine Capitis
lata. Germanis, *Cappisfraut*. Gallis, *Capini* uel *cabini coles*, non nul-
lis albi, uocata. Reliqua Brasicae genera Galli communiter uocabula
choils, id est, caules, appellant. Caulis enim etsi dicatur in herbis ro-
bur ipsum siue stirpes, sepius tamen ob sui caulis ac thyrsi magnitudi-
nem, pro brasica sumitur.

Est autem Brasicae peculiaris quaedam uis contra uina, ut Diosco-
rides hoc loco tradit, ebrietatis & crapulae noxas tollit, a cibo sum-
pta: imò & Plinius historiae naturalis lib. 20. Graecorum opiniones
referens, scribit Brasicam uino aduersari, ut inimicam uitibus: ante-
cedente quidem cibi cauere ebrietatem propter sumpta, crapulam di-
scuti, cuius rei rationem ex Aristotele colligere licet in problematis.

Amplius de Brasica scribit Plinius lib. 19. cap. 8. & lib. 17. cap. 24.

Brasica esculenta sapore nitroso, parum acri, siccata, tergit, sum-
pta & admota, induratas phlegmonas digerit, lepras terget, ulcera
etiam maligna glutinat. Cinis uisitorum eius caulium siccitate est cau-
stica, cum adipe ueteri mistus, ueteratos laterum dolores discutit.

Brasica syluestris. Cap. CXIII.

Syluestris

B

Crispa apifolia.



Weiß hederich.

Gât heyrich.



Sylvestris brassica, mariti-
Anis præruptisq; locis magna
ex parte gignitur: satius similis.
sed candidior, hirsutiorq; ama-
ra. cuius cyma in lixiua cocta,
ori non insuavis. Folia illitu vul-
nera conglutinant, & inflamma-
tiones tumor escq; discutiunt.

NOMINA ET EX-
PLICATIO.

Hæc uidetur eadem herba esse, de qua
suprà cap. CVII. egimus.

Germanis, Weiß hederich, uel
alij uolum, Gât heyrich.

Brassica sylvestris semen maximè te-
nuat, efficaciter siccatur, & digni lib. 4.
comp. pharma. part.

Brassica. Cap. CXV.

Marina brassica à satua
prorsus abhorret, quod
folia terat rotundæ aristolochiæ,
pra longa, tenuia: singula à ra-
mulis rubentibus ex eum, singu-
lari, ut hederæ, pediculo. albo
succo prædita est, sed pauco, sal-
so gultu, & aliquantum amaro.

pingui concretu. Herba in totum stomacho
inimica. acris. uehementissimè aluium ciuit, in
cibo cocta. coquitur propter acrimoniam cū
pingui carne.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græci, καλαδία.

Latini, Brassica marina.

Officinis Soldanella.

Germanis, Meerf.

Gallus Soldana, appellatur.

Brassica marina subsalsa, & subamaræ uentrem deiecit,
& cetera præstat, quæ his qualitates sequi consueuer.

Beta. Caput CXVI.

Beta duorum generum est. è quibus nigra
coquitur cum lenticula, ut uentrem leniat,
quod magis radice eius præstat. candida
aluo utilis est. utraq; tamen propter viscosum
humorem, quem habet in se. non succi est.

Vnde succus earum cum melle naribus indi-
tus, caput purgat, aurium doloribus auxiliatur. Decoctum radiceis & foliorum, fur-
fures lentesq; deterget. perniones fori mitigat. crudis folijs uirilgines, nitro antè
perfrictas: alopeciarum inanitates, scalpello prius exasperatas atq; depaucta ulce-
ra, illini prodest. eruptionibus papularum, igni sacro, ambustisq; cocta medetur.

NOMINA

Soldanella.



Beta.

Beta nigra.



B Beta hortensiorum leuissima. Vnde illud Martialis: Vt sapiant fatue fabrorum prandia Beta. O quam sepe petet uina, piperq; cocus. Eius duo genera: nigra, quae Graecis, σούτρον μέλαρ. Germanis, Roter mangolt. in inferiori Saxonia Rot rüben, ob radicis magnitudinem exuberantem: & altera alba, quae Graecis, σούτρον λευκόν, τούτρον, τούλιν. Germanis, Weiss mangolt. Gallis Peres, dicitur & altera praefertur, meliorisq; succi est, autore lib. 8. Theophrasto. Mira differentia si uera est, inquit, lib. 19. Plinius, candidis solui aluos, modice nigris inhiberi. Et cum brassica corrumpitur in dolio uini sapor, odore betae folijs demersis restitui. Medici innocentiores quam olim esse iudicauerunt, quam ob rem appositae memini degustare etiam religio est, utq; ualida potius in cibo sint. Semina ijs natura & oleris, & capite ipso exilientis. Nam ut Paulus Aegineta lib. 1. ait: Bili, Lactuce, atriplicis, malue, & betae planta humida, asparagi uero succus est. Per asparagum autem intelligit, quod primum, & nondum in folia explicitum earum plantarum ex terra prodiit germen, &c. Nec sine remedio est utraq; Beta, utridis, alba, & nigra, nitrosc est facultatis, qua digerit sine calore manifestio, terget, per nares purgat, alba & haec ualentior: nigra substringit, praesertim radi-

Asparagus
quid.

Lib. 8. simp. &

lib. co. pha. par.

ce: coquendo has vires exuit.

Portulaca.

Caput CXVII.

Portulacæ uis astringit. capitis doloribus, inflammationibus oculorum, catarrhisq; cum polenta imponitur. ardoribus stomachi, sacro igni, uesicæ doloribus, auxilio est. commanducata, dentium stupores sedat. stomachi & intestinorum æstuationem, fluxionesq; mulcet. renes & uesicam adiuuat, etiam si erosionem sentiant. ueneris

Portulaca sativa.

Portulaca sylvestris.



ueneris impetus exol- A
uit succus epotus simi
li effectu prodeit, in fe
bribus ualens. contra
teretes uentris tineas,
cruentam excreatio-
nem, dysenteriam, hæ
morrhoidas, & proflu
uia sanguinis, perco-
cta efficax est. item cō-
tra sepius morfus. ocula
ribus medicamentis uti-
lissimè commiscetur.
inceraueis fluxione l-
borantibus, atq; uulua-
rū erosionibus infun-
ditur contra dolores,
quos ætus excitauit,
caput ex rosaceo & o-
leo fouetur. eruptio-
nes papularum in capi-
te, cum uino emendat.
uulneribus quæ ad sy-
derationem spectant
ex polenta illinitur.

NOMINA ET
explicatio.Portulaca, Græcis α- B
πόρφυρα.

Latini & Officinis Portulaca. Germanis, Buttelkraut/Buttelen/Butgelen/Gronsel.

Brabantis, porcelerne. Gallis, Pourpier, Porcelles.

Portulaca in duas species distribuitur. Vna, in hortis emicat cauliculis teretibus, in altum erectis, lentè
erigentibus in punicum, folijs pinguibus, à tergo candidis, gustu subsulso, semine nigro, in herbaceis calyci-
bus collectis. Alia sponte sua in uerbis nascitur, & ternis quaternisue coliculis in terra sessilibus serpit, cul-
taq; latius uagatur. folio carnosio, uerum turbinatior, cetera priori consimilis.

Portulaca frigida ordine tertio, humida secundo, subaustera: fluxione biliosa, & ætus febriles maxime Gal. lib. 2. c. ph.
cohibet sumptis, & admodum, id est, dentium stuporem non omnem, sed eum solum, quæ ab acerbis, part. & lib. 6.
austertis, acidis est nata, sanat, quia ab his asperè exsiccata lenit, & replet humiditate lenta: uel quia suo leni simpl. & de o-
tore acido herens ac subiens, acorem illum sibi affinem sapore ex dente extrahit, ut Aristoteli placet, huius puma scita.
autem effecti omnibus cogniti causam inexplicabilem, & soli Deo notam, scribit Aphrodisius initio proble-
matum suorum.

Asparagi.

Caput CXVIII.

C Orruda siue sylvestris asparagus uulgaris est notitia. Huius cauliculi in cibo
cocti uentrem emolliunt, urinam cient. Radicis decoctum contra urinæ diffi-
cultatem, regium morbum, renum uitia, & coxendicum cruciatus, in potu proficiunt.
cum uino autem, phalangiorum moribus auxiliatur. si decocti succus super dente
contineatur, eius dolori medetur. semen porum ad eadem ualeat. canes, ut aiunt, si
decoctum bibant, emoriuntur. Asparagum etiam nasci proderunt, arietis corni-
bus contusis, atq; defossis. quod, quantum equidem sentio, planè à uarietate abhor-
ret. Altilis autem asparagus multis ramis fruticat, folijs fœniculi, longis, numero-
sis: radice rotunda, grandi, spongiam habente. Huius teneri cauliculi triti in uino al-
bo, renum dolores sedant. assus autem coctusue, urinæ stillicidium, difficultatemq;
ad dysenterias mitigat. Radix cum uino aut aceto cocta, luxatos artus mulcet deco-

A

Asparag.


Syluius.



B

Plantago. Cap. CXIX.

Maior.



Et cum ficis aut ciceribus, sumpta, re-
gium morbum sanat: coxendicis cru-
ciatus stranguriamque leuat. alligata
radix, aut haustum eius decoctum, co-
ceptum adimit, & sterilitatem aufert.

NOMINA ET EX-
plicatio.

Asparagus, uel Atheniensium more per ph.
Aspharagus, uel etiam apharesi, Sparagus, gene-
ratim quidem est coliculus tenerior herba, fruti-
cis, arboris, ad fructum & semen incresecens. spe-
ciatim uero herba uulgo nota, eaq; duplex, radi-
ce utilis & semine, ad detergendas renum & he-
patis obstructions. Regij, qui in hortis nascitur
& Helij, id est, palustris, meminit Galenus lib.
2. alimentorum: & huius etiam initio libro 1.
comp. pharmaco. part. ad icterum: & illius libro
5. simpl. Petrai autem libro 6. simpl. qui post in-
uentos altilles asparagos, Corrua proprie dici-
tur: Polluci autem syluestris asparagus. Hic
multo est satius efficacior.

In asparago mas a femina semine separatur.

Asparagus Graecis ἀσπάργος.

Officinis genuinum nomen seruauit.

Germanis, Spargen.

In inferiori Germania, Cozaelcruyt.

Gallis Esparge, dicitur.

Minor.



Duc.

Media.



DVo plātaginis genera. minor folia habet an gustiora, minora, molliora, leuiora, & tenuiora: caule anguloso, in terra scelsili: floribus pallidis: semine summis caulibus emicante. altera maior, latiores, uirentiorq; latis constans folijs, oleacei generis. cuius caulis cubitalitūdinem petit, angulosus, subruber, à medio ad uerticem tenui semine circumdatus, radicibus nititur teneris, hirsutis, candidis, digitum crassitudine æquantibus. Nascitur in lacunosis, sepibus & locis humidis. multo utilior magna est. Vim habent folia exicatoriam, constringentem, quare omnibus malignis ulceribus, & fluxioni opportunis atq; elephantiasis, fordibusq; illita profunt. profusua sanguinis, ulcera quæ serpunt, epinyctidas, carbunculos, nosmasq; cohibent. uetera ulcera & inæqualia cicatrice obducunt. chironia sanant. sinus conglutinant. moribus canis, ambustis igni, inflammationibus, panis, parotidibus, strumis, & gilophs, illita cum sale profunt. Coctum cum aceto & sale olus, dysentericis, celiacisq; sumptum subuenit. datur & in locum betæ cum lenticula coctum, & ad aquam intercutem, cui leucophlegmatie nomē est, datur & herba decocta post aridas epulas, sic ut media antecedit. comitialibus & suspitiosis data proficit. Foliorū succus, collata subinde oris ulcera, purgat. cum cimolia aut cerula igni sacro medetur. fistulis in fufus prodest. lippitudinibus & aurium doloribus idem succus instillatur. additur quoq; in oculorum collyria. gingiuis cruore fuisus. & sanguinis reiectionibus, potu confert. clystere dysentericis infunditur. contra tabem datur in potu aduersus strangulationes uulue, in uellere subijciuntur, etiam si uulua fluxione laboret. Semē ex uino potum alui fluxiones & sanguinis excreationes sistit. Decocta radix & manducatu, & collutione, dentium dolores sedat. eadem cum folijs, ulceribus renum & uesicæ in passo datur. Ferunt treis radices cum tribus uini cyathis, & pari aquæ modo, tertianis auxiliari: & quatuor, quartanis. Sunt qui radice gestamine, discutiendis strumis utantur.



Sium.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Duo hoc loco plantaginis genera facit Dioscorides. parua, Græcis ἀρνόγλωσσος & μικροί. Latine, Plantago minor. Officinis quinquenerua. Brabantis, Sondtstrubbe/Wechbee. Germanis, Spitz wegeich. Gallis, Lanecola dicta. Altera magnam & hac officinorem. Græcis, ἀρνόγλωσσος &:

Latine & Officinis, Plantago maior, latifolia, septinerua.

Germanis, Breyt wegeich. Gallis du plantain, appellatur.

Præterea est tertium nobis Arnoglossum uel Arnoglossa, Plantago media Latine, Germanis, Rot wegeich, folio rotundiore, sessili, hirsuto, in usu medicorū frequentissimum. Plantago refrigerat, siccatur ordine secundo, astringit, repellit, digerit, ob hæc ulcera recentia & uetera etiam rebellia glutinat, hæmorrhagiam sistit, fluxiones & putredines, & ab his dysenterias coercet, hepatis & renum obstructions tollit. Semen & radix eadem præstant, sed sicant magis, refrigerat minus, ad hæc semini adeest essentie tenuitas.

Lauer, seu Sium. Cap. CXX.

Slon in aquis inuenitur, frutice pingui, recto, folijs latis, olusatro similibus, sed minoribus, & odoratis. Quæ cruda coctaq; esu calculos rumpunt, atq; excernunt. urinas cient. mēsa

N a

A *Sisymbrium.*

& partus extrahunt. dysentericis in cibo auxiliatur. De *sio* Crateus tradit, herbam esse fruticis specie, pauca folia ferentem, rotunda, maiora quam mentha, nigra, & ad crucem accedentia.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, *Σίσυμβριον*. Latine, *Sium*, *laur*. Recentioribus *Betula*.

Germanis, *Wassermerck* / *Wasserponge*. Gallis *de la berle*, dicitur.

Sisymbrium. Cap. CXXI.

Sisymbrium, alij *serpyllum sylvestre* uocant, in solo inculsto nascitur, menthae hortenlis similitudine, odoratius, latiore folio. Inseritur coronis, calfaciendi uim habet. contra stillicidia urinae, calculosq; semen ex uino bibitur. tormina & singultus sedat. folia in capitis dolore, fronti aut temporibus illinuntur. item contra uesperum apiumq; ictus. uomitiones potu cohibet. Alterum *sisymbrii* genus, quod aliqui *cardaminam*, alij *sion* appellant: ea herba riguis gaudet, & eisdem in locis, quibus *sion*, provenit. quæ ideo nonnullis *cardamina* nominatur, quod gustu *cardamum*, id est, *nasturtium*, representet: folia primum rotunda prodeunt, adulta eructe modo finduntur. Id exalfacit, urinas mouet. crudum estur, purgat lentigines, cutisq; uitia in facie, noctibus impositum, matutinisq; detractum.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Sisymbrii hoc loco duo genera facit Dioscorides. Vnum quod in aridis, & locis incultis nascitur.

Græcis, *Σίσυμβριον*.

B Officinis, *Menta rubra*, uel *aquatica*: item *Thymbra*: Germanis, *Balsamtrane* / *Rote bachmünz* / *Wasserminz*.

Alterum, quod in aquis nascitur, Græcis *Σίσυμβριον* & *Καρδαμίνη*. & *Cardamina* a *nasturtii* sapore.

Officinae *nasturtium aquaticum* uocant, & *eressionem*.

Germani, *Wasserfressig* / *Baunfressig*. Galli, *Da eresson*.

Sisymbrium primum exalfacit, atq; resicat in tertio ordine. Alterum autem quum siccum est, iidem tertij ordinis est exalfacientium, & exiccantiū: quum humidum & uiride, secūdi.

Sisymbrium, primum tenuium partium est, digerentis, calefacientis, & exiccantis facultatis. Semen quoq; eius tenuium partium est, & calidum. Quocirca ipsum quidam cum uino exhibent singultientibus, & tormina patientibus.

Sisymbrium, quod quidam *Cardaminam* uocant, quandoquidem *Cardamo*, id est, *nasturtio* simile quiddam gustu praefert, eadem ferè potest.

Crithmum. Cap. CXXII.


Crithmum, seu potius, ut aliqui, *crithamon*, fruticosa & undiq; foliosa herbula est, cubiti altitudinem ferè petens. Nascitur in maritimis, & petrosis: folijs pinguibus, numerosis, albicantibus, ueluti *portulacæ*, latioribus & longioribus, falso gustu. flores cædidi sunt, & semē, ceu *rosinarii*, odoratū, molle, rotundū, quod siccatum rumpitur. habet intritrici modo nucleum, radices digiti crassitudine, tres aut quatuor: grati odoris & iucūdi. Radix, semē & folia



incoctis



Sonchus sativus.



incocta uino, potu urinae difficultati & regio A morbo auxiliatur: menses cient. estur crudū coctū in oleo. seruatur etiam in muria.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Κρόνος. Latine, Crethmus, seu Crithmus. Officinis, Creta marina, et bacula, seu bacille. Germanis, Bacillen. Gallis Bacille, ou seuil marin. Defertur ad nos Crethmus sale & aceto conditus. Verum de conditura non satis inter Plinium & Columellam conuenit: quandoquidem Plinius unā cum Dioscoride seruandum in muria olus prodidit: contra, Columella portulacæ, et bati murian non conuenire contendit.

Neque pugnare ista mihi uidentur, cū Plinius de crithmo seu bati maria loquatur, unā cum Dioscoride, qui sativæ nullam rationem habuit: Columella tantum altis et hortensianæ condituram prosecutus est.

Coronopus. Cap. CXXIII.

Coronopus oblonga herbula est, per terram repens, filis folijs. coquitur in oleo, radicem habet tenuem, adstringentem, quæ in cibo coeliacis facit. Prouenit in aggeribus, & locis incultis, & secus uias.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Coronopus, siue si dicere malis, cornicis pedē, inter aculeatas sponcque nascentes herbas Theophrastus retulit. Interim tamen medicinae ad usum feri Plinius commemorat, qui oblongam esse herbam cum fissuris, cauliculis per terram serpentibus, designauit. Leoniceus, Capriolam uulgo dici censet: nonnumquam et sanguinariam, quod indita naribus sanguinem eliciat.

Græcis, Κρόνος. Germanis, Kraenfass, Kappenfass, Sundsan, dicitur. Brabantis, Saxi horen, Cracynen, uel Ransenuoet.

Gallie olitores nunc dentem canis, ab acumine folij uocant, quoniam eodem nomine græci amen appellat. uulgari eorum lingua, la dent de chien.

Sonchus. Cap. CXXIII.

Sonchi duo genera. syluestrior quidam est, & magis spinis horret: alter tenebritate quadam mollescit, cibus expetitus, anguloso caule, inani, interdum rubente: folijs in ambitu per intervalla dissectis. Vtriusque uis refrigerat, modice adstringit, unde æstuanti stomacho & inflammationibus illiti profunt. Succus eorum stomachi rofiones sorbitione mitigat. lac elicit, in uellere appositus, sedis ac uulæ collectionibus opitulatur, tam herba quam radix illita uibratis a scorpione ictibus subuenit. Alter sonchus tenerior, arboris instar, latis confans folijs.

A

Sonchus sylvestris.

Gensdistel.



caulem in ramos exeuntem folia distinguunt
sed ad eadem pollet.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Hodie tria genera Sonchi nouimus. Primi generis Sonchum, qui candidus, tener & esculentus est, Dioscorides Cicerbitam à Romanis dici prodidit, quod nomen adhuc hodie in Hetruria seruiatur. Herbarijs nonnullis leporis palatium dicitur. Fortassis eadem Apuleio lactuca leporina fuit. Veneti lactucinos indigetant. Græcis, σόχρος ἐλάδου. Germanis, Hasentöl. Inferiori Germaniæ pro diuersitate generum, uarijs nominibus appellantur, ut: Mectweye, Lacteroenen, Gansdistel, Hasenlattouwe Gallis lacterones, uel potius lasseron, Dulacron. Sonchus sylvestris hic & niger, & spinosior est, Græcis, σόχρος ἰσχυρὸς. Germanis, Wilder Hasentöl, Gensdistel, Moß. Sonchi genus tertium est tenerum, arborescens, latiore folio, in quo ramosum caulem folia intersecant. Hic à solo Dioscoride describitur. Plura in capite sequenti.

Seris, huc intybus.

Caput CXXV.

SERIS duum generum est: altera satiuæ, altera sylvestris, quæ picris & cichorion uocatur: latioribus folijs constat, stomacho quàm hortensis utilior. quæ iterum in duas species digeritur: una folio latiore prodit, lactucarum simillima: altera angustiore est folio, & gustu amara, utraq; refrigerat, & astringit, stomacho utilissima. aluum sistit cocta, si cum aceto adsumatur. sylvestres stomacho meliores, quandoquidem æstuantem ipsum, & quem imbecillitas uexet, cibo leniunt. cardiacis per se, aut cum polenta, utiliter illinuntur. podagris, & oculorum inflammationibus auxilio sunt. herba cum radice illita, percussis à scorpione subuenit. igni sacro cum polenta medetur. succus cum cerusa & aceto, ualet ad illitus eorum, quæ refrigerationem desiderant.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Intybum, uel intybus satiuus, Græcis, κίχων ἡ ἀντιόχου, ἢ ὀκρίς. Officinæ cichorea hortensis. Germanis, Same wegweiss. Gallis, Lichorea, ou endiue: huius generis est scariola. Intybus erraticus, Κίχων ἡ ἀντιόχου, ἢ ὀκρίς. Germanis, Wegweiss, Wegwart. Gallis cichorea sauvage, dicitur. Cichorium, Romana lingua intybum eius dicitur. Gal. lib. 2. comp. phar. part. ad uerò & relique sercos species.

LIBER SECVNDVS.
Cichorium latifolium sativum.



Cichorea sylvestris.

198
A



B
Cichorea sativa.
 199



Species foliorum magnitudine, et cultu distincta, sed
 cultuibus parum discrepant, nisi quod aggregata sativis
 sine sicciora et amariora. Omnia enim haec subama-
 ra sunt, subfrigida, modicè astringentia: et in his mul-
 ta humiditas multa siccitatem extinguit. Ob haec hepa-
 tis intemperiem calidam tum solam, tum cum corruptis
 humoribus et ichoribus maxime iuvant refrigerando,
 roborando, si nam eius partem et gibbam obstructio-
 ne liberando: praesertim si cum vino albo bibatur, et
 cum melle, sic enim illos humores per urinas pellunt:
 nec frigidam multum ledunt, ut alia permulta, quae sunt
 frigida humida sine amaritudine et astringentia: su-
 muntur succo, decocto, pulvere, lib. 8. comp. pha. part.

Condrilla. Cap. CXXXVI.

Condrilla, quam aliqui cichorion, alij
 Cserin appellant, caule, flores & folia

N 4

DIOSCORIDIS

A

Condriila.



habet cichorio similia. qua ex causa nonnulli sylvestris intubi speciem esse pronunciarunt: uerum tenuior tota est. in cuius ramulis, gummi mastiches simillimum, tuberculo fabæ inueniri solet. quod cum myrrha tritum, & linteo appositum, instar oliuæ, fœminarum menses trahit. Tusa cum radicibus herba, adiecto melle, diuiditur in pastillos, qui nitro admisti uiliginem emaculant. Gummi inordinatos pilos replicat. quod item tenera radix efficit, si intincta succo acus, pilis admoueat. contra uiperas in uino potu proficit. Succus decoctus, in uino, aut per sese potus, aluum sistit. Aliud habetur condriillæ genus, folium ferens oblongum, circumosum, humi sparsum, caule succo madentem lacteo: radice tenui, rotunda, leui, uergeta, flavescente, succosa. Cuius & caulis & folia concoquendi uim habent. succus incommodos palpebrarum pilos reflecit. Nascitur in lætis & cultis.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Condriila omnis, & sonchus, & Hieraceum utrumque serenos species etiam Galeno putata, & serenos ac cichorii nomine etiam ab alijs dignata (licet Condriillam non seri iungat, lib. 2. Alimentorum) ut forma & temperatura sunt affines, sic uiribus minime discrepant. Ob id ea tanquam congeneria iungit & hoc loco Dioscorides. Pro intubo autem uirgis En diuam re & nomine corrupti, ut pro seri scariolam, quasi scariolam dicere tentauit.

Cucurbita.

Caput CXXVII.

Rotunda.

Longa.



Cucurbita esui apta: cruda trita illitu tumores & abscessus mitigat. Ramenta eius infantibus contra capitis ardorem, quam syriam uecant, in sinapite illinuntur. oculorum inflammationes podagrasque refrigerant. Succus e ramentis tritus per se, aut cum rosaceo infusus, aurium doloribus auxiliatur. ad fistulas cutis in ardenti febre illitu adiuuat. totius seruefacta & expressa succus, cum melle exiguo & nitro

nitro potus, aluum leniter resoluit. Vinum in cucurbitam recentem excavatam in-
fufum, si mistum sub diuo teneatur, potu aluum leuigabit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Κολοκυθός. Latine, Cucurbita. Officinis genuinum nomen seruauit.
Germanis, Kürbis. Brabantis, Canwoorde. Gallis Courge, dicitur.
Cucurbitarum duo genera sunt: longa & rotunda. Cibus quò longiores tenuioresq; eò gratiores, & ob id
salubriores, quæ pendendo creuere, minimumq; seminis tales habent, duricia eius in cibi gratiam terminan-
te. Rotundæ uasorum usum præbent. Sed de his plura apud Plin. lib. 19. De uiribus eius dicit Paulus Aegine-
ta, quòd refrigerat, & humectat, atq; aluum mouet: sed paulum alimenti præbet. Chrysippus Medicus, ut
lib. 10. refert Plinius, declamabat eo in cibus, sed omnium consensu stomacho utilissime iudicatur, & inter a-
neorum, uescicarum exulcerationibus.

Cucumer satiuus.

Citrullus.



Cucumis satiuus.



Caput CXXVIII.

Cucumis marinus.



Pepo.

B



Satiuus cucumis aluo & stomacho perquam
utilis habetur. refrigerat, qui corruptio-
nem nō sentit. uescicæ prodest. olfactu reuocat,
quos animus liquefit. Semen modicè urinam
mouet.

A

Melopepo.



mouet. cum lacte aut passo. uesciæ exu-
rationibus subuenit. Illita cum uino fo-
lia, morsus canum sanant: & epinyctidas,
cum melle. Peponis caro in cibis, urinam
cit. inflammationes oculorum illita sedat.
Ramenta eius contra adustionem infanti-
um, quam Syria sin uocant, sincipiti impo-
nuntur. fronti admota, oculorum fluxio-
nes auertunt. Succus cum semine, adiecta
farina, siccat in sole cogitur in smegma
ta, quæ faciem repurgant, & nitorem affe-
runt. Radix sicca, & ex hydromelite pota
drachmæ pondere, uomitionem mouet. Si
quisquam moderatè secundum cœnā uo-
mere cupiat, geminis obolis sit contentus.
sanat quoque illita cum melle ulcera concre-
ta in modum faui, quæ ceria uocant.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Cucumeres, qui priuatim & conuenienter hoc nomine uocantur, Germanis dicuntur Gurdien/ &
Gurdien/ Cucumeren. Brabantis, Concommeren.
Graecis, Σικυοῦ ἡγεσπευ. Gallis, Concombre.

Sunt enim & alij in cucumerum censu, suis etiam priuatim designati nominibus, ueluti citrini, & citrul-
li nunc dicti: item pepones & melones. De quibus omnibus Plin. lib. 9. cap. 5. Quod autem de cucumere, &
cucurbita dicit, crescere qua cogantur forma, id etiam ab Hippocrate libro de seminis genitalis natura prius
proditum est, ubi ait: Si quis cucurbitam cucurbitamue iam deflorescentem, matrisq; pediculo adhaerescen-
tem

Lactuca.

B



in paruo uasculo mittat, cauo uasis illius par similisue reddatur.
Si uero quis eundem in maiore uasculo mittat, quod probè cu-
cumini cucurbitamue capiat (quod tamen maius quam cucumis
natura non sit) cucumis par similisq; cauo huius etiam uasis e-
rit. Nam cum crescit cauo illius uasis hæret, & innititur. Cun-
ctæq; nascentia semper firmè crescunt, & habent, quemadmo-
dum ea quis cogat, &c. Cucumerum generis sunt, ut diximus, illi
pepones, tum melones, figura tantum & quantitate differentes.
Pepones quidem uocantur, cum magnitudine excessere, aut in lō
gitudinem processerunt. In rotundum uero effigati & mali for-
mam referentes, melopepones ex pepone & malo facti nomine,
dicuntur, & hi sunt quos in Martio Mense Melones uocat Pal-
ladius, quo nomine etiam nunc in communi usu sunt, &c.

Lactucæ. Cap. CXXIX.

Lactuca scariola, uel excaulis.



Lactucæ satiuæ, quibus natura refrigeratrix
lineat, stomacho gratæ habentur, somnū con-
siliant.

tiliant, aluum emolliunt, lac euocant, verum decoctæ magis alunt, stomachicis illor- A
tas esse prodest. Epotum semen, alsiduas libidinum imaginationes in somno com-
pescit, & ueneri refragatur. Ipsæ uerò frequentiores in cibo, claritati oculorum of-
ficiunt, inflammationibus & ignibus sacris opitulantur, muria coniunguntur. cum in
caulem exierunt, uim quandā nanciscuntur, succo aut lactis syluestris lactuq; similē.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Lactuca latecanis.



Lactuca Græcis $\Theta\epsilon\iota\delta' \alpha\gamma\gamma\iota$, η $\theta\epsilon\iota\delta' \alpha\gamma\gamma\iota$. uulgo apud recentiores

Græcos, $\mu\alpha\iota\sigma\upsilon\lambda\iota\sigma\upsilon$. Officinis lactuca Latino nomine.

Germanis, Lactich. Brabantis, Lateow.

Gallis, Lactue succupatur. nota herba est.

Lactuca dicta, ut in Ianuario mense tradit Palladius, quod abundantia la-
tis exuberet. Huius diuersas ob causas, diuerso etiam tempore uariis fuit
usus. Antiquitus enim, quod ebrietati oblectaretur, canq; prohiberet, in cœ-
na sine sumebatur: post uerò ad conciliandam appetentiam, in cœna prin-
cipiosum coepit. Vnde illud Martialis extat: Claudere quæ cœnas
lactuca solebat auorum. Dic mihi cur nostras inchoat illa dapes?

Hac nunc quoq; æstiuo tempore plurimum utimur in acetarijs. Herba
multum salubris, Vnde Columella in carmine: lamq; saluari propter la-
ctuca sapore. Tristitia que releuet longi fastidia morbi.

Et Paulus Aegineta lib. 1. ipsam optimi succi sanguinem facere testatur.

Plura eius genera à Columella & Plinio traduntur: est enim Lactuca, cuius
diminutium lactucula, quam Græcis thridacium uocari supra diximus. Germanis, Gemyner Lact-
ich. Gallis lactues appellata. Est & Lactuca laticaulis apud Theophrastum, η $\pi\alpha\lambda\lambda\iota\sigma\tau\eta$ $\theta\epsilon\iota\delta' \alpha\gamma\gamma\iota$
appellata, & tertium genus. Lactuca sessilis, quæ eandem cū sequenti existimo, scilicet Lactucam ex-
caulem, Græcis $\theta\epsilon\iota\delta' \alpha\gamma\gamma\iota$ $\alpha\epsilon\tau\upsilon\lambda\alpha$, Pythagoricis $\delta\upsilon\sigma\upsilon\chi\iota\sigma\upsilon$, mulieribus $\alpha\epsilon\tau\upsilon\lambda\alpha$. Germanis, Bauß late-
nich mit Rößlein, & Römischer lattich dicta, &c. Est quidē natura omnibus refrigeratrix, ideo assu-
te grata, à stomacho fastidium auferunt, cibiq; appetentiam faciunt. Celsus somno aptam dicit, &c.

Lactuca syluestris.

Caput CXXX.

Endiuia Officinarum.

Endiuia.



Syluestris

A Sylvestris lactuca sativæ similis est, sed longior caulis, & candidiora folia, graciliora, & asperiora, amaro gustu est, & uiribus aliquantum papaveri similis. unde lacteum eius succum aliqui meconio permiscuerunt. Aquam per aluum elicit, potus in aceto mulso succus ad duos obolos, argema caliginemq; repurgat. contra adustiones efficaciter illinitur cum lacte mulierum. in summa, somnum allicit. doloris leuamentum præstat. menses trahit, contra scorpionum & phalangiorum ictus bibitur. Semen, non aliter quàm sativæ, libidinum imaginationes in somno amolitur, ac uenerem arcet. Succus ad eadem ualeat, sed uiribus infirmior. Reponitur in fictili nouo lac eius, antea, ut in alijs liquaminibus moris est, insolatum.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Lactuca sylvestris, nisi sensus me deficiat, est quæ passim ab Officinis nostris nunc Endiuia dicitur, Lactuca, Cicerbita.

Germanis, Endiuen / Gensung / Leberdistel / Antiffien.

Gallis uerò Endiue, cum in aruis nascatur sponte, & uinearum limitibus, folio cum adoleuit per oras aculeato, dorso spiculis inhorrescente, quasi prona carina parte echinata, supina leniore, nonnunquam cum insenuit laciniatim serrato, caulibus bicubitali pyoceritate consurgentibus, hirtis, flore luteo, succo candido, amaro, acris, ideo linguam & os aliquantulum uellicante. huius uir sativæ semen occultitur lanugine. Decoctum huius saccharo conditum Officinæ, cuius tantus increbuit usus, ut nulla non ferè sinistra ualitudine à medicis præbeatur, utinam tam salubriter, quàm insciet.

Gingidium.

Caput CXXXI.

B



Gingidium, aliqui lepidion, in Syria & Cilicia plerumq; nascitur. herbula sylvestri pastinacæ similis, tenuior, & amarior: radice parua, candicante, subamara. Oulus hoc crudum, coctum, conditumue estur magna stomachi utilitate. urinam citius decoctum ex uino potum ueliceq; prodest.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis, Τριψιδιον. Latinis & Officinis Cerefolium: pro cherephyllon.

Germanis, Berbelkraut / Bösffel. Gallis Cersueil, dicitur.

Paulus Aegneta gingidion scandiel simile facit, astringente ui & amaritudine non pauca præditum, stomacho non ingratum: quare ieiunia inediaq; commodè faciat ex aceto, non tamen magnopere nutrit. Galenus, quod nonnihil amaroris & astringentie gustui representet, refrigerante ui simul & calfaciente donatum censet, & ab utraq; siccandi naturam sortiri.

Scandix.

Scandix. Ca. CXXXII. A



Caucalis.

Scandix, sylvestre olus est amarum, subacre, quod crudum coctumue manditur. stomacho & uentri utile, decoctum in potu, uelice, renibus, & iecinori confert.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Σκάνδιξ.

Latine, Scandix.

Officina imprudenter inter dauci genera refertur.

Germanis, Wild mozen/ dicitur.

Notissima olim omnibus Græcis scandix fuit, quæ toties Athenis in theatro risum & plausum excitauit. Vulgare & sua sponte nascens incultis plerumque locis olus est, plebis cibus in quotidianum pulmentum: folijs gingidij uel anthrisci, sed maioribus & minus odoratis, gustu æri subamaroq; nec aliter huius facies ab autoribus designatur.

Caput CXXXIII.

Caucalis, quam alij sylvestre daucum uocant, cauliculo est dodrantali, aut maiore, subhirsuto: folijs apio similibus, feniculi modo per extrema multifidis, hispidisq; candida in cacumine umbella, suauiter olente. Crudum coctumue olus B estur. urinam mouet.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Καυκάλις.

Latine, Caulis.

Officinis pimpinella hirsuta.

Germanis, Rauber bibinell/ dicitur.

Brabantis, Beuernelle.

Huius herbe radix foris nigra, intus alba est, cum rûpitur, cæruleum succum refudans. Galenus apud aliquos sylvestre daucum nominari tradit, non à similitudine, ut aliqui credunt, quasi rudimentum quoddam esset nascentis dauci, sed quod & gustu & uiribus id imitetur. eum, ut inquit, modo eodem excoctis, excicet & probellat urinam.


Erucæ. Cap. CXXXIII.

Cruda erucæ uenirem largiore cibo coctat. semen eodem effectu prodest. urinam cit. coctioni prodest, aluo perquam commodata. semine ad condimenta utuntur, quod, uti in longum tempus asseruetur, adiecto lacte aut aceto, digerunt in pastillos. Gignitur etiamnum sylvestris erucæ, maximè in Iberia, quæ occidentem spectat, cuius semine pro sinapi incolæ utuntur. urinam uehementius pellit, multo satius acrior.

NOMINA ET EXPLICATIO.

A

Sinapi aquati-
cum, luteu, ma-
ius.
Geel groß
Wasser
senff



B

Sinapi aquati-
cum, album, mi-
nus.
Weiß Fleyn
Wassersennff.



Eruca sativa.



Irion, Nobilis Eruca.
Eisenkraut/weiblin.



Eruca

Eruca Germanis dicitur Weisses Senffamen. Brabantis, Mostaertcruyt. Gallis, Roquette. **A**
 Herba est in acetarijs & ciborum usu non infrequens: cui, ut libro 20. testatur Plinius, in condiendis obso-
 nis tanta est suauitas, ut Greci *ῥαπυ*, appellauerint. Hec uenerem impendit excitat. Vnde Martia-
 lis: Et uenerem reuocans eruca morantem. Et Columella: Excitet ut Veneri tardos eruca mari-
 tos, quod idem Dioscorides hoc loco testatur. Adhuc Plinius libro 19. ait: Eruca præcipue frigorum con-
 temptrix, diutse est quam lactuca naturæ. Concitatrix Veneris, iccirco iungitur illi serè in cibis, ut nimio fr-
 gori par feruor immixtus temperamentum æquet. Et Marcellus Medicus libro de medicamentis experimenta-
 tis cap. 33. inquit: Ad abundantiam seminis præparandam erucam decoctam bibat, quoties quisq; inopia
 seminis se laborare perspexerit, uel potius assidue decoctam manducet: & mox post, tale medicamentum po-
 nit: Eruca seminis scrupulos 3. teres singula diligenter & permiscebis, atq; inde globulos facies ad formam
 nucis auellane: & cum opus fuerit singulos liquefactos, in caprino lacte potabis, si uenerem uolueris accendi.
 Sunt & alia uaria eruca genera hic depicta, quæ & inter Nasturtia aquatica referuntur.

Ocimum.

Caput CXXXV.



Ocimum uulgo cõ-
 gnitum. Id copio-
 siore cibo oculorum aci-
 em hebetat. aluum mol-
 lit. spiritum mouet. urinã
 pellit. lac euocat. agrè ta-
 men conficitur. illitum
 cum polline polentæ, ace-
 ro & rosaceo, pulmonũ *
 inflammationibus auxi-
 lio est. draconis marini
 & scorpionis ictibus per
 se prodest: & cum uino
 Chio oculorum dolori-
 bus. Succus uisus caligi-
 nem abstergit. destillatio-
 nes exicat. Semen potum
 conuenit atram bilem gi-
 gnentibus, difficili uri-
 ne, inflatisq; naribus hau-
 stum, subinde mouet ster-
 nutamenta: quod idem
 herba efficit: sed oculos
 premi necessum est, cum
 sternutamentum urget.
 Sunt qui in cibis abdicari
 dũ censent, quandoqui-

* Hec distio
 alijs deest.

dem manducatum, & in sole positum, uerimiculos creat. Aphri autem adijciunt, si fe-
 riantur à scorpione, qui ocimum ederint, nullo conflictari dolore.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Greci, *ῥαπυ*. Latine, Ocimum. Germanis, *Heydenkorn* / *Grün* / *Bauchweygen*.

Gallis de la dragee aux cheuals.

Rura nostra ocimum ferunt, frugem in agris folio hederaceo, sanguineum colorem præferente, scalpo gran-
 di per fastigia paniculas exerente, triangulis, rariusculè coarctatis granis, quæ foliaceis membranis corre-
 pta delinuntur. Hanc, quoniam auorum nostrorũ memoria è Grecia uel Asia uenerit, Turcicum framentũ,
 siue *Heydenisch Korn*, uulgari lingua nominant. Ea pecudem omnem ceteraq; ueterina, quàm optime sagi-
 nant, & in candidissimam teruntur molunturue farinam, quæ cum annone premis inopia, in panificia subin-
 de cogitur. Cum ematuruit granum, suis apludis explicitum fagæ glandis nucleo simile nascitur, quod inco-
 quunt rustici, ut bubus, iumentis, pecudibusq; cedat in pabulum, cuius usu uehementer gliscit sagina, mirè e-
 nim ab eisdem expetitur. Iam agri pleriq; in Germania & Gallia hac fruge rubent. R. uellius uidetur hanc fru-
 gem facere *Erysimum cereale*.

DIOSCORIDIS

Orobanche. Caput CXXXVI.



Orobanche cauliculus est sesquipedalis, & interdum maior, subruber, hirsutus, tener, sine folio, pinguis: flore subalbido, & in luteum uergente: radice digiti crassitudine, & cum ariditate flaccescit caulis, fistulosa. Hanc inter quædam legumina nasci constat, & ea strangulare, unde orobanche sibi cognomentum usurpauit. Estur, ut olus, cruda, & in patinis, asparagi modo, decocta. legumētis addita, coctionem accelerare creditur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Οροβάνχη.


Latine, Orobanche, quod eruum strangulet, alimentum suffurando, Germanis, Vnkraut der Wicken, Ernewürger.

Gallis Tigne, appellatur.

Forſan hæc fuerit, quam absurdissima quorundam imperitia, nescio unde, hypocistum audet appellare.

Barbula hirci. Cap. CXXXVII.

* Hæc dictio
alijs deest.



Barbula hirci, quæ ab alijs come uocatur, breui est caule: folijs croci: radice longa, dulci, supina*, magno super caulem calyce, & cuius summo semen nigrum dependet, unde nomen inditum est. herba esui apta est.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Barba hirci, uel barbula hircina, Græcis, Τραχύνωρος, appellatur. Germanis, Bodsbart / Habermalch / & Gauchbrot / appellat, hæc facie representatur à Theophrasto: Radix longa, dulcis, folium croci longius, caule puro, super quæ calix latus, & barbula, quæ summo uertice in caua & proluxa funditur, unde nomen accepit. Nascitur sua sponte in aruis & pratis, & magna ex parte luteo florenit.

Ornithogalum. Ca. CXXXVIII.

* semipedalis
Plin.



Ornithogalum.

Ornithogalum cauliculus est tener, cædicans, tenuis, sesquipedalis*, tribus aut quatuor in cacumine mollibus adnatis: à quibus flores prodeunt, foris herbacei, & cum hiantes se pandunt, lactei uisuntur: inter quos dissectum, cachrys modo, capitulum emicat. Coquitur cum pane, ut melanthii. radix bulbosa, cruda & cocta manditur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

A rusticis hæc herba passim eruitur rotunda radice, simili radici herbe Aron, bulbaceam speciem præ se ferente, è cuius medio cauliculus exit, tribus aut quatuor adnatis appendicibus in cacumine, filijs in capillamenta quædam extenuatis, floribus exiguis, foris herbaceis, intus lacteo colore candicantibus, qui simul coaceruali uelut paucula quædam compacti callo squamati coherentes in pilulam extuberant, nucamentum pineæ nucis representantem, Sueſtionensis Gallie ager churlos. Germani uero rustici Erdnuß / & Ruckelſtein / uocare consueverunt, quævis

pueris non incognitos, qui propter astantes cum aratro terra proscinditur, aut in latiores porcas sulcatur. A
eritos uomere colligunt: multo castaneis suauiores in cibis, quibus & crudis & in cineribus incoctis rure
tescuntur, odore inmundissimo eos mirum in modum commendante, nam tuberibus similes ferè nascuntur. qua-
re tanquam germanitate, uel quadam cognatione iunctos, Dioscorides hoc loco, his copulauit.

Tubera.

Caput CXXXIX.



Tubera rotundæ radices sunt, sine folijs, flauescentes.
uere fodiuntur: cruda & cocta eduntur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, ὄστρον. Latine, Tubera. Officinis Cerui boleti.

Germanis, Kurebraunst. Gallis Truffie, appellantur.

Inter ea quæ sine radice pronuntium, tubera quoque à Theophrasto numerâ-
tur. Credidi antiquitas cognationem illis aliquam cum cælo esse, nec nisi to-
nante loue nasci, ut in satyra Aquinas poeta monuit, dicens:

Et facient optata tonitrua cœnas.

Licet non fieri sed ostendi, & quasi signari tonitrua tubera aliqui dicerent,
pulsu æ- is ex ro, quemadmodum sole etiam fit, dehiscent terra, qua parte ca-
laient, filliq; qui aliter credant, non secus quam si opulentur imbrem cochle-
as facere, non ille etas humore ex seipso, & moereri producere. Fuerunt ta-
men qui secretiores naturæ causis, in altius repetentes, contrâ ostenderent, dicerentq; ingruentibus in terram
à superiore cæli parte tonitru, fulgetris, fulminibus, uentis, & imbris, quæ omnia perueni, si mul sunt, di-
uersos rerum succos contrariâq; temperamenta fieri in his, quæ ad generationem mouentur, non secus quam
rorem dulciorem pecori facere herbam Cælestem autem arcum subiectam omnem sibi terre materiam diui-
uo halitu implere dicunt, & c. Adde duo eorum genera esse, harenosa, dentibus inamica, & altera sincera Di-
stinguuntur & colore rufò, nigroq; & mus candido. de Tuberibus his sunt Martialis uersiculi hij:

Rumpimus atricem tenero de uertice terram,


Tubera, boletis poma secunda fumus.

Smilax hortensis.

Caput CXL.

Phasolus, Salselen/

De quo suprâ hoc libro, cap. 100.



A Hortensis smilax, frutex, cuius semen à nonnullis lobia uocatur. folia habet herederæ, molliora tamen: tenues caules, & capreolos uicinis fruticibus circumuolutos, qui tantum adoleſcunt, ut topiarias ſcenas repræſentare uideantur. ſiliquas ſcæni græci proferunt, longiores & toroſiores, in quibus ſemina renum ſimilia, ſed inæquali colore recluduntur: quæ quadam ex parte fulueſcunt. Siliqua cocta cum ſemine in oleribus, aſparagi modo, eſtur. urinam ciet, & tumultuoſa ſomnia facit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Σμίλαξ κηπόνα.

Latine, Smilax hortensis: item Dolichum uocant.

Officinis, Phascoli. Germanis, Welsch bonen/phaselen/Bundt Tüdtiſch bonen.

Brabantis, Boomsche Boonen.

Gallis, Fasseoles, & fèves painctes.

Smilacis hortensiane fructum, lobia quasi siliquas appellant, & alio nomine dolichon uocant. alius a phaselo, quæ uilem appellat Vergilius: quare errant, qui eundem putant, seu copiose annotarunt uiri doctissimi, & in medicæ rei erroribus emendandis per celebres, Ioannes Manardus Ferrariensis, & Hieronymus Tragus.

Medica.

Caput CXL.



Medica cum recenter prodijt, folijs & caule trifolio pratenſi ſimilis eſt, procedens uerò folia contrahit, caules ædens trifolij, & ſiliquas corniculorum modo intortas, in quibus ſemen lentis magnitudine dependet. Id ſiccatur, iucundi ſaporis gratia, conditamento ſali admisceſtur. uiride, quibus refrigeratione opus eſt, illitu ſuffragatur. Herba tota pro gramine utuntur, qui pecora alunt.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Eximia eſt ad ſagnanda iumenta, ad ſtercorandos agros, herba Medica, quæ cum ſcritur decennium durat, per annum quater, & interdum ſexties dimetitur.

Mirum eſt quanta de hac herba ſcribuntur: attamen in Germania, Wiedisch Kraut dicta, niſi fallor, paucis cognita, cum tamen aliunde ſemen afferri, & eodem modo, quo apud Gallos, apud Sequanos, & apud alios coli poſſet.

Dicitur autem uulgo ſœnum Burgundienſe.

Germanicè, Burgundiſch heu/ & Burgundiſch graß/ nempe quod à Burgundionibus ſemen aliò perlatum eſt, ſicut ex Media in Græciam. Vnde Græcis Μεδίκα πόνος.

Gallis uerò ſoin de Bourgoigne, & ſenacia dicitur!

Aphaca.

Caput CXLII.

Aphaca in aruis naſcitur, altior lente, tenuibus folijs. ſiliquas lentacula maiores fert, in quibus terna quaternæ ſemina nigra, lente minora, continentur: quæ ad ſtringendi uim habent, quare torrefacta, ſtomachi aluiq; fluxiones ſiſtunt, ſi freſa lentis more decoquantur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, ἀφάκη. Latinis Aphace. Officinis incognitum.

Germanis,

Wildwicken.



Vicia, Wicken.



Germanis, Wilde wi- A
cken/ Et Vogels wicken.

Gillis de la uesse, uel ut
alij scribunt, uesse sauage.

Hic notandum, non idem
esse Theophrasto, quod Dis-
scordi hoc loco cõstat aphā-
cen, qui modò leguminum ge-
neri, modò inter olera con-
numerat, inquit, primo ab
æquinoctio statim imbribus
germinare, & aculeis arma-
ri, folijs syluestri moro simi-
libus, &c. Sed Theophra-
sto, quod equidem inueni-
rim, aphaca non siliquatur,
cum sios euanescat in pap-
pos, in quibus magna ex par-
te semen occultatur: nec folio-
rum eius ad lenticulæ, sed ma-
gis cicorij frondem affurat.
Hieracorum primum genus
à Theophrasto nomine a-
phaces putatur intelligi.

Vicia uerò, Germanis
Wicken/Brabant Vicien
appellata, ægris cretense,
flore cicoris subpurpureo, al-
bo & rubro, eodem colicu- B
lo si quis fieri minuta quasi

visula, iumentorum pabulo idonea, aluum constipant, humores generant melancholicos.

Porrum capitatum. Caput CXLIII.



Capitatum porrum inflationem facit. noxium succum cre-
cat. tumultuosum somnum parit. ut inam ciet. aluo accom-
modatur. extenuat. oculorum aciem hebetat. mentes pellit, sed
lædit exulceram uescam, renescq. cum pt. sana uero coctum.
esu pectoris uitæ extrahit coma eius in aqua maris & aceto co-
cta, in defensionibus, ad præclusiones uulnæ & duritias, utilis ha-
betur. Porrum bis aqua mutata coctum, tum frigida maceratum,
dulcescit, & multò minus inflat. semen acrius est, & quandam
adstrictoriam uim habet. quare succus cum aceto, addito thure
aut manna, sanguinis profluvia sistit, maxime si naribus erum-
pat. uenere stimulat cõtra omnia thoracis uitia. tabemq. pro-
delinctu efficax est. arteriam esu purgat. sed si assidue estur, ui-
sus obscuritatem inducit. stomacho aduersatur. Succus ex mel-
le potus, aut illitus, contra bestiarum morsus auxilio est. ipsum quoq. cum aceto
aut thuris polline, lacte aut rosaceo, utiliter aurium do'oribus & sonitui instilla-
tur. Varos tollunt folia illita cum uua rhois, qua ad obsonia utuntur. epinyctidi me-
dentur. crassas ex sale illita rumpunt ueteres sanguinis reiectiones cohibent. si bi-
nis drachmis, & æquali baccharum myrti pondere bibantur. Ampeloprasum stoma-
cho magis aduersatur, & plus porro exalfacit. urinã & menses uehementius ciet,
id contra serpentium morsus esse conuenit.


NOMINA ET EXPLICATIO.

Porrorum duo genera sunt. Vnum sectium à secundo dictum, quòd frondem illi supra terram eminentem au-

A Ampeloprason.

Klein hundstnobl
lauch.

Sectium.



ferre solerent. Cui nuper, ut lib. 19. scribit Plinius, auctoritatem dedit princeps Nero, uocis gratia ex oleo æstiu mensibus diebus singulis, nihilq; aliud, ac ne pane quidem uescendo. Alterum est capitatum uocatum, eo quod in caput crescat. Ambo eiusdem nature, nisi quod capitato efficacior uis est. Si quis autore Sotione, ut refert Constantinus, cum mium præsumat ante porros, non oleabit.

Porrum capitatum, quod & aricinum. Dicitur & porrus Latine.

Græcè, Πράσιν κεφαλαίον.

Germanicè, Lauch. Inferiori Germaniæ, Pareye.

Gallicè uerò ung porreau.

Porrum sectium, Tarentinum, Germanis Schntlauch, dicitur.

Porrum agreste Græci Αρωελο-πράσιν, uulgo uineale porrum. Germani, Wild lauch, Hundstnobllauch.

Galli pourree de chien, uocant.

Ampeloprason caule profilit bicubit ali, folijs porraceis, sed angustioribus, flore candido, radice bulbosa. Prouenit in uinetis, unde à natali us ampe

Cepa capitata.

B

lopfrason, quasi uitigmeum porrum nominatur. Galenus agreste porrum esse tradit, siccioreq; natura donatum.

Cepa. Cap. CXLIII.

Cepa longa acrior est quam rotunda, item flaua quam candida, & sicca quam uiridis, & cruda quam cocta, aut sale condita. Omnes tamen mordent. status gignunt, appetentiam inuiant. sitim mouent, & extenuant. fastidium pariunt, & expurgant. alio utiles sunt.

ex detractis purgamentis in oleum coniectæ, hæmorrhoidas, reliquosq; excretionū exitus referant, subdita pro balanis. Succus cum melle illitus, oculorum hebetudinibus, argemmis, nubeculis, & incipientibus suffusionibus auxiliatur. anginae eodem perunguntur. suppressos menses pellit. caput purgat, naribus infusus. canis morbus cum aceto, ruta, & melle illinitur. cum aceto autem perunctas in sole utiligines sanat. & cum parispodio, scabras lippitudines sedat. uaros cum sale reprimat. contra calcea-



calceamentorum attritus, cum gallina ceo adipe utilis est. citæ aluo prodest. in auribus sonitum ac grauitatem emendat. ad purulentas aureis, & eliciendam earundem aquam, ualet. alopeciae earum succo perfriantur, qui celerius quam alcyonium pilos euocat. largiore cibo cepa capitis dolores ciet, coctaq; uehementius utinam pellit. eos lethargicos efficit, qui ualitudinibus aduersis, ea etiam cocta, plus æquo uescantur. elixa, & cum passis uinis & fico illita, tubercula concoquit, & celerimè rumpit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Ceparum plura genera. Omnibus odor lachrymosus; unde & lachrymosam uocat, in de cultu hortorum Columella. Apud nos, inquit lib. 19. Plinius, duo prima genera: Vnum condimentarium, quod illi gerhyon, nostri pallicanam. Germani, pafslauch/äschlauch. Galli porreta & ciueta, appellam.

Alterum capitatum. Græcis κρόμμυον, Germanis Swibel/Hollen/Sybolten.

Inferiori Germaniæ, Ayeuyn. Olchy. Gallis uero oignon dicitur.

Optima autem quæ rotundissima. Item rursus acrior quam candida: sicca quam uiridis, & cruda, quam uiridis, & cruda, quam cocta: sicca quam condita.

Gethium penè sine capite est, crucis tantum longæ, & ideo totum in fröde, sepiusq; ressecatur ut porrum.

Allium sylvestre.

Allium Vrsinum.

Allium. Cap. CXLV.



cinis illitus sugillationibus cum melle, & alopecij cum nardino unguine,

Allium quoddam latium atq; hortensium habetur, quod in Aegypto, singulari, ut porrum, capite constat, dulce, in purpureum uergens, paruum. reliqua uero magna & candida, ex pluribus coagmentatur nucleis, quos aglitas, id est, spicas, Græci nominant. aliud est sylvestre, quod ophiogorodon, id est, anguinum, uocant. Vis allij acris est, exalfacit, mordet, excernit, alium turbat, inflationes facit, stomachum exiccat, sitim gignit, flatum permouet, summam corporis cutem exulcerat, aciem oculorum esu hebetat. Eosdem effectus præbet anguinum, quod & claphoboscorodon* dicitur. latas uentris tineas in cibo sumptum abigit. urinas detrahit, contra uiperarum ictus, & priuatim hæmorrhoides, prodest, ita ut non aliud magis, si cum uino iugiter assumatur. aut trium in eodem cibatur, contra rabioforum morsus & illitu & cibo ualet. magnæ & alio utilitates contra aquarum mutationes, uocem clarificat, ueterem tussim crudum coctum lenit, potum autem cum origani decocto, pediculos & lentes enecat. cremati

*Forſan aphroſcorodon.

A unguine, medetur. eruptiones popularum cum oleo & sale sanat. vitiligines, lichenas, lentigines, ulcera capitis manantia, lepras, & furfures, cum melle eximit. cum thure & teda decoctum, dentium dolorem leuat, si in ore contineatur. contra uenatos muris aranei morsus, cum ficulneis frondibus & cumino illinitur. Feruifacta comæ ius, fœminarum defœssionibus additum, menses & secundos partus extrahit. Allium eiusdem gratia sufficit. factum ex eo & nigra oliua intritum, quod myrtoton uocant, esu cit urinam. ora uenarum patefacit, hydropicis utile. Scorodoprasum magnitudine porrum æquat, qualitatum porri & allij particeps. unde promiscuas sibi uires ex utroq; uendicauit, effectus allij & porri præbens, inefficacius tamen. coctum, porri modo, dulcescit, & in olerum uicem transit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, *ἄροπον*. Latine & Officinis, Allium.

Germanis, Knoblauch. Brabantis, Loock. Gallis, Aul ou aulx.

Trium uersum allij genera sunt. Primam hortense & satium; alterum syluestre, quod Columella, lib. 13. Rei rustice ulpicum uocat, alij aphroscorodon, id alio satiuo grandius. Theophrastus libro plantarum octauo Cyprium uocat: eius etiam inuenit idem Theophrastus lib. 7. Plantarum. Dioscorides agreste uocat ophioscorodon, quasi anguinum. hodie urinum cognominant. Germanis Wild Knoblauch, dicitur.

Tertium genus itidem syluestre, scorodoprason, appellatur Latinis. Græcis, *ἄροπον πικρόν*. Officinis Allium porrum, Germanis, Aber Knoblauch, quod & gustu & odore porri & allij conditiones possidet, quasi olitorum diligentia in unum olera duo ueluti monstrum aliquod coaluerint.

Communes utriusq; uires ascripsisse sibi tradit Galenus, cui Paulus astipulatur, &c.

Sinapi.

Sinapi, uel herba S. Barbare.



Caput CXLVI.

Sinapi alteri genus.



Sinapi hortense, aliqui Sinapi uocant. Eligi debet adultum, ualde rufum, non magnoperè siccum, sed quod fractum internè uirescat, & ueluti quodā succo madeat, cauum colore. siquidem recens id genus, temperstium habetur. Ad calfaciendum, extenuandum, extrahendum, efficax est. ad eliciendam capitis pituitam manditur. contra præduros tonsillarum tumores, ac ueterem callosamq; arteriarum scabritiæ, succus ex aqua & melle conuenienter gargarizatur. sternutamenta ciet, eritum & naribus admotum. comitialibus quoq; auxiliatur. fœminas uulvæ strangulatu oppressas excitat. lethargicis, depresso capite, illinitur. cum ficis admixtum, donec rubescat locus, & ad exocendi cruciatus impositum, ad lienes, & omne genus dolores confert, cum permutandæ ualitudinis

ualetudinis causa, ex alto ultia extrahenda sunt. alopecij illitum medetur. facie pur A
gat. fugillata cum melle, adipe aut cerato rapit. feræ impetigines & lepræ, eo cum
aceto perunguntur. contra februm circuitus aridū bibitur, aut potui, polenta mo-
do, inspargitur. extrahentibus emplastris, scabiemq; extenuantibus, utiliter admi-
screti solet. tritum, grauitati aurium & sonitui, cum fico impositum prodest. Succus
ad hebetudines oculorum, & genarum scabritias magna utilitate illinitur. expres-
sus recenti semine succus, in sole ficcatur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, *Σινάπι*. Latine, Sinapi. Officinis Latinum nomen seruauit. Germanis, Senff.
Hofstardt, Brabantis. Gallus, Moutarde, blanche, noire, seneue.

Varia genera sinapis obseruamus. Primum genus rapitiam frondem exprimit, alterum in Erace folium
laciniatur, caulibus ramosis, sepe bicubitalibus, flore luteo, nonnunquam albicante, siliquis teretibus, duro se-
mine pulloq; repletis, acerrimis saporis, igneque effectus. Iuxta aquas duo sinapis genera crescunt, hic de-
picta, Vnum luteo, alterum albo flore, amari gustus, paruum semen, ad modum nasturtij aquatici, producunt
filliculis inclusum. Sinapi calfacit, siccatur ordine quarto. Sinapi Alexandrinum laudatur lib. 9. comp. pha.
part. Quomodo Sinapi ad salgimarum simul & conuiuiorum usum conficeretur, olim utrunq; docet nos Co-
lumella lib. 12. per totum caput 55. Est & sua sinapis Confectio Palladio in Iulio mense. Varro rei Rusticæ
lib. 1. cap. 59. ait: Seruari rapa confecta in Sinapi putant.

Nasturtium. Caput CXLVII.

Nasturtium hortulanum.

Nasturtium folucifere.



Nasturtium optimum constat esse Babylonium. Omnium semen est acre, ex-
calfacit. stomacho aduersatur, aluum turbat, tineas excutit, lienem imminuit.
partus

Apartus exanimat. menses cit. uenerem stimulat. sinapis & crucæ simile intelligitur. lepras & imperigines absterget. illitum cum melle, lienem extenuat. fauos expurgat. pulmonum uicia extrahit. lorbitionibus incoctum. serpentium uenenis potum resistit, atq; eas suffitu fugat. capillorum defluuia cohibet. carbunculos ad suppurationem perducit, & rumpit. coxendicibus cum polenta commodè ex aceto illinitur. tumores collectionesq; discutit. emittit furunculos, illitum cū muria. Herbarum ad omnia eadem effectus, licet minor.

EXPLICATIO.

Græcè, Καρό αινω. Latine, Nasturtium hortulanum, Crescio hortensis. Officinis Latinum nomen retinuit. Germanis, Kressen/Garten oder Brunskressen. Brabantis, Kressesse.

Gallis, Alenois, cresson de iardin.

Nasturtium autem appellatum est, Varrone & Plinio testibus, à naribus torquendis, quod odore & seminis acrimonia sternutamenta prouocet.

Nasturtium diuersum generum est. Vnum satiuum, quo nunc communiter æstiuo tempore cum lactuca, oleo, aceto & sale coenas inchoamus.

Alterum est agreste, Iberis uocatum, de quo copiosius tractauimus cap. ult. lib. 1. Germanis, Ganchblum.

Nasturtium quinto die nascitur, herbis reliquis succum adimit mista satis frigora contemnit. Quare tam hyeme quam æstate facillimè prorumpit. Quod etsi nobilius quam ut representari deprecatur, uolumus propter generum differentias, eius picturam subiungere, quam Dioscorides omisit. Nasturtium coliculis assurgit sesquipedalibus, longè statim ab radice minorum foliorum pediculo, floribus albis, semine per ramorum latera copioso, firmo, calyculis orbicularibus contento, acris sapore. Pinguibus iusculis incoctum, magnam acris uisionis partem deponit. Natura ei omnino sinapis crucæq; similis est.

Thlaspi.

Caput CXLVIII.

Thlaspi.



Thlaspi minus.



Sinapi Persicum.



Thlaspi.

Thlaspi, herula angustis folijs, digitali longitudine, in terram uersis, subpin- A
guibus, in cacumine diuisis: binum dodrantum cauliculo, tenui, non sine adna-
scentibus ramis: fructu circa ipsum rotum, ab extremo in latius se pendente: semi-
ne nasturtij incluso, lenticulae uasis effigie, nisi quod infringitur, unde nomen acce-
pit. flos albicat. nascitur in semitis, & sepibus, fossisq; Semen asperi gustus, ex cal-
faciens bilem utrinq; extrahit. potum acerbuli mensura prodest ischiadicis, infu-
sum sanguinem potu educit. internas suppurationes rumpit. menses ciet. sed par-
tus enecat. Alterum thlaspi tradit Crateuas, quod aliqui Persicon sinapi uocant, la-
tis folijs, radicibus magnis, utile ischiadicorum infusioni.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Thlaspi, siue ut alijs placet, thlaspidium, Sinapi agrion, Capsella, Scandulaceæ, Nasturtium tectorum, Si-
napi rusticum, & sylvestre, Officinis incognita: Duorum generum est. Primum Thlaspi maius, folijs la-
tioribus, Germanis, Dauensenis, Brabantis, Wilde Fesse, appellatur. Alterum Thlaspi minus, folijs an-
gustioribus constat. Germanicè, Besenkraut, dicitur. Est & tertium genus Thlaspios. Dioscoridi *ἑλκυσ*
& *ῥαγγό*. Officinis, Raphanus maior. Latinis, Sinapi persicum. Germanis, *Wetterich*. Gallis, *raffle* dictum.
Galenus Thlaspios genera ita distinguit lib. 8. simp. ubi inquit: Thlaspi duplex, Cappadocium, nigrum, non
exatè rotundum, sed quadam sui parte uelut *ἑρδαιον* habet, id est, infractum, exiguum, unde illi no-
men: multo maius & præstantius, quàm secundum, quod etiam in Cappadocia & Creta, & ubiq; nascitur
ἀργεῖον, id est, ex pallido flauum, rotundum, admodum exiguum. Creticum tamen pleriq; immiscet the-
ria.


Draba.

Caput CXLIX.

Draba herba ad cubiti altitudinem assurgit, tenuis spargens ramos, & ex u-
troq; latere folia ceu lepidij, sed molliora, & cãdidiore. in cacumine uerò sam-
buci umbellam gerit, candidos flores habet. Herba hæc cum ptisana coquitur,
in Cappadocia maximè. semen aridum pro pipere obsonijs admiscetur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, *Ἀράβη*, *Ἀράβης*. Drabe, draba, Arabis. Apud Herbarios quosdam orientale nasturtium, uel B
Babylonicum. Officinis & Germanis incognita. Gallis, Draua, Draue, Cuminum sylvestre.
Inuenitur in noualibus, & sepe cultis, cubitali proceritate, ramo sursculorum prouentu, folijs lepidij, in-
canis, sed mollioribus, umbella sambuci, flore candido, semine ferè semiculi.



Irio.

Caput CL.

Erysimon, Latini irionem uocant, iuxta
urbes, rudera, hortosq; nascitur, folijs e-
ruca sylvestris: cauliculis in lori modum len-
tis & obsequiosis: floribus luteis, siliquis in
cacumine gracilibus, ut scenograeco, cornicu-
latis: semine nasturtij, exiguo, urtius gustus.
Contra thoracis fluxiones efficax est, & si pu-
rulentia extulsiuntur, regio morbo & coxen-
dicibus prodest. contra uenena in delinctu cū
melle datur. illinitur ex aqua aut melle utili-
ter cæcis, carcinomatibus, parotidibus, duritijs
mammarum, & testium inflammationibus.
in totum extenuat, & calfacit. mitius multò
ad clysteres fiet, si aqua madescat atq; torrea-
tur, uel linteo illigatum pinisita farina oblitū
perassetur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, *ἑρυσίμων* herba.
Latinis, Erysimon, & Irio.
Officinis & Germanis proprio nomine destituitur.
Quidam improprie, uocant *Isenkraut*, das weiblin.
P

A Gallis Eruca generatissima, fortala. Italis nobilis cruce, dicitur.

Hac pomeria, aggeres oppidorum, & rudera uirent, gustu mirum in modum erucam imitatur, quare sy-
necris cruce, licet perperam, quibusdam est dicta, &c.

Piper.

Caput CLI.



Piper in India nasci, breui arbore traditur, quæ inter-
initia, præ longum fructum, ueluti siliquam promit,
quod longum piper est, habet intus aliquid tenui milio
simile, quod tandem in perfectum piper euadit, id autem
suis temporibus dehiscens, pandensq; sese, racemos e-
mittit, grana ferentes qualia uidemus. Ea acerba candi-
dum piper faciunt, aptum ocularibus remedijs, antidotis
& medicaminibus, quæ contra uenenata parantur: the-
riaca uocant. Longum uero uehementius mordet, & quo-
niam prius quàm ematurescat decerpitum est, subamarum
relinquitur, antidotis & theriacis medicaminibus expet-
itum. Nigrum uero, ut potè quod tempestiua maturitate
collectum sit, odoratum esse constat, candido suauius, a-
crius, & ori gratius, nec non ad condimenta utilius. Sed
candidum, & adhuc in acerbum uergens, antè dictis in-
firmius est. Eligi oportet grauissimum, plenum, nigris

sine multis rugis, recens, minimè furfurosum. Inueniuntur etiamnum in genere ni-
gri semina nutrimento defecta, cassa, inania, minimiq; ponderis, quod uocant bras-
ma, uis omnium exalfacit, urinam ciet, concoquit, extrahit, discutit, absterget cali-
ginem, quæ oculis obuersatur. piper februm horribus circuitu repentinis, siue
potu, siue illitu, subuenit, serpentium morsibus auxiliatur, partus extrahit, conce-
ptum adimere creditur, statim à concubitu suppositum, tussi, omnibusq; pectoris
uitijs, siue eclegmate, siue potu, succurrit, anginae eo & melle conuenienter perungū
tur. potum cum recentibus lauri folijs, tormina discutit, cum uua passa* manduca-
tum, pituitam à capite elicit, ualitudinem tuetur, dolores finit, appetentiam mouet,
concoctionem adiuuat, ad intestus esculentorum additum, strumas cum pice di-
scutit, uirilignes ex nitro emaculat. Fictili nouo, ut lenticula, motum torretur. Nō
est huius arboris radix gingiber, ut aliqui existimauere, sicuti paulò post ostende-
mus. Namq; piperis radix costo similis est, ora gustantium accendit, saliuū ciet, hæc
lienem reprimat, cum aceto illita, aut pota: caput etiam purgat, manducata cum se-
mine pedicularis herbæ, quam staphidem agriam uocant.

* Alias, staphi-
de agria.

* Non, non pæ-
cip.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Gal. lib. 8. Simp-
phar.

Lib. 2. Antid.

Gal. li. 1. Antid.
& lib. 4. sani-
tatis tuende.

Lib. 1. Anti.

Lib. 9. c. ph. p.

Piperis fructus inter initia seu siliqua coryli nucamento similis, longum piper est, Græcis πέρων μα-
νός. Officinus, ut reliqua piperis genera, nomen genuinū retinuit. Germanis Langer pfeffer. Gallis poi-
re long, dicitur: humidius, ob id citò perforatur, ut zingiber, & tardè, sed diu linguam mordet, ut aris. Hæc
siliqua postea in grana milij amula racemati degenat, quæ aucta & siccata, sed adhuc tanquam ompha-
codea, & immatura, piper album, Græcis πέρων λευκόν: Germanis, Weiss pfeffer. Gallis poiure blanc,
appellatum, siue, nigro πέρων μαύρον, id est, acrius: nam nigrum quod Græcis πέρων μαύρον, Germanis
Schwarz pfeffer. Gallis poiure noir, dicitur, iam superassatum sole, & superficcum est, tamen utrumq;
ualenter calfacit & siccit, & maximè digerit. Item quod in agreste, rusum, cœli & soli iniquitate degenera-
uit. Germanis, Leicht pfeffer, Taub pfeffer. Gallis poiure léger dictum. Piper longum adulteratum
seculo Galeni erat duplex: efferebatur alterum ex Alexandria, alterum erat germen herbæ cuiusdam, quale
est nobis coryli aut betule nucamentum. Piper longum nec sit perusum, nec adulteratum: album sit maxi-
mum, plenissimum, graue: itidem & nigrum, neq; id sit rugosum. Piper nigrum maius est alio pipere, & con-
sticem habet tenuiorem & minus rugosum. Piper album stomacho est accommodatius, & acrius nigro. Pi-
per omne coctionem sumptum iquat, sed album supra duo reliqua genera stomachum roborat, lib. 4. sanitatis
tuende. Radicibus piperis maximè proceris etiam utitur Andromachus apud Galenum lib. 7. comp. phar.
part. Hic uires costo similes tribuit lib. 8. simpl. Piper longum & rotundum bis scribitur lib. 10. comp. phar.
part. ut id album, & nigrum comprehendat.

Piper καὶ πόν, id est, commune Actuatio in antidoto podagria, diapoconia, & diatrion pipercon, est ni-
grum: nam longum & album ibidem commemorat.

Gingiberis.

Gingiberis. Cap. CLII. A



Gingiberis sui generis planta est, in Troglodytica Arabia magna ex parte nascens. qua uirente, ad multa, perinde atq; nos ruta, utuntur, & primis potibus & edulijs admiscet. Huius radices, cyperi modo, parua sunt, candicantes, & odoratae, atq; piper sapore imitantur. Eligi debent quae teredines non nouerunt. A multis tamen ob id condiuntur, quod celeriter cariem sentiant. Fictilibus in Italiam asportantur. Gingiberis cibo conueniens est, & cum condimento assumitur. ex calfacto-riam uim & excoquentem habet. aluum leniter emollit. stomacho utilis est. efficax aduersus ea, quae oculis caliginem offundunt. in antidota addi solet. in summa, piperis uiribus responder.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Zingiber Galeno & alijs cum indigenis ferè dicitur; quibusdam zinziber, alijs zingiber. Germanis Ingber. Gallis Gignebre, Lusitanis gongoure: radix est herba graminis modo serpens, candicans, odorata, piperis sapore, et uiribus, nisi quod tardius calfacit, sed diutius, uti longum piper, ob humiditatem excrementosam: cuius occasione utrumque teredinibus facillè tentatur. Codiendum recens omnino est, nunquam uetus, impostorum more. Mittitur ex Arabia Troglodytica.

Hydropiper. Cap. CLIII.

Femina.



F 2

DIOSCORIDIS

A ¹⁷²Hydropiper apud aquas nascitur, quæ stagnant, aut in pigro lapsu repit. cau-
 lem ædit geniculatum, prædurum, multis alis concavum: folia menthæ, ma-
 iora, molliora, candidiora, gustu piperis, acri, citra tamen ullam odoris gratiam:
 fructum acrem, in furculis parvis, prope folia racematim cohærentem. Folia cum
 semine illita tumores ueteres, duritias discutunt, sugillata delent, quæ postquam
 inaruerunt, tusa pro pipere in obsonijs admiscuntur. Radix parua, nullius in medi-
 cina momenti.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, ὕδρωπενος. Latine, Hydropiper, Perscaria. Officinis incognitum.
 Germanis, Wasserpfeffer, Muskenkraut, Flöhkraut, Pfawenkraut, Pfersigkraut, Rassel.
 Hydropiper herba est in aquosis nascent, ramusculis ac folijs Menthe similis, maior tantum, gustu acer-
 rima, ut piper, perexigua semina, ut piper, singulis folijs ferens. Calida quidem est, non tamen accedens pipe-
 ri, quæ recens illita sugillata, ac durities sanat. Hanc nonnulli condimentis piperis loco addebant apud ue-
 teres.

Parmica.

Caput CLIII.



Ptarmica frutex est, surculos habens paruos, mul-
 tos & rotundos, abrotono non dissimiles: &
 circa eos folia oleæ, longa, multa, & in cacumine ca-
 pitulum, uti anthemidis, paruum, rotundum, quod
 suo acri odore sternutamentum excitat, unde nomē
 accepit. Folia cum floribus illita, sugillationes rapi-
 unt. flores sternutamenta efficacissime mouent. Na-
 scitur in montibus & petrosis.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Ptarmice, Ruellio uidetur ea, quam uulgo in Gallia Draconis hor-
 tibus, aut, ut ipse scribit, pyrethri sylvestris appellatione nouit, recte
 mantibus tamen notis omnibus, ut huius pictura cum ptarmice de-
 scriptione collata clare ostendit. Ptarmicen, Germanicè uocant
 Nieskraut / wild Bertram, Nistterkraut / quod locis mu-
 lieribus præfenti remedio succurrat: in montium summis nascitur, flo-
 re aureo chamemali, folijs oleæ quidem non dissimilibus, ut Dioscori-
 des scribit: multo tamen latioribus, ut in latioribus nata ad planta-
 gnem quandocq; accedant. Sternutamenta tum folijs, tum flore uel so-
 lo odoratu cidentur. radix fibras multas facit, ruffas, sapore zinzibe-
 ris, muliebribus utijs arida in pollinem trita bibuntur. Sunt qui à
 sternutandi numero, apud ueteres diptarmicem uocant, & Sterna-
 mentariam.

Radícula, seu lanaria herba.

Caput CLV.

Struthium herba uulgo nota, qua purgandis la-
 nis utuntur, qui eas eluunt. Huius radix est acris.
 urinam ciet. prodest tussi, iccinorosis, orthopnœæ ex melle sumpta, cochlearis
 mensura. aluum soluit. eadem cum panace & capparidis radice calculos frangit, &
 cum urina exturbat. duritiem lienis absorbit. menses imposita trahit. partus effica-
 citer enecat: cum polenta autem & aceto illita, lepras tollit. tubercula discutit, cum
 farina hordeacea, & uino decocta miscetur & malagmaris, & ocularibus collyrijs,
 claritatis causa. sternutamenta mouet. per os purgat, trita cum melle, & naribus
 infusa.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græci, Στρουθίου. Latini Struthium, struthios, radiculam, lanariam.

Officina

Radícula, seu lanaria herba.

Herba fullosum.



Officina saponariam, herbam fullosum, Condisi.

Germani, Seyffentkraut / Welsche kraut / Speychelwurms / Spayens wurm.

Galli l' herbe à fullon uocant.

Hæc herba olim notissima fuit, ideo à Dioscoride minimè depicta relinquitur: spinosa herba est, caule lanuginoso, folio olce, floret æstate, grata aspectu, uerum sine odore: semen ei nullum, radix magna, teres, oblonga, quæ conciditur purgandis lanis.

Cyclaminus.

Cap. CLVI.

Cyclaminus folia habet hederæ, purpurea, uaria, in quibus suscipit deq; albicant maculæ: caule nudo, quaternos digitos æquante: floribus in eo purpureis, rosarum effigie: radice nigra, & aliquantum lata, ut rapum uideri possit. Quæ cum hydromelite pota, pituitâ aquamq; detrahit. mentes potu appositivæ ciet. Tradunt, si prægnas radicem transgrediat, abortum fieri. partum ap-

Cyclaminus.



pena accelerat contra uenena, præsertim leporis marini, ex uino bibitur. illita cõtra serpentium ictus, remedio est. immista uino febriat. regium morbum discutit, tribus drachmis pota, cum passo aut diluto mulso. Sed oportet eum qui ebibit, multis uestibus contectum, loco calido, & à perfrictionibus tuto recumbere, quò facilius exudet. eiectiones autem sudores fellei colore inueniuntur. Succus eius ad purgandum caput, naribus infunditur, ad deficienda quoq; alui excrementa, in uellere sedi subijcitur: illito umbilico & imo uentre coxarum tenus, aluum emollit. & abortum efficit. suffusionibus, & retusæ oculorû aciei, oblitus cum melle succus prodest. medicamentis abortum inferentibus admiscetur. succus cum aceto illitus, prociduum sedem restituit. Exprimitur tusa radice succus, & ad mellis crassitudinem decoquitur. Radix autem purgat. eruptiones papularum reprimat. uulneribus ex aceto per se aut cum melle medetur. licet nem absumit. uitia cutis in facie, & alopecias emendat. eius decocto luxata, podagras, & capitis ulcuscula, permionesq; foueri congruum est. ipsaq; in oleo uetere seruescunt, illito oleo, ulcera ad cicatricem perducit. Cauata ra-

Adix oleo expletur, & cinere feruenti imponitur, adiecto interdum Tyrrhenicæ ceræ momento, ut strigenti crassitudinem unguentum contrahat, cum primis utile pernionibus. Radix, scillæ modo, concisa reponitur. Narrant ad amatoria assumi contusam, & in pastillos diuisam. Nascitur in umbrosis, maxime sub arboribus.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Κυκλάμινος. Latine, Malum terræ, Panis porcinus.

Officinis, Cyclamen corruptè, & Panis porcinus, uel Terræ panis, & Arthanita.

Germanis, Sewbrot, Schweinbrot, & Erdapffel. Brabantis, Weidenbroot.

Gallis, Pain de porceau.

Cyclamini radix tota uehementer medicamentosa, magis eiusdem succus: incidit, terget, ora uenarum aperit, trahit, digerit, illitus abdomini, uentrem purgat, per nares trahit, cum melle illitus suffusus iuuat: cyrrhos nure emendat, menses & sudores mouet, ut Dioscorides fufius tradit.

Altera Cyclaminus. Caput CLVII.



Est & altera cyclaminus, quam cissanthemon aut cissophyllon uocant: folijs hederæ, sed minoribus: geniculatis caulibus, crassisq; circa uicinas arbores, capreolorum modo, se uolentibus: flore candido, odorato: acinis hederæ molli-
bus, lenti gustus, aliquantulum acris: radice superuacua. nascitur in asperis. Huius acini, drachmæ unius pondere poti, cum uini albi cyathis duobus, quadraginta diebus, lienem per urinam & aluum absumunt ad orthopnoeam bibitur, reliquias à partu purgat.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Κυκλάμινος ἡ τετρα.

Latine, Cyclaminus altera, hederæ Cilicia, Milax.

Officina, Sigillum Mariæ.

Germanis, Syndstevant, Je lenger je liebet.

Gallis, Leseau nostre dame.

Hæc altera cyclaminos à paucis nunc cognoscitur, sed superior pictura eam deliniat, quam nunc herbarij, uel Officina, Sigillum Mariæ uocant, quandoquidem huic nihil refragari, sed omnia consentire declarabimus. Sigillum Mariæ folia fert hederæ, minora tantum, caules crassos, uel, ut Plinius inquit, superius cæneos, geniculatos, uicinas arboribus, capreolorum ritu, se conuoluentes, flores candidos odoratosq; corymbis hederæ, sed molli-
bus, aliquantum acribus, gustu lenis & glutinosi, radice nullius

usus in medicina, prælonga tamen & in miram molem extuberante, & cetera. Radicem tamen, ut potius medicina superuacua, non explicuit Dioscorides.

Dracunculus. Caput CLVIII.

Dracunculus folio constat hederæ, magno, candidis notis insigni: caule recto, bicubitali, uersicolore, maculis resperso purpureis, ita ut anguem planè referat, baculi crassitudine, fructus summò caule racematim coheret, colore primum herbaceo, & cum ematuruit, croceo, gustu feruens, mordaxq; radice aliquantulum rotunda, bulbosa, aro non absimili, tenui obducta cortice. Nascitur in sepibus umbrosis. Seminis succus cum oleo instillatus, aurium dolorem mitigat. naribus etiam ex lana impositus, polypum absumit. carcinomata illitu sistit, triginta eius grana, si in posca bibantur, abortus inferunt. odorem auiunt posteaquàm staccidi flores emarcuerunt, conceptus adhuc teneros enecare. Radix exalfacit. orthopnoeas, ruptis, uulsis, tussi, destillationibus auxiliatur. humores pectoris excreta faciles reddit, siue cocta tostaq; cum melle, aut per sese edatur, siue farina eius ex melle delingatur.

Dracunculus.

LIBER SECUNDVS.

179

Dracunculus palustris.

A



Colubrina, Viperina, Bistorta, Crocodilla,
Waterwurz, Dillwurz, Schlangenwurz.

B

Ophioglossum.
Watersünglin.



F 4

A delingatur, urinam pellit, uenerem excitat, cum uino pota, phagedanas ulcerum, & quæ cacothæ uocantur, trita cum melle & bryonia alba, expurgat, & ad cicatricem perducit. colliria ex ipsa ad fistulas & eijciendos partus fieri solet. qui radice suarum manus perfricuerunt, a uiperis feriri negantur. illita ex aceto, uirilignes emaculat. folia recentibus uulneribus, linamentorum uice, conuenienter imponuntur. decocta in uino pernionibus apposuisse prodest. caseus folijs inuolutus, a putredine defenditur. Succus radice ad nubeculas, albugines, & oculorum caligines conuenit. Radix cruda coctæ, ad sanorum usum pro oleris recipitur. in Gymnesijs insulis, quæ Balcares uocantur, coctam radicem cum melle multo, in conuiuijs placentarum loco offerunt. Radix melsibus effoditur, lotaq; frustatim conciditur, & lino traicta siccat in umbra, & ita reconditur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Ἀρακωντία μεγάλῃ. Latine, Dracunculus maior, Dracontion magnum.
Officinis, serpentaria maior, & draguntea, corruptè. Germanis, Großwaternwur. Brabantis, Serpentin/Slangencruyt. Gallis, serpentine, dicitur.

Iam in hortis studiosè colitur Dracunculus, ludentis nature miraculum, & Draconis rudimenta in stirpibus facere condiscens. simplici caule attollitur, binum cubitum alto, leui glabroq; baculi crassitudine, uersicoloribus anguim maculis uariato, purpureis etiam intercurrentibus lituris, ita ut planè serpentis habitum coloremq; mentiri uideatur. in vertice remoto folia procedunt, sèna septenauæ, crassiore pediculo digitorum ritu propendens, candicantibus respersa notis, rumicis figura, specie tamen hederacea longiore. E foliato scapi fastigio uagina quædam foris herbacea profluit, cubitalis sèrè longitudinis, in mucronem sensim turbidat, uelut erupturi partus inuolutum, quæ cum debescens sese pandit, purpureum cornu in acumen fastigiatum demonstrat. Ea seminis incremento distenta dissiliit in rimam, & tandem elanguescens flaccescit, subarescensq; perit refecto cornu, cuius imam partem racemosus fructus ambit, acinis prima pubertate uirentibus, & per adolescentiam cocci rubore rutilantibus, gustu mordaci, odore uirido, quando ianuinum illud exerit cornu: radice bulbosa, tenui libro uestita, nascitur in opacis sepibus.

B Plinio Dracunculus triplici effigie demonstratus est: folijs betæ non sine thyrsi flore purpureo, hic ut inquit, est similis Aro; huius picturam supra dedimus. Alij radice longa ueluti signata articulos aquæ demonstrare, tribus omnino cauliculis. Tertia demonstratio fuit folio maiore quam cornu, radice arundinacea, totidem affirmat gemculata nodis, quot haberet acinos, totidemq; esse folia.

Omnia hæc colubinarum genera uulneribus & apostematibus conducunt, calores sedant, uenena extrahunt, imposita.

Arum.

Caput CLIX.

* Alij, nullis.



Gal. li 9 ph 44.

A Ron, apud Syros lupha uocatum, folia emittit dracunculi, sed longiora, & paucioribus* distincta maculis: caulem subpurpureum, do drantalem, pistilli specie, è quo croceum semen exit. radice dracunculi alba. quæ decocta estur, utpotè cum minus acris sit. Folia ad esum condiuntur, & arida per se decocta, manduntur. Radix, semen & folia, dracunculi uires habent. priuatim radix ex fimo bubulo podagris illinitur, & dracunculi more reponitur. in totum, ob mitiorem eius acrimoniam, in cibum expetitur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, ἀρόν.

Latine, Arum, Lupha.

Officinis pes uitali. serpentaria minor. sacerdotis uirile.

Larus: Germanicè, paffenpindt.

Gallis, Vid de chien.

Ari radix, ut dracunculi, ex fimo bubulo podagris illinitur: eiusdem cortex spleneticos iuuat & hydropicos: calida sicca primo ordine: incidit, tenuat, terget mediocriter.

Arisarum

Arifarum.

Caput CLX.

A

Arifarum exigua herbula est, huius radix oleæ magnitudinem implet, longè maioris quàm Aron acrimonia. Vnde illitu nomas fitit. sunt collyria ex ea, ad fistulas efficacia. illitu radice, genitale animalis cuiuscunq; in perniciem agitur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Arifarum pusilla est herba, radice oleæ tuberculo, acrior gustu quàm Aron. Galeus longè minus aro tra didit, radicem magnitudine oliuam æquare, multò maioris acrimonia. Paulus multò minus esse sentit, sed acrius, radicem oliuæ magnitudinem referre. Aris Plinio similis aro nascitur, minor tantum, minoribusq; folijs. Est etiamnum aris herba Hippocrati, sed quasit facie, non explicat. Hærent igitur non immeritò quiddā, an eadem sit herba aris & arifarum, Ambiguitatem tollit pictura, & uires quæ utriq; consimiles reddantur. Plinius siquidem eisdem omnino notis arum, quibus alij arifarum, representant. Sed in primis fidem facit aperiè nomenclatura, quæ utriusq; retinuit appellationem, duobus tandem uocabulis in unum coalescentibus, arifarum dici cœpit. Cum igitur nec uiribus, nec reliqua facie disideant, unam & eandem esse fatendum est.

Hastula regia.

Caput CLXI.



Hastula regia uulgaris notitiæ est, folijs maioris porri: caule leui, ferente in cacumine florem, quem antheri con appellant. radices subia cent oblongæ, rotundæ, glandibus similes, gustu acres, quæ ex calfaciunt. urinas & menses potæ ciunt. lateris doloribus, ruptis, conuulsis & tulsibus, drachmæ pondere potæ ex uino, medentur. Ea uerò uomitiones adiuuat, ludicri tali magnitudine commanducata. à serpente demorsis datur aptissimè, uerum trium drachmarum pondere. folijs, floribus & radice ex uino, morsus illinire oportet. item ulcera fordida & depalcentia. mamarum quoq; & testium inflammationes, tubercula, furunculosq; decoctis in facie uini bulbis. recentibus inflammationibus expolenta auxiliatur. Radicis succus adiecto uete re uino dulci, myrrha & croco decoquitur, fitq; perquam utile oculis medicamentū. ad purulentas aureis per se, cum thurè, melle, uino & myrrha tritus, prodest. in contrariam aurem infusus, dentium dolorem mitigat. Cinis è radice illitus, alopecias ad pilum reducit. Oleum in excauatis radicibus igni decoctum illitu exulceratis perionibus & ambustis igni, cōducit: surditati, instillatum in aurem, auxilia tur. Candidam utiliginem, linteo antea præfrictam in sole, illita radix emendat. Semen floresq; in uino poti, scolopendraræ & scorpionum uenenis mirum in modum resistunt. aluum purgant.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Ασφόδελο. Latinis, Hastula regia, Asphodelus, Aluicum. Officinis, Asfodillus, uel Asphrodili. Germanis incognita. Gallis des asphrodiles, phrodilorum.

Bulbus esculentus.

Asphodelus Latinis hastula regia dictus, à caule insigni ex multis radicibus bulbosis emicante, quibus agnatis abundat, interdum ad so. Radice utilis est tergente: eadem uisita magis calfacit, siccatur, tenuatur, digerit. Nunc porcorum cibus est, olim etiam hominum: muribus uenenum. Autumno legitur cum ualet plurimum.



Bulbus esculentus.

Cap. CLXII.

Esculentus bulbus uulgo cognitus, à nobis estur. stomacho & aluo utilis, rufus, qui & ex Aphrica deferitur. amarus uerò & scillinus, stomacho aptior est, & concoctione adiuuat. Bulbi omnes acrimoniam habent. ex calfaciunt. uenerem stimulant. linguam tonillasq; exasperant. multum alimēti præbent. carnes creant, inflationem pariunt. luxatis, fractis, articulorum doloribus

A bus efficaciter illinuntur. spicula extrahunt. gangrænas & podagras ex melle aut per sese, hydropicorum tumores, & canum morsus cum melle & piperis polline illiti cohibent. sudores compescunt. stomachi dolores mitigant. furfures & ulcera, quæ in capite manant, cum tosto nitro abstergunt. sugillata uarosq; per se aut ex oui luteo, & lentiginis cum melle uel aceto, emendant. fractis auriculis unguibusq; ex polenta medentur. ijdem calidis cineribus torrefacti, tollunt ficus: item cum cinere è mænarum capitibus, impositi, cremati uerò & eum alcyonio misti, uitia cutis in facie, atrasq; cicatrices in sole illiti, emaculant. faciunt ad rupta, si cum aceto cocti edantur. Sed copiosiore eorum cibo abstinendum, quoniam neruos tentant.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Theophr. lib. 3.
de Plantis.

Bulbi priuatim uocati capis similes sunt. Suntq; plura eorum genera, ut lib. 2. de plantis tradit Theophrastus. siquidem magnitudine, colore, figura, & sapore differunt. Aliubi enim adeò dulces nascuntur, ut per se sine condimento alio edantur, quales in Taurica Chersoneso sunt. Cato Megarenses tanquam omnium optimos celebrat. Venerem mirè stimulant. Vnde & salaces à Martiali uocantur, in libro Xeniarum;

Cum sit anus coniunx, cum sint tibi mortua membra,

Nil aliud bulbis quam satur esse potes.

Columella item de ijsdem in hortulo ait:

Quæq; uiros acuiunt, armanq; puellas,

Iam Megaris ueniunt genitalia semina bulbi.


Aegnetæ lib. 1.

Sisimichion.

Et Paulus Aegnetæ lib. 1. Bulbi inquit, senas abundantiam faciunt, & uenerem stimulat frequentior cibis eorum. Hæc uerò de priuatim dictis bulbis. Nam generaliter bulbi uocantur, quorum radices sub terra sic crescunt, ut ad nouam quotannis sobolem decerpi aliqua pars possit, ut lilio, croco & similibus: item & alia rotunda, truncata radices, & cui dantur radices & olera capitata, uti Celsus innuit lib. 8. Vbi de alimentorum facultatibus agens, dicit: in media materia numerari debere ex oleribus ea, quorum radices uel bulbos assumimus. Et mox post: Ex oleribus ualentior rapa, napiq; & omnes bulbi, in quibus cape quoq; & allium numero, quam pastinaca, uel quæ specialiter radícula dicitur.

Corn. Celsus
lib. 1.

B



Bulbus uomitorius. Cap. CLXIII.
Scilla.

Bulbus quem uomitorium uocant, folia habet lentiora multò & longiora, quam bulbus esculentus: radicem similem, cortice nigro. Ea radix mansa, aut decoctum eius potum, uel sic malis medetur. uomitiones mouet.

EXPLICATIO.

Bulbus què uomitoriū uocant ab effectu, multò longior est, quam esculētus.

Scilla.

Cap. CLXIII.

Scilla uim acrem atq; feruentem habet. assatum ad multa utiliore esse constat. Polline ad crustā subactio, auri luto oblita,

oblita, in clibanum conicitur, aut carbonibus obruitur, donec obducens crusta sufficienter intosta fuerit, quæ exempta, si non emollescat, altero polline simili, aut luto circumlinitur, & eadem quæ prius, sunt, nam quæ ita non astat, interaneis maxime noxia est. Torretur item in olla, indito operculo, quæ in furnum demittatur. Summi etiam solet, quod maxime est medium, direptis uiuo tenuis tunicis: quod frustatim confectum coquitur, mutata sæpius aqua, donec ipsa nec amaritudinē, nec acrimoniam habeat, traiecitq; lino frusta siccantur in umbra, ita ut ne ulla quidem parte contingant. his scillæ segminibus ad oleum, uinum, aut acetum scillinum utimur. Ad rimas pedum, interna pars crudæ scillæ in oleo feruefacta, aut cum resina liquefacta, imponitur. decocta in aceto demorsis uiperæ cataplasma est. ad singulas asæ parces, adiectis octonis tosti salis, cochlear unum aut alterum damus ieiunis, ad emolliendam aluum. in potu autem & odoratis medicaminibus, & quibus urinā ciere uolumus, hydropicisq; & stomachicis, quibus innatat cibus, regio morbo, torminibus, in rursi uetere, suspiriosis, & ore reſcientibus tres obolos, in delictu ex melle sumptis satis est. coquitur cum melle, & estur eorundē gratia, maxime ut confectionē adiuuet. strigmenta per aluū extrahit. cocta & simili sumpta modo, eosdē præbet effectus. sed cauēde scillæ usus his, qui intestinū sentiūt uleus, ad peniles uerucas & priones, tosta efficaciter illinitur. Tritū semē, & carica aut melle decoratū, aluum emollic. Scilla tota in limine ianuæ suspensa, mali medicamenti noxiā arcet.

Pancration.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis, Πανκράτιον. Latinis & Officiis retinuit nomen priscum.

Germanis, Meuszwibel/Meerzwibel. Gallis, quilla oygneon marin, dicitur.

Scilla calida ordine secundo, admodum incidit. assam aut elixam sumi præstat, ut uirum eius uehementia exoluatur. Legenda ex terra, quando folia eius & caules omnino aruerint. Scillæ albæ segmenta seu taleole cultello ligneo separatæ, lino traiectæ, modicis interuallis, ne se contingant, in umbra siccantur diebus 60. ut ex his fiat acetum scillites. Alba est masculus, eaq; utilior quàm femina nigra.

Gal. lib. simp.

Lib. 1. Antido.

Plin. cap. 9. lib.

20.

B

De Pancratio. Cap. CLXV.

Pancratium, quod aliqui scillā appellant, radice est magni bulbi, subrufo colore aut subpurpureo, gustu amaro ac feruente: folijs lilijs, sed longioribus. Scillæ uires & præparationem habet, eodemq; pondere in morbis efficaciter assumitur. cui tamen mitior quàm scillæ facultas inest. Radicis succus cum erui farina digeritur in pastillos, qui hydropicis splenicisq; cum hydromelite commodissimè dantur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Πανκράτιον. Latinè, Pancratium. Officiis, Scilla minor.

Germanis, Bleyne merzwibel/oder Meerzwibel. Gallis, Scille bastarde.

Omnes scillæ representat effectum, sed longè censetur inuulidior. Paulus & specie uiribus comparauit scillæ.

Capparis. Cap. CLXVI.

Capparis aculeatus frutex est, qui in terra stratus, magis in orbem euagatur. spinas, ut rubus, habet, in hami modum aduncas: folia mali cotoneæ rotunda: fructum oleæ similem, qui cum dehiscens panditur, florem candidum promittit: quo excusso, non nihil glandis oblongæ figuræ inuenitur, quod apertum granis

acinis puniceorum similia ostēdit, parua, rubicūda, radices ligno sas spargit, grandes numerosasq;. Tenui solo, asperisq; locis, in insulis & iuxta rudera nascitur. caulis & fructus, cibi gratia con diuntur. aluum turbat. stomacho aduersatur. fitim gignit. cocta tamen stomacho quàm cruda utilior est. fructus drachmis duabus in uino potus, quadraginta diebus, lienem absumit, & urinam cruentumq; excrementum emittit. bibitur utilissi



A



Hybris.

mē in coxarum doloribus, & nervorum resolutione, item ruptis & convulsis, menses ciet. caput purgat. Dentium dolorem sedat semē ex aceto decoctum, colluto inde ore. Aridus radicis cortex ad eadē proficit. ulcera omnia uetera, & sordida, & quę occalluerunt, expurgat. lienosis cum farina hordei illinitur. dente demorsa, dolori eius auxiliatur. cum aceto trita, vitilignes albas absterget. Radix foliaq; in trita, strumas ac duritias discutiunt. Aurium uermiculos infusus succus enecat. Aphrica, & præsertim Marmarica capparis, uehementer inflat. Apula uomitus facit. & quæ à Libyco, & quæ rubro mari deferitur, mirum in modum acris est: siquidem in ore pustulas excitat, gingiuasq; ossitenus exest. quare in cibis non abredamnatur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Καπνάρια. Latine, Capparis. Inturis,

Officinis genuinum nomen seruauit,

Germanis, Kappren.

Gallis Cappres, dicitur.

Capparis radicis cortex amarus, acer, acerbus, terget, purgat, tenuat, incidit, digerit, constringit, lienes induratos & ischiadas, ob hæc magnificè iuuat. sumptus, uel cum idoncis remedijs admotus.

Eadem radix etiam hepatica est. li. 3. comp. phar. part. & splenetica, lib. 9. eiusdem. Flos eius & fructus aceto & sale conditus, primis mensis ad excitandam appetentiam sumitur, licet stomacho noxius, siticulosus aluum turbare Dioscoridi dicatur.


Folia capparis trita cum mero pota splenetica, lib. 9. comp. phar. part.

B

Gal lib. 7. simp.
& lib. 9. comp.
phar. part.



Lepidium.



Lepidium:
Cap. CL XVII.

Lepidium aliqui gingidium uocant, herbula uulgo nota. muria cum lacte seruatur. Vis foliorum acris & exulcerās. quapropter ischia dicis trita, præsentissimū est auxilium, si cum helenij radice, quarta parte horæ, illinatur. lienosis simili modo prodest. lepras eximit. Radix appensa collo dolore dentium liberare existimatur.

EXPLICATIO.

Vide annotationes in caput ultimum lib. 1.

Ranunculum,

Secundum genus.

Primum genus Ranunculi.



B

Complura ranunculi genera, uis tamen omnibus una, acris, & uehementer exulcerans. Nam unum coriandri folijs constat, latioribus, subalbidis, pinguius, flore luteo, interdum purpureo: caule gracili, cubitum alto: radice alba, exigua, amaraq; multis capillamentis, hellebori modo fibrata. nascitur in limitibus humidis. Alterum lanuginosius, longiori caule, pluribus foliorum incisuris, plerumq; in Sardinia proueniens, quam a cerimum, quod syluestre apium appellant. Tertium minimum, odore graui, flore aureo. Quartum huic simile, flore lacteo.

Folia, flores & cauliculi recentes, illitu exulcerant, & crustas non sine dolore gignunt. quare ungues scabros extricant, scabiem eximunt. stigmata delent, formicantes uerrucas, & peniles, alopeciasq; paulisper illita, tollunt. repente decocto per niones fouentur. sicca radix, tritaq; sternutamenta ciet, naribus admodum. dentium dolorem appensa leuat, ipsos tamen fragit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Plura ranunculi genera Dioscoridi demonstrantur. Primum genus ranunculi, Græcis Βατράχιος.

Officinis pes corui, ulceraria, scelerata.

Germanicè Gleitsblumen/Brennender hanensfuß/Zanenfuß/Butterblumen.

Gallis bacini, dicitur. Florem habet luteam, interdum purpuream, qui mihi tamen usus non est.

Hoc genus ranunculi duplex est. Vnum folijs candidis: alterum nigrioribus, in medio quasi sanguineis guttis, rubus maculis resperis: utrunq; genus cultis incultis nascitur.

Ranunculi genus alterum lanuginosius, pluribus foliorum incisuris, altiore caule, gustus acerrimi, quod priuatim apium rusticum cognominant. Herbarij hodie apium risus. Historici Sardoam aut Sardoniam herbam uocant, à Sardinia. Strabo ex hac herba toxici genus Hispanos confecisse meminit, hausta cuius urgente ui maiore citra dolorem ipsi sibi mortem consciscere. Græcis Βατράχιος & ερεπος. Officinis falsò hydropiper, Germanis, Stoschpfeffer, dicitur, quia palustribus locis prouenit.

c



Quintum genus.



Quartum genus.



Sextum genus.



Cuius multae species : una

Ranunculus tertius mi-
nimus est, graui odore, flo-
re aureo, perisq; locis con-
spicitur. Graecis Βαρβακχί-
ον ἴριον, ἤ ὁ ἄνδρ' ἴριον.
Officinis incognita. Germa-
nis, Gelbwaldthändle/
dicitur : nascitur enim in
sylvis. Ranunculus quar-
tus, superiori similis, flore
tantum lacteo, Graecis Βα-
ρβακχίον ἴριον, ἤ ὁ ἄνδρ' ἴριον.
Offici-
nis quoq; incognita. Germ.
Weißwaldthändle.

Est & Ranunculi genus
quoddam, a radice figura
uerticillum Apulcius uoca-
uit, ob globosam rotunda-
tem Minor alijs est, & ra-
dice floris inuersa. Genu
omnium acerrimi. Sunt qui
Laureā uocant. Graecis Εἰ-
δ' Βαρβακχίον ἴριον
ἤ ὁ ἄνδρ' ἴριον, ἤ ὁ ἄνδρ' ἴριον.
Officinis
pes columbinas, & uesica-
ria, Germanis, Gelb-
gleißblümle / Rleyner
Kanenfuß, Taubenfuß.

Est & alterum ranunca-
li genus hortense, quod ob
pulchritudinem in coronā-
menta uenit. Efficit enim
cultura, ut qui in limitibus
simplici foliorum compage
flores oriatur, structili quo-
dam densq; foliorum stipa-
tu nunc in hortis colluce-
scant. Germanis, Gefüllte
Kanenfuß, Gallis Bacilles
doubles, appellatum.

Omnēs Ranunculi spe-
cies urendi nanciscuntur li-
centiam, pastulasq; uelut
ignis excutiant: nam eorum
uis ualde acris & uehemen-
ter exulcerans: intra cor-
pus sumi non debens.

Anemone.

Ca. CLXIX.

Vo anemones
genera. Vnum
syluestre, alterum
in cultis nascens.
phoeniceum florem
profert.

Anemone.



profert, altera candicantem, aut lacteum, A
aut purpureum: harum folia coriandro si-
milis, tenuioribus prope terram diuisuris:
caules lanuginosi, tenues, in quibus flores
ut papaueris, & in medio capitula nigra,
aut cœrulea: radix oleæ magnitudine, aut
amplius paulò grandescit, fermeq; genicu-
lis quibusdam cingitur. Sylvestri amplitu-
do prorsus maior, latioraq; folia: & durio-
ra: oblongius caput: flore puniceo, tenui-
bus & multis radicum capillamentis. Acri-
or est quæ nigra habet folia. Vis utriusq; a-
cris: ea de caula succus naribus infusus, pur-
gat caput, commanducata radix pituitam
trahit. decocta in passo & illita, medetur o-
culorum inflammationibus. cicatrices eo-
rundem & hebetudines emendat. sordida
ulcera abstergit. folia & caules si cum ptisa
na decocti edantur, copiam lactis præbent.
menstrua ciunt, uellere apposita. Illita quoq; lepras eximunt. Sunt qui erroris ducti,
argemonem nominari eupatorium putent: quoniam à sylvestri Anemone, argemo-
nem, & papauer, quod rhœada appellât (de quo inter papaueris genera referemus)
propter colorum cognationem in floribus, distinguere non possunt, uerum papa-
uer & argemone colore minus saturato spectantur, & utraq; tardius floreret, quin-
etiam Argemone croceum succum, gustu admodum acrem, reddit: rhœas uerò can-
didiores & acrem. insuper Anemone & rhœadi capitula sylvestris papaueris si-
milis insunt, sed in Anemone supernè crassiusculum^a, in rhœade subangustius. A-^a Latiusculum,
nemones genera nec succum remittunt, nec calyces habent, sed quasi asparagi cacu-
men, in aruis illa sæpius enascuntur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Argemone.



Greci, Ἀργεμόνη. Latine, Anemone. Officinis herba Veno-
si. Consimilis est papaueri rubro sylvestri. Germanis, Bus-
chenschell, Sachetkraut. Brabantis, Windcruyt. Gallis,
Coque lourdes, uel corles. Hortenses uerò passi flores uocant.
Empirici hanc herbam uulnerariam faciunt. Secatur eius
folia non sine acore quodā, ita ut oculos quemadmodum alliu,
aut capse feriant. Illaq; per alembicum ui igni: destillata, a-
quam uulneribus manifestandis, curandisq; utilissimam præ-
stant, quæ & putridam carnem erodat.

Argemone. Cap. CLXX.

Protentilla.



CL 2

A Argemone in totū sylvestri papaueri similis est. folia habet Anemones, diuisa: florem puniceū: caput in cauliculo papaueris rhœadis, oblongius, & summis partibus latum: radicem rotundam. succum croci colore, ac rem, dimittit. Argema & nubeculas expurgat: folia illitu inflammationes compescunt.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Nostri herbarij hodie duo genera Argemones. Vnum papaueri sylvestri omnino simile, alterum Germani Genferich/ uocant, quia anseribus hæc herba uoluptati est. tamen apud me horum certi nihil habetur.

Anagallis.

Caput CLXXI.

Anagallis aquatica.

Mas.

Fœmina.



Duo Anagallidis genera, quæ tantum flore distat. nam quæ cœruleo flore est, fœmina dicitur: mas, quæ phœniceo. frutices sunt parui, in terra iacentes, folijs in quadrangulo caule pusillis, subrotundis, ad helixinæ folia accedentibus: femine rotundo. Vtraque mitigandi uim habet, inflammationem arcet. adactos corpori aculeos extrahit. nomas cohibet. Succus caput gargarizatu purgat. & naribus infusus, dolorem dentium lenit, si in aduersum narum inijciatur. argemā cum melle Attico emendat. retusa oculorum acies auxiliatur, contra uiperarum morsus, iecinoris & renum uitia, si ex uino bibatur, prodest. Tradunt eam, quæ cœruleū ædit florem, prociduum sedem reprimere: quæ uero phœniceum, illitu euocare.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Anagallis in duo genera diuiditur. Fœmina flore cœruleo conspicitur, mas puniceo. lacet in terra uterque sexus. Folia in cauliculis quadratis pusilla rotunda in terra iacentibus, nascuntur in hortis & aquis.

Anagallis Fœmina Latinis.

Anagallis Mas Latinis.

Morsus Galline Officinis.

Græcis Αναγallis ἀγενυ.

Αναγallis ἡνδεια Græcis.

Germanis, Gauchheyl/ mit roten blümlein.

Gauchheyl/ mit blaen blümlein Germanis.

Gallis quoque Morgelina (flore enim tantum distant) appellatur.

Morgeline, Gallis dicitur.

Est & tertium genus Anagallidis palustre, floribus cœruleis, Germanis, Wasserpungen/ & Bachpungen/ appellatum: eius pictura supra est.

Galenus tradit Anagallidem, siue quæ florem parit cœruleum, siue quæ phœniceum, quendam attritu calorem possidere, quo spicula uel impactos corpori refigit aculeos. Quæ de causa succus naribus inditus caput purgat, & ut summam dicitur, exicatoriam uim cura morsum obtinet, quare uulnera glutina, idem de utraque Anagallide sentit Paulus.

Veterinarij

Veterinarij uerò in hodiernum diem usq; hac herba, quam palustrem siue aquaticum Anagallidem appel-
lauius, in tumoribus discutiendis, & scabie equorum sanand. utuntur: exicatoriam uim citra morsum ob-
tinet, ut Anagallis, quare uulnera glutinat, ad recentia quoq; uulnera tanta ei traditur uis, ut saniem osibus
extrahat, quemadmodum id longa ac uaria experientia multis constat, quæ uires singulatim à ueteribus Ana-
gallidi utriq; attribuantur.

Hedera.

Caput CLXXII.



Hedera differentias multas in specie sortitur, summas autem genere treis. Nam quædā can-
dida est, altera nigra, tertia helix, candida, fructum
fert candidum: nigra, nigrum, aut croci æmulum,
quam uulgo Dionysiam uocat, helix fructum non
gignit, sed albas habet uiriculas, & folia parua, an-
gustola, & concinniora. Hedera omnis acris est, &
adstringens, neruos tenet, flos trium digitorū car-
ptu, facit ad dysentericos, in uino bis die potus, am-
bustis cum cerato tritus illinitur. recentia folia ex
aceto cocta, aut cruda cū pane detrita, lienes sanant.
foliorum & corymborum succus, cū irino unguen-
to, melle aut nitro, naribus infunditur, & cōtra ue-
teres capitis dolores, caput eo cum aceto & rosa-
ceo perfundi utile est, purulentis auribus, aut dolen-
tibus, cum oleo medetur, nigrae hederæ succus, aut
epoti corymbi, corpus infirmant, mentemq; turbāt
largius sumpti, acini quinq; triti, calfactiq; in punici mali cortice cum rosaceo, si in-
stillantur à contraria aure, dolorem dentium mitigant, denigrant capillum, illiti co-
rymbi, folia in uino decocta, illinuntur omnium ulcerum generi, etiam si caecō the-
sint, uitia cutis in facie & ambusta sanant, uti antea diximus, decocta, mouent menses
triti & subditi corymbi, ijdem poti, post purgationes foeminarum, drachmæ pon-
dere, concipiendi spem adiunt, pediculus foliorum melle irrigatus, ac uulua indi-
tus, menstrua & partus extrahit, instillatus succus putrida tædianauium, graueolen-
tiamq; emendat, & sanitati restituit, la chryma hederæ philothrum est, illitu pedicu-
los enecat, succus radicum in aceto potus, contra phalangia prodest.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Chelidonium.



Hedera plurimas, ut Dioscoridi placet, sigillatim habet differenti-
as, sed summas species omnium generum tres. Candida fructum candi-
dum fert, Græcis Κισσός λευκός, & λευκόνεπρος, Germanis, Weiss-
sef Ephew, Brabantis, Weyl / Wyloof, Gallis, Lierre blanche.

Nigrum fructum nigra hedera fert, Græcis Κισσός μέλας, Germa-
nis, Mauer ephew / Baum ephew, Gallis Lierre noire, & dionysia
appellatur, Tertia, quæ nominatur Helix, nullum parit fructum, tenui
tus sarmentis, folijs paruis, angustis, cōcinnioribusq; hæc Græcis Κισ-
σός ἀκρόεπρος & Λύξ, Latinis, Sterilis Helix. Germani Ephew on
frucht, & Aley Ephew uocant.

Hedera satis omnibus inimica, sepulchra ac muros rumpens, serps
tium frigori grauiissima: quæ etsi crescendo arborum magnitudinem
æquat, frutices eam tamen sibi uendicant.

Hedera, ut Aegmetæ placet, contrarijs constat potentij. Stringit
enim, & refrigerat, atq; cum quadam acrimonia calefacit, essentia a
quose particeps, uiridis, tepida.

Chelidonium. Cap. CLXXIII.

Chelidonium maius, caule est gracili, cubitali aut
caltiore, adnatis foliosis: folijs ranunculi, multis,
mollioribus tamen, & colore caesijs: flore uiolæ albæ,
secundum singula folia prodeunt, in eo succus croci.

A mordax, acris, & aliquantulum subamarus, grauiter olens, radix supernè singularis, infernè in multa crocea capillamenta fibratur. siliqua, seu corniculati papaueris, te-
nuis, in metæ figuram longa: in qua semen papauere maius recluditur. Succus in æ-
reo uase, cum melle prunis decoctus, oculis claritatem adfert. Folijs, caule, radice,
succus exprimitur ineunte æstate, & siccatus in umbra digeritur in pastillos. Radix
cum aniso & uino albo pota, medetur regio morbo, & ulceribus quæ serpunt. im-
posita cum uino aut manducata, dentium dolorem sedat. Hoc nomen sibi uidetur
uendicasse, quod aduentu hirundinum exoritur, & discessu emarcescat. Sunt qui
narrant, hirundines matres ex cæcatis pullis, ad mota herba uisum restituere.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Χελιδνίου ῥίζα.

Latine, Chelidonium & Hirundinaria.

Officinis, corruptè Chelidonia, Germanis, Schellwurcz. Brabantis, Gonwe.

Gallis, Chelidoine, ou esclere.

Herba nota est: licitur autem nomen sumpsisse ex hoc, quod eo tempore semper florescit, quo Hirundines
præsto sunt, quas Græci Chelidonas uocant: uel, ut quidam memorant, quod nidis suis eandem Hirundines
ferant, ob acuosos succedentium usus.

Chelidonium minus.

Caput CLXXIIII.



Chelidonium minus, quod triticū syluestre
aliqui nuncuparunt, herbula pediculis ab
radice pendens, sine caule: folijs hederæ, multo
rotundioribus & minoribus, teneris, & supini-
guibus: radices habet ex eodem callo complu-
res, pusillas, in granorum tritici modū acrua-
tim cōgestas, quarum tres aut quatuor in longi-
tudinem exeunt. Iuxta aquas & lacus nascitur.
Vis ei acris, & anemones modo, summam cutē
exulcerat, psoras & scabros ungues eximit. suc-
cus radicibus expressus ad purgandum caput, na-
ribus infunditur, decoctum eius cum melle gar-
garizatum, magnificè id præstat, & omnia pectō-
ris uicia extrahit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Χελιδνίου ῥίζα μικρόν.

Latinus, Chelidonium

minus. Officina scrophulariam minorem.

Germani, Heytraut/Seigwarzen Traut/Pfassenhödlin/Schalechtraut/Kelberkernen/Bi-
berhödlin. Inferiori Germanis, Speuckuyt. Galli, Caoullons des prestes, appellant.

Hæc herba longo tempore & medicis & herbarijs incognita fuit: quod equidem demiror, cum nulla uer-
no tempore frequentior occurrat, præsertim hirundinum aduentu: & marginibus aquosis inueniatur, quæ
nulli non ulignesi tractuscatem. Quam longè disidenti nomine, proprio ignerato, nunc Officina uocat
scrophulariam, quod strumosa radix multis granorum frumenti granis uideatur coaluisse: quanquam putem
inditam appellationem, quod strumis (quas uocant Græci imitatione, non Latina, scrophulas) medeatur.
Sed ne sine peculiari demonstratione testemur, id euidenter pictura poterit comprobari. Siquidem scrophu-
laria herbula est pediculis pendens, uiduo caule, folijs hederæ, rotundioribus multo, minoribusq; teneris &
modicè pinguibus. Radices ostendit ex eodem callo prodeuntes, paruas, complures in granorum tritici morē
acruatim cōgestas, quarum tres uel quatuor in longum protenduntur. Humida sequitur & palustris. Flo-
res aduentu hirundinum, nec longo post tempore marcescens euanescit, sicut irrigui limites, qui largo folio-
rum florumq; stipatu pubescunt, confestim ipsi spoliati glabrescere conspiciuntur, qua de causa Chelidonium
id est, hirundinariam dici, nulli dubium est. Flos ei Ranunculi, luteo colore nitens.


Othonna.

Caput CLXXV.

Othonnam aliqui maioris Chelidoniæ succum esse aiunt, quidam glauci: alij
succum floribus corniculati papaueris expressum. alij permistos cœruleæ a-
nagallidis, hyoscyami, & papaueris succos, esse contendunt. alij Troglodyticæ cu-
iusdam herbæ succum, quæ Othonna uocatur: nasciq; eam in eo Arabiæ tractu, qui
ad

ad Aegyptum spectat. Othonna folijs erucæ, perforatis cribri modo, & ueluti à ti- A
nea derolis, squalore oblitis, paucis: flore croci, latifolio, quare quidam anemones

Auriculamuris.
Blac Wintergehu.



Auricula muris.
Gross Meusohr/
Wagelkraut.

speciem esse putauerunt. extractus succus oculorum medi-
camentis adicitur, ubi expurgare est opus. mordet enim
& abstergit omnem caliginem, quæ oculis offunditur. Tra-
dunt humorem quendam ex herba emanare, qui elotus,
femoris calculis, in pastillos ad eadem digeritur. Aliqui ta-
men affirmant, lapidem esse Aegyptium, in Thebaide na-
scentem, exigua magnitudine, aereo colore, gustu cum fer-
uore quodam & adstrictione mordaci.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Othonna, quid fuerit, etiam Dioscoride teste, ne inter ueteres quidem sa-
tis constat.

Auricula muris:
Cap. CLXXVI.



Pilosella, Alfine.
Aleyn Meusohr/
Geydnisch wundekraut.

Muris auricula, quæ myos-
otida uocant, herba est
caulibus pluribus, ab una radi-
ce, aliquatenus ab imo ruben-
tibus, & concavis: folijs angu-
stis, oblongis, dorso acuto, cla-
to, nigricantibus, per interval-
la assidue geminatis, atque in

Myosot.
Blac Meusohr/
Kosen f. folium.



A mucronem desinentibus, & tenuibus cauliculis ex alarum sinu prodeuntibus: flore ut anagallidis, cœruleo: radix digitali crassitudine, multis capillamentis fibrata. Radix illita ægilopia sanat. Sunt qui alfinen, muris auriculam uocitent.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Μυρὸς ὠτὶς, ἢ μυρὸς ὠτῆς.

Latine, Muris auricula.

Germanicè, Waldt Mangolt/ mit blawen blumen.


Existimatur ea, quam in Germania uulgò medici betam sylvestrem nominant, floribus cœruleis, diuersam à pyrola. Varia hodie reperiuntur genera, hic depicta, huius herbe.

Glastum.

Caput CLXXVII.

Sylvestre glastum.

Glastum.



tenues multifidos, quadam tenuis rubentes: in quorum cacumine folliculi multi dependunt, quandam linguarum effigiem referentes, in quibus semen. flore tenui, luteo. Eadem quæ & supra dicta præstat. potu & illitu lienosis auxiliatur.

NOMINA

LIBER SECVNDVS.
NOMINA ET EXPLICATIO.

129

A

Græci, Ισάρις.

Latini, Guadum, Glastum, Isatis.

Officinis, Indicum, à colore.

Germanis, Weyd / Endich.

Gallis, Du gues de pastel de languedoc, dicitur.

Viridem herbam trusatilibus molis premunt, ut herbaceam saniem excludant: dein abactoliquore digerunt in magnos globos, quos tabulatis in cinerem computrescere sinunt, hos cortinis insectoriae coquunt Officine, & laneos pannos ac uellera demergunt, ut coeruleum ebibant colorem. Coeruleam illam spumam innatantem, quam igni conferuescens crustans cortina, hanc ad pictorum usus siccant.

Germani Indich. Galli inde, uocant.

Telephium.

Caput CLXXVIII.



Telephium herba portulacæ similis & caule & folijs, habens gemina tubercula, à singulis radicum geniculis enascentia: à quibus rami seni septeniue fruticant, à radice referti coeruleis folijs, crassis, lentis, carnosiss: flore luteo, aut candido. Nascentur in cultis, & maximè inter uites. Tempore uerno folia senis horis illita sunt. albam utiliginem sanant: sed postea hordeacea farina illini debet, perunctam ex aceto etiam in sole utiliginem tollunt, sed ubi inaruerunt, absterguntur.

B

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græci, Τυλέφω.

Latini, Telephium.

Officinis illecebra minor, Vermicularis minor, Sedum minus.

Germanis, Baigentreiblin / Blatlose / Maupfeffer, dicitur.

Brenius Dioscoride Plinius descripsit Telephium portulacæ simile, & caule & folijs, ramis à radice su-

ptem octoniue fruticant, folijs crassis, carnosiss. Galenus tradit, putrilaginis ulceri-

bns opitulari. Unde Telephij nomen dictum puto, quod ulceribus

malis, quibus rex Moyses Telephus consenuit, ab

Achille uulneratus, auxilietur.



Finis Libri Secundi.

PEDANI

**^ PEDANII DIOSCORI-
DIS ANAZARBEI, DE MEDICINALI MA-
TERIA, LIBER TERTIVS. IOANNE RVELLIO SVESSIONENSI IN-
terprete, cum figurarum debita appositione, & annotationibus in singula capita.
Per Gualtherum H. Ryff, Argentinum, Medicum, ex doctissi-
uorum lucubrationibus adiectis.**

P R A E F A T I O.



VPERIORIBVS, charissime Aree, commentarijs, tradidimus de aro-
matibus, unguentis, oleis, arboribus, earum fructibus & lachrymis :
item de animalibus, cerealibus, oleraceis, & herbis acrimonia prædi-
tis. In hoc autem tertio Lib. radices, succos, semina, herbas, & quæ uer-
na cula & inter se cognata censentur, quæq; pluribus scaturit remedijs
prosequemur.

Agaricum.

Caput I.

* Agaricum fer-
reæ radice laser-
pitij simile.



* Agaricum radix fertur laserpitij similis, sed facie
summa solutior, & rariore fungosoq; tota con-
textu. Duo eius genera. scæmina, quæ præfertur, rectis
intus uenarum discursibus constat, mas rotundus est, et
undiq; compactior. Vtriq; gustus in initio dulcis, mox
in amaritudinem transit, gignitur in Sarmatiæ regione,
quæ Agaria dicitur. Sunt qui radicem esse plantæ affir-
ment, alij ut fungos nasci in arborum caudicibus, qua-
dam putredine: gignitur in Galatia Asia, & Cilicia, in
cedris, sed friabile & infirmum. Adstringendi calfacien-
diq; naturam habet. efficax est contra tormina, crudi-
tates, & rupta. prodest itidem contusis, & ab alto deuo-
lutis, datur duobus obolis in uino mulso, febrim non
sentientibus: febriculosis uerò, in aqua mulsa. Arqua-
tis quoq; suspitionis, iecinoris renumq; uitio laboranti-
bus, dysentericis. item si urina ægrè reddatur, si uulua
strangulatus urgeat, si pallor membra decolorer, dra-
chma una dari solet: si tabes infestat, ex passo: si lien
negocium exhibet, ex aceto mulso. si dissolutio stoma-
chi est, ita ut cibi tenax non sit, manditur, & sine ulla hu-
moris sorbitione deuoratur. simili modo acida ructan-
tibus propinatur. sanguinis reiectiones sistit, tribus

obolis ex aqua sumptum. facit ad coxendicum, & articulorum dolores, & comitia-
les morbos, si cum aceto mulso, pari pondere assumatur. menses ciet scæmipis, quas
inflatio uulua uexat, utiliter æ quali modo datur. horrores soluit datum ante febrim
um accessiones. aluum purgat drachma una aut altera, si cū aqua mulsa bibatur. ue-
nenorum antidotum est denarij instar, cum diluta portione sumptum. si serpentes
ictum uibrarunt, morsumq; subfixerunt, tribus obolis ex uino potum, mirè auxilia-
tur. In summa, internis omnibus uitijs conuenit, pro uiribus & ætate datum, nunc
ex aqua, nunc ex uino. hys ex aceto mulso, alijs ex aqua mulsa.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Αγαρίον. Latine, Agaricum. Officinæ genuinum nomen retinuerit.
Germanis, Dannenschwamm. Gallis Agaric dicitur.

Gal. li. i. Antid. est rariore & fungoso, sed facie summa & mucrone solutior: sede uerò & radice semilignosa & semipru-
& o. simp. tri, ob id abijcienda. In eo scæmina rectis intus uenarum discursibus fracta constat, qui densum murinorum
neq; signa

actiua in casco duro representent. Eade leuior, rarior, mollior, albiore, breuior, friabilior, splendidior, proinde prestantior. Mas uero in fracturis filiosus, neruorum modo, grauis, densus, durus, niger, lignosus, leuis, interdum rotundus, sed ubiq; compactior: neuter adulterationem recipit. Vtriq; sapor est initio dulcis, mox amarus, tandem etiam subacer, & substringens: unde incidit, tenuat, terget, digerit, obstruit a liberat. Vis autem phlegmagoga, hoc est, pituitae purgatrix, stomacho aduersa: utrius tamen omnibus internis ab ea natis si liber est in omni etate, ob quae medicamentum similita ueteribus est dictus. Datur drachma pondere, seu a scrupulis duobus ad drachmam unam, pro egi natura, etate, uiribus, consuetudine, & morbi natura & tempore, cum uino, uino diluto, uino mulso, sapa, aceto, aqua, hydromelite, Oxymelite. Quinque in stomacho solutis, ut cibicruax non sit: & acida rursus manditur, & sine humore deuoratur Dioscoridi. Nobis omnibus nauscabundus est, fortasse quia deterior nunc ex Alpibus Germanicis, Gallicis, & Galiae Delphinatui affertur, quam quem maioribus mittebat Agarua Sarmaticae regio (a qua illi nomen) & Galacia, & Cilicia. Ponticus Andromacho iuniori in Theriaca probatur. Mendum igitur uidetur iure quae in fine lib. 9. comp. phar. par. ubi suffocatis ab utero datur uncia una, cum uino, pro drachma una. Corrigitur uino, zingbere, caryophyllis, nucem muscata, uel alijs stomachicis. Seruatur annis quinque, integer, praecipue cum dauco, libylico, polypodio: non solum autem sumitur, sed etiam foris admoetur, ut Galenus docet lib. 6. simp. phar. & in fin. lib. 10. comp. phar. par. in ischiadicis remedijs.

Gal. lib. 6 simp.

Gal. lib. 1. Anti.

Agaricus Galeno & Dioscoridi radix dicitur, cum potius fungus sit, aut uelut fungus quidam, candidus, odoratus, nocte lucens, truncis illicum, & aliarum arborum glandiferarum truncis uinacis.

Rhaponticum.

Caput II.

RHa, aliqui rheum, latini Rhaponticum uocant, prouenit in his quae supra Bosphorum sunt regionibus, ex quibus affertur. Radix nigra, centauro magno similis, sed minor & ruhiore, fungosa, aliquantum lauis, sine odore. Optimum habetur, quod teredines non sentit, figurata cum remissa adstrictione lentescat, manducatumq; colorem reddat pallidum, aut ad crocum inclinantem. Id epotum facit ad inflationes, stomachi imbecillitatem, & omne genus dolores, ad conuulsas, lienosos, hepaticos, tormina, ad renum, uescicae, & pectoris uitia: aduersus interita praecordia, & uuluae mala, coxendi cum dolores, sanguinis excreationes, suspiria, singultus, dysenterias, & coeliacorum affectus, contra febrium circuitus & uenenatorum morbus, datur in singulis ualitudinibus eodem quo agaricum pondere, & cum eisdem liquoribus, si febri careant, in mulso: si aliter, ex aqua multa. si tamen experiantur, ex passo, si lienis exercet, in aceto mulso. si dissolutio est stomachi, id est, cum cibicruax non est, manditur, & sine sorbitione ulla deuoratur, liuentia lichenasq; tollit, cum aceto illitum inflammationes omnes ueteres ex aqua oblitum dissipat. Summa eius uis adstringens, cum aliquanto calore.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Rha, Rhason, Rheon, Rhion, radix nigra, costis nigro firis, centauro magno in uis similis, sed minor & rufior, fungosa & laxa, aliquantum leuis, sine odore, teredinebus non cuncta, quae mansa colorem reddit pallidum, aut ad crocum inclinantem: facile fragilis, amara, ut a Dioscoride praesenti capite describitur: sed praeter haec legi in Dioscoride Serapio: astrungens, si plusculum manditur, subacris.

Ex riguis ad Rha fluium supra Pontum (unde Rhaponticum Graecis & Latinis, & radix ponticae Celso dicitur) & Bosphorum septentrionali tractu affertur: parum purgatorium, experientia posteriorum licet inuentum sit rarissimum, & hodie propere ignotum: obscuratum opinor a Rhabarbaro seu Indico, quod ex India meridionali in totam prope Europam quaestu maximo conuehitur, odoratum, grauitate insigni commendabile, restringens, amarum, chalagogum magis, colore dum manditur plane croceo. Quod siue idem sit genere cum Pontico, uiribus tamen, colore, odore, pondere nonnihil dissimile soli & caeli ratione: siue omnino diuersum, alijs disquirendum relinquo quibus plus est ocij & facultatis: cum praesertim etiam celebres medici hodie, in ea controuersia sibi non consentiunt, & nunc idem, nunc diuersum affirmant. Manardus namq; in epi stolis nunc idem, nunc diuersum censet. Mesue & Serapio suo Rhabarbaro tribuunt omnia, quae Dioscorides & Galenus Rheo. Mihi satis fuerit admonere, in locum Pontici iam prope desui Indicum uiribus proximū, & ubiq; copiosum potius esse sufficiens, tamò tamen parcius, quamò efficacius, in Graecorum compositionibus, quam Centaurij magni radice minimo uirium commercio cum Pontico conuenientem. Praesertim autem sufficiens est, quod in Indico est, astruens magis, minusq; purgatorium, quale multum manetur: aut saltem eius macerati uel asini magna, prout Medicus indicauerit in Arabum autem compositionibus utriusq; distinguitur, illud Rheu ponticum, hoc Rheu sem appellatum, Rheu uel Rheu Ponticum, uel

A

Rha Germanicum.



B

Gentiana.



uel Rhus Pontici radix ferè Galeno dicitur in compos.
medic. part. 7. & 8. & in Antido. ῥέον ποντικόν, & ῥέον
βαρβαρικόν, Actuario: & Rhei pontici radix, idem Po-
tica radix in Esdra antidoto, ῥέον ἰνδικόν Actuar. in
ῥαλδύει, pro Raud Seni Mesue. Seruatur annis 3. 4.
psillio, milio, cera oblitum sola, uel cum terebinthina.

Quod autem uulgus Europæ pro Rhabarbaro in ho-
tis passim ferit, cuius picturam damus, nomine Rha, Ger-
manici Lapathi genus omnino uidetur, licet radice colo-
re Rhabarbaro nonnihil sit affine, uiribus autem imbecilli-
us est. At cum reliqua Rhei utriusq; historia nemini scri-
batur, sed radice solius, conuincere nequeas, congenerem
plantam uel degenerem & diuersam, nisi ex partis unius
natura.

Gentiana. Cap. III.

Inuentio Gentianæ prima assignatur Gen-
tio Illyriorum regi, à quo cognomen
habuit. folijs partim proxime radicè, iuglan-
di plantaginifue similibus, subrubris, partim
à medio caule, & præsertim iuxta cacumen,
paulum dissectis: caule cauo, & læui, digiti
crassitudine, geniculato, & ex intervallis ma-
ioribus foliato, binum sepe cubitorum: semi-
ne in calycibus lato sine pondere, aceroso, sa-
tis ad sphondylii semen accedente: radice lō-
gæ aristolochiæ, crassa, amara. Nascitur in
sublimibus montium iugis, umbrosis locis,
aquosisq;. Vis radice excafactoria, & ad-
stringens. cōtra morsus serpentium, duabus

drachmis, cum pipere, ruta & uino pota, auxiliatur. extra-
cti succi drachma, laterum doloribus, & ex sublimi detur
batis, ruptis & conuulsis, prodest. hepaticis & stomachi-
cis, pota cum aqua subuenit. radix collyrii modo subdita,
partus ei cit. inposita, ut lycium, uulneraria est: & ulcerū
cuniculatim depascentium medela. succus præcipue eodē
effectu prodest. oculis inflammatione laborantibus illini-
tur. pro meconio collyrijs acribus immiscetur. radix uiti
lignem absterget. Succi extrahendi ratio hæc est: Contu-
sa radix quinq; diebus aqua maceratur: postea in eadem
tantisper decoquitur, dum extent radices: & ubi refrigit
aqua, linteo excolatur: mox discoquitur, dum mellis cras-
situdo fiat, fictiliq; reconditur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, ῥέον γένιον.

Latine, Gentiana.

Officinis Latinum nomen integrum seruauit.

Germanis prima littera ablata, Encian.

Gallis de la Gentienne.

Huius genus maximum Sabaudi uocant Verlache: minimum (Germa-
nis, Kreuzwurz, & Bitterwurz, appellatum.) du peret.

Gentiana radice est ob multam amaritudinem efficaci, ad tergendum,
tenuandum, purgandum, obstructa liberandum: propter quam aloè Gal-
lica dicitur: ab Illyricorum rege inuenta, & dicta, ut ipse Dioscorides tes-
tatur.

Aristolochia.

Aristolochia.

Caput IIII.

A

Aristolochia nomen ex eo sibi adoptavit, quod existimetur optimè puerperis opitulari. Tria eius genera traduntur. Rotunda, quæ femina vocatur, folijs hederaceis, præstanti odore, cum acrimonia, mollibus, subrotundis, multis ab una radice germinibus, prælongisq; palmitibus, floribus candidis, pilei similitudine, in quibus quod rubrum est, graviter olet. Longa, mascula appellatur, nonnullis dactylitis, longiore quàm rotunda folio, tenuibus ramulis, dodrantalibus: flore purpureo, graviter olente, qui marcescens in pyri similitudinem turbinatur. radix rotunda, in orbem conglobata, rapi modo: longa uerò radix digitica crassitudinem, & dodrantis longitudinē implet, nonnunquam paulò maiorem. ambæ colore intus buxæo, gustu amaro & graui. Est etiamnum tertia longa, quæ clematidis vocatur, ramulos habens tenues, repletos folijs subrotundis, minori semper uiuo similibus: flores rutæ: radices longiores, tenues, crasso cortice odoratoq; uestitas, priuatim unguentorum spissamentis conuenientes. Rotunda cæteris uenenis resistit. Longa uerò aduersus angues & uenena, drachmæ pondere ex uino bibitur, & illinitur. pota cum pipere & myrrha, menses, partus, & omnia uuluarum onera eiicit, eadem efficit subdita in pecto. Rotunda ad eadem pollet. insuper singultibus, suspirijs, horroribus, lieni, conuulsis, laterum doloribus, pota cum aqua, singulariter auxiliatur, aculeos & spicula extrahit. ossium squamas illitu adimit, ulcera putrida exest, & sordida expurgat. caua cum iri & melle explet, gingiuas & dentes extergit. Cle

matidis ad eadem pollere creditur, uiribus tamen inferior est.

Aristolochia rotunda uera.

Aristolochia Officinarum.



NOMINA ET EXPLICATIO.

Aristolochia, quia sit ἀρίστω λος ὄσος, id est, partu uentibus optima & salubris, Dioscoridi & Galeno triplex, radice figura præcipuè distincta. Quæ primo generi est tuberum modo rotunda, Græcis Ἀριστολόχεια σπογγύλη. Latinis malum terræ ob id dicitur: tamen nō est ea quæ sic Officinis & Germanis dicitur: secunda

B

A baculi crassitudine, digitos quatuor longa: unde (opinor) dactyliis dicitur lib. 2. comp. phar. gener. & M. 7. comp. phar. part. in arteriace Andromachi: 6. Græcis Αἰσολοχία μακρά

Tertia longissima, quasi utium nouellarum, ob quam Clematis, id est, sarmentosa dicitur. Huius fructum putatur quibusdam in 10. regi orientis, vulgo Gallorum coques delectum. Germanis Fisch Föner dictus, stupor faciendis piscibus efficax: quam uim Plinius tribuit rotunde, hæc Græcis Αἰσολοχία κλαματίτις. Officinis longa, Germanis Osterlucel / siue Lang holwur, dicitur.

Quartum genus ostendit Plinius Pistolochiam seu Polyrhizon, omnium tenuissimum, densis radicis capillamentis tunc plenioris crassitudine.

Plin. li. 25. ca. 8.

Gale lib. 10. co.

phar. part.

Omnes ualent tantum radice amara & subacri, sed rotunda omnium est substantia tenuissima: longa uero terget moderatius: clematis quia odore est gratiore, & cortice carnosio, ad anguenta (nardina Plinio) est, quam ad medicationes aptior. Præfertur Pontica, & huic Cretenfis lib. 10. comp. phar. part. Effodienda est mensibus, & desquamato terreno seruanda.

Dulcis radix.

Caput V.



Dulcis radix plurima gignitur in Capadocia & Ponto: fruticosa est, ramis binum cubitorum altitudine assurgentibus: folijs lentisci, densis, pinguibus, tactuq; gummosis: flore hyacinthi, fructu pilularum: platani magnitudinis, asperiore, qui siliquas lentium modo habet rufas & paruas: radicibus longis, ut gentiana, coloris buxi, subacribus & dulcibus, quæ densantur in succum, lycin exemplo. Is in arteriæ scabritia efficax habetur. uerum oportet ut linguæ subditus eliquescat. & fluanti stomacho, thoraci, ac iccicoricon uenit. sanat uesicæ scabiem, & renum dolores, cum passio potius. idem eliquatus sit in sedat. uulneribus illitus accommodatur. commanducatus ori prodest recentis radicis decoctum ad eadem conuenit eiusdem farina pterygijs commodissime inspargitur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Γλυκύριζα.

Latine, Glycyrrhiza, & Dulcis radix.

Officinis corruptè Liquiritia.

Germanis, Leckritz, & Süßholz.

Gallis Reclisse, Raygallisse.

Hispanis Alcamux, dicitur.

Glycyrrhiza Actuaria, sæpe Glycyrrhizon, Γλυκύριζα, & absolutè Γλυκίς. lib. 7. comp. ph. part.

Galeo dicitur. Radice sola & succo ex hac recenti expresso, dulci & leuiter astringente ualet, tipida, temperato proxima, modicè humida, unde quia siem sedat, & si p & quoq; dicitur. Asperitates lenis arteriæ & uesicæ scabræ. Melior nigricans & lenta, quam buxæ & fragilis.

Hæc hodie abundat ager Pabenbergenfis, ubi copiosissime prouenit.

Centaureum magnum.

Cap. VI.


Centaureum magnum folia habet iuglandis, oblonga, uiridi brasicarum colore, serrata in ambitu, caulem, ceu rumicis, binum aut ternum cubitorum, multis ab radice adnatis, in quibus capita, ceu papauerum, in rotunditate oblonga: flos ceruleus: semen cnico simile, ceu lanceis floccis quibudam inuolutum: radix crassa, grauis, solida, tripedalis, succo prægnans, cum adstrictione aliqua & dulcedine

actio.

Lib. 7. co. ph. p.

Lib. 6. Simp.

Centaurium magnum.



acris, & rubescens. Amat solum pingue & apricum, ac sylvas & colles. copiosissima est in Lycia & Peloponneso, in Arcadia, Helide & Messenia, pluribusq; locis circa Pholoen, Lyciam, & Smyrnam. Radix conuenit ruptis, conuulsis, pleuriticis, spirandi difficultati, ueteri tussi: sanguinem expuentibus, drachmis duabus trita datur, si febris sit, in aqua: ceteris in uino. ite ad tormina, & uulæ dolores. ramenta eius in collyrii formâ uulæ subdita, menses atq; partus extrahunt. succus eadem præstat. uulneribus prodest. nam recens tusa, aut arida antè madefacta, ea glutinat & coniungit. carnes coalescunt, si tusa simul decoquatur. In Lycia succum exprimunt, quo pro lycio utuntur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Κενταύριον ὁ μέγας.

Latine, Centaurium maius.

Officinae perperam Rhaponticum.

Germani, errore Officinarum decepti, ut Galli renpontic appellant.

Centaurij magni radix acris, astringens, subdulcis, & subamara: ulcera glutinat, sanguinem reijicientibus prodest: à Chirone centauro, sagitta Hercules uulnerato, inuentum, & nominatum Centaurium. Ammis decem seruat Theophrasto.

Centaurium minus. Cap. VII.

Centauriū, limnesion aliqui uocauerunt, quoniam rigua amelloca. herba origani aut hyperici similis, caule anguloso, palmum excedente. flore lichnidis, è puniceo in purpuram uergente: folijs rutæ, prælongis & paruis: fructu tritico simili: radice pusilla, laxi, & superuacua, quæ gustanti amaritudinem adfert.

Herba recens tusa, suo illitu uulnera conglutinat. uetera ulcera purgat, & cicatrice obducit, bilem crassosq; humores per aluum exigit, si decocta deuoretur. ius decocti ischiadicis conuenientissime infunditur: trahit enim sanguinem & dolorem leuat. succus oculorum medicamentis perquam utilis: siquidem cum mel le caliginem oculorum expurgat in uellere appositus, menses & partus extrahit. epotus peculiariter neruorum uitij succurrit. Succus extrahendi ratio: Legitur herba femine prægnans, & diebus quinque madefacta, decoquitur donec superemineat aqua, mox ubi refrigit, linteolo exprimitur, & eiecta herba, iterum decoquitur, utq; dum mellis crassitudinem habeat. Nonnulli eam recentem grauidamq; contundunt, atq; succum fictili non picato exprimunt, & in sole, lignea rude assidue mouentes, inspissant: quod si quid concretum faucibus uasis adhærescat, deradunt, reliquoq; humori permiscunt. noctu diligenter operiunt, namq; ros nocturnus liquores coalescere non finit. Quæ autem siccis radicibus aut herbis liquamenta exprimuntur, decocta, ut in gentianæ mentione retulimus, præparantur. sed quæ ex corticibus humidis, aut contusis herbis factitantur, in sole, uti antè dictum est, coguntur. sic è thapsia, sic è mandragora, reliquisq; similibus succus: sic ex acerbis uuis melligo elicitur. lycium tamen, & absinthium, hypocistis & confumilia, decocta, eo quo diximus modo, coguntur.



NOMINA ET EXPLICATIO.

A Græcè, Κένταυρον ὁ μικρόν, κένταυρος.

Latine, Centaurium minus, fel terra : fibrifuga Theodoro Gaze.

Officinæ Latini nomen seruant. Germanis, Tausent guldin Kraut, Wurth, Erdgallen.

Brabantis, Centozie. Gallis fel de terre nuncupatur.

Radice mitem, ramos, magisq; folia & flores ualere scribunt Dioscorides & Galenus. Si centaurium paruum Gale. amarissimum ac subastringens est, magnum autē acre, astringens, subdulce, quasdam utriusq; centaurij qualitates & uires desuē confudisse, nihil miri est, cum etiam maius subamarum, & minus subdulce sit, dum recens est, cum etiam Galeno quibusdam conueniat. Succus enim minoris suppositus, menses fecundumq; educit : maioris autem radix, menses prouocat, mortuos fetus extrahit, uiuos corrumpit : dicitur Gale. no. Eadem pota, torminibus medetur, & sputum cruentum sanat cum uino, si febris abest : cum aqua, si adest, Dioscoridi. Minoris etiam astringens qualitas ex hoc patet, quod uulnera glutinat, præsertim si recens tusa adhibetur : minor quoq; uirens uulnera etiam magna glutinat Diosc. & Gal. Maioris herba, adhuc recens, ulcera antiqua, ad cicatricem difficillimè cuncta, purgat, & ad cicatricem adducit Diosc. & Gale. quod Mesue minoris pulueri recte etiam tribuit amaro, ob id tergenti & sicanti, & quatenus astringit, glutinat, & cicatricem inducit. Cum etiam Galenus scribat, minorem siccantibus & glutinantibus misceri, quæ sinus, & fistulas, & maligna ulcera sanent, & durities molliant : quamuis potioris non meminerit, nisi quod succum à quibusdam bibendum dari scribit in neruorum passionibus, seu siccantem, & absq; molestia uacuam rem : eundem cum melle illitum oculis purgare ea, quæ luminis claritati obstant. Diosc. Gale. ad spirandi difficultatem, & tussim antiquam, & lateris dolores, maius salubre faciunt ambo. Maius ad drachmas duas datur Diosc. & Gal. cum ad drachmam unam & dimidiam coctum ad dimidias in aqua cotila Paulo. Mesue uero datur à tertia parte unc. unius usq; ad sesunciam. Decoctio autem ab uncia una ad uncias tres.

Chamaeleon albus.

Caput VIII.

Chamaeleon albus,
Alcyon Eberwurz.

Chamaeleon uerum.



autem in uino austero, cum origani feruefacti succo. hydropicis commodissime dra-
chma in uino datur, etenim eos extenuat. contra difficultatem urinæ decoctum pro-
pinatur. hausta in uino, serpentium uenenis resistit. occidit canes & fues. mures ite-
necat, subacta cum polenta aut aqua, & oleo madefacta,

NOMINA

Chamaeleon hic abstrahitur a serpite, in crinacei modum aculeos erigens, caule prorsus deficiente, sed è medio foliorum complexu statim à radice caput exerit, breui pediculo fultum, & spinis densioribus echinatum, in quo flores emicant capillati, purpurascetes, qui se in lanugines, uocatos pappos, dissoluunt, & tandem in aurum abeuntes uolitant: foetu cnico non dissimili, radice candida, dulci. In neglectis agrorum limitibus, & montium glabretis passim inuenitur, uulgòq; in solo censu spinarum reputatur, & *Wegdistel*, *Widerdistel*, *Bleyen Eberwurz*, appellatur.

Chamaeleon niger:

Caput IX.



Chamaeleon niger, foliis scolymo similis esset, nisi minora, tenuioraq; ac rubro distincta uiderentur. caulem emittit dodrantalem, crassitudine digitali, subrubrum: & in umbella flores spinosos, tenues, hyacinthi emulos, uersicolores: radice crassa, nigra, densa, interdum exela, quæ dissecta flauescit, commanducata mordet. Prouenit in campestribus, siccis, & cliuosis tractibus, & maritimis. Radix trita, addito attramenti futuri exiguo, cedrino oleo, & axungia, scabiem abigit: eadem, cum sibi sulphur & bitumen asciuit, & cocta in aceto illinitur, impetigines absterget. decoctum collutione dentium dolorem mitigat. cum pari pipere & cera oblita radix, dolenti denti auxiliatur. radice concisa, & in aceto decocta, dentes fouentur. eos quoq; frangit, si scriptorio stylo feruens admoveatur. uitia cutis in facie, uertiliginesq; cum sulphure emendat. erodentibus medicamentis admiscetur. phagedænas, tetrag; ulceri illitu sanat. Quare chamaeleo uocetur, à uarietate foliorum euenit. mutant enim cum terra colorem: hic uiridia, illic albicantia, aliubi cœrulea, nonnunquam rubra inueniuntur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Chamaeleon niger Latinis. Græcis, Χαμαίλεος ὀρίδαρ.

Officinis, *Cardopatum* & *carduus suarius*.

Germanis, *Eberwurz*.

Recentiores radices carui suarii, siue cardopatii, drachma pondere in uino sumpta, contra pestilentie contagia prodesse tradunt. Eandem etiam in aceto decoctam, contra scabiem, impetignem, & omnes cutis sceditates, curatu difficiles, conferre scribunt, si eius decoctio lauentur. Idem dentium etiam dolori succurrit.

DIOSCORIDIS

A



Crocodylion. Cap. X.

Crocodylion chamæleontis nigri figurā habet. Nascitur in syluosis, radice longa, laui, aliquantum laeta, odore, ut nasturtij, acuto. Feruescit in aqua & pota radix, sanguinem copiosum per nāreis pellit, datur lienosis, eos euidenter adiuuans. Semen ei rotū dum inest, duplex uti scutum, quod suapte ui urinam ciet.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Grecē, Κροκόδιλον.

Latine Crocodilion, uel Crocodilium, Officinis. Germanis, Weiß oder schwarz Gärten distel.

Ruellius omnino arbitratur eam esse, quam hodie Carlinam uocant: cuius picturam exhibemus. Chamæleontis enim nigri figuram habet, cui adeo similis est, ut huius temporis uiri multi eruditi hanc iterum chamæleontem nigrum esse credant.

Dipsacum, siue labrum Veneris. Caput XI.



Dipsacum aculeatarum generis est. caulem habet altum, spinis horridum, folijs lactuce, spinosis, binis genicula singula complectentibus, prælongis, ceu quasdam bullas intus & extra aculeatas, in dorsi medio habentibus, concauo alarum sinu, in quo imber aut ros asseruetur: unde dipsaci, quasi siccantis, nomen traxit. in cacumine caulis, singula furculis capitula insunt, oblonga, echinata spinis, quæ arefacta, candida spectantur, dissecta; medulla tenus, uermiculos ostendunt. Sanat rimas sedis, fistulasque, si tusa & decocta in uino radix, usque dum sit crassitudo ceræ, immittatur. Medicamentum æreæ pyxidē recondendum. Aiunt fornicationibus, uerucisque pensilibus remedio esse. Vermiculi capitulum in folliculo alligati, collo aut brachio appensi, produntur quartanis febribus remedio esse.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Grecē, Διψάκω. Latine, Dipsacum, Labrum Veneris.

Officinis, Virga pastoris, fistula pastoris.

Germanis, Gärtenkraut, Rartendistel, Weberkarten.

Gallis char don à cardir, nuncupatur.

Dipsacos ea spina est, qua rudes pannos, uelut echino quodam, expoliunt, detractisque floccis fimbriisque, quas uocant crocydas, cominuant, qua etiam detritæ uestes mangonio fullonum interpolantur, & in uillum muricatis orbibus restituntur. hinc fullonum carduus coepit appellari. Germanicè Weberkarten dicitur, quod la miseria uncatis uerticibus aculeorum pestantur. Dipsaci singuli echini è rotundo in oblongum quadantenus turbinantur, inter quorum spicula puniceus flos emicat. is dissectis, in medulla uermiculos idē eidem nobis licuit inuenire: qui non offenderunt, parnam admodū

uidentur

videntur impendisse diligentiam. Hoc uermiculo aliquoties sanauimus uulgari experimento p. maritimum, quod A
apostema Germani. Den uurm om finger/ appellat, maliguum quidem, ac omnem curam, nisi mutetur,
omnino respuens. Scribit hodie multis in locis magno colentium prouentu, ut potè cum echini fillorum manu
gono & complendis panis oppidò quàm utiles: in syluestri disfacio mutiles ac plantè inuacui, & in ulla di
cam, nullius usus.

Spina alba.

Caput XII.

Carduus Mariæ.
Vnser swawen Distel.

Spina alba syluestris.
Gross weiß Distel.



B

Spina alba nascitur in montibus & syluosis. fo-
lia fert albi chamaeleonis, angustiora, & candi-
diora, aliquantum hispida, & aculeata. caulem su-
pra bina cubita altum, pollicari aut ampliore cra-
ssitudine, albicantem, intus cauum. in cacumine capitulum inest spinosum, echini ma-
rii æmulum sed minus, & oblongum, flores purpurei, in quibus semen ceu cnicū,
sed rotundius. Huius radix pora, celiacis, stomachicis, & ijs qui cruenta extrusionē,
efficax est. arinam cit. tumoribus illinitur decocto eius dentes in dolore collui pro-
dest. eorum semen conuulsis infantibus, & à serpente demorsis auxiliatur. gestatū
pro amuleto, serpentes abigere traditur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græci, ἀκνὴν λευκὴν. Latine, Spina alba. Germanicè, Vchdistel/ Mariendistel/ Swawen
distel. Gallis est une blanche. Italis spinus albus dicitur.

Duo habentur huius spinæ genera, albe cognomento propter maculas albas folijs aspersas. primum uoca-
tur Carduus Mariæ, Vnser swawen Distel/ alterum Spina alba syluestris, Gross weiß Distel. Bedegor ho-
die uocat spinam illam. Quandoquidem hæc Bedegaris spinis infecta hæret, folijs Chamaeleonis albi, castiga-
tioribus candidioribusq; caule triplicato, pollicari crassitudine. & inani, ouali super uerticem echini, flore
purpureo, cnicū feru, sed rotundiore. Et Spina albe semen potum recentioribus contra incipientem pieu-
resim, & lacerum dolores, remedio est.

Spina Arabica.

Caput XIII.

Arabiam spinam natura alba spinæ similem esse constat: ipsa siquidem strin-
git ad sanguinis reiectiones, mensium abundantiam, cæterasq; fluxiones radix
etiamnum ualeat. Prouenit in asperis.

R 4

A

NOMINA ET EXPLICATIO.

Spina Arabica uel Aegyptia, Syria, similis esse creditur albæ spinæ, quæ in fruticem assurgit. Duo habet genera: candidum & nigrum, hodie nobis incognita. Arbor tota, præterquam caudice, spinis horret. Semen in siliquis est. Flos medicamentis utilis, & coronis iucundus. Gummi profundit, non cortice, sed in uasculo. Hæc ferè eadem de arbore acaciam fundente, Plinius de Arabica & Spina acacia seorsim, ut differentium, trahit. Galenus & Paulus eandem & Arabicam & Aegyptiam, appellant.

Carduus.

Caput XIII.



B

nonnulli, sic candorem asciscere, & amaritudinem exuere promittunt, ut in hybernos cibos gratius admittantur.

Carduus, Græci scolymon uocant, folia chamæleonis habet, aut albæ spinæ, nigriora, & crassiora. caulem longum addit foliosum, capite spinoso: radice nigra & crassa, quæ illita, graueolentiam alarum totiusq; corporis emendat: item si decocta in uino bibatur. copiosam autem urinam foetidamq; expellit. herba cum recens tene rescit, in olera, asparagi modo, transit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Σκόλυμος.

Latine, Carduus & Strobilus.

Columella Cinaræ dicitur.

Officinis Acorus Articoalus, siue Articoa uocatur. Germanis, Strobildorn.

Gallis Artichault, dicitur.

Romani hodie carchiopus nuncupant, quod ut herba ita & nomen ab Italis petiitum est. Adhibentur conuiuijs cinaræ asparagi modo, iuribus incoctæ, et ex oleo, sale & aceto. Folia quoq; ineunte hyeme obruunt humo

Poterium.

Caput XV.

Poterium, Iones neurada uocant, largè fruticat, cortice obductum tenui. spinis horridum, lanugine spissa, ramulis longis, mollibus, lentis, tenuibus, tragacanthæ proximis: folijs paruis, rotundis: flore exiguo, candidi coloris: femine nullius usus, sed gustu acuto & odorato. Nascitur in aquosis, & collibus: radices demittit binam ternumue cubitorum, neruosas & firmas, quæ proxime terram recisæ, dant succum gummi similem, tussæ, præcis nervis & uulneribus glutinandis illiuntur. decoctum quoq; eius neruorum affectibus prodest.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Ianus Cornarius, doctissimus atq; excellentissimus Medicus, Galenicæ lectionis summus restaurator, de Poterio ita scribit:

Huius fructus cuiusq; fructus meminerunt & quidem diligenter Dioscorides, Galenus, Paulus, ac Plinius, estq; is (nisi penitus fallor) quem hodie Germani Schlehendorn/fructum uerò Schleben/appellant. Sed Galenus quidem & Paulus de fructu penitus silens. Dioscorides autem fructum ferre acrem & inutilem dicit, eumq; nullo nomine insigniri. Plinius uerò semen pro fructu conuertit, iidemq; nullius usus esse, sed tamen gustu acuto & odorato præditum esse, testatus est: palam ostendens, se non scire quæ res sit Poterion, quam describit, ut etiam pleriq; omnibus, maxime Dioscoridis interpretibus, ansam dederit putandi, herbam ab ipso, non spinam & semen describi. Ex Græco autem autore aliquo, & fortassis ipso Dioscoride, uel etiam inde, unde etiam Dioscorides sua transcripsit, hæc nobis conuertit, in quibus reddendis quam felix fuerit, ut eumq; patere posset, utriusq; Dioscoridis uidelicet & Plinii uerba, apud utrumq; autorem legat. Quod igitur ipse quid esse Poterion ignorauit, non difficile est iudicare, Græca Dioscoridis uerba, cum ipsius uerbis conferenti. Verum tantum abest, ut nos dubitemus Poterium eum esse fruticem, quem Schlehendorn Ger-

man



Carduus benedictus.
Earden benedict.



manu uocamus, ut si stomachicum pharmacum præparatur ut
essent aliorum potiorum inopia, eius fructu uti non dubitem.
Neq; auctor aut ex eo, quod Galenus & Paulus de Poterio as-
serunt, aut ex eo, quod Dioscorides inutilem dixit, cum ad stoma-
tici medicamenti confectionem, commodissimus sit, & ne esse
quidem alius possit, quam is quem indicauit. Poteri fructus alio
nomine Brabyla dicitur Galeno lib. 6. comp. phar. part. 2. libra
2. de aliment.

Iacobus Syluius arbitratur eum fruticem, qui hodie Offici-
nis barbaro nomine Ribes appellatur, Poterium esse Dioscori-
dis: de quo alij indicent. Cordus ait esse herbam, quæ mittit
nostrum Tragantum.

Acanthium. Caput XVI.

Acanthium alba spinæ simile, folijs a-
culeatis per extremitates, & lanugine
araneosa obductis, ex qua collecta & neta,
uestes bombycinis similes texunt. Folia uel
radices ad remedia opisthotoni bibuntur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Inuenitur in agris, prope limites & uias spina eandem
canticibus folijs, alba spinæ non dissimilibus, quæ per am-
bientem oram tantum aculeos erigunt, & spissa pube-
scunt lanugine, quæ facillè quidem in flocculos depecti
posset, sed usq; eo fragiles, ut inde nec telas ordiri, nec fila
ducere quis ualeat. Acanthium sit, nec ne, asserere non
ausim.

Valerius Cordus cum quibusdam alijs, non absurde, as-
serit Acanthium esse nostrum Carduum benedictum, Ger-
manis, Earden benedict, quem tamen Ruellius putat esse
se Atractylin, de quo infra cap. 89.



Acanthus.

Caput XVII.

Acanthus, Romani pæderotam uocant, nascitur in hortis, petrosis, & riguis.
folia habet multò laetucaceis latiora, & longiora, erucæ diuisura, nigricantia.
pinguia, læuia: caulem binum cubitorum, digitali crassitudine, læuem, prope uer-
ticem

A

Acanthus.



B



Acanthus sylvestris.
Acanthus Germanica.
Carduus pratensis.
Brassica pratensis.
Wisen f3l.

ticem ex intervallis circumdatum foliolis, seu nucamenta quædam oblonga referentibus, spinosis, è quibus flos prodit albus: semen oblongum, luteum: caput thyrsi specie: radicibus nititur longis, mucosis, rubris, & glutinosis: quæ uitis igni & luxuriantibus illis subueniunt, potæ urinam ciunt, sed aluum cohibent, ruptis, conuulsis, tabem sentientibus, mirè profunt. Nascitur & sylvestris acanthus, scolymosimilis, aculeatus, breuior quàm sativus, & is qui in hortis prouenit. cuius radix ad eadem ad quæ superior efficax.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, ἀκανθὸς ὁ, ἢ ἀκανθὸς δὲ. Latine, Acanthus, siue Acantha.

Officina à similitudine, quam eius folia cum anterioribus urforum pedibus habent, Brancam uersuam uocant. Ad quæ etiam similitudinem Germani respicientes, Berentlaw / Berentapen / Welsch berentlaw, nominant. Brabant, Berenpoot. Galli branze ursine.

Dioscoridis designatio (nec fallor) omnino eam noscitur explicare, cuius nomenclaturam et picturam dedimus: siquidem quinque senisue folijs extenditur, lactuca longioribus, multò latioribus, ut quæ nonnunquam cubiti longitudinem æquent, pinguibus, carnosiss, eruce ritu laciniosis, nigro colore nitentibus, caule tripedaneo, digitali crassitudine, leui, cuius uertex foliorum in aculeos molles exeuntium cingitur uallo, et uelut imbecilem paniculam nucamentum fastigatur. Summatim scapus erumpit thyrsi figura, flores candidi, semen oblongum, luteum, radicibus oblongis, pinguibus, lentis.

Acanthus uel Acantha, folijs modicè digerit, radice siccatur, incidit: est tenuium partium, emolliendæ alio iniectionibus hodie destinata.

Anonis.

Caput XVIII.

A Nonis, quam aliqui ononida appellant, ramos habet fruticosos, dodrantem maiores, frequentibus geniculis cinctos, cauis alarum multis, capitibus rotundis, folijs lenticulæ pusillis, ad rutæ aut pratensis loci folia accedentibus, subhirsutis, odoratis.



odoratis, non iniucundè olentibus. Muria conditur antè A
quàm spinosa fiat. cibus gratissima. rami acutioribus spi-
nis, & ueluti spiculis firmioribus horrent. radicem mittit
candidam, quæ ex calcfacit, & extenuat. huius cortex ex ui-
no potus urinam ciet, calculos comminuit, margines ulce-
rum erodit. radix cum decoquitur in posca, dolorem den-
tium collutione mitigat. decoctum eius potu hæmorrhoi-
das sanare creditur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, *ονωνίς*, uel *ονωνίς*.

Latine, *Ononis*, aliter *anonis*, ut Theophrasto ac Galeno.

Officinis acutella, restia bouis, remora aratri, *Onosma*, *Vrinalis*, *Vrinalis*
ria. Germanis, *Sawbachel*, *Stallkraut*, *Ochsenbiedel*, *Ragensep*,
Wersteyntiaut. Brabant, *piangworteel*, *Reckeleuyt*.

Gallis *Bugraues*, *Bugrandes*, dicitur.

Nihil in aruis hac peste frequentius occurrit, sed cultis maxime gaudet.
Hac uiret post menses restibilis ager, quæ non modò ingredientium pedes of-
fendit, sed aratrum remoratur, illi se tam pertinaciter inuoluit, ut uix possit
expleari. Latior tamen in proficisso, iteratq; solo confurgit, plurimum a te-
no frugum labore proficiens.

A salgemarijs olim sale condecabatur, ut Dioscorides testatur, cibus gratif-
sima: qui modus hodie prorsus obsoleuit.

Leucacantha. Cap. XIX.

Leuacantha prædita est radice cyperi, ualida & amara, quæ manducata dolo-
rem dentium sedat. ueteri lateri dolori atq; ischiadicis prodest, decocto cy-
athus tribus ex uino potu. eadem ruptis & conuulsis medetur radicis epotus succus
eisdem præbet effectus. B

NOMINA ET EXPLICATIO.

Λευκάανθη Græcis, Latine *Alba spina*. Differt ab ea quæ diuisim *λευκάνθη* *Λευκά*, id est, *spina alba*
nominatur, hodie incognita.

Tragacantha. Caput XX.



Tragacanthæ radix lata & lignosa, summo cespite nititur,
unde surculos humiles, robustos, latissimè fundit, in qui-
bus minuta folia, multa, nonnunquam tenuia exoriuntur, quæ
sub se spinas albas, rectas & firmas occultunt. Est etiamnum tra-
gacantha lachryma, quæ uulnerata radice manans concreuit.
Præstat pellucens, gracilis, læuis, sincera & subdulcis. Cutis pi-
racula, ut gummi, obstruit huius increbuit usus ad oculorum me-
dicamenta, ad tussim, exasperatas fauces, retusas uoces, cæce-
rasq; destillationes, cum melle in delinctu. subdita quoq; linguæ liquefit. in passo
madefacta drachmæ pondere bibitur contra renum dolorem, & uesicæ rosiones,
mixto cornu cerui uiso & eloto, aut scissi aluminis momento.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Herbam utpotè peregrinam Germanis, & prorsus exoticam nostrates herbarij non norunt: lachrymam
tamen nulle non cognoscunt Officinæ, interpellato nomine, dragantum gummi nunc appellant: cuius innu-
merus propemodum inoleuit medicis usus. hæc lachryma tragacanthos, tragacantha, uel tragaganton, radici-
bus incisis Dioscoridi, sponte Theophrasto profluens: uim habet similem gummi emplastici. in quandam sic-
cantem, acrimoniam leuiorem, arteriæ asperitatem lenit cum uino macerata & leuigata, ut cancam radicem
uel in aqua die uno. Tragacanthæ fructus, lib. 10, composi. pharma. part.

Tragacantha alba Aciniario saepe.

Eryngium.

A

Eryngium.

Caput XXI.



Eryngion aculea-
tarū generis est.
Cuius folia in princi-
pio, sale condita, in ci-
bos recipiuntur. lata
autem sunt, & extre-
mo ambitu aspera,
gustu aromatica. E-
ryngio, cum adoleue-
rit, complures ramu-
lorum striæ rubent,
in quorum summita-
tibus globosa capitu-
la, durarum acutissi-
marumq; spinarum
ambitu stellatim cir-
cunvallantur, quorū
colos aliās uiridis,
aliās albus, interdū
cæruleus inuenitur.
radix oblonga, lata,
foris nigra, internè

candida, pollicis crassitudine, odorata. Nascitur in asperis & campestribus. Vim ha-
bet calfactoriam. pota menses & urinas pellit. tormina inflationesq; discutit. cōtra
iecinorum uitia, serpentium morsus, & hausta uenena, cum uino prodest. Bibitur
aduersus plurima, cum seminis pastinacæ drachma una. appensa illitæue, tubercula
discutei e proditur. pota cum hydromelite radix, opisthotonicis & comitialibus
medetur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græci, ἑρύνγιον. Latine, Eryngium. Officinis, Centum capita: quibusdam falsò Secacul.
Germanis, Brachendistel/Wallendistel/Mannstrew/Elendor/Radendistel.
Brabantis, Eynsdisteln. Gallis panicault, dicitur.

Dioscorides una Eryngij specie contentus est. Plinius albi & atrii discrimina fecit, eryngem statuens du-
ram, fruticosam, spinosis folijs, caule geniculato, cubitali & maiore aliquando: aliam albicantem, aliam nigri-
cantem, radice odorata. Satiua, ut inquit, quædam est, sed & sponte nascitur in asperis & saxosis: in litori-
bus maris durior, nigriorq; folio apij. Ex ijs candidum Latinis dicit centum capita uocari.

Eryngij radix longissima, intus alba, foris nigra, odorata: calida ad primum ordinem, sicca ad secundū:
tenuum partium, ciet menses & urinas, morsus uenena-
tis resistit, flatus dissipat. Saporem nucis habet, unde caryon
dicta: quibusdam locis odorata, quibusdam non. Cord.



Aloë. Cap. XXII.

Aloës folium scillæ similitudinem habet,
crassum, pingue, modicè latum, rotun-
dum, retrorsus pandum. folia utrinq; gerit ex
obliquo spinosa, rariusculè striata, breuia &
curta. caulis emittitur non dissimilis antheri-
co. flos albus, fructus hastulæ regię cognatus.
grauis tota est odore, & gustu amarissima. radi-
ce una, ceu palo, in terram depacta. Plurima
præpinguisq; in India gignitur, ex qua co-
ctus succus adfertur. Nascitur etiam in Asia &
Arabia, in locis quibusdam maritimis: & in
insulis, ut in Andro, non ualde succo extrahē-
do

do idonea, sed ad glutinanda uulnera sanè quàm utilis, si detrita illinatur. Duo succi **A** genera: quoddam arenosum, quod sedimentum purissimè esse uidetur. alterum ad iecinoris imaginem uergit. Eligi debet boni odoris, syncera, quæ nihil doli sensuit, nitida, calculorum experta, rufi coloris, friabilis, ac iecinoris modo coacta, facillè liquefscens, eximie amaritudinis, improbatum nigra & fractu contumax. Gummi eadem adulterant, quod deprehenditur gustu, amaritudine, & ualido odore: eoq; argumento, quod digitis friata non ad minima usq; frustra resoluitur. Nec defunt qui acaciæ immisceant. Natura eius est spissare, exicare, somnum allicere, & corpora densare, aluum resolvere, stomachum repurgat binum cochlearium mensura, in aqua frigida aut egelida pota, sanguinis reiectiones sistit, regium morbum purgat, tribus obolis ex aqua, aut drachmæ pondere in potu deuorata cum resina, aut cum aqua, uel melle cocto sumpta, aluum soluit. purgationis perfectæ causâ, tribus drachmis sumitur, alijs purgatorijs medicaminibus admista, præstat ut minus stomachum infestent, sicca glutinandis uulneribus inspargitur, ulcera ad cicatricem perducit, cohibetq; eadem peculiariter exulceratis genitalibus mederur. disrupta puero rû præputia iungit, condylomata, rimasq; sedis ex passo sanat, hæmorrhoidum abundantiam & sanguinis eruptiones sistit, pterygia ad cicatricem ducit, liuores & insignita, ex melle tollit, priuatim scabras lippitudines, pruriginisq; angulorum permulcet, dolorem capitis fedat, temporibus & fronti illita ex aceto & rosaceo. Capillû fluentem continet, cum uino, tonsillis, gingiuis, & omnibus oris ulceribus, cû melle & uino proficit, oculorum medicamentis torretur, in munda & candenti testa, pennaq; subinde uersatur, ut possit æqualiter torreri. Lauatur, ut quod sit arenosissimum, tanquam inutile subfidat, & leue ac pinguisimum assumatur.

* Ligula quæ ferrea sit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, ἄλός. Latine, Aloë.

Officinis genuinum nomen seruauit, Aloë epaticum, succotrinum, caballinum, Semperuium maritimum.

Germanis, Aloë, Ditter Aloes.

Callis Aloës, & perroquet.

Aloë herba semper uirens, nunc in multis Gallie occidentis domibus, ad ostentationem appendi solita, & eius herbe succus calidus in fine ordinis primi, aut initio secundi, siccat ordine tertio. Valenter amara est, astringit modicè, idq; sine morbo, ecoprotica est, id est, stercus deducens, & customachos, præcipuè elota: repellit, digerit, terget parum, quantum scilicet ulceribus puris non sit molestum, serius glutinat, ulcera dyspneuticæ, præsertim sedis, pudendi, oris, glutinat: & phlegmonas harum partium sanat, aqua subacta, sumpta sæpe hæmorrhoides uenas aperit, uel à tota substantia, uel quia calida: crasse essentie, & pro modo terstonis mordax, quamuis anastomatica sint acris, terrea, admotæ autem sanguinis fluorem cohibet, quia effringit, & emplastica est, ob id emphrastica, id est, obstruens dicitur, cap. 1. lib. 5. simp. Optima est pinguis & Indica. Velut etiam ex Cælosyria, & Arabia. Ex magna Syria humidior, Arabicam tamen tanquam omnium utilissimam, & solis Mulomedicis usurpandam damnauit Mesues: Et inde caballinam uocant, nigram, obsec Mulomedici, ram, se ci simillimam, amarissimam, odore retro, arenosam, ut optime sedimentum, tertiam Armeniacam, uideatur. Primam succotrinam, secundam hepaticam seu Persicam, quartam bonitate Arabicam statuunt, Mesues & alij. Aloë lota minus aluum ducit: multum enim uirtutis medicamentose lauando deponit, magis tamen uentrem roborat. Aloë etiam lota his maxime aduersa est, qui citra paucos humores intemperie calida sicca laborant.

Absinthium.

Cap. XXIII.

Absinthium, aliqui bathypicron, herba uulgò cognita. Præstantius in Ponto & Cappadocia, in monte Tauro nascitur. Vim habet calfaciendi & astringendi, bilem expurgat, quæ & stomacho & uentri inhæsit, urinam cit. crapulam præsumptum arceat, ad inflationes ventris, & stomachi dolores prodest, cum seseli & nardo gallico potum, fastidia discutit, arquatos sanat madefacti dilutum, aut decoctius, quotidie tribus cyathis haustum, menses cit potum, aut cum melle appositum. Contra fungorum strangulationes conuenienter ex aceto bibitur, aduersatur ixiq; uenenis cum uino, item cicuta, & muris aranei moribus, & draconi marino. angina eo cum melle & nitro perunguntur, & epinyctides ex aqua, ad sugillata & oculorum caligines ex melle illinunt: item auribus, si manat sanies, dentium auriumq;

A

Absinthium.



dolores decoctum uaporis suffitu compescit. decoctum in passo dolentibus oculis oblinitur: item præcordijs & iecinori, tritum cum cerato cyprino: stomacho quoque longa ualitudine laboranti, cum rosa ceo: cum ficis autem, aceto & loliacea farina, aqua inter cutem lenosissimè subuenit. Vinum ex eo fit, quod absinthiten uocant, præsertim in Præpontiæ & Thracia, quo ad antè dicta utuntur, cum febri carent: alioquin in ætate propinant, & acceptam huic uino incolumitatem referunt. In parsum arcis absinthium, uestes ab erodentium iniuria uindictæ, culices ex oleo perunctum abigit, & à corpore arceat. atramentum librarium diluto eius temperatum, literas à muriæ erosione tuetur. Existimatur liquamentum eisdem præstare effectus. Attamen potioribus improbat, quoniam stomachum malè habet, & capitis ciet dolorem. Sunt qui cocta amurca, liquamentum adulterant.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, ἄνισιον. Latine, Absinthium.

Officinæ Latinum nomen seruant.

Germanis, Wermut; Belgis, Brabant, Alsen.

Gallis aluyme, absince, dicitur.

- Li. 2. Method.** Absinthium triplex, forma, sapore, facultate planè diuersum, ut interim natales omittam. Primum generis nomine dicitur, quale præstantissimum est Ponticum. Id folio & flore est multo minore, quàm cætera absinthia, & odore non insuauis, sed aromaticum quid præferente, qui reliquis omnibus planè seorsus: quapropter
- Lib. 8. co. ph. p.** hæc fugienda. Utendum autem semper Pontico, ad uentriculi, & hepatis phlegmonas, ad tergendum, purgandum, subducendum prauos humores stomacho hærentes, roborandum dictas partes contrahendo & astringendo. Cum enim omni absinthio duplex sit facultas & qualitas, in Pontico astringens quidem plurima est, amara uerò exigua: ob id calidum est excessu primo, siccum tertio. In cæteris absinthijs, ut abrotano, amara est uehementissima, astringitio autem obscura, aut prorsus nulla gustu sentitur, ob id hæc stomacho sunt inimicissima. Ponticum præterea terget fordes tunicarum uentriculi, non tamen si quid aliud in eo imbibitum est foras extrahit, aut expellit: aut saltem parum id præstare ualet, ob iunctam insignem astringendi facultatē. Hæc autem picea propter id excogitata salubriter, illud ipsum potest. Ponticum autem uidetur esse, quod Romanum Mesues uocat, quodque passim hodie uisitur, & cuius picturam exhibemus. Diuersus enim Mesues Galeno tantum est, quod siccum tertio gradu hic, ille secundo scribit. Quæ controuersia in alijs simplicibus multis est inter medicos etiam doctissimos: quorum unus in fine, uerbi gratia, primi uel secundi, alter in principio secundi uel tertij intelligit: quæ ambiguitas etiam Galeno ipsi est in anetho, prasio, ruta agresti, & alijs permultis. Nam quod succum eius dicit Mesues obnitrosam qualitatem nocere stomacho, ipsi Galeno id non aduersatur scribenti, succum longe ipsa herba esse calidiorem. Nostrum autem uulgare absinthium sarmen-tosum, folio & flore multo maiore, quàm cætera tria absinthia: ueteribus inter absinthia comprehensum non uidetur, nisi esse uelut absinthium primum Dioscoridis, quod uulgo aloina dicit, & βαδύμινον, uel potius βαδύμινον uocari à multa amaritudine, qualis in aloë, cui subscribitur Dioscoridi, à qua uulgus Gallorum aloinum appellat. Id autem si primum in Dioscoride recipias, quæ nam alia in eo statues? Tamen id ad lumbricos, uti & san tonicum, est efficacissimum, sumptum & adnotum.

Marinum absinthium.

Caput XXIII.

Absinthium marinum, quod aliqui seriphum uocant, copiosissimum in Tauro monte, iuxta Cappadociam, & in Taphorisi Aegypti gignitur, quo Isiaci pro oliuæ ramo utuntur. Herba est tenuis, abrotoni parui similitudine, referta minutulis feminibus, subamara, stomacho inimica. Ea grauius olet, & cum quadam calfactione adstringit, per sese aut cum oryza cocta, interaneorum animalia, teretesque tineas, adiecto melle, enecat. aluum leuigat. cum edulio* autem uel lentacula decocta, eadem præstare potest. pecora maximè pinguescunt hoc pabulo. Tertium genus

*Definito.

genus absinthio assignatur, quo Gallia alpihus finitima A
scatet: id patrio nomine Santonicum uocant, regionis in
qua nascitur cognomento, absinthio non dissimile, uerum
subamarum est, non adeo seminis fecundum. Eadem quæ
seriphium potest.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Marinum Absinthium aliqui, Dioscoride teste, Seriphium uocant: herba
est fruticosa, præcunctibus cirris, paruo similis abrotono, exiguo semine, præ-
gnansq; subamara, stomacho inimica, graui odore, linguam astringens, &
leniter excalescens. Huius semine medici tinea, uermibus, necnon molliuntur:
ob id semen contra lumbricos uocant Germani. Wurmsamen. Brabant, Syer-
cruyt. Galli Barbotine appellant, nonnunquam uero mortem uermium. Offi-
cinae ipsorum appellationibus.



Abrotonum.

Cap. XXV.

Abrotonum duorum est ge-
nerum. femina quadam ar-
boris specie fruticans, candicat,
circū ramulos folijs, seriphi mo-
do, minutim incis. floribus res-
ferta est, comantibus in summo,
fulgore auri, corymbis. quod
per ætatem prodit, suauiter o-
let, cum grauitate quadam, & a-
maro gustu. Id genus Siculum es-
se constat. Alterum mas uoca-
tur, sarmento sum, gracilibus ra-
mulis * uti absinthium. Plurimū
in Cappadocia gignitur, & Ga-
latia Asiatica, atq; in Syria Hierapoli. Crudum semen

* Tenui semine.
B

tritum & feruifacum ex aqua, in potu auxiliatur ortho-
pnoicis, conuulsis, ruptis, coxendicibus, urinæ angustijs,
mensibus suppressis, aut remorantibus. in uino potum
exitiale uenenorum antidotum est: horroribus ex o-
leo illinitur, serpentes & substratu & nidore fugat. con-
tra ictus eorum cum uino potum prodest, priuatim efficax contra scorpionum &
phalangiorum uenena. oculorum inflammationibus commodè illinitur, cum co-
toneo cocto, aut pane tritum cum farina hordeacea, decoctumq; tubercula discu-
tit. irini compositionibus admiscetur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, ἀβρότον. Latine, Abrotonum.

Officinae genuinum nomen retinuerunt.

Germanis, Stabwurz / Schoßwurz / Gertwurz. Brabant, Aueroone.

Gallis Auronum, auronine.

Abrotonum femina, folijs seriphi & cypresso proximis, albiorebus. Mas uero abrotonum, generis no-
men tenet: calidum sicum tertio recessu à medijs, admodum amarum, coma cum floribus utile, ut absinthium,
& cineribus suorum sarmentorum ad pilos reddendos. Sunt qui arbitrantur, chamæcyparissum abrotoni
speciem esse, uidelicet feminam: quod affirmare non ausim.

Abrotonum marem, Cordus uocat Gartheyl. Feminam, Wilde cypress / Garthagen. Rarissime in
Germania flores producit, propter frigus.

Hyssopum.

Caput XXVI.

Hyssopum, herba nulli non cognita, duum generum est: montanum & hortens-
se. Optimum est Cilicium. Vim habet extenuandi & calfaciendi. decoctum

A

Hyssopus sylvestris.
Heyden hyssop.

* Alij, nasciturio.

Hyssopus.



cum ficis, aqua, melle & ruta, potumq; peripneumonici, diurne tussi, suspiriosis, de stillationibus, & orthopnoicis auxiliatur: tineas enecat. idem facit, si cum melle delingatur. crassum humorem per aluum extrahit, decoctum ex aceto mulso epotum. ad subducendam aluum, cum ficis uiridibus detritis manditur: uehementius, addita iri, cardamomo*, aut irione, deiecit. colorem in corpore fouet. leni, & aquae inter cutem, cum fico nitroq; inflammationibus quoq; ex uino illinitur. cum feruente aqua impositum, sugillata discutit. cum decocto ficorum, optimè anginis gargarizatur. decoctum cum aceto, dentium dolorem in collutione sedat. inflationes auricularum uaporis suffitu discutit.


NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, ὕσσωπος.

Latine, Hyssopus.

B

Stoechas.



Gale. lib. 8. comp. phar. part.

Officinae genuinum nomen seruarunt.

Germanis, Bitchhyssop / Closterhyssop.

Gallis de hyssope, dicitur.

Hyssopus calidum sic cum ordine tertio, tenuium partium: crassa & lenta ex pulmonibus extrahit: humorem crassum per aluum etiam purgat, obstructions tergit: Montanum est efficacius hortenfi: Cilicium præfert Dioscorides, Creticum uero commendatur Archigeni, lib. 8. comp. phar. part. Gale. in Chrysocome, & origano Heracleotico. Quædam à Dioscoride Hyssopotribuuntur, quæ in nostro desiderari uidentur. Cum florum spica legendum est, aut cum semine turget.

Est & Hyssopus sylvestris, luteo flore, & semine in folliculis, radice glabra, lignosa, crescit desertis & montibus. Herba sagminalis est mulierum.

Stoechas.

Cap. XXVII.

Stoechas, iuxta Galliam in insulis eiusdem nominis & regione Mafsiliæ gignitur, unde cognomentum accepit. herba tenuibus furculis, coma thymi, longiore folio, subamaro gustu, & aliquantum acris. Cuius decoctum, hyssopi modo, ad pectoris uitia efficax est: antidotis miscetur. uiscera omnia, & uniuersum animantis habitum extenuat. ab obstructionibus & tactu liberat.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Στοιχὴς nascitur multa ubiq; terrarum, copiosissima in Creta insula, & dictis

et diſtis Steechadibus inſulis, in mari iberico, à quibus appellata eſt: naſcitur et in Arabia, unde et Ara-
bica uocatur. Prouenit etiam hoſie in multis Germanie hortis. Amara eſt, modicè aſtringit, pròinde tenuat,
targit, obſtructa liberat, roborat uiscera, et corpus reliquum: putredinem arceſcit. Habitat atq; melior nutri-
tis, et preſtantior ex inſula Creta petiſtur, lib. i. Antido. Gal. li. i. Antiſ.

Eſt in Gallia Narbonenſi, et multis Germanie locis, Steechas Citrina uulgo dicta, à come et corymbiſto
ris colore luteo. Dioſcorides Heliochryſum, et Galeni Amaranthus uidetur: altera autem flore purpureo, de
quibus plura in ſequentibus.

Spica.



Lauendula.



Hic locus poſtulat, ut de noſtro Germanico narſo,
quam omnino Steechadis ſpeciem eſſe arbitramur, diſ-
ſeramus: quòd ubiq; naſcens fruticat folio craſſiore,
carnoſo, anguſto, colore languido, in candidum uer gen-
te: frequentibus ſpicis in ariſtas ſparſis: ſtoſculis purpu-
reis. Gaudet apricis et petroſis, tanta ſuauiſſima fragran-
tia, ut omnes flores odoris incunditate prouocet, qua do-
te uetiſſimis inſeritur. Dulciſſimum cernitur generum. Vnum
proterius adoleſcit, et maiorem ſpirat odorem: quòd
quæ non minus quàm narſum placet, ſibi ſpica nomen

apud nos arrogauit, Germani Spicamarſi, Galli aſpic appellant.

Alterum cum amplitudine, tum odore minus, quòd quia balnei, et hominum lauachris expetit, elotaq;
omnia, ſi permisceatur, odoris ſuauiſſima commendat, uulgo Lauender cepit nominari.

Veracis perpetua coma caneſcit, exitu ueris, iunio et Iulio meſe ſpicatur. Viſci caſſiaſtoria et reſi-
cans abſceſſu ſecundo, tenuibuſq; conſtat particulis, nec multum à natura et forma Steechadis diſſidens.

Origanum.

Caput XXVIII.

Origanum Heracloticum, quòd et cunilam uocant, folium habet hyſſopo nõ
diſſimile, umbellamq; non in rotæ ſpeciem orbiculatam, ſed ueluti multiſidã,
ſemine in ſummis uirgis haudquaquam denſo. Excalfacit, unde decoctum cum uino
potum, demorſis à ſerpente conuenit. ſi cicutam aut meconion hauſerunt, ex paſſo:
ſi gypſum aut ephemerum, ex aceto mulſo propinatur. ruptis, conuulſis, hydropi-
cis, cum ſico eluidatur. aridum acetabuli meſſura potum in aqua mulſa, atros hu-
mores per aluum extrahit. meſes ciet, et ruſſi cum melle linctum medetur. ad pru-
riginem, pſoras, regiumq; morbum, decocti ius in balneis prodeſt. Succus uirentis
conſillas, uiam, et oris ulcera ſanat, et per nares, ex oleo irino inſuſum, trahit. aurium
dolores cum lacte mulcet, conſicitur ex eo, et cepis, et rhois fructice, quo ad obſo-

A *Origanum nigrum.**Origanum.*

nia utuntur, uomitorium me-
dicamentum, his omnibus
in cupreo uase per dies his
uicenos in solatis, dum canic-
ulæ sydus flagrat. herbæ au-
tem substratu serpentes fu-
gantur. Quæ onitis appella-
tur, cãdidiore est folio, & hyl-
sopo similior. Semen ueluti
cõiunctos corymbos habet.
Vis ei origani Heraclæi, sed
multò inefficacior. Syluestre
origanũ, aliqui panaces He-
raction, alij cunilam uocant,
ex quibus est Nicander Co-
lophonius: folijs est origa-
ni, ramis tenuibus, dodran-
tem altis, in quibus umbellæ
anethi insunt, flores candi-
di: radix tenuis, superuacua.
Peculiariter percussis à ser-
pente, folia & flores ex uino
poti auxiliantur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, ὀρίανον. Latine, Origanum.

Officina genuinum nomen seruauit.

Germanus, Wolgemüt / Rot dosten / Costen. Brabantis,
Mariolayne / Welghemoet. Gallis de l'origan, dicitur.

Origani Dioscoridi hoc loco plura produntur genera: omne uerò
genus calidum siccum tertio ordine, incidit ac tenuat. Tragoriganũ
etiam substringit: præfertur montanum, uel Creticum, uel Heraclæo-
ticum.

Tragoriganum.

Caput XXIX.

* *Gummosum.*

Tragoriganum tenuis frutex est, syluestri serpyllo aut origano similis, folio
& ramulis, quibusdam in locis lætius uirentiusq; inuenitur, latioribus folijs,
fatis glutinosum. alterum exilibus furculis, ac tenuibus folijs, quod aliqui prafum
uocauere. Optimum est Cilicium, & Cretense, & Smyrneum, & in Chio Chooq;
proueniens Omnia exalfaciunt, urinam cient, aluo accommodantur. decocto poro
bilem deiciunt, lienosis ex aceto bibere prodest. contra pota ixiæ uenena in uino
bibuntur, menses trahunt, peripneumonici, tussientibus, ex melle in eclegmate dā-
tur. grata ac mitis eorum portio est: quare cibum fastidientibus & stomacho acida
ructanti, imbecilloq; traditur, item si à marina iactatione nausea, & æstus præcor-
diorum exciteretur, tumores uerò cum polenta illita discutiunt.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Tragoriganum Dioscorides in duo genera dispefcit, quæ à Plin tribuuntur Heraclio. Ruellius suspica-
tur hanc Gallis mastichinam herbam dici, quoniam lentore quodam interdum madescit, aut quodd iucundum
mastices spiret odorem, studiose nuper in hortis ceptam seri, frutice serpylli uel origani, coliculis ramisq; nō
dissimilibus, folijs sampsuci, flore paruo, odorato, in umbellâ, in qua propendent incani hircorum uilli: unde
ductum Tragorigani nomen existimo. Odore sampsucho non cedit. Germanis adhuc incognita, Herba ma-
sticina Officinis Gallis appellatur.

Pulegium.

Caput XXX.

Pvlegium herba uulgaris notitiæ. Extenuat, calfacit, decoquit, menstrua, secun-
das ac partus eicit, pulmonis uitia ex melle & aloë potum extrahit. conuulsis
auxiliatur.

Pulegium.



auxiliatur. nausæas stomachiq; intercisiones, ex posca per-
mulcet. atram bilem per aluum exigit. bibitur in uino utilissi-
mè contra serpentium morsus. defectos animo recreat, cum
aceto naribus obiectum. gingiuas arefacti cinere corrobora-
rat. illitum cum polenta inflammationes omnes sedat. poda-
gris per se subuenit. impositum usq; dum rubescat locus. cū
cerato uaros extinguit. lienosis cum sale utiliter illinitur. de-
coctum eius ablutas pruriginis mitigat. conuersas uuluas
corrigit. contra inflationes duritiasq; uuluar, in defelsiones
conuenienter adijcitur. Vocant aliqui blechona, quoniam
dum floret gustatum à pecoribus, balatum concitat.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Πύλεον. Latine, Pulegium. Officinis nomen retinet.

Germanis, Poley. Sæpius poley.

Gallis, du pouliot, dicitur.

Pulegium nota herba est. Huius natura, ut lib. 19. testatur Plinius, in carna-
rijs resflorescens est. Vnde idem lib. 18. dixerat: daretur hoc qui non nemi-
ipso brumali die pulegium in carnarijs florere, idè nihil esse occultum natura
uoluit. Et lib. 2. ait: floret ipso brumali die suspensa in rectis arenis herba pul-
legij. Est autem calefaciens, & concoctiones adiuuat.

Efficax ad recreandos defectos animo, cum succulis suis in ampullis utreas
aceti diectum. Quæ de causa dignior è pulegio corona uertigum, quàm è ro-
sis cubiculis nostris pronuntiata est. Nam & capitis dolores imposita dicitur lenare. Quin & elictu capi-
ta tueri contra frigorum æstusq; iniuriam.

Dictamnus Cretensis.

Dictamnium.

Caput XXXI.

Dictamnium Officinarium.



Dictamnium, aliquibus syl-
uestre pulegium uocatur.
Cretensis herba est, acris, leuis,
pulegio similis, sed maioribus
folijs, quæ tomento quodâ spif-
sa, lanugine pubescunt. Florem
nullum aut semen profert. Præ-
stat omnia quæ sativum pulegi-
um, sed efficacius multò. non po-
tum modò, sed appositum quoq;
aut suffitum, defunctos partes
efficat. Produunt in Creta capras
sagittis percussas, huius herbæ
paltu eas excutere. purgandi
uim habet succus, illitus, aut cum
polenta tritus. herba impactos
pedibus reliquæ corpori acu-
leos, illitu refigit. ad lienis dolo-
rem efficax habetur. siquidem i-
psum imminuit. Metunt astate
& autumno. Radix eius gustu cal-
facit. partus accelerat. succus cū
uino potus, contra serpentium
morsus præsidio est. tanta her-
bæ facultas est, ut olfacta abigat
bestias, quæ ueneno ictu saui-
ant, appensaq; cōtactu exanimet.
uulneribus ferro illatis, & uene-
natis moribus, infusus succus

A praesentaneo est remedio, si etiam ab instillatione statim in potu assumatur. Quod pseudodictamnū uocant, multis in terris nascitur, antè dicto simile, sed minus quàm illud acre. Eosdem effectus præbet, sed inefficacius multò. Defertur à Creta alterum dictamni genus, folijs sisymbrij, ramis maioribus: in quibus flores sylvestris origani, nigri, molles: odor foliorum inter sisymbrium & saluiam iucundissimus. Efficax ad eadem, sed minus nares ferit, miscetur emplastris & medicaminibus, quæ aduersus serpentium iniurias confinguntur, theriaca uocant.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Veri dictamni descriptioni Dioscoridis ad omnia respondens, hodie in magna copia ad nos defertur. Quæ autem uulgo circumfertur dictamni radix, est potius pseudodictamni, aut *Paeonia maris*, ut uir doctissimus Hieronymus Tragus testatur. Creticus laudatur potius & appositus. Metitur æstate & autumno.

Dictamnū, quod è Creta defertur, Dioscoride teste, folio sisymbrij, ramis maioribus, flore sylvestris origani, nigro, molliq; ad hodie Galli tum diptamnū, tum hortensem gingiberim appellam, quod ætiosam statim os adurat, & linguam uellicet, &c.

Saluia.

Caput XXXII.

Ambrosius, Wilde Salbey.



Salvia siue eleisphacon, frutex est ramosus, longus, uirgas habens quadrangulas, & canas: folia mali cotonei effigie, sed longiora, asperiora, crassiora, & quæ sensim attritarum quasi uestium scabritiem referant, hirsuta, subalbida, per quàm iucundo odore, sed graui. semen summis in caulibus sylvestris ormino simile gerit. In asperis nascitur. Menses cit & urinas, decoctum foliorum ramorumq; potū. paratus extrahit. pastinacæ marinæ ictibus auxiliatur: capillos denigrat: uulnèrū sanguinem cohibet. tetra ulcera purgat, testium pruritus sedant rami soliaq; si decocto eorum foueantur.

NOMINA

LIBER TERTIVS.
NOMINA ET EXPLICATIO.

89

A

Græcè, ἑλελίσφακος. Latine, Salvia.

Officinæ genuinum nomen servauit.

Germanis, Salbey.

Gallis Saulge, dicitur.

Salvia, quod ad multa, præcipuè fecunditatem, sit salutaris, ἑλελίσφακος Græcis, quasi sylvestris lens dicitur: folio est maiore, squalidior, scabrior. hæc Germanis Bauern salbey / dicitur: Sphacelus nerò breuiore & tenuiore. Quæ Theophrasti uerba nostram Saluiam fenicam, Germanis Edel salbey / ducht salbey / uidentur exprimere. Calfacit euidenter, & astringit ἑλελίσφακος.

Mentha.

Caput XXXIII.

Mentha rubra, Rote mînth.

Zickermînth.

Seldmînth.

Mînth salbey.



B

Mentha, cognita herba est. Calfaciendi, adstringendi, atq; exiccandi uim habet. Siftit sanguinem, potu ex aceto succo, tineas in uentre teretes enecat, uenerem stimulat, singultus, uomitiones, cholerasq; sedat, terni ramuli cum acidi granati succo poti, suppuraciones discutit, si cum polenta illinatur, imposita fronti, capitis dolores mulcet, mammas, si tendatur, aut lacte turgant, compescit: cum ialecanum moribus illinitur. aurium doloribus cum aqua mulsa subuenit: uulua ante coitum admota, conceptioni resistit, linguæ scabritiem conficta leuigat, coire lac densariq; in caseum non patitur, si folia potionibus lactis immergantur. in summa, stomacho utilis est, & in condimentis peculiarem gratiam habet. Sylvestris mentha, Latini menthastrum uocant, hirsutior est folio, & profus maiore, quàm sisymbrii, grauiori odore: quare minus ad sanorum usus expetitur.

NOMINA

DIOSCORIDIS
NOMINA ET EXPLICATIO.

A

Frawenmünz.



Græcè, ἡδ' ὄσμοσ, μίνδγ.

Latine, Mentha.

Officinis nomen seruat.

Germanis, Münz / Balsamkraut.

Brabantis, Munte / Herrecreuyt.

Gallis, de la mente, dicitur.

Menthe in uniuersum duo sunt genera. Una enim satia et hortensis est, altera sylvestris et fera. Satia iterum quatuor præcipua sunt genera: una est, quam Germani Deyment / simpliciter, uel, Krauß Deyment / uocant.

Alteram, quam idem Krauß balsam.

Tertia, que iisdem Balsam minz / appellatur, et Unser Frawen minz / uel Spizminz: à nostra ætatis herbarijs Romana, uel Saracenica.

Quartam Germani quidam Herzkraut / nonnulli Balsamkraut / uocant. Per me tamen licebit has species, quandoquidem scilicet cultatibus similes sint, ut cuius placuerit nominare. Nobis autem, ut certius discernerentur, prædictis nominibus appellare placuit.

Non ignoramus plures esse menthe species, nos tamen eas

duntaxat, quas uidimus, pictas exhibemus.

Syluestris mentha Græcis ἡδ' ὄσμος ἀγρὸς.

Officinis Latino nomine Menthastrum.

Germanis, Wildmünz / Fischmünz / Bachmünz / Rosmünz / Wangenkraut / Nam habet et hæc

Balsamita, Spizbalsam.

Rosenkraut / Balsamkraut.

B



plures

Salsamint.



Zergering.



Plures species.

Callis de la mente sauvage dicitur.

Mentha nomen, ut Plinius tradit lib. 19. suavitatis odoris apud Græcos mutauit, cum aliqui minti & uocaretur: (Hedysmo illi nomen est) unde ueteres nostri nomen declinauerunt. Omnis mentha species, tam horrens quam syluestris, gustu acris, & facultate calida est, ex tertio ordine exaltatissimum. Infirmitas tamen est horrens, & minusq; calefacit. Exicat autem in secundo ordine: illi enim ex cultura aliquid humiditatis accedat. Grato menthamens odor percipitur in rusticis & spibus, ut Plinius scribit lib. 2. quod Mentha odor animum excitet, & sapor auditatem in cibis. Celsus eam inter urinam mouentia numerat, inquiens: Vri nam autem mouent quæcumq; in horto nascentia boni odoris sunt, ut apium, ruta, ocimum, mentha.

Calamintha.

Caput XXXIII.

EX calaminthæ generibus quædam montibus familiaris, folia ocimi habens incana, surculos aridos, & caules angulosos, purpureum florem. Altera pulegio similis est, sed maior: quam syluestre pulegiū ideo appellarunt, quod odore ipsam remulatur. nepetam Latini uocitant. Tertia menthatro cognata est, folijs oblongioribus, caule & ramis maioribus quam superioris, sed uiribus inefficacior. omnium folia gustu impense feruentia & acris radix superuacua. Nascentur in campistris, asperis & aquosis. Potu aut illitu demorsis à serpente opitulatur de eo citu potu mentes & urinas expellit, ruptis, conuulsis, orthopneæ, torminibus, cholent, horroribusq; auxiliatur regium morbum expurgat. præsumpta in uino uenena resistit, tinea & cæteraq; interaneorum animalia, cum sale & melle pota, enecat. nec secus

A Mentha lutea,
Elemin.



Pulegium sylvestre.



secus cocta crudae si te-
ratur. elephanticos cura-
ta adiuuat, si postea serū
lactis ebibatur. Folia de-
trita si in uellere subijci-
antur, menses extrahūt,
& partus enecant. accen-
sa aut substrata, serpētes
fugant. nigris cicatrici-
bus candorem reddunt,
in uino cocta & illita. su-
gillata tollunt. Calamin-
tha ischiadicis imponi-
tur, ut ex alto humores
euocet, summam cutem
exūrens. uermes necat
succus auribus instilla-
tus.


NOMINA ET
explicatio.

Calamintha, uel cum Nican-
dro, Calamentum, Galeno du-
plex est: domestica, & eo effi-
caciō montana, quam Andro-
macho minore miratur, Nepe-
thā uoce Romana potius quā
Calaminthā, Græca uocari in sua
theriace, cum cetera Græcē ap-
pellarit. Dioscoridi triplex est.

Prima montana, uulgare cala-

mentum: secunda pulegium sylvestre. Germanis, Wilder poley, Fischmünz, Bachmünz, Wasserminz/
Rohminz. Gallis du poulliot saunage. Tertia herba cattaria, Officinis Romanum nomen retinens, Nepita:
Germanis Tlept & Katzenmünz. Gallis de l'herbe au chat dicitur, ut

Thymum.



Lb. 7. Sup.

Ruellio uidetur. Musc uerō contrā: tertia uulgare calamentum, secunda cat-
taria putatur. Ob imperfectum omnium historiarum in hac sententiarum uar-
ietate iudicium difficile, ἡ ἀληθὴς πρὸς τὴν ἀλήθειαν addit Aduarius. Galen-
psis, quæ uulgō herba cattaria putatur esse, urtica fetida purpurascens floribus uidetur.

Calamintha calida sicca gradu tertio, acris, parum amara, tenui substan-
tia, culm cal facit, mordet, sugit, postremo ulcerat: tamen eius succum uulne-
ri etiam cerebri meningis diuidenti infusum, milij farina sicca superiecta glu-
tinare affirmat Archigenes, apud Galen. lib. 2. comp. phar. part.

Thymum. Caput XXXV.

Thymum ab omnibus cognoscitur, surculosus frutex,
exilibus folijs multis & angustis circumdatus: capitū-
lis in cacumine, flore purpureo refertis. Gracili solo & pe-
troso provenit. Vim habet hanc, ut cum sale & aceto potum,
pituitam per aluū detrahat, decocti ius prodest orthopnoi-
cis, & anhelatoribus. tineas uentris exigit. menses, partus,
& secundas pellit. urinas ciet. cum melle & eclegmate faci-
les facit excreationes. recentes tumores discutit, cum aceto
illitum. concretum sanguinem dissoluit. uerrucas thymi co-
lorem reddentes, penilesq; tollit. ischiadicis cum uino &
polenta impositum subuenit. hebetibus oculis in cibo pro-
dest.

est. perquam utile pro condimento, duntaxat ad usus eorum qui recte ualent. **A**

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Θύμω. Latine, Thymus. Officinis genuinum nomen seruatur.

Germanis, Thymian / Immenkraut / Edel Balsamkraut / Welcher Quendel.

Gallis du thym, Maiorana Anglica dicitur.

Thymum commendatur maxime Atticum, aut ex locis siccis & editis: calidum siccum ordine tertio: incit mensēs & urinas mouet, crassa & lenta ex pulmone & thorace expectorat. Epithymus Græcorum est flos thymi, satureia similis: calidus siccus gradu tertio: omnia potest quæ thymus, sed efficacius, ob id illius penuria hoc uti licet, mensuratamen maiore. Datur Epithymum drach. quatuor cum sero lactis uel mulsæ, ad educendum humorem melancholicum. Horem loco si Arabum Epithymo, hoc est, cassuta thymo innata, ut satureia seu thymbra epithymum Actuario dictum, & hyssopo & maiorana, epissopum: & oroborobanthæ: & lino inanchæ, ut libet, quia uires cum thymi flore easdem illi Plinius utrum solus tribuit: dabitur cū Mesue ob imbecillitatem a drachmis 4. ad drach. 20. Epithymus autem Arabum, ut thymus, est duplex, hortensis, & hoc calidior, siccior montanus.

Satureia.

Caput XXXVI.

Satureia triualis notitiæ est, gignitur in asperis locis, & tenui solo, thymo similis, minor tamē & tenerior, defert spicam florum plenam, coloris herbarum. Eadem potest quæ thymum, si modo cōsimili sum pruritur. Aptus senis usus. Est etiamnum quædam satia, syluestri prorsus minor, quæ propter mitiorem acrimoniam, commodius in cibos recepta est.

EXPLICATIO.

Græcè Θύμω. Latine Satureia, hortensis thymbra, Mart. in plurali neutro est usus:

Improba nec profunt iam satureia tibi,

Officinis Latium nomen retinuit.

Germanis, Gartthysop /

Swibelhyssop / Saturey /

Sadancy.

Gallis ferricta, quasi satureia Satrea.

Satureia herba est fragran-

tis odoris, & alio nomine thymbra uocata, & inter cunilas numerata. Columella lib. 9. cap. 4. Tum etiam thymbra, uel nostratis cunila, quam satureiam rustici uocant: & paulo post, Nostra cunila, quam dixi satureiam. Plin. lib. 19. 8. Thymbra uerò quæ sit cunila, hoc apud nos habet uocabulum, & aliud satureia dicta in condimentario genere. Columella tamen thymum a satureia discrepare sentit hoc fenariolo:

Et satureia thymum referens, thymbraque saporem. Columella itaque thymbra a satureia discreuit, & nostratam cunila esse docuit, quam rustici uocant satureiam, colore floris purpureo, thymbra uerius herbaceo.

Serpillum. Cap. XXXVII.

Serpillum duorum generum est. Hortense odore siamphuchum imitatur, atque in coronas addi solet, cui a serpendo nomen inditum est: quoniam si qua eius particula terræ attingat, inibi radices demittit. folia & ramulos origani habet, sed candidiores: in macrois multo procerius assurgit. Syluestre zygis apellatum, non serpit, sed in altitudinem increscit, ramulos ædens tenues, surculosos, folijs refertos longioribus quàm ruta, & duriori-



Abus, angustis. flores iucundè olent, gustanti acres. radicis nullus usus. Nascitur in petris: latius efficacius, atq; magis exalfaciens, & ad medendi usum aptius. Menses trahit urinam potu ciet. torminibus ruptis, uulsis, & iecinoris inflammationibus auxiliatur. & aduersus serpentes potu illitue, capitis dolores mulcet còctum, adiecto rosaceo, & madefactum in aceto. maximè uerò phreniticis & lethargicis conuenit. cruentos uomitus sedat succus, drachmis quatuor ex aceto potus.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, *Ἐρωδίου*. Latine, Serpyllum.

Germanicè, Quendel / Hünereßel. Brabantis, Ruel / Thymus / Vnse. promeen bettstro.

Officinis Latinum nomen seruauit. Gallis Serpoullet, Pillolet.

Ἐρωδίου Græcorum, & inde serpyllum Latinorum, dictum est à serpendo, tum quia per terram, quam illum contingens radicans, serpit: tum quia iuxta sepes plantatum, aut ex altiore loco deorsum demissum adiecto illi pedamento, in longum protrahitur, ut hoc loco Dioscorides, & lib. 6. de plantis Theophrastus testatur. Serpyllum gustu acre est, ob id calidum ualde, ita ut menses & urinam moueat.

Sampsuchum.

Caput XXXVIII.

Maiorana syluestris.

Wild Majoran.



Sampsuchum in Cypro & Cyzice no laudatissimum. secundum sibi locū uendicauit Aegyptium. Amara cum gens Sicula & Cyzicena appellat. Herba est ramosa, per terram repens, folijs eius calamintha, quæ tenui folio constat, leptophyllos appellatur, hirsutis & rotundis. suauissimum odorem spirat, ideo coronis inseritur. Vis eius exalfaciens. succus decocti porus, conuenit incipientibus hydropicis, & his quos urinæ difficultas, aut tormina excruciant.

illita ex melle arida folia, sugillata tollunt. mentes subdita in pello trahunt. contra scorpionis ictum ex aceto & sale illinuntur. luxatis tum oribusq; cerato excepta imponuntur. aduersus oculorum inflammationes, tumoresq; cum polline polenta illini prodest. acopis malagmatisq; calfaciendi gratia, commiscetur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, *Σάμψυχον* & *ἀμαράντος*.

Latine, Sampsuchus, uel Sampfychon, Amaracus. Officinis Maiorana.

Germanis, Meyeron. Brabantis, Wägelkryne. Gallis Mariolaine, dicitur.

Maiorana

Maionana, Amaracin, sampsychnus, Dioscoridi, Theophrasto, Plinio eadem sunt herba: unguentum tamen amaracinum à sampsychno cur diuersum sit Dioscoridi supra ostendimus lib. 1. Calida est herba & sic ea ordine tertio, & tenuium partium Sampsychnum, Galen. lib. 3. simpl. Amaracum uerò calidum ordine tertio, sic cum secundo, idem lib. 6. simpl. Ex qua temperamenti uarietate, & quod seorsim de his agitur, Amaracum Galeno, & post eum Paulo esse dictam uulgo Matricariam suspicantur. Est & aliud huius herbe genus, quam Maionanam syluestrem uocant, & hyeme corollis tendens uirens, folijs, caule ac floribus aliter maui, ambo eiusdem penè odoris & efficacie.

Melilotos, siue sertula Campana.

Eoler Steynlee.

Melilotus Italica.



Caput XXXIX.

Sertula Campana laudatissima in Attica, & Cyzico, & Chalcedone nata. cuius odor uicinus est croco, boni odoris. Nascitur & in Capania circa Nolam, colore in luteū languescente, odore infirmo. Vim habet aditectoriam inflammationem omnē emolliat, præsertim quæ in oculis, uulua, sede aut testibus erumpat, si ex passo cocta illinatur: interdum autem addito oui luteo assato, aut fœnigraci farina, lini semine, aut polline, capitulis papaueris, intyboue. Recentes meliceridas per se cum aqua, & ulcera manantia in capite, illita cum creta Chia, uino aut galla sanat. stomachi dolores & eruda & cocta cū aliquo ex antè dictis leuat. do-

B

NOMINA ET EXPLICATIO.

Dioscorides hanc, utpote triuialem, non depinxit, circa Nola tamen Italia gigni, coloris lutei, odore languido tradit. Verum tria eius inueniuntur rei herbarie prudentibus fastigia: uulgare statim ab radice fruticosum, cubitale, flagellis exilibus, coma trifolij, minuta, ac lente fimbriata, flosculo melino, odoris eiusdem curia & herba, nempe suavis, tereti ac per ramos diffuso semine. Alterum aspectu cano, croci odore, ac flore, pinguis simis ac breuissimis folijs. Tertium, cuius picturam tanquam ueri ac genuini meliloti damus, simile fœnigræco, folio raro, semine in lunata filiqua, glauco, rotundo, infra sinapis amplitudinem, flore luteo, odorato. Nascitur ubiq, Græco nomine Officinis nobilior, ac Latino Germani, Welsch oder Italiensich Steynlee. Brabantis, Claueren & Steenclauer. Galli patellum, & coronam regiam, appellant.

Melilotum coquit, digerit, & parum adstringit, ut crocus, largior enim est in eo substantia calida, quam frigida. Germanis, Eoler Steynlee uocant, Hieron. Tragus Medicam putat.

Marum.

Caput XL.

Marum herba cognita uulgo, surculosa, flore origani, folijs multum longioribus, flore odoratiore. Vim habet sisymbrio confimilem. substringit enim & modicè calfacit. qua de causa illitu serpentia ulcera fistit, & in calidas illitiones additur iuxta Magnesiam & Tralleis copiosissima gignitur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Marum herba surculosa, flore origani, sed odoratiore: planta est uehementer odorata & amara, amaraco proxima, quo tamen est multo odoratiore & amarior, minus tamen eo est acris. Unguento amaracino fortè disto, quod à amaraci plurimum olim reciperet, nunc solum marum immittunt: satius tamen est, æqualem ama-

T 2

Lib. I. Anti. A raci & mari portionem imponere, ut bechyroi compositioni, qua mistione minus quidem odorum, non tamen minus efficax erit. Hæc Galenus. Suspicio nobis est uehemens Marum esse herbam, apud Gallos Mastie uulgò dictam, Maiorane simillimam, flore tamen muscoso in pappos abeunte.

Acinos. Cap. XLI.

Acinos aut aconos à Græcis dicitur, tenui siccoq; ramulo herba, ocimo similis, odorata, sed hirsutior, qua coronæ factitantur, à nonnullis olitoribus colitur, Menfes & aluum pota sistit, illita panos ignemq; sacrum sanat.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, ἀκινός. Latine, Acinus herba.

Officinis incognita. Germanis, Kleyen Basilien.

Gallis, basilic menu, basilic sauage.

Acinon Paulus ocimo cōsimilem prodit, mediocres astrigendi uires possidere, quare uentrem & menses potu sistere. Ad panos & ignem sacrum utiliter illinitur. Differt acinos ab acano, quod acinos ocimastrum est, cuius picturam exhibemus: acanos uerò spinosa, breuis, & lata herba, eryngio quibusdam contributa, spinis latioribus, &c.

Baccharis. Cap. XLII.

Baccharis herba fruticosa, quæ in coronas additur. cuius folia aspera sunt, media uiolæ & uerbasci magnitudine: caulis angulosus, cubiti altitudinem petens, aliquan-

Chrysogonum.
Benedicten Kraut.

tulum asper, non sine appendicibus adnatis: flore purpureo, subalbicante, odorato: radicibus ueratro nigro similibus, quibus odor inest cinnamomo proximus. Asperum squalidumq; solum amat. Radix in aqua decocta ruptis, uulsis, ex alto præcipitatis, spirandi difficultati, salutaris. ite diurnæ tussis, & urinæ difficili, menses pellit, contra serpentium morsus utilissimè datur in uino, recens radix apposita, partum extrahit. puerperis eius decoctum in defectionibus prodest, in diaphanata utiliter inseritur, iucundi odoris gratia. folia utpotè quæ adstringant, capitis doloribus illitu profunt, oculorum inflammationibus, mammis tumentibus à partu, ægilops incipientibus, ignibusq; sacris auxiliantur, odor somnum gignit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Nostrates Officinæ Baccharim non norunt. Rura apud Gallos diuæ Mariæ chirotecas: Germani Unser frauen hendesbüch / appellant, eamq; nectum in coronas. Baccharim esse facile potest intelligi, cum fruticosa sit herba, cuius folia quandam referant asperitatem, media uiolæ uerbasciq; magnitudine, caule anguloso, cubiti altitudinem petente, agnatis appendicibus quadantenus scabris, flore purpureo, subalbicante, radicibus nigro ueratro similibus, Cinnamomum subolentibus: asperum squalidumq; solum amat. Paulus odoratam esse tradit herbam, odore cinnamomum imitantem, quæ coronis dicari soleat. Bacchare fascinum depelli, Virgilius autor est, ita canens: - Bacchare frontem

Cingite, ne uati noceat mala lingua futuro.

Quidam hanc herbā pro Chrysogono habent, Germanicè Benedicten Kraut. De quo infrà lib. 4. cap. 46.



Rura

Ruta.

Caput XLIII.

A



Ruta montana sylvestrisq; sativa & hortenfi acrior est, & in cibis damnata. sativa uero quæ sub ficu arbore enascitur, magis in cibos admittitur. Vtraq; urit, calfacit, exulcerat, urinam ciet, menstrua pellit. aluum sistit potu ciboue. letalium medicamentorum antidotum est, si semen ex uino, acetabuli mensura, ebibatur. folia per se præsumpta, aut cum nuce iuglandæ, aridisq; ficis, inefficaces uenorum uires reddunt. contra serpentes simili modo sumere conuenit: genituram cibo potuue extinguit. cū anetho sicco decocta, tormina sedat. facit ad pectoris laterumq; dolores: difficultatem spirandi, tussis, pulmonis inflammationem, coxendicum articulorumq; cruciatus & horrores febrium circuitu repetentes, pota ut antè dictū est. item ad inflationes coli, uulue, rectiq; intestini, cū oleo decocta & infusa. fœminas uulue strangulatu liberat, si à genitali sederenus cū melle subiiciatur. seruefacta ex oleo, & pota, uentris tinea excutit. articularijs doloribus ex melle, aquæ inter cutem cum ficis illinitur. eisdem in potu auxiliatur, decocta in uino ad dimidias parteis, & oblita. cruda conditaq; cibo, uisus aciem excitat. dolores oculorū illita cum polenta lenit. doloribus capitis cum rosaceo & aceto illita auxiliatur, profluentem naribus sanguinem sistit, trita & indita. testium inflammationibus cum laureis folijs imposita, & eruptionibus papularum, cum myrto et cerato prodest. Cum pipere autem, uino & nitro affricta, albæ utiligini medetur. cum eisdem illita, fornicationes tollit, & uerrucas quæ thymi florem repræsentant, contra impetigines cum alumine & melle utilissimè imponitur. succus in mali punici calyce calfactus, aurium dolori efficaciter infunditur. hebetudinem oculi qui sensere, ruta cum fœniculi succo ac melle peruncti iuuantur. ignem sacrum, ulcera quæ serpunt, aut in capite manant, cum aceto rosaceo & cerula persanat: manfa, aliorum ceparumq; acrimoniam domat. Montana si copiosius estur, interficit, dum florem promit, & ad murias colligitur, cutem inflat, & rubore quodam inficit, cum pruritu ac uehementi inflammatione. oportet itaq; eam unctis antea manibus & facie colligere. Tradunt succum gallinaceis pullis in parum feles arcere. Adijciunt eam quæ in Macedonia circa Haliacmon amnem prodeat, comedentes interimere. Montosus autem is locus, uiperis scatet. Semen eius potum, contra intestina uitia ef ficax est: in antidota commodè additur. contra incontinentiam urinæ tostum, semē septenis diebus potui datur. Radix huius montanum moly uocatur. Sylvestris ruta sativæ similis est. Prodest comitialibus & coxendicum doloribus: menstrua mouet, partus enecat. acrior est uiribus quàm horrensis, & ualidior. sylvestris, ut potè noxia, cibis abdicatur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Ῥόγανον. Latine, Ruta. Officinis Latinum nomen seruauit. Germanis, Weintaut & simpliciter Raut. Gallis Rue, appellatur. Ruta hortenfis est imbecillior agrestis: hæc enim calida ordine quarto (tantum tertio dicitur lib. 6. com. phar. part. in stomachica Diabesasa) illa tertio: utraq; acris, amara, tenuium partium, ualenter siccans, incidit, digerit ualenter crassos & lentos humores: urinas mouet: statum, & ueneris appetitum cohibet.

Sylvestris ruta.

Caput XLIIII.

Vocant etiamnum sylvestrem rutam, quod in Cappadocia & Galaria Asiæ finitima moly dicitur. Frutex est qui ab una radice multos emittit cauliculos: folijs multò quàm alterius rutæ longioribus, tenerioribusq; odore graui: flore candido: capitulis in cacumine paulò maioribus, quàm sativæ rutæ, quæ tribus maxi-

A

Ruta sylvestris.



B

mè partibus constat: in quibus triangulum semine subrufum, gustu amarum recluditur, cuius est usus semen autumnò maturefcit. quod cum melle, vino, croco & fœniculi succo, ac gallina ceo felle, teritur cõtra refusam oculorum aciem.

Sunt qui eam harmalã uocent, Syri bēfāsan. Qui Cappadociã incolunt, moly, quoniã quãdam cum moly feruet similitudinē: radice nigra, flore candido: In collibus & læto puenit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Ρήγανος ἄγρος. Latine, sylvestris ruta, Moly, Bēfāsan, Bēfāsa, Armala. Officinis & Syris Harmela. Germanis, Wild rauten.

Gallis Rue sauvage, dicitur.

Ruta sylvestris, cuius picturam exhibemus, Hieronymo Trago, uirò in simplicium recta cognitione exercitissimo si de dignissimoq; è mōte Pessulano ab amicis transmissa, ad eò legitime huius delineationi per omnia respōdet, ut ueram ac genuinam sylvestrem rutam esse, nemo sane mentis dubitare possit. Moly, quod nonnulli rutam sylvestrem, aliq; Harmalã dicunt, tertio calefacientium ordini annumeratur: substantia tenuē, hinc crassos humores uiscososq; incidit, discutit, & urinam promouet.

Nomenclationes, quæ contra Dioscoridis morem in calce huius capituli, quod sylvestri Ruta dicatũ est, subditæ sunt, adsequens moly magis uidentur pertinere.

Moly. Cap. XLV.

Moly folia habet graminis latiora, humisparsa: florem albæ uiolæ similē, sed minorem, lactei coloris: caulem candidum, quaternũ cubitorum, in cuius cacumine inest aliquid quod alij speciem referat. radix parua, bulbosa, quæ mirum in modum ualet ad aperiendas uuluas, si trita cum irino unguento, in pesto subiiciatur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Moly Galenus, Dioscoridis uerba citans, μύλλω appellat Ruta etiam sylvestris (ut supra ostendimus) idem nomen habet. Molon quoq; non alia uidetur, quàm Moly. Laudatissima herbarum fuit, Homero teste, cuius inuentionem Mercurio assignauit, contraq; summa Circei ueneficia demonstrauit, decima Odyssee rhapsodia. Hodie & Medicis & Officinis planè incognita.

παραχρησάμενος Panacea, herba q
est, noluerunt dicitur nō solum
in aen. Bp. omnia in modum
in mente sua p̄stare p̄sophide.

Panaces.

Caput XLVI.

Panaces nonnullis heracleum dicitur, ex quo opopanax colligi solet. plurimum in Bœotia & in Phocide* Arcadiæ nascitur: ibiq; compendij & quæstus, qui ex eo liquore facitatur, gratia studiosè colitur. folijs est asperis, in terra iacentibus, herbacei coloris, multum ad ficulneā accedentibus, in ambitu quinque partitò diuisis: caule, ut ferulæ, altissimo, qui lanugine quadam incanescit, folijs etiam minutioribus obstitus, muscarijs, ceu anethi, in cacumine: flore luteo, & semine odorato feruenteq; radices habet multas ab origine una, candidas, graueolentes, crassi corticis, & subamari gustus. Nascitur in Cyrene Libyæ, & Macedonia. Excipitur succus incisa radice, recenti caulum pullulatu: ea candidum succum emittit, qui siccatu, in summa cute croceum colorem contrahit. Effluentem autem succũ excipiunt, folijs excauato solo stratis, quæ siccata tolluntur. Similimodo caule mēsisibus inciso, profluentem succum eximunt. Meliores ex radicibus, albæ, rigentes, distenteq; siccæ, quæ cariem non sentiant, aromaticæ, feruentes gustu. Fructus ex media ferula cibo idoneus est: sed ex agnatis stolonibus, ab usu cibario abhorret. Maximè in hoc succi genere probatur quàm amarissimus, internè albus, aut subfuluus, foris ad

ad croci colorem inclians. lævis. pinguis. friabilis. tener. statim in aqua eliquefcs. A
gravi odore. niger improbat. ac mollis. Adulteratur ammonia co aut cera. Sed
sinceris experimentum est. si digitis in aqua friatus resoluatur. & lactescat. Ex calca-
tis. mollis. extenuat. horribis febrium circuitibusq. uulvis. ruptis. laterum dolo-
ri. torminibus. stillicidio urinæ conuenit. contra uescæ scabiem ex aqua mulsæ aut
uino bibitur. menses trahit. foræm enecat. infestationes quæ uuluum malè habent. du-
ritiasq. ex melle dilutus. discutit. ischiadici illinitur. ac opis & capitis medicami-
nis admiscetur. carbunculos rumpit. podagricis cum uua passa illitus subuenit. do-
lore dentium liberat. cauis inditus. oolorum aciem illitus excitat. ex eo & pice opti-
mum fit emplastrum. contra bestiarum morsus. quæ in rabiem efferantur. Radix in
ramenta conscissa. uuluz æmota. partus extrahit. ad uetera ulcera effica est. nuda
ta ossa. corpore operit. fitritra cum melle illinatur. Semen cum abinthio sumptum.
menses pellit. cum aristolochia prodest ad uersus animalia. quæ uenenum ei aculan-
tur. contra uuluz strangulatus in uino bibitur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Πανάκες (πάντες) nomine flammam morborum omnium remedium pellitur. Communis est pluribus
 herbis nomenclatura, Centauro, Ligustico, Tithymallo, Origano, Heracleotico. Dioscoridi tamen priusime
 sic nominatur tria solum genera, proximè sequentia; primum de quo præsentì capite agit, Græcis πάντες
 ἡγεμόνες, Latinis Panæe. Heracleum, id est, Heracleum dicitur.

Oppopanax liquor, & Panacis Hircacis radice in asina manans, cum caulis primum erumpit, aut vulnera
to caule misquis: calidus ordine tertio, siccus secundo: enollit, digerit, modice terget, ob hoc affusa ruda uesti
tione, mellea maligna & contumacia sanat. Recens est candidus, ubi aruit, coloris fivis est croceo. Nos
trum quod habemus, aliqua amaritudine insignitur, non tamen amarissimum est, & graui odore sentitur.
Propterea cum nostro liquidi mixtum arbitror, quod intensam amaritudinem tollit, velopis est quantitate
notatu dignum mandare, si intensa amaritudo feniri debeat: in reliquis notis penitus consentit.

Panaces Asclepij. Caput XLVII.

Panaces Aſclepii, caulem à folo emittit tenue, cubitale, geniculatum, maiori
bus quam fœniculi folijs, hirsutiſſimis, odoratis: aureo flore, acris, odorato, ex
muſcaribus dependente, radix parua eſt & tenuis. Auxiliarem uim habent flores & ſe
mina, contra ulcera, phagedænas, & tubercula, ſi trita cum melle imponantur. aduer
ſus ſerpentes ex uino bibuntur, & cum oleo illinuntur. Aliqui Panaces ſylue
ſtre originem uocant, alij cannili: de qua in origani mentione diximus.

NOMINA ET EXPLICATIO.

NOMINA ET EXPLICATIO.
 Panacea Aselepiō dictum aīunt, quoniam filium Aesculapij Panacium vocauerit. Huius radicem Theophrastus multū & salsi corticis habere dixit, quod quidem priori generi à Dioscoride tribuitur. Est & hæc Medicis cum Officiis hodie incognita.

Chironium Panaces. Caput XLVIII.

Chironium Panaces in Pelio monte maximè provenit. foliū eius amaraco * si
mīle. flos aureus. radix parua, quæ non alitè demittitur, gustu acris. Pota radix
serpentium ueneno resistit. illi ca, eadem præstat.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Et hoc ab inuentore nomen retinet, cui folium rumicis Theophrastus & Plinius reddunt: maius tamen, hirsutius, radice parua. Nascitur pinguibus, flore ad supradicta efficaci: nobis hodie incognita.

Ligusticum. Cap. XLIX.

Ligusticum, quod alij panaceæ, alij panaces uocant, plurimum in Liguria nascitur, in monte Apennino, Alpibus continendo, unde nomen traxit. Panaces incolæ non ab re appellant, quoniam & radice & caule, heracleotico panaci simile sit, & uiribus eisdem præditum. Gignitur in altissimis asperisq; montibus, ac umbris, maxime iuxta fluenta. cauliculus fert anethi, geniculatum, tenuem, & in circuitu folia fertulæ campanæ, molliora, odorata, prope verticis graciliora, & longè magis diuisa: in cacumine muscarum, in quo semens dependet nigrum, foliolum & oblongum, feniculo proximum, guffanti acre, & aroma olens; radix candida,

A



B

cū: nā quod folia latio-
ra aliquantulū, radixq; foris nō adeo atrā, culturæ adscribendū, nā cetero similis est.

Pastinaca Gallice sylvestre genus, cuius semine
pro Daucis utuntur Officinæ.

heracleotici panacis similis, odorata. Radix
seminisq; ex calsfactoria, cōcoquens, præ-
dest ad intestinos dolores, tumores, conco-
ctiones item ad inflationes, præsertim qui-
bus stomachus turgeat, & contra serpentū
ictus, urinas & menses potu trahit. Eosdē
præstat effectus apposita radix. Semen cum
radice oxyporis & medicamentis decoquē-
tibus admiscetur, oriperquā utile, quare
pro pipere utuntur eo indigenæ ad obso-
nia. Adulteratur semine quodam simili,
quod facile gustu discernitur: amarū enim
est. Alij semen fœniculi aut fœselis admiscē-
tes ligusticum dolo utiānt.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, *Λιγυστικόν*, *Αλευστικόν*. Latine, Ligusti-
cum. Galenus Libycticum. Brabantis, Leuistock.

Officinæ corrupto uocabulo Leuisticum. Germani,
Liebstöckel uocant. Gallis Leuistic, appellatur.


Ligusticum, à Ligusticis alpinis, in quibus frequens
nascitur, Galeno et Actuarius, unus literæ mutatione, Li-
bycticum: sylvestre, hodie rarum, semine solo usum Ma-
nardo: radix imperatoria uocatur Leoniceo & Musæ.
Hoc autem accipiendum in compositionibus Arabū, pro
Kcisin seu Leuistico, aperte docet Diatrion pipereon, et
dia Calaminthes, à Nicolao & Mesue ex Galeno paucis
admodum mutatis descripta. In quibus & alijs non pau-
cis Arabum descriptionibus, ut diacymino, dia moscho,
libycticum reposuit Actuarius. Vulgatum autem Leuisti-
cum sativum est, ob id minus efficax: nec Smyrniū est
cum Ruellio: aut apij, uel dauci genus, cum Manardo,
Smyrniū putante petroselinū Alexandrinū uel Macedoni

Pastinaca Gallica, Germanis
Zam moren/Rox/ & Gelb
rüben/ appellata.

Pastinaca.
Cap. L.



Pastinaca sylue-
stris folia gin-
gidij habet, latio-
ra, subamara: cau-
lem rectum, scabrum:
umbellam similem
anethi, in qua flores
insunt candidi, &
in medio purpureū
quiddā, feræ cro-
ceum. radix digiti
crassitudine, dodrā
talis, odorata, quæ
cocta manditur. Se-
men potum uel im-
positum, menstrua
mouet. hīs conuenit
in potione, quos u-
rinæ difficultas tor-
quet,



quet, aut lateralis dolor excruciat, aut si aqua curf A
subijt. serpentium moribus ictibusq; prodest. pra
sumentes id nulla affici iniuria à serpentibus ira
duntur. conceptus adiuuat. Radix urinam pellit.
uenerè stimulat. partus appositae enit. Folia trita.
& cum melle imposita, phagedæ nas ulceru purgat.
Satiua ad eadem pollet, inefficacior tamen, & cibo
aptior.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Pastinacæ duo generatraduntur. Vnum satium, & trafuli
v. antræ. & Grecis: pastinaca satia Latinis: Pastinacy, di
citur Germanis. Alterum agreste, quod Daucus etiam appellatur,
autore Gale. & Paulo Acygeta, hoc Grecis σαπωνίος & zpos.
Latinis, Pastinaca erratica. Germanis, Wilde Pastinacy/
Vogels nester. Brabantis, Pastinakfen/peen/Caroten. Gallis
verò Carottes sauage appellatur. Est & alterum genus in eadem
similitudine pastinacæ, quam Gallicam pastinacam uocant, Germa
ni Gelb & Rot rüblin/ uel Moren. Galli Carottes, præ dulci
radice, odorata, rufa, uel interdum purpurea: cuius genera etiam
quatuor fecere. De quibus etiam Dioscorides agit sub dauci nomi
ne, infra cap. 67. Pastinacæ omni calens natura est. Efficac
ior syluestris, magisq; in petrosis nata.

Seseli. Caput LI.

Seseli Masiliense folia Ferniculi habet, crassio
ra: caulem uegetiorem: umbellâ anethi, in quæ
semen oblongum, angulosum, degustanti statim a
cre. radix longa est, iucundi odoris. Semè & radix
excalfaciendi uim habent. potu straguriz & ortho- B
pnceæ medentur: suffocationibus mulierum,
comitialibusq; profunt. menses & partus tra
hant. ad omnia interna mala pollent. tussim
ueterem sanant. semen cum uino potum, co
coquit, & tormina discutit. epialis febr. bus

Seseli Aethiopicum.
Weiß Seselwurcz.

Seseli Peloponesiacum.
Schwarz Seselwurcz.



A utile contra perfrictiones in itineribus, cum pipere & uino bibitur. capris, ceterisque pecudibus datur in potu, quod facilius suos fetus enitantur. Aethiopicum Sefeli, folia habet hederæ, minora, & ad periclymeni modum oblonga. frutex nigricat, palmatis in bina cubita extensis: ramis sesquipedalibus: capitulo anethi: semine in tritici morem denso, nigro, amaro, Malsiliensi odoratiore, & acriore, multum suauis. Peloponense folia habet cicutæ, latiora, & crassiora: caulem supra Malsiliensis magnitudinem, ferulaceum, & larum: in cacumine umbellam, in qua semen huius odoratum, & carnosum pendet. Eisdem uiribus prædum est. nascitur in asperis, siquis & collibus, inuenitur etiamnum in insulis.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis Σεφελί, μασσαλιώδης. Latinis Sefeli Malsiliense. Officinis Siler montanum. Herbarijs quibusdam maior saxifraga. Germanis, Sefel/Welscher Steynbroch/Bergwur. Brabantis, Sefel wortel. Gallis Ser montain, apud Allobroges.

Sil sine file, herba est alio nomine Sefeli appellata, cuius radice uel semine olim uina condebant, quæ ante meridiano tempore sumebant. Unde silatum ueteres dixere, quod nunc tentaculum uocamus. Sefeli fructu & radice, id est, semine, ualde calet, ac tenuium est partium, quare urinam mouet, epilepsie & orthopneæ cõferi: laudatur Malsiliense. Et alterum etiam Aethiopicum, & tertium Creticum: de quo in capite sequenti, &c.

Creticum sefeli.

Caput LII.

Tordylum, quod aliqui Creticum sefeli uocant, iuxta Ciliciam in Amano monte nascitur, herbula surculosa, semine duplici, rotundo, scutulorum effigie, odorato, subacri. Contra uirinae difficultatem bibitur, potu cit menses. succo seminis caulisque uirantis, tenuis ebolis ex passo decem diebus hausto, renes sanantur. efficax est radix ad ciendas pectoris excretaiones, in delirio cum melle.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Τορδύλιον, Tordylum uel Tordylon. & Sefeli Creticum, Paulo Gordylon: & Tortilen, aliqui semen Sefelis esse dixerunt, alij herbam per se, quam & Syreon uocauerunt, de qua nihil aliud proditum inuenisse scietur Plinius, quam quod in montibus nascitur, ambustum citre menses &c.

Sifon.

Quibusdã hæc herba Germanicè Berwurzel uocatur. Idem est Tordylon, quod latius hoc loco à Dioscoride. presentatur in Amano Cilicie monte: breuis

& fruticosa herba, semine per uero orbiculato duplici, clypeo lis simili, modicè acri, & aromatum modo odorato cuius pecturam damus, Meum est.

Sifon.

Cap. LIII.

Sifon exiguum semen est, in Syria natum, apio simile, nigrum, feruens, oblongum. Contra lienis uitia bibitur: urinae difficultatem potu commendat, remoratos menses citat, quo in condimentis.



LIBER TERTIVS.

dimentis, cū cucurbita, & aceto, indigenæ utuntur in cacumine granula multa gerit. A

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Σίσιον. Latine, Sison. Officinis falsè semen Amomi.

Germanis Fremder Petersilien dicitur.

Officina eius herbe, cuius picturam dāmus, semine hæc eas pro uero Græcorum Amomo usi sunt, non tamē sine errore, cum hæc herba cum Amomi planta nihil habeat commune, ut facile iudiciū feret, qui utriusq; historiam conferre uoluerit, & uerum esse Sison comperiet, si quoq; diligenter & huius delineationem examinauerit.

Anisum. Cap. LIIII.



Anisum in summa exalfacit, exiccat. oris halitum iucundiores facit. doloris leuamentum præstat. urinam ciet. aquam quæ sub hunc cutem, dissipat. potum si incohibet. animalium uenens aduersatur, ualet ad inflationes aluum & alba fecminarum profluvia sistit lac ad mammas elicit. uenerem stimulat. dolores capitis leuat. suffitum naribus. cum rosaceo tritum, instillatumq; fractis auribus medetur. Melius semper recens, plenum, non furtuosum, odore præstans inter prima laudatum est Creticum, proximo loco Aegyptium.

*Addunt alijs
Diffundenda
uium habet.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, ἄνισον. Latine, Anisum uel Anesum.

Officinis Latinum nomen seruauit.

Medicorum uulgo Romanum fœniculum.

Germani Anis, uel Anis. Galli Anis, appellant.

Anisi semen calidum sic cum ordine tertio. uenitibus proximum, acre sub-

Gal. lib. 6, simp.

amarum urinas ciet, status uentris dissipat, digerit: addit Dioscorides uen-

enis resistere. Inter prima laudatur Creticum, melius recens & plenum. Huius

loco & penuria, Anisum dulce usurpamus. quod ἄλκωνισον Aethiopijs se-

Gal. lib. 6, simp.

pe appellat. Ita sentire malo, quàm cum nonnullis Anisum uulgarè Græcorum,

Anethum initio tertij gradus calidum, sic cum primo affirmare. Anethum uerò

uulgare calidius siccius, Anisum Græcorum calidum sic cum tertio gradu. Nā

uero uerum Aniso (ut dixi) caremus. quod semen paruum a, iij simla

semen, sed maius Dioscorides scribit: Anetho autem semen latum & sō-

tiatum Ruellius tribuit: ex quo scriptore nescio, nisi forè anethum ue-

strum pinxit, non descriptum ueteribus.

Carum. Cap. LV.



Carum, semen est uulgaris notitiæ. Exalfacit. urina concitat. stomacho utile. os commendat. concoctionem adiuuat. utiliter miscetur antidotis & oxyporis. anisi uicem præbet, radix cocta, pastinacæ modo manditur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Κάριον. Et recentioribus Græcis Carnabum, uel Carnabadi-

um, ut quibusdam placet.

Latine, Carum, Carium, Caros.

Officinis & herbarijs tantum paterno casu cognitum: carni enim omnibus ore uno dicitur.

Germani, Martkummel, Wickenkummel, Gartenkummel.

Brabantis, Wit Comijn. Galli Carui uocitant.

Carui semen calidum sic cum ordine tertio, modicoiter acre, urinas mo-

uet, statim discitit: planta etiam reliqua ab hoc utilis, à Caria regione lan-

datissimum afferebatur: unde illi nomē multiplex, Carui, Carion, Careo,

Car. 401.

A Carota, Carota, siue, ut nunc pronunciant, carota. Cari siue Carei, unde nomen traxit, radix est, quam Aethi-
neus diptero sophiscarum lib. 9. celebrans, maiorem pastinacam falsò appellat, uulgari & cotidiana illa melio-
rem: quæ etiam elixa Pastinaca modo estur, ut hoc loco Dioscorides quoque testatur, licet seorsim etiam sub
fari nomine de eadem agere quibusdam uideatur supra cap. 10. 4. lib. 2. his uerbis: Suauis in cibo ori cluxa si-
ri radix est, stomacho utilis, Vrinam cit, & cibi appetentiam excitat.

Præterea Paulus Aegineta lib. 1. cap. de ijs quæ edendo sunt radicibus, hanc tanquam congenerem Pastina-
cæ & dauco simul iungit, inquit: σαπολινος δὲ ῥίζη δ' αὖτις ῥίζη καὶ ἡ δὲ ῥίζη ἴσῃς, id est, Staphylini
uerò, quæ pastinaca est, & dauci & cari radices, Vbi cari radices, et si ser Interpretes confundunt, errore ma-
nifesto: nam hæc genera nos ita distribuimus, ut pastinacæ, quæ Staphylini Græcis dicitur, sit nostra uulga-
ris pastinaca, Germanicè Pasteney dicta. Dauci uerò radix sit uulgaris illa radix, Germanis Moren/Seel
oder rot rüben dicta. Sifer autem, cuius Plinius meminit lib. 19. Germanorum Geyerlein/ & Carota Cari
radix, Germanicè Mattymmel wurz: quod multi docti uiri non animaduertentes, has radices magno
errore confundunt.

Anethum. Caput LVI.




A Ridi anethi comæ feminisq; decoctum, poru
lac euocat inflationes, & tormina sedat. alui,
uomitionesq; sistit. urinas ciet. singultus lenit, oculo-
rum aciem hebetat. genituram refunguit, assidue por-
rum, scemini uulq; malo opportunis, ad defelsiones
utile. condylomata illitus eius cinis tollit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, ἀνέθον. Latine, Anethum.
Officinis Latinum ac genuinum nomen seruauit.
Germanis, Dyll/ Sochtiaur.
Gallis Anet, dicitur.

Anethum calidum secundo ordine. sic cum primo, tenuium parti-
um, digerit, ex oleo decoctum dolo-
res sedat, somnum conciliat, cru-
dos humores coquit, præsertim ui-
ride, quia minus calidum & humi-
dus est. Vsum autem calidum sic-
cum gradutertio sit, ulcera præhu-
mida, præcipue pudendorum, &
præputij cicatrice tegit. Coma florum odoratissima, & semen nobis con-
suetissimum est.

Cuminum satium.



Cuminum satium. Cap. LVII.

C Vminum satium ori gratum est: sed multò magis
Aethiopicum, quod Hippocrates regium appellauit.
secundum locum tenet Aegyptium. reliqua sequuntur.
Prouenit in Galatia, in Asia, Cilicia, & Terentia, & ple-
risq; alijs tractibus. Excalfacit, adstringit, exiecat. ad tor-
mina inflationesq; conuenit, coctum & cum oleo inditum
aut cum hordeacea farina illitum. orthopnoicis datur in
posca: demorsis à serpente, in uino. testium collectionis
bus auxiliatur, impositum cum uua passa, aut lolij farina
ceratoue. mensium abundantiam inhihet. contritum autē
in aceto, & naribus obiectum, sanguinis profluuiâ sistit.
colorem bibentium aut perunctorum mutat in pallore.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, κύμινον. Latine, Cuminum.
Officinis Romanum cognominam.
Germanis, Römischer Rymmel/ Pfeffer Rymmel:
Gallis Cumin, dicitur.

Cumin

Cuminum semen utile magis, calfacit ordine tertio, secat, urinam mouet, flatum extinguit: satium est ac A
 sylvestre. Plin. lib. 19. Condimentorum tamen, omniumq; fastidijs cuminum amicissimum. Idem lib. 20. In eo
 magnus usus in stomachi præcipue remedijs. Discutit pituitas & inflationes, tormina quoq; & micæinorū
 dolores. Veruntamen omnem pallorem bibentibus gignit.

Sylvestre cuminum.

Caput LVIII.



Rittersporon.

R
 Cathartica
 blumen.

Sylvestre cuminum, plurimum efficaciusq; in Lycia
 & Galatiæ Asia, atq; Carthagine Hispaniæ gigni-
 tur: frutice paruo, dodrantali caule, ac tenui, qua ternis
 aut quinis folijs tenuibus, ueluti ferratis, & gingidij di-
 uisura, in cacumine capitula quina, aut sena habet, mol-
 lia, rotunda, in quibus est semen acerosum, gustu satiuo
 acriore, nascitur in collibus. Bibitur semen ex aqua, ad
 uersus tormina inflationesq; item contra uenenatas be-
 stias, ex uino. singultus ex aceto sedat: stomacho utile,
 quem humor uexat. sugillata tollit, si manducatum cū

A melle & uua passa illinatur: testium inflammationibus, adiectis eisdem illitum me-
detur. Est & aliud sylvestris cumini genus, satiuo non dissimile, quod à singulis flo-
ribus pensilia promit cornicula, in quibus semen est melanthio simile: quod po-
tuum omnium serpentium moribus praesidio est. calculosis & his qui urinae stillici-
dio uexantur: aut concretum sanguinem cum lotio reddunt, auxiliatur. sed apij se-
men feruefactum postea bibendum est.

Cumini sylvestris primum genus, Graecis Κύννον ἀγρόν.

Latinis sylvestre Cuminum. Officinis Consolida regalis.

Germanis, Bitterspölin. Gallis cornueta, dicitur.

In segetibus inuenitur, caule singulari, ramoso, folio propè foeniculi, semine nigro in corniculata siliquula
concluso, hodie in hortis seritur, & Germanicè S. Catharinen blümen/ dicitur: herba ad descriptionem
primi generis sylvestris cumini ferè propius accedens, Germanicè aliqui peregrina herbazac nuper ex Italia
allata, eius figuram praecedens pictura ostendit.

Alterum Cumini sylvestris genus, Graecis Κύννον ἄγριον ἔσπερον.

Officinis nigella sylvestris.

Germanis, Wild schwarzer Coziander/ nominatur.

Folia anethi habet, flores nigellae sativae similes, nisi quod colore sint elegantiores. Capitulum phaeae aequi-
legae respondet, atque in se semina nigra & odorata continet.

Ammi.

Caput LIX.



Ammi Aethiopicum cuminum appel-
lanit. plerique hoc natura diuersum
ab illo existimant. Vulgo notum est semen
exile, multo minus cumino, origanum resi-
piens. Eligendum est purum, minime furo-
sum. Vis ei ex calfactoria, feruens & exie-
cans. facit ad tormina, urinae difficultatem,
serpentium ictus, cum uino potum. men-
strua ciet. miscetur de rodentibus canthari-
dum medicamentis, quae ecdoria uocant, ut
inde exortis urinae difficultatibus resistat.
sagillata cum melle tollit. colore potu aut
illitu mutat in pallorem, suffitum cum uua
passa aut resina, uulvas purgat.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Graecè, ἄμμι.

Latine, Ammi.

Romanis Cuminum Alexandrinum, quidam Aethio-
picum cuminum id esse putant, alij regum cuminum ap-
pellant, plerique alterius naturae in totum existimant Ae-
thiopicum cuminum ab eo, quod uocatur ammi.

Officinis Ameos corruptè.

Germanis Ammey semen/ dicitur.

Lib. 6. Simp. Amos semen calidum siccum in fine ordinis tertij, tenuium partium, album, subamarum, acre, digerit, ur-
Lib. 9. c. ph. p. nam mouet. Ammi commendatur Illyricum, lib. 9. comp. phar. part. alij Aegyptium laudant. Nasctur & hoc
die in Germania nostra, & magna copia prouenit, sicut deinceps extirpari uix queat.

Coriandrum.

Caput LX.

Coriandrum aut corianum, uulgaris est notitiae, uim refrigeratori iam habens.
Quare illitum cum pane aut polenta, ignibus sacris, & ulceribus quae serpunt,
medetur. epinyctidas cum melle uel uua passa, testium inflammationes, carbunculosque
sanat. cum faba fresa, strumas & tubercula discutit. tineas interaneorum expellit
semen. cum passo potum. genituram adauget. largius tamen sumptum, mentem non
sine periculo mouet: quare continuo & copiosiore usu abstinendum. Succus cum
cerussa

Coriandrum.



LIBER TERTIVS.

21

cerussa spumæ argenti, necnon aceto & ro-
faceo illitus, ardentes summæ cutis inflam-
mationes emendat.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Κόριανδρον.
Latini, Coriandrum, Corianum, Corium.
Officinis Latinum nomen seruaui.
Germanus, Coriander/ Coleander.
Gallis Coriandre, dicitur.

Coriandrum essentie amarae habet plurimum, parum hu-
miditatis aquæ repenti, pauxillum astrictionis, à qua refri-
gerat, ut ab amarore calfacit: terget, digerit, tenuium est
partium, lumbricos necat: sed largus sumptum mentem ma-
net non sine periculo, ob id aceto maceramus: post sicca-
mus. Officinæ coriandrum præparatum vocant ita emaco-
ratum.

Hieracium. Cap. LXI.

Dens Leonis. Hieracium minus.

Hieracium.



B

Hieracium magnum, caulem e-
mittit asperum, subrubrū, spi-
nosum, caui: folia ex interuallis ra-
riusculè diuisa, similia soncho per
ambitum: luteos flores in oblongis
capitulis. Vim refrigerandi habet, &
modicè substringendi, unde illitum,
stomacho æstuant, inflammationi-
busq; prodest. succus erosionem sto-
machi sorbitione mitigat. herba cū
radice illita, uibratis à scorpione idi

bus auxiliatur. Hieracium parvum, folia ex interuallis habet, diuisa in ambitu: cau-
liculos teneros, uirētes, in quibus lutei flores orbem circinantes emicant. Vim suā
ad eadem ad quæ superior impendit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Hieracium Dioscorides in duo genera distribuit: maius scilicet & minus. Hieracium maius nusquā non

V 2

A in pratis emicat, Officina & herbarij Cichoream luteam aut croceam appellant, Germani ad Græcam alludentes appellationem, Babich Erant uocant, facie tota, præterquam flore, qui luteus conficitur, cichoreâ emulatur, namq; caulem emittit asperum, subrubrum, spiculis horrentem, intus cauum, folia ex interuallis rariuscule lacinata per ambitum, flore in oblongis capitulis luteo. Hieracium Græci uocant, quoniam accipitres scalpendo eam, succoq; oculos tingendo obscuritatem, cum sensere, discutiam. Hieraceum paruum Græcis ἡγῶν & ἡγῶν. Officinis dens leonis, quod folium sinuatim per lacinias denticulatum sit. Sunt qui Taraxacon, & Altaraxacon uocant, monachi caput, lactucam erraticam, & Sonchitem. Germanis Ralskraut / Pfaffenrödeln / Pfaffenplatt / Genszung / dicitur, folijs multis constat, utrinq; denticulatis in terra festilibus, cauliculis dodrantalibus, concavis, leuibus & enodibus, flore luteo, stipantibus in circuitum foliis coronato, qui senescens euanesceit in lanuginem, quæ cum aura raptim fertur, &c.

Apium hortense.

Apium. Cap. LXII.



Hortensis apij herba ad eadem ad quæ coriandum conuenit inflammationibus oculorum, cum pane aut potulenta illinitur, æstuantem stomachum mulcet, mammarum duritiam ex lacte concreto contractam reprimat, urinam ciet, siue crudū, siue coctum edatur. decoctū eius radiceq; potum, uenenorū noxæ resistit, quum uomitiones excitet, aluum cohibet, semen uehementius urinam pellit. cōtra serpentium uenena, aut epotam argenti spumam auxiliatur, inflationes discutit. admiscetur medicamentis quæ dolorū leuamēta præstant, theriacis quoq; ac tussis remedijs. Eleoselinum in humidis nascitur, satiuo grandius, & ad eadem

efficax Oroselinum, caule est dodrantē alto, ab radice tenui exeunte: per cuius ambitum rami & capitula cicutę, multo tamen tenuiora: semine cumini, oblongo, acris, & odorato, tenui nascitur in petrosis & montibus. Urinam ciet, semine ac radice in uino potis, menses trahit, antidotis, necnon medicamentis urinam cientibus & excocti factorijs inferitur. Nec hallucinari nos oportet, existimantes oroselinū esse, quod **B** in saxis prouenit, aliud enim est petroselinum. Petroselinum in Macedonia prouenit, in præruptis locis: semine ammi, odoratiore, sapore acris, aroma olente. Urinam ciet a mēstrua, cōtra stomachi & coli inflationes, & tormina prodest laterum, renū, & uesciæ doloribus in potu subuenit admiscetur antidotis urinam cientibus. Hippofelinum, Latini olusatrum appellant, aliqui smyrnion, quāuis aliud sit quod propriè smyrnion dicitur, ut paulo post referemus. Est autem maius & satiuo apio candidius: caule alto, cauo, molli, habente ueluti lineas: folijs latioribus, in puniceum uergentibus: coma rorismarini, florum plena, dependentibus in cacumine corymbis, antè quàm deflorescat, ea semine turget nigro, oblongo, acris, folido, aromatico, radix dimittitur tenuis, odorata, candida, quæ os commendat. In umbrosis & palustribus enascitur, olerum generis, ut apium, radix cruda coctæ uel estur, folia cū caulibus decocta manduntur, & per se aut cum piscibus præparantur, crudaq; muria condiuntur. Vim hanc habet, ut potu semine ex mulsio uino menses ciet, algætes calfacit potu aut illitu: urinæ stillicidio auxiliatur, radix eosdem præstat effectus.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Apium satiuum est, cuius rami largis portionibus per iura innatant, & in condimentis peculiarem gratiam habent. Quæ Plinij uerba nostrum uulgare petroselinum magis indicant, Germanis Peretlin / & Petersilien / Gallis Persil, appellatum.

Nostrum uerò uulgare apium, est Dioscoridis & Galeni Eleoselinum, hoc est, cum Gaza, paludapiū, quia in paludibus & secundum aque ductus nascitur. Græci ἡλεοςέλιον, Latini apium palustre, uulgo simpliciter apium, ut aliqui sentiunt. It. ali. tamen Macronem, aut Canneam uocare scribit Ruellius, Germanis Epffich / & Eppen. Brabantii Joffrowmerck. Galli Esgrun persil uocant, ut Ruellius arbitrat.

Petroselinum autem uerum ex Macedonia asperis & præruptis petendum, ut Galenus docet lib. 1. de antidotis, his uerbis: Petroselinum, id est, apium petrosum omnibus notum, in regione Macedonia præcipiti ne magna, laudatissimum nascitur, hoc est, acerrimum & amarissimum maxime si recens fuerit, sed parcum, a qua Estreaticum dicitur & Macedonicum. Plurimum uerò in Epiro gignitur, ex qua in Macedoniam exportatum, & propè totum in Thessalonien, inde tanquam Macedonicum à mercatoribus deuehitur: alioquin uersis gentibus non sufficit. Quo modo mel Atticum melle ex Cycladibus locupletant, proq; Attico uendunt.

pendunt: & uinum salernum in parua quidam Italiae regione parum genitum, sic ab indigenis adultera-
tur, ut in omni Romanorum imperio subditam regionem feratur.

Si autem Estreaticum & Macedonicum petroselinum desideras, nihil peior, sed minus amara erit theria-
ce, & alia antidotus, si alterum injicias. Non enim deleterijs pharmacis, aut uirulentarum bestiarum morfi-
bus adeo aduersatur, quod principalissima est theriacis promissum: sed id hydropicis, imbecillibus, & alijs
quibusdam similibus affectibus succurrit.

Petroselinum: Apium uulgare.

Ostrutium. Meysterwurz.



B

Pimpinella, Bibinell.



A

Hodie de petroselino etiam inter doctissimos parum cōstat.
Conrado Gesnero, Medico peritissimo, id uidetur, quod hodie
Ostrutium alij Imperatoriam uocant, in montibus & saxosis
uascens, figura apij, amarissimum acerrimumq; inter omnia a-
pij genera, quod Galenus de petroselino Macedonico et Estrea-
tico scribit: quod sanè nomen etiam ad Ostrutium accedit. Alij
Astrantium: quidam magis corrumpendo, Magistrantium uo-
cant. Easdem omnino uires nostrum de eo pollicentur,
quas de petroselino ueteres. Alpini ad omne morborum genus
quasi panacea utuntur. Germanis Meysterwurz dicitur.

Hieronymus Tragus, in uera cognitione simplicium nulli
secundus, aliam herbam pro ueterum petroselino nobis osten-
dit, uidelicet nostram uulgarem pimpinellam, quam Germani
Bibinell uocant, & hæc sanè non longè à legitima ueterum

A Paludapium, Wasserapfel.



petroselinum delineatione abscedit. quid uerò in tanta sententiarum varietate statuendum sit, doctioribus, et quibus plus ocij fuerit, iudicandum relinquimus.

Quod uerò Macedonicum petroselinum uulgo dicitur, est hipposelinum, quod olus atrum, seu pullum à Latinis appellari Hermolaus, Ruellius, Marcellus in Dioscorido inscripserunt à quod meus codex Graecus non habet, Galenus autem uerum Smyrnum ὁ λεγόμενος Ρομα ναοι iam consuetum scribit lib. 2. Aliment.

Hipposelinon.

Graeci ἵπποσέλινον.

Latini Hipposelinum olusatrum, ut diximus.

Officina Petroselinū Macedonicum. Germa. à magnitudine Grossi eppich/ uel Grossi eppf. Galli Meicheron Alexandri uocant.

Est et aliud genus apij λεγόμενον ὁ ἵπποσέλινον Graecis.

Paludapiū et palustre apium (ut uulgare apium) et Rusticum apium Latinis. Ger-

manis Wasser eph/ et Bauren eph dictum: nascitur in paludibus, et ipsa aqua, Apio hortulano maius, caule tenero, concavo, folio molli, raro nec hirsuto, simile apio sapore, floribus, semine et radice.

Sunt tamen qui genera apij ita distinguunt, uidelicet, ut primum apij genus, quod Dioscorides hortense appellat, nostrum uulgare apium sit, uulgo Eph et Eppich/ appellatum.

Eleoselinum uerò, de quo ultimo egimus, scilicet palustre apium. Germanis Wasser et Bauren eppich/ dictum.

Orcoselinum uerò arbitrantur hortulanum nostrum apium, Germanis Peterfilien/ Gallis Persil, dictum.

De Petroselino nihil certi constat.

Hipposelinum quartum genus apij erit, quod Officinis Petroselinum Macedonicum appellari falsò, supra monuimus.

Omnia haec Selinorum, id est, apiorum genera idem pollent tota, sed semine sunt potentiora, et in his praecipue Macedonicum calidissimum ordine tertio, &c.

Smyrnum. Cap. LXIII.

Smyrnion, quod in Cilicia petroselinum uocant, passim in Amano monte gignitur. caulem habet apij, & stolonum multos: folia latiora, subpinguia, ad terram infracta, robusta, odore medicato, cum quadam acrimonia, iucunda, colore in luteum languescens. capitibus caulium orbiculatis, ut anethi, semine brassicae, rotundo, nigro, acri, myrrhae sapore, ita ut alterum alterius loco cedat. radix quoque odorata, gustu acri, fauces mordet, succosa, mollis. cortex eius foris niger, intus uiridis, aut subalbidus. Nascitur in saxosis, & collibus, atque squalidis, & limitibus terrenis. Vis radice, herbae & seminis, excoctae. folijs muria maceratis ad obsonia utuntur. alium sistunt. radicem contra serpentium ictus bibere conuenit: tussis & orthopnoeas mitigat. urinae difficultati medetur. recentes tumores, collectiones, duritiasque discutit. illita, uulnera ad cicatricem perducit. partus abortu uiriat, si feruefacta subiiciatur. Semen, lienis, renum & uesicae uitijs prodest. menses & secundas perlit. commodè datur ischiadicis in uino. inflationes stomachi lenit. sudores ciet, & rictus. peculiariter datur hydropicis in potu, & contra febrium circuitus.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Proximè ad sententiam Dioscoridis Plinius Smyrnion depinxit, folia apij tradens habere, latiora, & maiora.

Ante circa stiones multos, quorum à sinu exiliunt pinguis, ad terram infiltrata, odore medicato, cum quadam
 acrimonia, iucunda, colore in luteum languesciente, capitibus caulium orbiculatis, ut apij, semine rotundo, ni-
 gro, qui arescunt incipiente estate. Si cuiquam tam celebres notulas libeat explicare, facile perpendet, eam esse
 herbam, quam nostri herbarij, Angelicam, & Sancti spiritus radicem, à suavisimo eius radice odore, quæ spi-
 rat: aut ab inmensa contra uenenis facultate, appellant, Germanis Angelic / Heilig geysts wurz / &
 Drust wurz uocatur. Duo huius plantæ inueniuntur genera. Vnum in hortis, hac specie uisitur, & Sam

Wido angelicæ.

Sam angelicæ.



angelicæ uocatur, &
 dix crassa est, et mal-
 ta, foris nigricans, in-
 tus candida, tuber in-
 ea quæ super terram
 eminet. Caulis ei foris
 culaccus, folium apij
 in aurei colorem lan-
 guescens, semen folia-
 ceum, laeum, nempe
 quod figura exile fo-
 liolū exprimit, in um-
 bellæ apio simili aut
 anetho: hoc mira fra-
 grat incunditate. Al-
 tera sylvestris in mon-
 tosis proueniens, odo-
 re illo suauis cum ra-
 dix, tum semen caret.
 Satius angelicæ, quam
 uerum esse Smyrni-

nō dubitamus, amice uenenis aduersatur, quam uim illi Dioscorides quoque
 tribuit, cum radicem eius contra serpentium ictus bibere docet. Pestilen-
 tiæ populatim seientis areet contagia. Corpora ab huius pestifera nimiditate
 si tantum, ut ad firmam, in ore teneatur. Per hanc ciceris magnitudinē
 cum uino, per æstatem ex stillatitio rosarum liquore sumpsisse satis est.
 Nec sensurum ea die contagione pollicentur, quæ quis deuorauit, nam urī
 na & sudore uenenum abigit.

Weiß Stenwurz.

Elaphoboscum. Caput LXIII.



Elaphobosco fœniculaceus caulis est, aut rorimari-
 no similis, geniculatus: folijs duum digitorū latitu-
 dine, ut terebinthi, prælongis, aliquantū alperis, circun-
 fractis, adnata multa habet, feretia umbellæ anethi simi-
 les, & semina eiusdē: florem subluteum: radice ternū
 digitorum longitudinis, & crassitudinis unius, cā dida,
 dulci, esui apta. Caulis tener pro oleo manditur: contra
 serpentium ictus, datur semen in uino. Fama autem est,
 hoc pabulo ceruas serpentium moribus resistere.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Paucis hodie cognoscitur elaphoboscon, etsi frequens ubique reperia-
 tur, Romani Cerui ocellum appellant. Officina Gallie simul & herba
 rij, ut rei ipsius nouæ, nouū indiderunt nomen, Gratia dei uocantes. Sues-
 sionensis ager, herbam copiam nominat, quod ea utantur ad uulsa, ru-
 pra. Nempe Gratia Dei, caule proslit fœniculaceo, geniculato, folijs ferme
 duorū digitorum latitudine, prælongis, subasperis, infractis. Adnata mul-
 ta caulis spargit, umbellæ anethi similes ostendentia, & semina eiusdē, flo-
 re subluteū, radice ternū digitorū lōgtudinis, et crassitudinis unius, cā dē
 dā, dulci, apta cibo, Dioscoridis pictura ad ungū profectō representat.

A nulla reclamante nota, herbam quam modò diximus tam insigni nomine Gratiam dei uocari, fortè ea quæ ibi
die Weiß Hirtzwurg Germani uocant.

Fœniculum. Cap. LXV.



Fœniculum si herba edatur, aut semen cum pitas-
na bibatur, mammas lacte replet. comæ decoctū
in renum doloribus subditum proficit, quippe quod
urinam excitet contra serpentium ictus in uino cōue-
nienter bibitur. menses ciet. in febribus nausæ & sto-
machi feruorem, ex aqua frigida potum, sedat. contri-
tæ radices & cum melle illitæ, moribus canum medē-
tur. Succus caule & folijs exprimitur, & in sole sicca-
tus, in medicamenta adhæritur, quæ ad excitandam ocu-
lorum aciem commodè temperantur. Extrahitur suc-
cus ad eadem ualens, etiam semine uiridi, ramulisq; et
radicibus prima germinatione incisis. In lberia quæ
ad occidentem spectat, succum reddit gummi similē.
Caulē medium, dum herba flores, uisici de metu ut-
igni; admovent, quò facilius uī caloris exudans gum-
mi remittat: quod efficacius succo est, ad medicamen-
ta oculorum.

Hippomarathrum.



NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis Μαράθρον. Latinis, Fœniculum. Marā-
thrum. Officinis Latinum nomen seruauit.

Germanis, Fenchel. Gallis du fenouil.

Fœniculus calidus ordine tertio, siccus primo, semine
magis quàm radice, minus folijs, quibus lac gignit, ut illis
urinas, & menses magis ciet. Cortex radictis in usu est fre-
quenti, lib. 8. comp. phar. par. μαράθρον & quoy per lo-
ubiq; scribit Actuarius, id est, marathri semen.

Fœniculum erraticum, siue Hip-
pomarathrum. Cap. LXVI.

Est & syluestre fœniculum, magnū. fert
autem semē cachryi simile, cuius radix
iucundè olet, potaq; stranguariæ medetur.
menses imposita ciet. uentrō sistit, radice aut
semine potō contra serpentium morsus au-
xiliatur, calculos comminuit, regium mor-
bum

bum expurgat. lactis abundantiam facit. decoctum foliorum haustum. feminas à partu purgat. Traditur aliud hippomarathri genus, longo, exili, & angusto folio, semine coriandri, rotundo, acri, & odorato. Excalcificandi naturam habet, & uiribus fœniculo respondet. ad omnia infirmius.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, *ἡ πικρά γὰρ πορ*. Latine, Fœniculum sylvestre.

Officinis incognitum. Germanis, Wilder Fenchel / Roffenchel.

Gallis fœnol bastard, dicitur.

Satiuo procerius est, brachiali crassamento, folijs etiamnum maioribus, semine miliaceo, radice alba, odorata, in apricis, & petrosis inuenitur.

Diocles alterum sylvestris fœniculi genus, Dioscoridi *ἡ πικρά γὰρ πορ* & *ἡ τρυφή* dictum, longo & angustio folio, semine coriandri representauit. Medicina cum eo genere priore communis, uerum inferioris operæ.

Daucum.

Caput LXVII.

DAUCUM aliqui Daucium uocant. Creticum folijs fœniculo simile, minoribus & tenuioribus: caule dodrantali: umbella coriandri: flore albo: semine acris candido, hirsuto, suauissimi odoris in mandendo. radix digitali crassitudine & dodrantis longitudine adolefcit. in saxosis nascitur, & locis sole illustratis. Aliud eius genus syluestri apio simile, acre, odoratum, aroma olens, feruentis gustus. Probatissimum Creticum. Tertium assignatur genus folijs coriandri, floribus albis, capite & semine anethi, muscario pastinacæ: semine oblongo, ceu cumini, acris. Oportet semen excalcificat potum. urinam, menses, & partus extrahit. torminibus liberat. ueterem tussim mitigat. phalangiorum moribus potum in uino auxiliatur. tumores illius discutit. Seminis duntaxat in alijs generibus inualuit usus. in Cretico, etiam radicis, quæ maximè contra uenenatorum iniuriam, in uino bibitur.

Daucum.



NOMINA ET EXPLICATIO.

Daucus genera tria: Creticum Latinis, Gallica pastinaca dicitur, uulgo (falsò tamen) sylvestris carota, in Officinis principem retinet appellationem, ea namq; caule assurgit pedali, folijs fœniculi, sed candidiusculis minoribusq; coriani muscario, in quo semen hispidum, milij ferè capacitatis, album, feruens, acre, odoratum, radice digitali crassitudine, bipalmo longa, in apricis petrosisq; nascitur. Germanis Vogels nester / Seld mozen dicitur. Alterum ubiq; provenit, præcipuè in terrenis, limitibusq; & pingui solo, apio simile, feruens, acre, & gustanti odoratum.

Tertium genus pastinacæ non dissimile, opacante fastidium anethi umbella, semine oblongo, odoratu graui, sapore, ut cumini, acris: utrunq; genus asininum daucum herbarijs audio uocari. Galen. & Paulus daucum nihil aliud esse uoluerunt, quàm staphylinum sylvestrem. Hippocrates daucum Aethiopicum laudat. Daucum refert Galenus agros sem pastinacæ nonnullis nominari.

Delphinium.

Caput LXVIII.

DELPHINIUM surculos emittit à radice una sesquipedales, aut maiores, à quibus folia exeunt parua, tenuia, diuisa, prælonga, quæ delphinorum effigiem representant: unde tractum nomen est. flos uiolæ albæ non dissimilis, purpureus: & semen in siliquis milio proximum, quo non aliud utilius bibi potest ab scorpiione percussis. Aiunt enim obiecta herba scorpiiones resolui, atq; ignauos torpescere: semota uerò ea, sese recolligere. Prouenit in asperis & apricis. Alterum est delphinium.

Aphinium, quod Romani buccinum uocant, superiori simile, sed folijs & ramis longè gracilius. Viribus eisdem pollet, sed non ita efficacibus.

Filius ante patrem.
Buccinaria.

Herbarij quidam Delphinium esse putant, quam filium ante patrem, uulgo appellant, quòd siliquam & in totum semen ante floris exitum ostendat, rectius si partus ante conceptum, ab eis appellaretur. Iam audio aptius ab teretis siliquula per extremum in expansum florem exeunte, buccinariam, quadam similitudine dici, siquidem ea surculus à radice una pedalis funditur, folijs paruis, tenuibus intersectis, incuruis, longiuscula delphinis effigie, flore uioleæ matronalis, subpurpureo, semine in ualuis teretibus exiguo, nullo non dissimili. Inuenitur frequens in asperis, & locis totius dici solem excipientibus.

Pyrethrum. Cap. LXIX.

Sylvestre Pyrethrum.

Capitaceum, alijs.



Pyrethrum saluarem uocant, folia caulemque emittit ut daucum sylvestre & feniculi: umbellamque anethi, circinarum rotunditatis. radix longa est, pollicis crassitudine, gustu feruidissimo. Pituitam elicit, ideo in dolore dentium, decocta in aceto, colluto inde ore, auxiliatur. mansapituitam extrahit. sudores ciet, peruncto ex oleo corpore. diuturnis horribilibus efficacem contra perfrictiones membrorum, resoluonesque eximie conducit.

NOMINA ET explicatio.

Græcè, Πύρεθρον.

Latine Pyrethrum, à feruido sapore dicta, & Saluaria.

Officinis genuinum nomen seruauit.

Germanis, Bertram / Speydel wort. Gallis pes Alexandrinus, dicitur.

Pyrethrum ab ignea, urenteque, uidebitur, quia mansu saluam potentius, quam pro caloris modo elicit: unde

& saluaria quoque, Latine dicitur, ut Dioscorides testatur: in Apennino frequens, annis quinque seruatur & effectibus omnibus frigidis efficax.

Rosmarinus. Caput LXX.

Duo rosmarini genera. unum scædum frugiferumque, cuius semen cachrys uocatur folia feniculi habet, crassiora & latiora. in rore speciem, humi sparsa, iucunde olentia, caulem cubiti altitudine, aut maiorem, multis concuum alis: in cacumine umbellam, in qua semen copiosum, candidum, sphondylion simile, rotundum, angulosum, resinaceum, quod in mandendo linguam exurit. radix thus redolet, candida, prægrandis. Est & alterum omnino consimile, semen ferens latum, nigrum uti sphondylion, odoratum, minime exurens, radice foris nigra, intus si frangatur, alba. Verum id quod sterile dicitur, illorum planè similitudinem refert: sed neque caulem, neque florem, neque semen promit. nascitur in saxosis & asperis. Trita omnium herba communiter hæmorrhoidum profluuiâ sistit. sedis inflammationes & cœdylomata mitigat. concoquit strumas & abscessus, qui ad maturacionem ægrè perducuntur. Sicæ radices cum melle ulcera purgant. torminibus medentur cum uino potæ.

pōta. & contra serpentium morsus conueniunt. menses & urinas cient. vterest tu- A
mores illitu discutiant. Tam radicis quā herba succus adiecto melle illitus, o cu-
lorum aciem exacuit. Potum semen ad eadem pollet. si comitale malum sentiat, ur-
aut uetus pectoris uitium, auxilio est. regio morbo laborantibus cum uino & pipe-
re datur, sudores mouet, cum oleo perunctum. ruptis & conuulsis prodest. poda-
gris, cum loliacea farina & aceto tri-

Schwarz Singswurz.



tum, illinitur. purgat utiligines, addito aceto
quā acerrimo. Semine in potonibus uten-
dum, eius quidem quod Cancryn nō ferat,
quippe illud sua acrimonia arteriam exasper-
rat Rosmarinum cum erica nasci, folijs lactucę
syluestris amarę asperioribus, candidiori-
busq; radice breui, Theophrastus autor est,
potuq; idipsum alterutra parte purgare. Can-
chrys uim habet ex calfaciendi, & uchemēter
exiccandi, quare abstergentibus medicamen-
tis inferitur. contra oculorum fluxiones capi-
ti illinitur, ita ut tertio die soluiatur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Libanotis siue rosmarini, Dioscorides tria genera fa-
cit. Vnum sterile, hodie nobis planē incognitum. Alterum
secundum, quod duplex est, alterum est, cuius semen can-
chrys dicitur, sceniculi folio, crassiore, orbiculato, in terrā
iacente, et ule cubitali, aliquando etiam maiore, stolonibus
multis, quorum à capitibus umbellę gestantur, seminis ple-
ne candidi & spondylii similis, rotundi, angulosi, gustu acu-
to, resinacei, accendentis os cum manditur. Radix alba ma-
gnitudinis iustę, thus redolens: & hoc genus (quod equidē
sciam) hodie prorsus nulli cognitum. Alterum simile supe-
riori per omnia, sed lato semine atq; nigro, spondylii imi-
tante, odorato, neq; feruenti, radice foris atra, intus si fran-
gatur, albida, hec est quam Germani Schwarz Sings-
wurz appellant, à radice nigra. Eius picturam hic exhibe-
mus, B

Rosmarinum coronarium.

Caput LXXI.



Rosmarinum quo coronarij utuntur, ramos mittit te-
nues, & circa eos folia minuta, densa, longa, exilia,
subter incana, supernè uirentia, grāui odore. Excalfacto-
ria ui præditum est. regium sanat morbum, si decoctum in
aqua, ante exercitationes bibatur: & ubi laborans exer-
citationi se crediderit, in balnea discendat, & merum potet,
ac opis, gleucinoq; unguento admisceri solet.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Λιβανotis & ὀβανωζελωξή. Latine, Libanotis coronaria.

Officinis Rosmarinus. Germanis, Rosmarin.

Gallis Rosmarin, dicitur.

Libanotis ea quam Romani appellant Rosmarinum, & qua nectentes co-
ronas utuntur, in exilibus uirgis solum fert tenue, crebrū, oblongum, & gra-
tile, intus candicans, & extrā uiride, odore grāui, quo Narbonensis prouin-
cie tractus adeò scatet, ut haud temerè lignum aliud urant. Apud nos arces
hortorum, eleganter topiario conuectit opere, utilis folio & flore, quem uul-
gus absoluit & uel & malè uocat. nec antidotus dicitur & actuarij solius
Rosmarini florem recipit, sed & aliorum.

Spondylium.

Caput LXXII.

Spondylium

A



DIOSCORIDIS

Spondylium folia quadantenus platani & panacis habet. caules sceniculaceos, cubitali altitudine, aut amplius, assurgentes, in quorum cacumine semen duplex, se-
feli simile, sed latius, candidius, & magis paleaceum, gra-
uis odoris. flores eius albi, aut pallentes: radice rapha-
ni, candida nascitur in palustribus & aquosis. Potum se-
men pituitam per aluum extrahit. medetur iecinoris ui-
tijs, regio morbo, comitialibus, orthopnoicis, uulvarum
strangulationi. ueternosos suffitu reuocat. cum oleo com-
mode infunditur capitibus phreniticorum & lethargi-
corum. item capitis doloribus. cum ruta illitum, serpen-
tia ulcera cohibet. Datur radix contra regium morbum
& iecinoris uitia: circumrassa eadem & iniecta, callos fi-
stularum derodit. Recentis floris succus exulceratis auri-
bus, purulentisq; accomodatur: qui ceterorum succo-
rum more exprimi, dein recondi solet.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Grecè, Σπονδύλιον. Latinis Spondylium, & Spondylion.
Officinis Ostrutum, Adrens, Magistrantia. Germanis, Mysterwurz.
Gallis P. austruce, dicitur.

Hanc plantam, quam uerum spondylium esse non dubitamus, etiam uiri docti miserè distinxerunt, ut tan-
dem inuenirent, cui caput uerum Dioscor. rectè aptari possit. Alij enim, ut suprà ostendimus, hanc uerum esse
petroselinum Macedonicum contendunt, alij Lascepitum Germanicum, alij pro uero Smyrno habent. Sunt
& alij, qui hanc ad Panaces Dioscoridis referunt, ex Panacis adprobantes descriptionibus, ex odore, succo
& gummi, quæ omnia Panacis radicibus conueniunt, sed facile erroris conuincuntur, si ad legitimam delinea-
tionem spondylii conferatur, nulla penitus reclamante nota. Adde quòd easdem omnes uires ualguis nostrum
de hac pollicetur, quas de spondylion ueteres, atq; hoc loco Dioscorides describit.

B

Peucedanum.



Ferula. Caput LXXIII.

E Viridi ferula medulla pora, utilis est ad eru-
tas excreationes, celiacosq; contra uiperarū
morsus in uino datur. erumpentem naribus san-
guinem indita sistit. semen potum torminosis au-
xiliatur. sudores ciet, uncto ex oleo corpore. Cau-
les, si edantur, capitis dolores faciunt. mutua con-
diuntur. Ferula itaq; caulem proferit ternum sa-
pe cubitorum: folia sceniculi, longè asperiora & la-
tiora: qua ab imo caule uulnerata sagapenum ef-
ficitur.

Calidis Ferula nascitur locis, atq; trans maria: hodie planè in-
cognita.

Peucedanum. Cap. LXXIII.

Peucedanum caulem emittit tenuem, gracilem
tum, sceniculo similem. comam habet statim
à terra foliosam, spissamq; flore luteo, radice ni-
gra, crassa, plena graui odore, succosa, gignitur in
montibus opacis. Tenera radix cultello concidi-
tur, profluensq; è plaga succus umbræ mandatur:
in sole siquidem confestim euanesceat. Colligitur
capite prius & naribus rosaceo perfusus, ne capi-
tis dolor premat, & uertigo sentiatur. assationi ra-
dix inutilis fit. Tam lac quàm succus radice & cau-
libus extrahi solet, sicuti è mandragora: uerum in
efficacior succo lachryma habetur, & uelocius
expirat. Interdum etiā concreta inueniuntur lachry-
ma.

ma, thuris similitudine, caulibus radicibusq; adhærens. Præfertur succus è Sardinia A
& Samo thrace, colore rufo, odore graui, feruens gustu. Ex oleo & rosaceo illitum
peucedanū prodest lethargicis, phreniticis, uertiginosis, comitialibus, & longis ca
pitis doloribus, resolutis, ilchiadicis, conuulsis, omnibus in uniuersum uitijis neruo
rum, ex oleo & aceto illitu, prodest. eius olfactu respirant uuluz stragulatus, & ue
ternosi reuocantur, incensum serpentes abigit, aurium doloribus cōuenienter ex ro
saceo instillatur, cauernis dētium inditum, mitigat dolorem, contra tussim efficacis
simè ex ouo assumitur, suspirijs, torminibus & inflationibus subuenit, uentrem leni
ter emollit, lienem absūmit, difficiles partus mirè adiuuat, faciat uesciæ cruciatus,
& renum distentiones potum, uuluum aperit. Radix ad eadem utilis est, sed ineffica
cior, eius decoctū bibitur, farina eius sordida ulcera purgat, & uetera cicatrice ob
ducit, squamas ossium extrahit, in cerata & calfacientia malagmata additur. Radix
eligi debet recens, quæ cariem non sēserit, firma, odoris plena. Succus ad potiones
amaris nucibus aut ruta aut pane calido aut anetho resoluatur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, *πρυκιδάριον*. Latine, Peucedanum. Officinis genuinum nomen seruauit.
Germanis, *Harstang* / *Sewfenchel*. Brabantis, *Verckens* uencl el dicitur. Peucedani radix ca
lida ordine secundo, siccata tertio: incidit, tenuit, digerit, affectibus neruorum frigida, lieni indurato, pulmon
fario, piuitie crasse, lentæ, ulceribus contumacibus auxilio est. Succus ex hac expressus uiolentior est. Gal. lib. 9. simp.

Gith, seu Melanthium.

Cap. LXXV.

*Nigella Damascena.**Nigella ungaris.*

A

Pseudomelanthium.



his diebus sumptum. & lac extrahit. difficultatem spirandi cum uino potum leuat. phalangiorum moribus ex aqua drachmæ pondere hauitum auxiliatur. incenso serpentes fugantur. Tradunt largius epotum enecare.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis, Μελάνθιον. Latine, Melanthium, Gith, Nigella.

Officinis, Nigella Romana.

Germanis, Schwarz Römisch wolteichend Coziander/Schabab.

Gallis poiurette, à piperis sapore Nielle, ou nigelle poiurette.

Melanthium est Gith, quamuis flore sit ex cerulco albicante, semine nunc nigro, nunc rufo: calidum siccum tertio gradu, tenuium partium, amarum, assiduo olfactu catarrhos sanat, orthopneam iuuat, lumbricos necat, lepras tergit, menses obcrasit, & lentorem retentos mouet.

Que uero in segetibus altius adolescit, Nigella uulgo dicta, Germanis Ratten / inodora, pseudomelanthium, & Githago uocari possit.

B

Laserpitium, & Laser. Caput LXXVI.

* Intinctibus.

Laserpitium in Syria, Armenia, Media, & Libya nascitur, caule ferulaceo, quem maspetum uocant: folijs apio similibus, lato semine. Radix exalfacit. in cibis ægre concoquitur, uesciænoxia. sugillatis illita cum oleo, & strumis, ac tuberculis cum cerato, medetur. ischiadicis conuenit cum irino aut cyprino cerato. ex crescentibus circa sedem tollendis illinitur, cum putamine mali punici, & aceto decocta. uenenis pota resistit. os commendat. cibis* aut sali permista. Laser è radice atq; caule scarificatis colligitur. præfertur autem rufum, translucens, myrrha æmulum, non porraceum, odore ualens, suauis gustu, quod dilutum facile albescit. Cyrenaicum si quis degustarit, humorem toto corpore ciet. blandissimo odore, adeo ut ne os quidem gustanti nisi paululum spiret. Medicum & Syriacum minus uiribus ualent, & magis uirosum reddunt odorem. Laser omne antequam siccescat adulteratur sagapeno, aut fabæ lomento, quod maleficium deprehenditur gustu, odore, uisu, & dilutione. Caulem aliqui silphion, radicem magadarin, & folia maspeton uocauere. Efficacissimum laser, mox folia, postremo caulis. Acem uim habet. inflationes facit. perunctas cum aceto, pipere & uino alopecias sanat. oculorum aciem exacuit. incipientes suffusiones, illitum cum melle, dissipat. cauernis dentium in dolore inditur, aut cum thure in linteo circumligatur, aut cum hyssopo, ficis coctis in posca, os colluitur. ijs prodest, quos bestia in rabiem efferata momorderit, uulneribus immisum. ualet aduersus uenena telorum, & animalia omnia, quæ uirus ei aculantur, potum aut illitum. scorpionum plagis oleo dilutum circumlinitur. gangrænis præcoërcitis immittitur: & cum ruta, nitro & melle, uel per se, carbunculis. clauos callosq; prius circumrasos uellit. cerato aut aridorum ficuum carne præmollium, recentes lichenas ex aceto sanat. & ex crescentia in carne. polyposq; si aliquot diebus cum atramento sutorio, aut æruginè illinatur. extuberantia cum forfice extrahit. Venteribus faucium scabritijs opitulatur. graue, subitoq; irrauescentem uocæ, dilutum aqua, sorbitione confestim expedit. uua illitum cum melle reprimit. anginis ex aqua mulla

multa utilissimè gargarizatur. uescientes lætiore colore mangonizat. tussis commo- A
dè in forbili ouo datur, & pleuriticis, in forbitionibus: infellis suffusione, & aqua
inter cutem, cum aridis ficis, horrores discutit cum uino, pipere, & thure potum.
neruorum contractionibus, opisthotonicisq; datur oboli pondere deuorandum.
hærentes gulæ hirudines, gargarizatum cum aceto decutit. ad lac intus coagulum
bibitur. comitialibus ex aceto mulso proficit. menses ciet, cum pipere & myrrha
potum celiacos adiuuat, in acino quæ sumptum. cum lixiuo autem potui datum,
repentè conuulsis ruptisq; prodest. ad portiones resoluatur, nucibus amaris, aut ru-
ta, aut calido pane. Foliu succo ad eadem proficitur, sed multò inefficacius. cum
aceto mulso manditur, ad expediendam arteriam, maximè cum uox retunditur. eo
cum la Fucus utuntur, exitq; in uicem erucæ. Fertur & altera magudaris in Libya na-
sci: radix laferpitio similis, sed minus crassa, acris & fungosa, ex qua non profluit
succus: eiusdem cum lafere facultatis.

NOMINA ET EXPLICATIO.

ὄντος liquor est, crassum illud & lētum, quod ex uulnere effluit, uel radice incisa, qui inde ὄντος dicitur:
uel caule etiam usq; ad medullam secto, terebrato, castrato, qui ὄντος dicitur, altero puriore, & perluci-
diore, specialius tamen, & per excellentiam ὄντος, Cyrenæicus & Medicus, & Syriacus intelligitur, qui o-
mnes caliditate & tenuitate exuperat: ob id omnium maximè digerit per halitum, quamquam reliqui liquo-
res sint multum calidi, & spirituosi, & plurima horum pars essentia aeris, & ignea. ὄντος tamen, d' ὄ-
ντος, ὄντος, & acis sepe confunduntur, & Latinis succus, lachryma, liquor. Præstantissimus autem ex A-
phrica est, Cyrenæicus Galeno, Indicus & Armenius Mesue: imbecillior Medicus & Syriacus: uterq; enim
uirus, & putrilaginem respiciens, ut & Parthicus, & Persicus. Est autem laferis seu laferpitij seu Silphij her-
be liquor. E Tabrobana maris Indici, insula omnium maxima, conuehi hodie præstantissimum, Beizoy uulgo
dictum, scribit Ludouicus Romanus patricius. Opus Cyrenæicus est saluberrimus phlegmonæ, Gargareonis,
& aliarum partium, non incipienti, sed ueterate, & in scyrrum duræcenti. Est enim acerrimum & maxi-
mè calfaciens medicamentum.

Sagapenum.

Caput LXXVII.

B

Sagapenum ferulaceæ herbæ succus est, quæ in Media nascitur. Optimum est,
stranflucens, fuluo forinsecus colore, & intus albo, nescio quid inter lafer & gal-
banum redolens, gustu acri. Prodest laterum & pectoris doloribus, tussibus uetu-
stis, conuulsis & ruptis. crassam pulmonis pituitam expurgat. datur comitialibus,
opisthotonicis, lienosis. item contra neruorum resolutionem, perfrictiones, & feбри
um circuitus* in potu. in unguenta probè admittitur. menses pellit. sed fœtum exa-
nimat, cum hydromelite potum. prodest ex uino haustum, serpentium ictibus. olfa-
ctum ex aceto uuluarum strangulatus excirat, oculorum cicatrices, offusam caligi-
nem, hebetudines, suffusionesq; detergit. Resoluitur ut lafer, ruta, aqua, & amaris
nucibus, aut melle, aut calido pane.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Sagapenum est frutex ferulaceus, seu ferula similis planta, lib. 8. simp. seu ferula quædam panaci similis,
lib. 1. antid. in Media regione, & abusuè ex ea succus: qui etiam ὄντος & ὄντος dicitur, lib. 1. antid. ca-
lidus, tenuium partium, ut alij opij, seu liquoris: modicè terget, oculorum cicatrices purgat, & terget, suffu-
siones, & oculorum hebetudines à crasso humore leuat. Laudatur preluendum, foris rufum, intus candidum,
acre, odore porri, seu medio inter laferis liquorem, & galbanum, quibus adulteratur. Opopanaci enim nichil
est simile, sed galbano albiori. Nam spumosa coherens, albior, leuiusq; pars galbani in Sagapenum degenerat:
pars altera densior, & multò quàm aliud galbanum constrictior, fit Galbanum optimum, Sagapenum respici-
ens, eaq; tanquam præstantissima utendum lib. 1. antid. Si uerum est, uino aut aqua statim dissoluitur, adulte-
ratum non liquefit.

Euphorbium.

Caput LXXVIII.

Euphorbia Libyca arbor est, ferulæ speciem habens, quæ in monte Atlante* Alij, Tmol:
iuxta Mauritaniam, inuenitur. ea acerrimò succo turget. cuius eximium feruo-
rem expauescentes incolæ, ouillos uentres elutos arbori circumligant, & eminus cau-
lem contis incidunt, confestimq; è plaga, perinde atq; uale quodam, in uentriculos

A copiosus lactis humor effluit, præter id quod humi sparsum, uulnus ei aculatur. Duo succi genera. Vnum orobi magnitudine, sarcocollæ modo emicat: alterum in uentriculis concrevit, atque uitreum spectatur. Eligendum est translucens, & acre. Euphorbium adulteratur sarcocollæ & glutini mixture, sed difficile quidem experimentum: quippe cum leui gustu, os ac lensum diu detineat, adeo ut quicquid ostibijciatur, planè euphorbium respiciat. eius inuentio tempore Iubæ regis Libyæ cognita extitit. Succus illius suffusiones discutit, potius tota die exurit, quare melli colorisera potione haustus, squamas ossium eadem die eximit. uerum eo utentes, necesse est linamentis aut ceratis communire corpus quo ossa conuestiuntur. Aliqui memoriæ prodiderunt, percussos à serpente nihil molesti passuros, si incisa osse tenus capitis cute, intritus succus infundatur, uulnusque postea consuetur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Euphorbium & Euphorbia arbor, unde liquor emanat, qui ex occidentis regionibus affertur, ut Sagapenum ex orientalibus, lib. 3. comp. phar. gener. Euphorbium liquor est stirpis cuiusdam spinosæ in Maurusiorum terra provenientis, in uentre cuius reponitur, quoniam hunc solum non erodit. Bimum aut trimum mediocre uiribus adhuc est (talique utitur Galenus lib. 1. comp. pharm. part. in alopecia) interdum & quadrimum. Quarto autè uel sexto anno exoluitur, deinde procedente tempore in totum elanguescit, Gale. ne putes cum uulgo annis decem posse seruari: etiam cum milio, lentibus, fabis; Adulteratur lacte caprino, sarcocollæ, glutino, id igni iniectum odorem edit fastididum. Pituitam purgat Euphorbium, à Iuba rege inuentum, ab Euphorbo suo Medico, Antonij Mæse fratre, uocatum, sed magis aquam. Euphorbium cum Mastiche, & tragacantho coctum in pane dedit in morbo Italico Manardus, & sine manifesta noxa iuuat. Cum melle tantum Dioscorides quoque accedit, Auicenna tres obolos. Serapion duos.

Galbanum: Caput LXXIX.

I Galbanum succus est nascentis in Syria ferulæ, quod nonnulli metopium uocant. Maximè laudatur cartilagosum, merum, thuris effigiem præbens, pingue, minimè lignosum, retinens non nihil adiecti seminis & ferulæ, graui odore, neque ualde humidum, neque nimis aridum. Adulteratur faba fresa, resina & ammoniaco. Galbanum exal facit, urit, extrahit, discutit, menses ac partus trahit, appositum uel suffitum, lentigines aceto & nitro perunctas tollit, deuoratur ad tussim ueterem, diffcultatem spirandi, suspiria, rupta, conuulsa, aduersatur toxicis, potum cum uino et myrrha, simili modo lumpum mortuos partus extrahit, imponitur lateris doloribus, & furunculis, comitiales & uulnæ strangulatus, & uertiginosos olfactu fuscitatus si uratur, fugat nidore serpentes, & perunctos feriri non patitur, serpentes cum oleo & sphondylo circumpositum, necat, dentium dolorem oblitum, aut cauernis inditum, mitigat, urinæ difficili prodesse existimatur. Resoluitur ad potiones amaræ nucibus, aqua, aut ruta, aut calido pane, mulsaue: aliàs meconio, ære uiso, aut felle liquido. Si purgare galbanum uoles, in feruentem aquam demittito, namque cum liquefactum fuerit, eius sordes fluitabunt: quas hoc modo facile separabis: munda linteo raroque alligatum in fictili aut ærea pyxide ita pendeat, ut imum uasis ne tangat: operitoque uase in feruida aqua demittito: sic enim syncerum, ueluti petecolum eliquescet, & lignosum in linteo remanebit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Galbanum liquor ferulæ Syriacæ, seu plantæ ferulacæ in Syria frequentis, calidus in fine ordinis secundi, aut principio tertij, siccus multo secundi: mollit, digerit: addit Dioscorides, trahit, urit. De hoc pauca supra in Sagapeno. Laudatur purum ligno, aliquid tamen seminis mistum habens, odore graui, sapore abominabili, humidi & sicci medium, pingue, & in ammoniaci aut thuris similitudinem carti: agnosum Eius obolos tres misceat Andromachus arteriacæ 12, alteri drachmæ sex, lib. 7. comp. pharm. part. Purgandi eius sordibus ratio Dioscoridi traditur. Viuitur resina, faba fresa, Hammoniaco, ut idem Dioscorides testatur.

Ammoniacum. Caput LXXX.

Ammoniacum ferulæ succus est, quam iuxta Cyrenem Africa gignit: cuius fruticem cum radice agafyllim uocant. Probatum bene coloratum, ligni & calculorum

calculorum expers, thuris similitudine, minutis glebis, densum, syncerū, nulla for-
de spurcatum, castoreum odore imitans, gustu amarum. hoc genus thrausma, id est,
frituram appellant: quod uerò terram & calculos collegit, phryama. gignitur in
Aphrica iuxta Ammonis oraculum, succum stillante ferulacea arbore. Mollit, ex-
trahit, calfacit, tubercula duritiasq; discutit. potum, aluum soluit, partus extrahit.
lienem consumit, drachmæ pondere* hautum, articularum coxendicumq; dolori-
bus liberat, auxilio est anhelatoribus, orthopnoicis, comitialibus. item quibus hu-
mor in pectore coit, si cum melle delingatur, aut cum ptisanæ succo sorbeatur. cru-
entam urinam pellit, albugines oculorum absterget. genarum scabritiam absumit.
tritum autem cum aceto, & impositum, iecinoris lienisq; duritias sedat. discutit ro-
fos, qui in artubus concalluerunt, cum melle aut cum pice illitum. lassisitudines & co-
xendicum dolores eo perungi utile est, cum nitro & cyprino oleo, uice acopi.

Hammoniacum, seu Ammoniacum Galbanum, emollium, mitigant, emplastica sunt, ut opopanax, sed illis
ualentius, Gal. lib. 10. simp.

Sarcocolla. Caput LXXXI.

Sarcocolla, lachryma est arboris in Perfide nascentis, pollini thuris similis, ru-
fa, gustu amara. Vulnere glutinat, oculorum fluxiones inhibet. emplastris inferi-
tur. Adulteratur admisto gummi.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Sarcocolla, quod carnem glutinet, Græcè dicta, tanquam sit carnis colla. nam uulnera glutinat, & sine
morsu siccatur. Albanæ ruse præfert Plin. & anni nigrescere scribit. primo gradu circiter calida uidetur, nā
Dioscoridi subamara, Plinio cum quadam acrimonia dulcis. Galen. emplastica, & parum amara dicitur, sic
eans sine morsu. Ophthalmias discutere expertus est Manardus, ubi hæc consiliterunt, initio enim cum uino
fluxiones oculorum sistit, Dioscor. & Plinio. Sarcocolla ueteres tantum foris usi sunt: purgatricem uim, ut
Medici Arabes, non dederunt, quæ etiam hodie parum est cognita. Si purgat & uentriculo est noxia calido,
impinguare uidetur tantum per accidens: uacuitatis scilicet excrementis, probam nutritionem impediendi-
bus, id quod alijs purgantibus est commune: sed dum correcta est lacte asinino: calida humida euadit, ob id
semen augere, & promouere potest. Hanc dies quinq; asinino lacte indies mutando macerant. post aqua ro-
sarum dissolunt, ut castigent.

Glaucium. Cap. LXXXII.

Glaucium, succus est herbarum quæ ad Hierapolim Syriæ nascitur, folijs ferè cor-
niculati papaueris, pinguioribus tamen, in terram sparsis, odoris tetri, gustus
amari, tota croceo succo madet. Folia in olla fictili semifrigidis clibanis calciant
indigenæ, usque dum flaccescant, deinde contusis succum exprimunt. cuius est usus
ad oculorum medicamenta, ut potè cum inter initia refrigeret.

Quantum hic succus differat à succo Papaueris corniculati, hic docet Dioscorides, & succum extrahendi
rationem, Græcis in usu multo & Arabibus, nunc ignoratur: ualenter astringit, & insigniter refrigerat.
Officina Barbaro nomine Memiche appellant.

Glutinum. Cap. LXXXIII.

Glutinum, quod xylocollan, alij taurocollan uocant, præstantissimum Rho-
diacum, quod ex bubulis corijs conficitur, id candidum est & translucens. Ni-
grum uerò minus probatur. Resolutum in aceto, impetigines leprasq; cutis delet.
ambustis igni ex aqua calida dilutum illitumq; pustulas erumpere non patitur. uul-
neribus prodest, melle aut aceto madefactum.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Glutinum, siue Gluten, Germanicè Leim. Gallicè non aliter quàm Græco uocabulo colla dicitur. Præstan-
tissimum est ex auribus taurorum & genitalibus, sed adulteratur nihil æquè, quibusuis pellibus inueteratis et
decoctis, Rhodianum uerò Dioscoride teste fidelissimum, eoque medici & pictores utuntur. Lignosum impro-
batur. Contexti par est & reliqua glutinum genera, Auro glutinum est santeria, ferro argilla, aris musis
cadmia, laminis alumen, stagnum erantentis, stagno argentum, marmori & plumbo resina, plumbum nigrum.

A albo, album ipsum sibi. Est & glutinum auri cum inducitur ligno Leucoporon siue Leucopheon, Germani Goldgründt / uocatum: habetur & glutem librarium ex simila & polline, Bäckbinder bapp / Germanice appellatum, &c.

Glutinum piscium. Caput LXXXIII.

I Chthyocolla, gluten piscium, uenter est piscis cetacei. Præstat candicans, natione Ponticum, subasperum, minimè scabrum, & quod celerrimè liquefit. Vtile emplastris, capitis & leprarum medicaminibus, & tetanothris, quæ cutem faciei erugant & extendunt.

Hanc Galli collam buccæ, hoc est, colle de la bouche, appellant. Germani Mundteym / quod oris salua diluere glutinandis rebus soleant. Alij collam Morue, ita enim cetaceum uocant piscem. Germani Saufen blasen / piscem uerò Em-Sausen / quo frequentissimè uescuntur, cuius glutinoso uentre & corio glutinum fieri inter omnes conuenit.

Viscum. Caput LXXXV.



cu m sandaracha, aut auripigmento illitum, unguis extrahit. mistum cum calce & uini face, suam uim intendit.

Viscum optimum est recens, in tus porraceum, extrà fuluum, quod asper, nihil, aut surfurum conceperit. Fit a inis in robore nascentibus, buxo fruticis folio. contusum acinum lauant, & postea in aqua decoquunt. sunt qui commanducando ipsum efficiant, gignitur quoq; in malo, pyro, & plerisq; alijs arboribus. quinetiam inuenitur in quorundam fruticum radicibus. Emollit, discuit, extrahit, parotidas, tubercula, cæterasq; collectiones ad maturationem perducit. cum resina autem & cera pari, epinyctidas in splenio sanat. uetera ulcera abscessusq; quos cacoethes uocant, ex thure mollit. lienem cum calce, gagate, aut asio lapide coctum & impositum absomit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, ἰσός. Latine, Viscum, de planta intelligitur, cuius picturam damus, uel eius gravis expresso glutino. Officinis uiscum quercinum dicitur, & non sine graui errore interdum ad emplastra pulueris ligni pro uisci glutino utuntur.

Germanus, Mystel. Affolter. Glutinum uerò Vogelleyms.

Gallus du gay, appellatur.

Quidam putant lignum uisci è robore aut ilice, si terram non attigerit, comitialibus mederi, conceptumq; feminarum adiuuare, si omnino secum habeant. uulgo Eychen mystel, dicitur: de uisco uide plura lib. 1. Fit & uiscum in Syria ex acinis, quos ab Augusti, ut arbitror, honore, sebastes appellauerunt, & hodie quoq; Officinis adhuc Sebeste ubiq; dicitur: ueteribus fuisse myxa conisio, quæ & per diminutionem quoq; myxaria recentioribus Græcis nominatur, & uoδ Πύξυς, id est, à muco lento è naribus fluente: cum simili hi fructus abundam, bilem detrudere, & sitim sedare dicuntur. humida primo gradu, calido frigido temperata.

Iulube, Zizypha Græcis, Zizypha etiam Actuario, fructus Myxarijs affinis facultate, nam calidus humidus primo gradu, etiam pulmonarius: id duplex, sericum, id est rufum, Gallis frequens, & candidum adhuc ignotum.

ignotum, ad fluxiones calidas, acres, tenues, in pectus salu-
bre: ut alimentum uerò à Galeno damatur lib. 2. alimen-
torum, quem locum Auicenna Sauanorola citat in suis u-
inibis. horū picturam libuit hic exhibere, cum in usu Offici-
narum sine frequentissimo, nulla uerò eorum apud Diosco-
ridem fiat mentio.

Sebest, Schwarz brustbeere.



Aparine.



B



Aparine?
Cap. LXXXVI.

Aparine ramis multis &
paruis fruticat, asperis,
quadrangulis, per interualla
orbiculato foliorum ambitu,
ut in rubia: flos albus, semen
durum, rotundum, cōcauum,
album, umbilici figura, asperi-
tate uestium tenaci. Ea pasto-
res coli uice utuntur, ad exi-
mendos è lacte pilos. seminis,
caulium, ac foliorum succus,
potu contra uiperarum pha-
langiorumq; morsus auxilia-

X 4

A tur, infusu aurium dolori medetur. Herba cum axungia trita firumas discutit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, ἀσπερίνη. Latine, Aparine. Officinis & Herbarijs Aspergula, alijs Ruella.

Germanis, Klebkraut / Liddegeng. Gallis Grateron, dicitur.

Ramosa est herba, quadrangula, ex intervallis orbiculato foliorum ambitu, & ueluti stellatim decussato, ut in rubia. Flos albus, semen durum, rotundum, concavum, album, umbilici figura. Omphalocorpon inde dici putatur Dioscoridi, ab umbilici similitudine, quam semen præfert. Et philanthropos à nonnullis dicta (quia uelut amici solent) commanantium lacinijs adhaereat. Hippocrates, ut Galenus putat, philynon & philyterion appellat, &c.

Alyssum. Caput LXXXVII.



B

Alysson fruticosa herbula est, unicaulis, subaspera, rotundis folijs: fructu duplicium scutorum effigie, in quo est semen quadantenus latum: in montibus & asperis locis emicat. Eius decoctum singultus sine febris, potu discutit. idem efficit si quis eam aut teneat, aut odoretur: cum melle trita, uittia cutis in facie, & lentigines emendat: contusa in edulio, rabiei canis mederi putatur. domibus appensa salutaris esse creditur, & hominibus atq; animalibus fascini amuletum. purpureo linteo circumligata, pecorum morbos abigit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, ἀλυσσόν. Latine, Alyssum. Officinis & Herbarijs mater sylua. Germanis, Waldtimeyster / Waldtimännlin. Gallis Rubca minor.

Alysson Plinio distat à rubea, folijs tantum ramisq; minoribus quippe nomen ac cepit, quod emorsos à cane rabiem sentire non patitur potum ex aceto alligatumq;. In montibus & asperis emicat, inuenitur etiam in pratis, locis humidis & opacis. Dioscoridis uerò Alysson propius accedere uidetur ad eam, quam rusticam canna bim uocant Herbarij. Siquidem fruticosa herbula est, unicaulis, folijs per initia satis rotundis, ubi adoleuit oblongis, & per ambitum leuiter serratis, fructu duplicium scutorum effigie, in quo est semen quadantenus latum, in montibus & asperis emicat: inuenitur quoq; in pratis frequenter.

Asclepias.

Asclepias. Cap. LXXXVIII.

Asclepias, ramos emittit longos: folia hederæ, longa: radices numerosas, tenues, odoratas. floris uirus graue. semen securidacæ, nascitur in montibus. Radices ex uino potæ torminibus auxiliantur, & contra serpentium ictus. Folia aduersus uulnæ mammarumq; ulcera, quæ cacoethe uocant, illinuntur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, ἀσκληπιάς.

Latine, Asclepias.

Officinis Vincetoxicum. Hirundinaria.

Germanis, Schwalbenwurz.

Gallis Hederæ apud aliquos, appellatur.

Recentiores radice eius magna efficacia ad mensum prouocationem utuntur, & ad rabidi canis morsum, uenerisq; potenter resistere affirmant. Vnde etiã haud temerè uictrix toxici ab ijsdem appellata est. Hydro picis etiam radicē in uino maceratam & subinde coctā, mirificè auxiliari tradunt. Flores præterea foliaq; siccata, mox trita, uulneribus utiliter inspergi aiunt. Sordida enim ulcera purgat, & ad cicatricem perducit, genitaliumq; uitijs & rupturis egregè mederi docent, Quæ in uniuersum



omni

omnes facultates cum ijs quas Asclepias obtinet, pulchrè quadrant, ut eandem esse Hirsutianam Officinis, Germanis uero Schwalbenwurz uocatam herbam, nullus deinceps dubitare debeat.

Atractylis. Caput LXXXIX.



Atractylis, spina est cnico similis, folia multò lōgiora ferens in summis uirgis, magna parte nuda, alpera q̃, qua scemina pro folijs utuntur. capitula in cacumine spinis horrent. flos luteus: quibusdam in locis purpureus inuenitur. radix tenuis, superuacua. Coma, semen & folia cum pipere & uino teruntur utilisimè contra scorpionum ictus. percussos tradunt quādiu ea teneantur herba, nullū experiri dolorem, ipsumq̃ deposita statim recrudescere.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Ἀτρακτύλις ἑτέρα.

Latine, Atractylis alter.

Officinis Carduus benedictus.

Germanis, Carden benedicten.

Gallis Chardon benoyt.

Carduus à nostris benedictus, ob singularem plāte totius amarissimæ facultatem aduersus pestilentes, putresq̃, alios affectus. præterea contra serpentium & scorpionum morsus ualere omnibus in confisso est. Reiectiones contra capitis uehementissimos dolores, uertiginem, memoriam amissam, in cibi aut potus sumptum ualere tradunt. Idem ad putrescentia

ulcera, mammarum potissimum, si in puluerem reductus inspergatur.

Polycnemum. Caput XC.

Polycnemon, frutex est furculosus, folijs origani: caule, ut pulegij, geniculis multis intercepto, sine umbella. tenui tamen in cacumine corymbo, boni odoris & aeris. Vulneribus agglutinandis recens, aut aridum cum aqua, efficaciter illinitur: sed quinto die solui debet. ad urinæ stillicidia ruptaq̃, cum uino bibitur.

Hæc herba hodie incognita adhuc, Plinio cunila bubale appingitur similis, semine pulegij, furculosas, multis geniculis, corymbo odorato, acris & dulci odore, que ferro factis uulneribus commanducata imponitur, quinto die soluitur.

Clinopodium. Cap. XCI.

Clinopodium frutex est folijs serpyllo similis, furculosus, duum dodrantum altitudine nascitur in petrosis. flores, marrubij modo, ex interuallis distincti speciem lectipedum præbent. Bibitur herba & succi eius decoctum, ad conuulsa, rupta, strangurias, serpentium ictus, menses & partus pellit. & peniles uerrucas, quas acrochordonas uocant, eijcit, aliquot diebus potum. aluum sistit decoctum ad tertias, potumq̃, si febrim sentiunt, ex aqua, alioquin ex uino.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Κλινόπῳδον. Latine, Clinopodium, Herba orbiculata.

Officinis pulegium motanum, lecti pes.

Germanis, Weibeldost, dicitur.

Folij est serpylli, floribus per interualla furculos coronantibus. ut in marrubio, altitudine, serè pedale, præsim in Saxonia in petrosis nascens.

Leontope-

A **Leontopetalum. Caput XCII.**

Leontopetalon caulem emittit dodrantalem, aut altiore, plurimis alis concavum, & in cacumine semina parua duo aut tria, in siliquis, ciceris modo: flores anemonæ similes, punicei coloris: folia brassicæ, sed papaveris diuisura: radicibus nigris, rapæ similibus, strumosis. nascitur in aruis & segetibus. Radix auxiliatur serpentium ictibus, ex uino pota, nec alia res celerius dolorem finit. miscetur ilchiadicorum clysteribus.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Leontopetalon Italia papauerculum, & leoninum sem n appellat, caule semipedali, aut etiam maiore, alijs numerofo, quarum cacumine in siliqua semina ciceris modo bina ternaq; continentur, flore puniceo, simili anemonæ, folio brassicæ, diuiso, papaveris forma, radix nigra similis rapæ, strumosa, tuberculis quibusdam ceteris nodis articulorum eminentibus: nascitur in aruis frumentario agro. Pata leonis Officinis & Herbarijs, Germanis Lewentapp/ Lewentap. Gallis pate de Lyon, dicitur.

Teucrium. Caput XCIII.

Veronica, Brenpreis.



Teucrium, sue ut alijs placet, teucris, herba est uirgæ referens effigiem, trisaginis similitudine, tenuifolio, non multum a cicere alieno. hæc in Cilicia iuxta Gentiadem Cissademq; ubertim prouenit. Recens cum posca, aut aridæ feruefactæ ius, potu lienem potenter absumit, lienosis cum aceto & ficis illinitur, item serpentium moribus ex aceto solo, sine ficis.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Τεύκρον. Latine, Teucrium. Officinis incognitum.

Germanis, Groß Balthengel/ Groß Chamedien/ & Bommetrost/ quasi mæroris solatium.

Teucrium uocatum est Græcis pariter & Latinis, quod Teucer, Aiædis frater, hoc inuenit, ut Plinius refert, (De Hemionitide, quam Teucer quoq; inuenit, & ideo Teucrion cognominata, scribendum alibi nobis erit) Recentioribus planè uulneraria herba est, uino incocta & epota. Hieronymus Tragus, uir in re herbaria exercitatus fide dignissimusq; altam herbam Herbarijs & Officinis Veronicam, Germanis uero Brenpreis/ appellatam, uerum esse Teucrion Dioscoridis scribit, quæ sua descripti. ne Teucris faciem, non malè exprimit, sed nihil definitio, eruditioribus iudicium in hac relinquens. Hæc mirificè ad cruentæ ac ueteræ uulnera & ulcera sananda confert.

Scabie

Scabiei deniq; et omnibus cutis vitijis medetur. Tumores etiam in quacumq; parte corporis fuerint, potissimum autem in ceruice, discutere potest. Recentiores huius usum unice commendant in febris pestilentialibus, iccoris & lienis obstructionibus, potissimum uero pulmonis exulcerationibus. Ob mirificam sanandâ ulcera & uulnera facultatem, Germani Gruntheyl uocant.

Trixago.

Caput XCIII.

Vera Chamædrys, mas.



Chamædrys Græcis, alijs Chamædrops*: Latinis Trixago dicitur. sunt qui eam teucrion appellauerunt, propter eam quam cum teucro seruat similitudinem. Nascitur in petrosis & asperis. frutex dodrantalis, folia habens exigua, amara, effigie & diuisura quercus: flore paruo, penè purpureo. Carpitur semine prægnans. Recens in aqua decocta, potu tussibus, indurato lienî, urinæ difficultati, incipientibus hydropicis, auxiliatur cit menses. partus extrahit. lienem ex aceto pota consumit. aduersus serpentium uenena ex uino, potu illituq; efficacissima. trita digeritur in pastillos ad supraddicta. purgat ulcera, cum melle, cum oleo illita, caliginem oculorum discutit. natura eius est calfacere.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Χαμῆδρυς. Latine, Chamædrys, Trixago.

Officinis corruptè Chamædreos, quercula, serratula.

Germanis, Aleyu Bethonien/ Gamander/ Blamander.

Gallis petit chesue, gelimandri.

Chamædrys, id est, quercula, amara, subacris, calida sicca tertio gradu, subaltior paulò quàm sicior. Ex Creta (que nunc Candia) Cesari adferebatur ad theriacis compositionem, tamen ubiq; nascitur, etiam in Romæ suburbijs, odore & gustu quàm Cretica uehementior. præsertim si multo imbre non fuerit irrorata, quamuis hac campestris sit melior. Prægnans semine cum Dioscoride, aut succo cum Plinio, aut etiam flore cum Galeno carpitur.

Leucas.

Caput XCV.

Leucas montana, latioribus quàm urbana folijs, semine acriore, amariore, oris ingrato, efficacior tamen quàm satiua habetur. Vtraq; ex uino contra animalium uenena, præcipuè marinorum opitulatur.

Leucas.

A *Leucas*, cui eadem *Leuce* videtur, hodie incognita. In quo genere apparet grandior, que in sylvis emicat, & triplicem rusticam Herbarij uocant.

Lychnis. Caput XCVI.

Herba Tunica,
Donderneglin.

Bethonica coronaria,
Grasblüm.

Superbia,
Wäwillen.



B

Lychnis coronaria, flore est albæ uiolæ simili, quo corollæ factitantur. Contra scorpionum ictus semen in uino potum auxiliatur. Lychnis sylvestris, omnia urbana similis. Bilem per aluum detrahit, semine duabus drachmis potio. ictis à scorpione subuenit. Aiunt huius herbæ appositu scorpiones torpescere, & inertes prorsus reddi.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, *Λυχνίς σεγαυαλύνη*.

Latine, *Lychnis coronaria*, *Gaza lucernulam* uocat, *Plinius Rosam Græcam*, uel *Græculam*.

Officinis herba *Tunica*.

Germanis, *Donderneglin*, *Wild neglin*, *Seldneglin*, *Blättröpfelin*.

Gallis *Cireffles sauuages*, dicitur.

Folia habet porracea, oblonga, flamine quo medium diuiditur puniceo, ac rubente, cum recto calamo triangulari, floribus in uertice purpureis, albæ uiolæ similibus. Huic non absimilis est ea, que uulgo *Beronica coronaria*, Germanis *Tegelblüm*, *Grasblüm*. Item alia, ipsam *Wäwillen*, *Sodmüt*, hoc est, *Superbia* uocata. Sylvestris lychnis meminit *Hermolai* in corollario, in herba *Lyche*, sibi tamen ignota. Eam *Venetij* hepaticæ nomine in littoribus passim nasci scribit, olitorio foro ieiuniorum tempore, quo nascitur uenalem, hederaceo firè folio, flore purpureo, lilij pusilli effigie. Conuoluit herba sese quibus appropinquat. Ciet aluum cocta & cruda, oleris modo accepta. Hec *Hermolai* uerba *Lychnin* eandem esse liquidd contemplantur. *Plinius* quodam loco *Lychnin flammeam* cognominat, & omnino ea uidetur esse, quam Germani

Wocah

Lychnis coronaria,
Mergenöfelin / Strawentöfelin.



uocant *Strawentöfelin* / flore albe uiole simili, in-
odoro, nec nisi coloris gratia coronamentis additus.
Nam æstiuus is flos, cauliculis incanis, calice qua-
drangulo, purpureo flore, betouice attilis, aculeatis
apicibus, folijs circa terram frequentibus, semipedali
longitudine, sesquiunciali latitudine, mollibus ac la-
nugnos, radice numerofo capillitio fibrata: hanc
ego potius *Lychnis coronariam* satiuam, seu *bortu-
lanam* crediderim, quamuis & altera superius de-
scripta, à legitima delineatione non longè abscedat.

Lilium. Cap. XCVII.

Lilia coronamentis se dedunt. Liria
à quibusdam uocata. E quibus un-
guentum temperatur, quod aliqui liri-
num, alij susinum appellant, nervos &
priuatim uulnæ duricias emolliens. Fo-
lia herbæ illita contra serpentium ictus
auxiliantur. feruefacta, ambustis profi-
ciunt. aceto condita uulneribus opitulā-
tur. Succus adiecto melle aut aceto, in
æreo uase coquitur, conuenienti medi-
camento uetustati ulcerum, & ad recen-
tia uulnera. Inassata radix & ex rosaceo
trita, igni ambusta sanat. uulnam emol-
lit. menses ciet. ulcera cicatrice obducit.
cum melle detrita nervis præcisis, luxa-
tisq; medetur. uiriliginis, furfures & le- **B**

Lilium album.

Lilium rubens.



*Gal. lib.
7. simp.*

pras emendat, ulceraq; in capite manantiā
expurgat. abstergit faciem & erugat. teritur
in aceto cum hyoscyami folijs, & farina tri-
tici, mulcendis testium inflammationibus.
Semen porum moribus serpentium aduer-
satur. ignibus sacris semen & folia cum ui-
no illinuntur. Tradunt & rubra esse Lilia.
In Syria autem & Pisidia Pamphyliæ, effi-
cacissima unguentis nascuntur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, *Κολοψ*. Latine, *Lilium*, *Iunonia Rosa*.
Officinis genuinum nomen retinuit.
Germanis, *Gilgen / Lilgen*.
Gallis *Fleur de lis*, *lys*, dicitur.
Lilium uerò *rubens* apud nos frequens, flore tantum
ab albo diuersum, aliàs simile, Græcis *Κολοψ ἑρυθρῶς*.
Germanis *Rot Lilgen / Gallis Rouge lys*, appellatur.
Lilij radix terget primo ordine, digerit moderatè, e-
molliit. menses ciet, uulnera glutinat, etiam in capitibus
oculorum cum melle mista. Eadem præstat solium, sed
imbecillius. Flos uerò substantia constat mista ex tenui

A & terrea, & aqua: coctus ex oleo mollis, & citra morsum digerit &c. Plura Lilij genera uide apud Theophrastum, cum nostris in eundem annotationibus.

Ballote. Caput XCVIII.



B

Balloten, nomine alio nigrum Marrubium uocant. caules adit quadrangulos, nigros, subhirsutos, & plures ex una radice: folijs maioribus quam marrubij, hispidis, intercedente spacio, subrotundis, graecolentibus, apiastro proximis: unde aliqui apiastrum eam uocauerunt. candidi flores uniuersi uerticillato ambitu caulem coronant. Vis eius effica duersus canis morsus, folijs ex sale illitis. feruenti cinere flaccescunt folia, ut condylomata reprimant. purgant & sordida ulcera cura melle.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Βαλλότη. Latine, Ballote, Marrubiastrum.

Officinis Marrubium nigrum.

Germanus, Schwarz Andorn.

Brabantis, stinckend Melckone dicitur.

Ballotem alio nomine melanprason Græcis appellari Plinius tradit, herbam fruticosam, angulosi caulibus, nigris, hirsutis, folijs uerticillis maioribus quam porri, & nigrioribus, graecolentibus. Sed deceptum hic Plinium constat similitudine nominum, prason pro prasion legitur nam Marrubio folia sunt non porri, sed Marrubij albi, aut apiastri.

Apiastrum. Cap. XCIX.

Melissa. Citraga.



Apiastrum.



Melissophyllum

Melissophyllon siue Melittæna, id est, Apiastrū, id sibi nomen usurpauit, quoniam apes ipsa herba delectantur. cauliculi & folia ballotæ, de qua paulo antè diximus, similia essent, nisi maiora, tenuioraq; nec ita hirsuta spectarentur. citreū malum olent. Folia cum uino pota aut illita profunt contra ictus phalangiorū, scorpionumq; . item aduersus canis morsum. decocto eorundem gratia, foueri prodest. defectionibus sceminarum ad ciundos menses conuenit . dentes eodem in dolore colluuntur. dysentericis infunditur. Fungorum strangulationibus folia, addito nitro, potu auxiliatur: torminibus & orthopnoicis, delinctu illita cum sale strumas discutunt. ulcera purgant. articulares dolores illita sedant.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Μελισσόφυλλον. Latine, Melissophyllum, Citrugo.

Officinis Melissa. Germanis, Mitterkraut/Wangenkraut/Wandileuskraut.

Gallis De la Melisse, ponceirade.

Duo Melissophylli genera exhibemus depicta. Vnum passim in hortis colitur, Alterum nascitur in syluis, odore multo, suauiori: hoc genus uerè Melissophyllum, id est, apum folium, quod herba hac, præsertim florente, apes plurimum gaudent, unde Apiastrum Latinis dicitur: alterum uerò à citri odore Citrugo. Folia et cauliculi syluestris Melissophylli (quia in syluestribus nascitur) Balloti seu Marrubio nigro similia sunt, ma iora tamen et tenuiora, nec ita hirsuta, iam etiam in hortis feri cepit.

Melissophyllum uiribus est Marrubio simile, sed imbecillius, ob id etiam usurarius.

Gal. lib. 7. simp.

Marrubium. Caput C.



Marrubium, frutex est ab radice ramosus, cædicans, subhirsutus, quadrangularibus ramis, folium pollicem æquat, subrotundum, hispidum, rugosum, gustu amaro, semen in caulibus, & ex interuallis. flores uerticillato ambitu, asperi. Nascitur propter ædificia, ruinas, & rudera. huius folia sicca, cum semine decocta in aqua, aut uiridium succus datur cum melle suspensiois, tussientibus, & ad tabitudinem reductis. crassam è pectore pituitam, cum sicca iri eicit. mulieribus à partu nō purgatis datur, ut menstrua & secundas extrahat. item in difficili partu, & his qui uenena hauserūt, aut à serpentibus demorsi sunt. uescicam renesq; lædit. Folia cum melle illinuntur sordidis ulceribus purgandis. pterygia nomasq; sistunt. laterum dolores mitigant. Succus folijs contusis expressus, & sole coactus, ad eadem pollet. cum uino & melle illitus, oculorum claritatem adiuuat. naribus regium morbum expurgat. aurium doloribus conuenienter instillatur, per se aut cum rosaceo.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Ρράμα.

Latine, Marrubium.

Officinis Marrubium album, Prasium album.

Germanis, Andorn/Gotts vergeß/Lungenkraut.

Brabantis, Maltone. Gallis Du marrubium dicitur.

Marrubium seu prasium album, sapore amaro, calidum ordine secundo, siccum tertio: lienis & hepatis obstructions soluit, pulmonem & thoracem purgat, menses ciet, ad motum terget, digerit, & cum melle oculorum aciem claram reddit.

Marrubium nascitur circa domicilia collapsa, & inter rudera. Colligitur herba in æstate iunio & iulio potissimum mense, dum semine est prægnans.

Theophrastus duplex genus constituit. Vnum folio herbaceo, & incisuris altioribus serrato, unguentarijs, ut idem ait, ad quædam que sita: huius picturam supra exhibuimus. Alterum folio rotundiore, uehementius

Y a

A squalido, ut salui, & obscurius serrato: hoc candidum interpretor, de hoc capite presenti agit Dioscorides.

Stachys.

Caput CI.

Stachys frutex est marrubio similis, sed longior: folia ferens numerosa, hirsuta, rara, prædura, cana, odoris iucundi, & complures uirgas ab radice exeuntes, marrubio candidiores, nascitur in montibus & asperis. Vim habet excafactoriam & acrem. foliorum decoctum potu pellit menstrua & secundas.

NOMINA ET explicatio.

Græcè, Στάχυς.

Latine, Stachys.

Officinis nomen nullum inuenit.

Germa. Riechender stundender Adoum.

Gallis salvia mollis appellatur.

Stachys marrubio similis, paulò tamen longioribus folijs, pluribusq; modicè hirsutis durisq; iucundi odoris: uirgulis ab una radice pluribus, quàm marrubij candidioribus: montes & aspera diligit. Stachys gustu acri & amaro est, terijq; ordinis excafacientium.



Phyllitis. Cap. CII.

Phyllitis, folia promit rumici similia, longiora, & uiridiora, sena aut septena, recta, quæ parte anteriore læuia cernuntur, à tergo autem penfiles, quasi uermiculos tenues ostendunt. in umbrosis & opacis hortorum locis emicat, gustu acerbo, neque caulem, neque florem, neque semen profert. Folia in uino pota serpentium moribus aduersantur, quadrupedibus per os infusa auxilio sunt. & si dysenteria aut resoluta aluus exercet, potuidatur.

Phyllitis, Euritio Cor do, quæ uulgo linguam Ceruinam dicit esse, uisa est. Ruellius uerò Hemionium linguam cerui facit, cui Gesnerus subscribit: sed de hac re copiosius in annotationibus nostris in cap. 128.



Phalangium. Caput CIII.

Phalangium à quibusdam phalangites uocatur, ramuli sunt ei duo, aut tres, plus minus, in diuersa tendentes: flos candidus, lilio similis, multas incisuras habes. semine nigro, lato, ad lenticulæ dimidiatæ figuram, multo tenuiore. radice parua, tenui, herbacei coloris dum à terra eruitur, prouenit in collibus. Huius folia, semine flos cum uino pota, auxiliantur, contra scorpionum phalangiorumq; ictus. tormina quoq; discutiunt.

Phalangium uel Phalangitis, herba hodie incognita.


Trifolium.

Trifolium. Cap. CIIII.

A



Album.



Luteum.



Purpureum.



B

Trifolium, Græci Triphyllon, alijs oxytriphylon, alijs menyantes, alijs asphaltion uocant. frutex supra cubi-
ti altitudinem attollitur, uirgas habens tenues, iuncas &
nigras, unde ramulares enascuntur appendiculæ, in qui-
bus terna singulis germinationibus exeunt folia, loto arbo-
ri similia. ijs recenter enatis rutæ odor inest: ubi autē ado-
leuerūt, bitumen olent. florem ædit purpureum, semen qua-
dantenus latum, subhirsutum, ex altera extremitate exer-
tum, antennæ modo corniculum gerens. radix tenuis, lon-
ga, ualida. Semen & folia in aqua pota pleuriticis, urinæ
difficultati, comitialibus, & ijs qui aquæ inter cutem prin-
cipia sentiunt, sceminis quoq; uulnæ uitio opportunis, au-
xiliantur. menses ciunt. ternæ drachmæ è semine dari de-
bent, è folijs uerò quaternæ. Contra serpentium ictus trita
folia, & ex aceto mulso pota, præsidio sunt. Tradunt ali-
qui, totius fruticis, radicis, foliorumq; decoctū forū dolo-
res eorum finire, quos serpentes percusserint. qua autē ma-
qua sanatus quis fuerit, si ea quispiam alius foueatur, qui
ulcus habuerit, perinde afficitur ut à serpente demorsus.
Quidam terna folia aut semina in tertianis, cum uino po-
tui dedere. & in quartanis, quaterna, ut quæ febrim cir-
cuitus discurrerent. Radix antidotis inferitur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Τριφυλλίον. Latine, Trifolium odoratum. Officinis inusitatum. Brabantie, Clauereu.

Y 3

A Germanis, Siben gesezt, propterea quod singulis diebus septies odorem (ut aiunt) suum habeat, & toties etiam amittat, quandiu in horto creuerit. Decerptum autem & exiccatum, odorem suum perpetuo retinet. Qui certe pluuioſa temporis constitutione, ac tempeſtate inſtāte multo uehementior, ſic ſanē ut totas &

Oxytriphylon.



des, in quibus herba reposita est, odore suo cōpleat. Videtur autem uera esse lotus urbana, de qua inſi a lib. 4. cap. 96. Potest etiam imitatione Latina commodiſimē adpellari Wolrichender Klee. Sponte ſua in Germania non prouenit, ſatum uerō nulla difficultate prodit. Calidum eſt & ſiccum in tertio ordine. Debet autē huius triſolij odorati uſus eſſe ſubinde in omnibus Officinis, quod mirificē aduerſetur uenenis, & ad ulcera malefica ſananda perquā utile ſit. Ceterum adhuc tria apud nos paſſim in pratis proueniuntia cernuntur triſolij genera: quorū primum à floribus purpureis, Triſolium pratense purpureum, Germanicē Brauner Wiſentlee / Braun Sleyſchblumen. Gallicē Treuffle incarnat: alterum itidem à floribus ſuis candidis Triſolium pratense album, Germanis Weiſſ Wiſentlee, Weiſſ Sleyſchblumen. Gallis Treuffle blanc: & tertium luteum, Germanicē Gel Wiſentlee. Gallis treuffle jaune appellatur. Quod ad ſolia ipſa attinet, non admodum differunt: quoduis enim horum generum tribus conſtat ſolijs, quæ in primo ſunt latiora & herbacea, in ſecundo autem longiora & anguſtiora, magisq; palloſcentia candicantiāue: in tertio ſunt parua & rotunda, adq; ſemigraeci ſolia accedētia. Adſtrictoriē cuiuſdam qualitatis ſen-

um in gūſtu præ ſe ferunt, non tamen multum admodum, nihilominus ſunt tenuium partium, et exiccatoris, quandoquidam etiam exigua acrimonia prædita uidentur. Triſolium acutum, quod oxytriphylon appellatur (ut Scribonius Largus ſcriptum reliquit) naſcitur in Sicilia plantatum. nam Italiae regionibus nunquam uidit herbam, niſi in Luciae portu, cum Britanniam peteret cum Claudio Caſare. Quod uerō apud nos oxyſ ſue oxytriphylon dicitur, Officina, Herbarij panē cuculi & alleluia, uoce barbarā uocant. Germani Gaudbrot / Saurtlee, Nüchampffer / Nüſenampffer / Gaudtlee / appellunt, humile, longis tantum pediculis, triſolium præferens acetoſo ſapore, flore candido, ruſo in lunatis ſiliquis ſectis, radice in tranſuerſum longa & fruticoſa. Hoc in acetarijs utuntur incundo ſapore, id quod ab acido ſapore Plinio oxyſ dicitur ſolia habere. B lenta, unde illi triſolij nomen apud Germa. Officinis.

Polium. Caput CV.



Dvo genera polij. montanum, cui theutrio nomen eſt, & cuius eſt uſus, tenuis frutex eſt, candidus, dorantalis, ſemine refertus: capitulo in cacumine quandā corymborum ſpeciem præ ſe ferente. paruo, canis hominis ſimili, grauiter olente, non ſine quadam ſauitate. Alterum fruticoſius, nō uſq; adeo ualens odore, & uiribus infirmis. Potum ſeruefacti ius auxiliatur ſerpētium ſcibibus, hydropicis, morbo regio, & lienofis ex aceto. ſtomachum malè habet. caput doloribus afficit. aluum & menſes ciet: ſubſtratum ſuffitumue ſerpentes abigit. uulnera conglutinat.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Polium montanum, quod odore effectūq; præfertur, in Narbonenſi provincia Gallie frequens, unde ad nos deſertur: ſurculis palmeis, terebinthi, canis, per interualla ſoliatis, thymi carnoſiore mollioriq; coma, et ea quoq; incana, ſtoſculo pallido, capitellis corymborum effigie, fructu plenius. Huic delineationi adamuſim reſpondet noſtrum Germanicum polium, cuius pithuram damus, Germa. De lenger ye lieber / weible / appellatum. Polium aſtringit & cohibet uulnera, prohibetq; ſerpere.

Scordium. Caput CVI.

Scordium in montibus & paluſtribus naſcitur, ſolijs triſaginis, maioribus, non ſic in ambitu diuiſis, aliquantum allia redolentibus, gūſtu amaris & aſtringentibus: quadrangulis caulibus: ſubrubro flore. Herba uim excaſfactoriam habet: uirnam ut coſta recens, aridaue cum uino, aduerſus uenenatos ſerpentium morſus bābitur.

Scordium.



bitur. ad stomachi quoq; rosiones, dysenteriam, & urinæ difficultatem, binis drach cum hydromelite. crassamen purulentum pectore expellit. facit aride farina ad ueterem tussim, rupta, conuulsa, si cum nasturtio, melle & resina miscetur in eclegmate. in flammata modicè præcordia, cerato excepta, recreat. cū aceto acri aut aqua, podagris conuenienter illinitur. menses imposita mouet. uulnera conglutinat. uetera ulcera purgat. & ex mel le cicatricem perducit. sicca ex crescentias in carne cohibet. Succus ad eadem uicia bibitur. Inter prima efficax Ponticum natione, Creticumq;.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Σκόρδον. Latine, Scordium. Trixago palustris.

Officinis longo tempore incognitum.

Germanis allusione quadam ad Romanam appellationem, Wasserbateng / Anoblauchstraut / & Wasser chamedren / Lachen Anoblauch.

Callis Chamaræ, uoce à chama dryos similitudine deslexa appellatur: hanc, ut permulta alia, Valerius Cordus, doctissimus uenis, et restat ad præfata medicina strenuus indagator, primus, nullo demonstratè, in Germania nostra inuenit. Scordium autem ab odore et acrimonia scoradi id est, allij dictum est: subamarum, acre, acerbum, calfacit, purgatq; uiscera, obstructions liberat, urinas et menses mouet: uiride magna uulnera glutinat: siccum autem sordida purgat, contumacia cicatrice tegit. Optimum ex Creta petitur, quale etiam Andromachus minor sue theoricæ miscet: non malam tamen in alijs regionibus posis inuenire. Putrefactis animalium ueneris et pharvacis delectarijs succurrit. Que uis eius inde est coniecta, quod a que in bello occisa fuerant corpora, diuq; insepulta super Scordium iacerunt, minus putris sum inuenta, quod à uiris qui

Ratio quare scordium in appellata inter herbas

Allcaria.



busdam fide dignis acceptum tradit Galen. lib. x. antid. Nobis hodie in Germania locis riguis est largissimum uerum scordium, Valerio Cordo, ut diximus, primo demonstrante.

Falsi sunt hætenus Officinæ et Herbarij, qui Scordion esse putauerunt herbam cubitali proceritate, folijs urticæ, parcius fimbriatis, à pediculo latioribus, alijs cum teruntur odoratu, solum solum lacteo, exili in pelliculis semine, radice oblonga, eiusdem cum folijs odoris, ideo alliarie nomen sibi uendicauit. Germani uero Anoblauchstraut / Lauch sinder lauch / hoc est, allium sine alio uocant: sed hæc est terete cauliculo, illa quadrato: huic flos candicat illi subnabet: huic folia urticæ fimbriata, chama dryos siue trixaginis querna, quæ olfactu suboleau allia.

Tussilago. Cap. CVII.

Tussilaginis folia sunt maiuscula quam hederæ, sex aut septem à radice, subalbida à terra, supernè uirentia, in plures angulos exeuntia. caulis palmum altus, flos luteus in uere, flore & caule confestim exiit: inde nonnulli his uacare existimauerunt. radix tenuis est & superuacua. nascitur in amenis & riguis. Folia ex melle trita igni sacro & omnibus inflammationibus illita in dentur. arida fumus per infundibulum hians ore rapus, hos sanat qui sicca tussi atq; orthopnea

A



infestatur. pectoris uomica rumpit. Eundem effectum præbet suffita radix. decocta in hydromelite, & pota, emortuos partus eiecit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Βήχιος. Latine, Tusilago, Bechium.

Officinis Vngula caballina. alijs farfara, nonnullis populago. Germanis, Rosshüb / Brandelattich / Esels hüß / Hüßlattich. Brabantis, Perts clauwe.

Gallis pas d' asne : & in montibus supra lacum Lemannum, taconette dicitur.

Plinius hanc aliter atq; Dioscorides describit, folia ei tri buens maiuscula quam hedere quinq; aut septem, sublata à terra, supernè pallida, sine caule, sine flore, sine semine, radice tenui. Quidam eandem esse bechio & alio nomine chamaeleuten putant. Sed hic obseruandum diligenter, caulem & flores Tusilaginis esse fugacissimos, ipsiq; enatis breui uigor uitâq; durat, longissimaq; mora (quantum mihi licuit deprehendere) biduum, post quod illico tempus flaccescunt res euanescent, & caduci marcent. Quare non nisi ijs, qui uere medio sese fortuna ferunt obuiam, & flos & caulis cernitur: namq; die uno locum uniuersum caule & floribus pubescere uidebis, post ridie prorsus eos concubuisse, frondeq; sola uirescere. quapropter sine caule & floribus nasci plerisq; qui tam citam caulis iacturam non conspexerunt, credidum est.

Artemisia. Cap. CVIII.

Tanacetum, Tagetes.

B

Rot Bucf.



Weiß Bucf.



Artemisia

Artemisia magna ex parte in maritimis nascitur, absinthij modo fruticosa, maioribus & pinguioribus folijs, ramisq; huius quidem genera duo: unum latius habitusq; folijs virgatis; latioribus alterum tenuius, flore paruo, tenui, candido, graecolente aestate floret. Sunt qui in mediterraneis uniculis nomine appellant, tenuem herbulam, simplici caule & minuto, floribus scaente, flauo colore hanc iucundiorē quā praeceps efflat odorem. Vtraq; exalta est, extenuat, feruefacit, conuenienter in muliebres defessus adijciuntur, ad d. trahendos menses, partus, secundasq; item ad praecusiones uulua, & eundem inflammationes. calculos comminuunt, remoram urinam cient, menses pellunt, pubilitate Succus uulue inditus ex myrrha, eadem quae infusio trahit. Coma tribus drachmis eorundem eductorum gratia bibitur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Graece, *Aglesmoia*. Latine, *Artemisia*. Officinis Latinam nomen seruauit. Germanus, *Deifuss*. Rot oder weiff Buck. S. Johans gürtel. Gallis Armoise dicitur. Nuncupata autē est artemisia herba, ut aliqui uolunt, ab Artemisia Mausoli regis coniuge, quae ipsam ad partum cognominem sibi se in herbe & nominis & gloriae suae memoriam et monumentum naturae a qua uenit ad posteros transmutaret. Sicut ut alij uolunt, non ab hoc, sed a Diana, quae Graece artemis dicitur, nomen hoc adeptae est, quod ipsa primò eam reperisse & uirtutes eius demonstrasse dicitur. Et quomodo dum praegnantibus & parturientibus, ut seculum sine aliqua interiorum locorum noxa facile in aciem ad dē liceret, auxilio & adiumento esse credebatur de illa uotis & precibus inuocata: sic etiam eiusdem dea benefecit eandem praestat haec herba, & foeminarum malis, menses, secundas facit, iradendo, & matris conelusiones inflammationesq; sanando, priuatim medetur. Artemisia alia monoclonos est, alia polyclonos, Germanus inuenit in loco colore distinguunt, hanc Rot buck oder Deifuss, alteram Weiff buck oder Deifuss, apud nos hodie quidam & certum artemisiae genus addunt, id simplici caule confurgit, folijs minutim sessilibus, colore sub palliatis, flore lacteo, odore non ingrato, gustu amaro haec Officinis Athanasia, quod immortali flore nec citò marcescente fastigetur, aut in aeternum, Germanus de inferis dicitur. Flores copiosius inueniunt cum uia mature sit, in dijs autem dijs floribus non dei in uitis, comanibus aut si colore bullis, ideo diligenter ad hybernas referuntur corollas.

Ambrosia.



Ambrosia. Cap. CIX.

Ambrosia tenuis frutex est, ramosus, riuum ferè palmorum: folijs rorae, circa imum caulem exiguis: cauliculi seminibus, perinde quasi racemulis grauidi, qui nunquam florem pariunt, odore uinoso, suauiter radice tenui, sesquipedali. Coronantur ea Cappadoces Vis eius reprimere ac repellere, & illi tu adstringere humores, qui in aliquam partem incumbunt.

Non est Ambrosia, quae ab Officinis ita & Herbarijs demonstratur, ramis exilibus, paulis folio uispete multo rura aut sanguinaria longiore ac maiore, in quorum cacuminibus corymbi dependunt, nigro semine, radice cubitali, sub albidis, radice, hoc est, struthio simili: inueniunt in montis ac macris. Inueniuntur autem apud nos uel copiosa inter exiles & madidas segetes, quae mulieres se coronant, ut insolata diu capita iucundo & uinoso simul odore recreent, & sic frondosa coma se uindictam ab aestu. Paucis rusticis optimè cognita, qui uertices racemosos lanugine nulli per mitia uestitos, minores uocant. Vinosi herba rusticis dicitur. Audio à quibusdam uinaceam rutam, Germanice Weinrauten / velich Weinrauten / quod folio rutam, & odore uinum imitetur, nominati. siquidem

A ea dodrantali assurgit frutice, ramoso, folijs rutaceis, circa inium caulem minoribus. cauliculi seminibus racemato matim collectis. graui di nunquam florem pariunt, factu in uertice racemoso & odore uinoso, radice tenui, nec sefqui palmo longiore. Superior longa radice nititur, hæc breui: illa floret, hæc minime: illa ramis uiget, hæc inualida sese, ut fertur, adminiculis quibus cunq; inuoluit: hæc uinum, illa herbaceum uirus olet.

Botrys.

Caput CX.



Botrys fruticosa herba est, lutea tota, & in multas alas sparsa. semen circa totos ramulos prouenit: folia cichorio similia. tota suauem odorem spirat: quare uestimentis interponitur. inuenitur in torrentium ripis, & conuallibus. Pota orthopneas mulcet. Hanc Cappadoces ambrosiam uocant, alij artemisiam.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Βότρυς. Latine, Botrys. Officinis ignota.

Germanis, Traubenkraut / Brottentkraut.

Gallis Pymen, Sabaudis la migraine.

Botrys Parisiensibus matronis, melius quam Officinis aut Herbarijs noscitur. Hanc odoris gratia, uestimentis, pannis, & linteis curiose nimium interponunt, ut odoris suauitatem contrahant. Defertur Augusto & Septembri mense uenalis per urbem, pymen, magno clamore denunciam, portantes corribus rustici, inde nomen hoc pymen manauit in uulgus. nam hac facie conspicitur: si nitida herba, luteis ramulis ex intervallo brachiatis, folijs cichorij, odoratis, erumpente pasim semine in racemulos collecto, quod per maturitatē gummoso lentore pellucet, coëuntibus fulgore aurifimul acinulis, unde nomen Græcis ductū. Pymen, uel potius pygmen uulgo Gallis putauerim nominari, quod ex se pygmenarij inuictoris uice faceret unguentū. nam si prægnans suo liquore premeretur, in gummi lentesceret.

Geranium rubrum, quibusd. m.
Behen rubrum.

Geranium. Cap. CXI.

Geranium folijs anemones, diuisuris longioribus: radice subrotunda, cum estur dulci: Quæ drachmæ pondere in uino pota, uulua inflationes discutit.

Geranium alterum, caulibus minutis & pilosis, sesquipedalibus: folijs maluæ: in summis alis sursum spectantia gruum capitula in sunt, cum suis rostris, aut canini dentes. Nulius in medicina usus.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Duo Geranij Dioscorides tradit genera. Primum quod longioribus rostris, & in mucronem acuminatis constat.

Hoc hodie Officinis & Herbarijs Acus pastoris & Muscata, Germanis uerò Storckenschnabel dicitur.

Alterum, quod maluæ folia habet, Pes coruius uulgo nominatur, & Officinis Germanicè Krautsüß, & Scharenkraut appellatur: præter hæc duo alia adieciimus genera, inter quæ unum folijs Cherephylo simile existit: herba Roberti & Robertiana, Gallis de l'herbe au chancre, Germanicè Rüpschtkraut, Brabantis, Oyeuarts beek.



Geranium

Acupatoris.



Herba Roberti.



Quartum folia obtinens laciniata, Germanicè pro certiori discrimine Branchialis vocari potest.
 Quintum, quod folia ranunculi habet, Gratia Dei nominatur. Germanicè Gottagnad.
 Sextum, quod forma quarti generi simillimum est, nec ferè ab illo nisi sola magnitudine foliorum, florum
 & radice distat, Germanicè Bläwurz, à rubro colore, aut mirifica in sistendo sanguinis profusio fa-
 cultate, vocatur.
 Omnium folia & radices, primo excepto, cuius radix dulcis est quodammodo, atq; discutendi adeo ut pre-
 dia adstringunt & seccant.

Gnaphalium. Caput CXII.

Gnaphalij folijs mollibus minutisq; pro tomento utuntur. Bibuntur efficacia-
 ter folia in uino austero ad dysenteriam.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, τρυφάλοιον. Latine, Gnaphalium, tomentum. Officinis Centunculum, centuncularis herba,
 Germanè, Rattent, Martenflachs, Wiesenwollen. Brabantis, Rootmeltjocentuyt.
 Gnaphalium

A

Gnaphalium,
Kärfraut/Wartensflachs.

Linum pratense, Tomentum.
Wiesenwollen.



Gnaphalium uocata est hec herba, Galeno autore, à candidis mollibusq; eius folijs, quibus ἀνρί γναφάλας, hoc est, pro tomentis uuntur. Gnaphalium itaq; dicitur quasi tomentitia. Centunculum autem dixerunt, quòd centonibus eius tomento maxima sit cognatio. Germanicam priorem nomenclaturam ab eius facultate aduersus dysenteriam illi inditā esse, nemini non notum est.

Est & alterum Gnaphalii genus, Linum pratense, siue tomentum uocatum, rotundum iunci genus, in cacumine tenui alba lana, qui flos & semen est: poterit eo usu esse quòd Xylon. Confert & uino coctum torminibus uentris.

Typha. Ca. CXIII.



Typha folium ædit cyperidi simile: caulem album, leuem, æquabilem: florem in cacumine ambientem, densum, qui in pappos soluitur, quod paniculam aliqui nominant. Huius herbæ flos, suillo adipe eloro exceptus, ambustis medetur. Gignitur in palustribus & aquis stagnantibus.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Τύφη, ἢ Τίφη.

Latine, Typha apud Theophrastum aquaticus frutex, nec radice numerosa coherens, sine geniculis, & folijs cirpi modo profiliens, Orchamenion circa lacum, parte caudici proxima, esu præcipue pueris tenera. Sunt qui folijs literæ mutatione à cereali typha putent differre, tipham scribentes. Germanicè, ut Euritius Cordus tradit, Moskölden/Warzenkölden/Dettelsölden/L. esköspen. Brabantis, Lisdoden. Gallis mache, uel masse, ab similitudine insignis illius clauæ argenteæ, uel aureæ, quæ ante primos magistratus gestatur, dicitur. Namq; in paludibus & stagnantibus aquis erumpit, folio cyperidi proximo, caule alto, leui, plano, enodi, cuius cacumen densa florum congerie stipatur, & ueluti spissa capitatur lanugine, quæ in pappos tandem euanescat. Galli massas apposuere dixerunt, quòd sceptræ regum, machas uulgo dicta, perpolitus caulis lanosa floccorum densitate summam fastigatus emuletur.


Huius generis arundinis & caricis plura sunt genera, plerumq; acutis

utrimq;

tring; cultri modo folijs, flore albo, ueluti cucurbitæ: Quorundam se-
men in acuta caputella condensatur: quo, unâ cum radice, uino cocto, u-
renati morfus loti, sanantur. Alia absq; flore arenosis locis & montibus
proueniunt, duris quasi calamis, rustico usui uariè accommodata.

Sparganium, Calamagrostis,
Ried. Carex, Graß.

Gramen,
Klein Riedgras.



Filipendula.

B



Circæa. Caput CXIII.

Circæa, quam & dircæam aliqui uocant, folijs est hortensis
solani, agnatis crebris: flore nigro, pusillo, copioso: semi-
nemili, nascente in quibusdam ueluti corniculis: dodrantali ra-
dice, triplici fermè aut quadruplici, candida, odorata, exalta-
ficiente. Nasctur in apricis, saxis, & uento perflatis. Radicis tusæ
pondo quatuor. in sextarijs tribus uini dulcis, per diem & no-
ctem macerantur, potuq; triduo uulvas expurgât. Semen in for-
bitionibus datum, lacte mammæ nutritum explet.

Circæa hodie incognita, fortè à Circæ dicta.

Oenanthe. Cap. CXV.

Oenanthe folia habet pastinacæ: florem candidum: caulē
crassum, palmi altitudine: semen atriplicis: radicem ma-
gnam in multa rotunda capitula extuberantem. nascitur in pe-
tris. Caulis eius & folia, cum multo uino pota, secundas eiciūt.
Radix è uino urinæ stillicidio conuenit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, οὐρανὸν ῥόα. Latine, Oenanthe herba.

Officinis Filipendula, Saxifraga rubra. Germanis, Rot Steynbrech, dicitur.

Oenanthe herba nascitur, ut Plin. ait, in petris, foliis pastinacæ, radice magna, nu-

Z

A merosa. Caulis eius & folia cum melle ac uino nigro pota, facilitatem pariendi præstant, secundasq; purgans, tuſim è melle tollunt, urinam cient. Recentiores in lotij ſtillicidia, & urina remoratu, neq; non renum doloribus, atq; lapide eorundem confringendo utuntur. Eandem ſtomachi inflationes diſcutere, mederi & ſuſpirioſis & anhelantibus, & omnibus morbis quos cauſa frigida concitari iradunt. Farinam eiusdem cibus comitialium inſpergunt.

Conyza.

Conyza. Cap. CXVI.

Conyza duo genera. quæ parua uocatur, odore præſtantior eſt. maior uero frutice altior & folijs latioribus, graui odore. urriusq; folia oliuæ ſimilia, hiſſuta, pingua. in maiore caulis binum cubitorum altitudine attollitur. in minore pedem æquat. ſlos fragiliſſi, lutei aut ſului coloris*, qui in pappum abit. radices ſuperuacua. Suffitu ſubſtratuq; frutex totus ſerpentes fugat. culices abigit, & pulices necat. Folia conuenienter illinuntur ſerpentium plagis, & tuberculis, ac uulneribus. flores & folia cum uino ad menſes partusq; cunctos bibuntur. item contra urinæ ſtillicidia, arquatū morbum, & tormina comitiales pota ex aceto adiuuāt. Decoctum in deſſionibus medetur uulgo malis. Impoſitus ſuccus abortum facit. ex oleo efficaciter horroribus obliuitur. Capitis dolores tenuis illita ſanat. Eſt & tertium conyza genus, caule craſſiore, ac molliore, folijs quàm parua maiuſculis, minimè pinguis, & maiore minor, multo grauioris odoris & inuicundioris, ſed inefficacior. Prouenit lo-

Hemerocallis.

NOMINA ET explicatio.

Plinio ut Dioſc. duo conyza genera in coronamentis, diſſerētia in folio: tenuius ſœminæ conſtrictius anguſtiuſq; rubricatim maris & ramoſius, ſlos

quæq; magis ſplendet eius, ſerotinuſq; utiq; poſt Arcturū, mas odore grauior: ſœmina acrior, & ideo contra beſtiarum morſus aptior. Folia ſœminæ meliſ odorē habent. Maſculæ radix à quibuſdam libanotis appellatur. Theophrasto maior dicitur maſcula, toroſiore caule magisq; ramoſo, folio ampliore ac pinguiore, nec non ſplendidiore flore. ſœmina tenuiori folio, & cōpreſſiore. Manipulo eius abiecto omnes etiam à tota domo blatta conueniunt ad eā. In coronamenta folio uenit & flore, maior & minor appellata, qui odoris ſentitur, cuius auidiſſimæ ſunt apes. Germanis Geelē münz: & ut Trago placet, Dürzwurz appellatur.

Hemerocallis, ſiue Lilium ſylueſtre. Ca. CXVII.

Hemerocallis foliū & cauſe habet lilij, porraceo colore. flores in caule per ſingulos exortus, terni aut quaterni erumpunt, lilij diuiſura, quoties dehifcere cōperūt, colore perquam pallido. radix magna eſt atq; bulbola: quæ pota, aut cum melle & lana in peſſo appoſita, aquam educit & ſanguinem. Folia trita mammarum inflammationes à partu contrahitas, oculorumq; collectiones mitigant. Radix & folia igni ambuſtis utiliſſimè illinuntur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ἡμεροκάλισ. Latine, Hemerocallis. Officinis, falſo Aſphodelus, ſiue Hyacinthus. Germanis, Goldwurz. Heyoniſch liliē / Heyoniſch blüm / Junckert liliē dicitur. Hanc quidam falſo pro uero aſphodelo cōmonſtrant, omnibus reclamantibus notis: nam radix huius nec amara nec acris eſt, ut Dioſco. Gale. & Plin. de aſphodelo ſcriptū reliquerunt. Inde hemerocallis nomen traxiſſe uidetur Græcis, quod ſlos ſuæ pulchritudinem ſuam interdū tuncat, appetentis nocte, languidus effluceſcat,

Leucojum

* Adit Mar-
cel. amarig-
nos.

B



Leucoium, siue Viola alba:

Caput CXVIII.

A

Leucoium luteum,
heiri.Leucoium purpureum,
Negelblümlein.

Leucoium album.



B

Leucoium Theophrasti, Weiss-Römungsblüm.



Leucoion uulgaris est notitia, sed in floribus differentia quaedam. nam q; aut cerulei, aut albi, aut purpurei, aut lutei inueniuntur. Lutea uero praecipui in medicina usus. Huius aridi flores seruescunt in defensionibus, ualent contra uuluae inflammationes, & menstrua expellunt. sanant oris ulcera, cum melle: cum cerato, rimas sedis. semen duum drachmarum pondere ex uino potum, aut cum melle inditum, menses, secundas & partus extrahit. Radices cum aceto illitae, lienem reprimunt, & podagricos iuuant.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Graece, Λευκίον. Latine, Leucoium. Viola matronales. Officinis, Kory quod flore aureo est.

Germanis, Gelb Violon. Dacian. Weiss-Ror-leibfarb. Neglin. Stuckburger Negelblümlein. Brabantis, Violieren.

Gallis, Violettes grassilles, dicuntur.

Λευκίον quamuis uiolam albam significet, ad omnes tamen uiolas praescribitur eas, quae primo uere nascuntur, siue albae, siue luteae, siue purpureae fuerint, seu

Z

A nigra cum Hippocrate, seu cerulea, ut quidam Dioscoridis codices habent (quod expungendum putant plerique, praesertim Plinius lib. 20. & Paulus de oleo ioto, id est, violaceo, album, luteum, purpureum, leucoion tantum commemorant) extenditur. In his efficacissima sunt lutea, Keiri Arabibus dicta. Tamen cetera tres autem caryophyllata, à floris figura, caryophylli imitant, nobis dicta, non sunt inefficaces: lingua enim valenter calfaciunt, & acrimonia sua mordent folio, sed magis flore, qui in his colore plurimum uariatur, arte opinor quaesita, ut in floribus alijs. Adversus uero Theophrastus, quod florum primum se ostendit, etiam nondum exarsita hyeme: radice bulbosa, an sit ea quae nobis circa natale Christiani florem alibi pulcherrimum trifolium natus uirentem ostendat, Germanis Hornungs blum dicta, ab alijs malo diuinari quam à me rem non satis comperitam pro uera pronunciari. De quo multa Massarius in librum nonum Plinij.

Crataegonum.

Cap. CXIX.



Crataegonum, siue, ut alijs placet, crataegonon, folijs melampyro simile est, multis calamis ex una radice emicantibus, multorumque geniculorum, semine mylii, nascitur in opacis & fruticosis, summopere acre. Triditum est quibusdam, hoc si bibat ieiuno ore, ter die post menses purgatos, tribus obolis, in cyathis aquae duobus mulier, ante conceptum quadraginta diebus: & uir modo censi mili, totidem diebus ante coitum hauriat, uirilis sexus partum futurum.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, κραταίγειον.

Latine, Crataegonum, Hippocrati Polycriton: uel ut alias legitur, Polycarpon.

Officinis, Persicaria. Germanis, Fiedschkraut.

Brabantis, Persiekeruyt, Vlooceruyt.

Gallis, Rassel, Cu raige appellatur.

Dioscorides Crataegonum melampyro similem folio demonstrat Plinius spica tritici, Theophrastus lino pyri-no, id est, lino triticeo, intelligens fuisse quod Plinius culmum siue spicam tritici. Sed suspicor melampyron in Theophrasto, unde id Dioscorides uidetur sumpsisse, legendum, cum statim adiungat fructum tanquam milium ferre, uimque genitalem roborare: nisi quis linopyren, id est, lino triticum scribendum fuit, pro melampyro, quod linum folio satis imitetur. & reuera Gallicum uulgius Chamelimum: melampyron solet uocare, quo oleum Gallia ad lucerna uim exprimit. Sed ad rem ipsam accedere uis: re uera omnes persicariae nota uidetur crataegono suffragari, quod ex una radice multis calamis, multorumque geniculorum prosiliit. Breuibus internodijs, factu quasi Milij uis pendente, aspero gustu, quod etiam opacis gaudeat. Ista persicariae maiori, quam Germanicè, Fiedschkraut, Galli curage uocant, mihi uidentur asipulari: sed quod caput totius rei est, persicariae folium tantum simile est melampyro, ut alterum pro altero fallat. Quod ad saporum perimet, admodum asper in aliquo persicariae genere sentitur, in altero lenis sit. Hæc forma, illa mascula. Quod si quis per imprudenciam se di conficiet, rabiosos solum mouere cruciatus. Crataegonum Græcis creditur appellari, quod genitalem uim roboret, ita ut diu praesumptum marces figurare prodatur.

Phyllum.

Phyllum, Caput CXX.

A


Phyllum, quod elæophyllum vocatur, in saxosis nascitur. duum generum est. quod autem thelygonum appellant, uas habet floribus oleæ similes, pallidiores tamen. folijs itidem oliuæ est, caule tenui, breui, radice exili. florem album profert: semen papaueris maiusculum. Sed arrhenogonum cætera huic simile, solo fructu distat: habet enim racemosum quiddam de florentibus oleis non dissimile. Arrhenogonon potu, masculi sexus facere partus, ut thelygonon feminei, proditur. horum Crateuas autor est. sed huiusmodi historia tenus mihi produxisse uisum est.

NOMINA ET EXPLICATIO.


Herba hodie planè incognita. Phyllum Libycum & Aethiopicum Hippocrati silphij semen est. Solet etiam pro malobathro accipi: de quo plura in lib. 1.

Testiculus, Caput CXXI.

Orchis.



Cynorchis.



B

2,

A Testiculus, quem Græci cynosorchin uocant, folijs circa caulem mollis oleæ similibus, in terra stratis, longioribus, angustioribus, læuibus: caule dodrantali: floribus purpureis: radice bulbosa, oblonga, oliuæ modo angusta, duplici ordine: superiore, quæ plenior est: inferiore, quæ mollior ac rugosior. Eduntur radices coctæ, ut bulbi, ex quibus si maiorem edant uiri, mares generari dicuntur: si minorem feminæ, alterum sexum. Addunt, in Thessalia mollem mulieres in lacte caprino bibere, ad stimulandos coitus: aridam uerò, ad inhibendos: & alterum alterius potu resolui nascitur in petrosis & sabuletis. Testiculus alio nomine serapias, Andrea autore, uocatur, quoniam radix ad multa utilis sit: folijs est porri, latioribus, oblongis, pinguibus, ex alarum sinu inflexis: caule palmeo: floribus penè purpureis, radice testiculis simili, quæ illita tumores discutit, ulcera purgat, & serpere eadem non patitur, abolet fistulas, & illitu inflammationes lenit, aridæ radices nomas inhibent: sanantq; putredines, & oris ulcera, cacoethe aluum sistunt è uino potæ. De hac eadem quæ de testiculo canis, produntur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis duorum generum est: Vnus qui cynosorchis dicitur, qui folia habet circa caulem, & in ima eius parte per terram strata, mollis, oleæ similia, angustiora tantum longioraq;: siue, ut Theophrast. tradit, folia habet scyllacea, minora tamen, & minore leuore nitentia: caulem dodrantalem, in quo purpureus flos panditur: radicem bulbosam, oblongam, duplicem, mutuo contactu coherentem oliuæ figura, superioris alteram quæ maior, acgeta & distenta est, alteram uerò inferiorem, quæ minor, languida & rugosa est. Nascitur planta hæc petrosis & sabulosis locis. Germanis Unser Strawen trähjen / Stendelkraut, Ragwurß dicitur. Brabantis, Cullekens cruyt.

Alter autem, quem serapiadem uocant, & triorchin, folia habet porro similia, oblonga, latiora tantum, pinguiq; ex alarum cauis emicantia & inflexa: coliculos dodrantales, & purpurascens flores: radix est illi minimis testiculis similis. Germanicè ut prior, Gallicè du coullon de chien appellatur. est autem Latine & Græcè sic appellata herba, à Sarapi Aegyptiorum Deo, propter lasciuia impudendam, qua is Deus Canopi, ubi templi, & cultu & religione excellens habebat, colebatur, uti Strabo tradit Geographia lib. 17. Radix eius maior calida, & humida est, gustantibus dulcor apparet. Minor admodum elaborata est, ad calidius sicciorq; tendit.

Satyrium. Caput CXXII.

^{al. multum.} **S**atyrium aliqui trifolium uocant, quoniam tria fert folia, ad terram * infracta, rumici aut lilij similia, minora tamen, ac rubra: caulem cubitalem, nudum: florem lilij effigie, candidum: radicem bulbosam, mali magnitudine, fuluam, intus ut onum candidam, gustanti dulcem, & ori non ingratam, quam in uino nigro austero bibere conuenit, contra opisthotonum. utrum dum ea dum concumbendi in celsis cupiditas, siquidem ea proniores ad uenerem fieri affirmant.

Est & alterum satyrium erythroniū siue erythraicon, id est, rubrū, semine lini, maiore, duro, leui, splendente, quod fertur non secus atq; scincus, libidinem excitare cortice radice gracili, rufo: intus autem album includitur: sapore dulci, non ingrato ori, in montosis & apricis nascitur. Venerem, ut produnt, si omnino manu teneatur radix, stimulat: eoq; magis, si bibatur in uino.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Satyrium, quod à foliorum numero triphyllon, id est, trifolium uocant, tribus plerunq; folijs fractis uirgumici, lilijue similibus, minoribus tantum & rubentibus: caulem habet glabrum, cubitalem: florem lilij figuræ, & candidum: radicem bulbosam, pomo similem, foris ruffo, intus candido oui colore, gustu suauem, & in cibo ori gratam, Germa. ut Orchis, Stendelwurß / Stendelkraut / Mergendowchen / Ragwurß dicitur.

Alterum uerò quod erythron dicitur, lini semine, æquale semen habet, maius tamen firmitusq; cum lenore splendens: radice cortex exterior tenuis & rufus, interiora uerò candida sunt, grata in cibo, & dulcia uescientibus. Nascitur apricis montanis locis. Et utriq; horum generi siue radices gemine, sed priori æqua-

L I B E R T E R T I U S

Satyrion basilicum, mas.



les, nam maior semper altera: posteriori uerò æquales, & sibi inuicem pares. Habent hodie & Syri herbam simili effectu, Bucheidenq; nominant, & Indicum Satyrion, radice candida & dura, commendatior, quo crassior, rugosior, & albius fuerit, podagris utili. Græci ferè herbas omnes libidinem stimulant, satyri uoce cognominantur. Non est omitendum genus hoc, quod Basilicon Græci, Officinæ Christi pal'mam dicunt, filijs nigra plumbagine maculosis, reliqua superficie cynosorchi similis. Radix subest lutea, ac instar manus effrige ramosa.

Postremo, quod ad nominis Satyrii rationem attinet, dictū est Satyrion à Satyris dijs syluestribus, in Venere propensiss, eo quod primi ad libidinem concitandum eam inuenerint & ostenderint. Sive quod quem admodum ipsi natura sua in eam uoluptatem sunt potentiores, sic herba hæc homines etiam ad eadem ducet, & concitiores firmioresq; reddit.

A Satyrion, femina.



Satyrion, mas.



Sylvestre.



Satyrion minus.



B Satyrion montanum.



Horminum. Cap. CXXIII.

Horminum sylvestre.



Horminum sativum.



Horminum

Horminum herba est, folijs marrubio similis, caule semicubitali, quod drangu. A
lo, circa quem eminentiæ siliquis similes prodeunt, quæ ad radicem spectant,
in quibus diuersum semen recluditur: siquidem in syluestri rotundum, fuscumq;
inuenitur: in altero, nigrum, & oblongum, cuius est usus. Ad uenerem stimulan-
dam, cum uino bibi uolunt. purgat cum melle argemas albuginesq; illitum ex
aqua tumores discutit. eo etiam extrahuntur aculei ex corpore idem effectus est
illitæ herbæ. Syluestre magis uiribus pollet: quare unguentis, præsertim gleucino,
permiscetur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Hortense ὀρμινῶν κνίτρυς. Latinis orminum, & Geminalis.
Officinæ Gallitrichum. Germanis, Schallach / Schälley. Gallis oruala dicitur.
Syluestre autem Græci ὀρμινῶν ὄρμιον. Latini & Officinæ saluam agrestem,
Germani Wild Salbey. Galli brodon, oruala, toutes bone, appellant.
Ne quæpiam nomenclationis aucupium remoretur, est notandum aliquid esse cereale harminum, de quo
Theophrastus, Galenus, & item Plinius inter fruges differunt, quod amarum rugumq; est, nec cumino pen-
tus absimile, doctriuali Plinio altitudine, de hac supra quædam annotauimus inter segetes.
Orminum calidum & sic cum medio creter est, id quod amaricudo atq; strictio in gustu satis monstrant.
Recentiores easdem facultates suo Gallitricho attribuit, quas illi ueteres adscripserunt. potissimum autē
conferre ad albugines, & oculorum caliginem tradunt, ut hinc etiam colligi possit, hanc hanc Orminon
Dioscoridis esse, quamuis nonnullis legitimæ delineationis in quibusdam repugnare uideatur.

Securidaca. Caput CXXIII.

Hedysaron, unguentarij pelecium, dicitur, securidacæ uocant, fruticosa & fo-
lijs ciceris, semen rufum in siliquis tert, corniculorum modo aduncis, quod
aucupitem iecurimæmulatur, unde nomen accepit: amarum gustu. Stomacho uirile
in potu additur in antidota, cum melie ante coitus subditum, concipiendi spem adi-
mit. Nascitur in segetibus & hordeis.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græci, Πελεξίν, ἡδύσαρον. Latine, Pelecium, securidaca, hedysaron.
Officinæ incognita. Germanis, Vntraut der Limjen.
Gallis subalupina, alijs herbum, uulgo Graua, quod (ut existimo) tritico & hordeo, cum quibus alitur,
suo complexu grauis sit & molesta.
Ab una radice multis flagellis emicat, ciceris similitudine, quam & folijs æmulatur. Siliquæ corniculorū
modo aduncæ curuantur, in quæ flauum, pallidumq; & amarum semen concipitur, quod aucupius securicu-
le pelecem gerit, &c.


Onosma. Caput CXXV.

Onosma, oblonga folia habet, ad similitudinem anchusæ, longitudine quatuor
digitorum & unius latitudine, mollia, in terra iacentia, sine caule, sine semine,
sine flore radice nititur longa, tenui, infirma, rubescente gignitur in asperis. Folia
in uino pota partus extrahunt. Prægnans si eam supergi ediat, abortum facere di-
citur.

Onosma hoc tempore incognita, Plinio folia habet ferè ad tres digitos, in terra iacentia, tria, ad similitu-
dinem anchusæ incisæ, sine caule, sine flore, sine semine.

Nymphæa. Caput CXXVI.

Nymphæa nascitur in paludibus & stagnantibus aquis, folijs fabæ Aegyptiæ,
minoribus, & longioribus, alijs in summa aqua, alijs demeritis pluribus ex ra-
dice eadem prodeuntibus: flore lilio simili, albo, & in medio crocos habente, cum
defloruerit, ut rotundum malum, aut papaueris caput, extuberat nigro semine, den-
so & lato, lentij gustus caulis est levis, niger, minimè crassius, ciborio cognatus, radix
nigra, scabra, clauæ similis, quæ autumno secatur. Sicca cum uino pota cæliacis, dy-
sentericisq; auxiliatur. Lienem absumit. Radix stomachi ac uesciæ doloribus illini-
tur, uirilignes ex aqua emêdat, imposita cum pi. e, alopecij, medetur, eadem contra
ueneris

A *Nymphaea lutea.**Nymphaea alba.*

ueneris in somnia bibitur, siquidem ea prorsus adimit. pota assidue aliquot diebus, genitale infirmat. Idem semen potum efficit. Nymphae nomen sibi uendicasse uidetur, quoniam aquosa amet. plurima inuenitur in Elide, in Anygro amne, & in Bceotia Aliarto. Est & altera nymphaea, cuius flos blephara dicitur, folijs antedictae, radice alba, scabra, flore luteo, nitente, rosae simili. Huius semen & radix contra foeminarum profluvia efficaciter ex uino nigro bibuntur. Nascitur in Thessalia amne Penco.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Graecè. Νύμφαία, καὶ ὀρνίς. Latine, Nymphaea: quaedam luteo, quaedam albo flore est.

Officinis uocem Arabicam Nenufar, adhuc retinuit.

Germanis, Gelb & weisse Seeblumen / Seezwarts. Brabantis, Witte plomben, Geel plompens.

Galles Nenufar lauhne & blanc. Italis taiero, uel taicrazo de aqua.

Lusitanis Gelpiano dicitur.

Nymphaea, quod aquosa amat, dicta: una est flore albo, radice nigra, & semine nigro: altera flore luteo, radice alba. Vtriusque radix & semen frigidum, siccat sine morbo, parum detergens, proinde alui profluvia, & dysenterias cohibent: semen immodice profluens, siue per insomnia, siue aliter, retinet: ne ex uino nigro austero pota: in id efficacior lutea, adeo ut medeatur muliebri profluvio, ut ad tergendum alba pro pollet.

polet. que aqua macerata albos. pice liquida alopecias sanat. Autumno radices exciduntur: nerum fissul. A
tatis florum, quibus hodie ferè solis utimur, non meminerunt. ueteres.

Androsaces. Caput CXXVII.

Androsaces herba est amara, tenues spargens iuncos, sine folijs, folliculos in capitulis habens, in quibus semen continetur. gignitur in Syria maritimis. Ea drachmis duabus in uino pota, copiosam hydropicis urinam ciet. idem effectus est femini poto, & herbæ decocto. podagris utiliter illinitur.

EXPLICATIO.

Plinio androsaces herba est alba, amara, sine folijs, folliculos in cirris habens, & in se semen. Nascitur in maritimis Histriae, Germanis planè incognita.

Asplenium. Caput CXXVIII.

Asplenium, aliqui scolopendrium uocant, alij splenion, alij Hemionium: folijs est multis, scolopendrea animali similibus, ab radice una prodeuntibus. Nascitur in parietibus, saxisque siliceis, & opacis. nec caulem, nec florem, nec semen habet. folia filicula modo diuiduntur, subter flauescencia hirsutaq, supernè uiridia. Vm hanc habent folia in aceto feruefacta, ut per dies quadraginta pota lienem absumant, quibus etiam contritis lienem ex uino illini oportet. stranguriae & regio morbo prodest singultum sedat, calculos in uesica comminuit. conceptum adumere creditur, per se aut cum muli liene appensa. Tradunt noctu, silente luna, huius rei gratia effodiendam.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Lingua Cernina.

Citerach.



Asplenium idem cum Scolopendrio contendunt, Musa & Massarius in librum uorum Plinii: tamen Galenus ait, maiores lienis obstructions uehemētior apostulare remedia, caparis corticeustamaricis radices, scolopendrium, & scellam, et eam herbam, quæ asplenon appellatur, esse tamen id nomen representans. Vbi aperte scolopendrium ab asplenon separat, licet postea in censu simplicium asplenon uires describit, scolopendrium non meminerit. Librotamen methodi 13. scolopendrium quoque, lieni conuocari scribit, nulla mentione asplenon facta: quamquam ibi alia quoque, eius remedia attingat. Diveras etiam herbas facere uidetur in splenonitis lib. 9. comp. phar. part. Ex quibus colligere possis, herbas esse affines, non uiribus modo, sed forma & habitu, unde nomen hæc incertitudo nata sit. Quod & in Dioscoride passim obseruatur, & in Asplenon quoque, quod hoc capite statim ab initio ab aliquibus σκολοπενδριον, ab alijs ημαδονιον uocari ait, non tamen ημαδονιον dixit, quod hæc folio sit diuersissimo, quam tamen αμαδονιον, quoque uocari scribit. Vnde Massarius & ex Theophrasto affirmat, Hemionium uel Hemionium esse uulgatum nobis Citerach: Asplenon uero suum scolopendrium plantam esse aliam, ex foliorum & radicum pictura persuadere conatur. Quæ autem uidetur scolopendria, Germanis Kirsjung appellata, Dioscoridis est φούμις, à multis lingua cernina iustus appellata, quàm à Gaza scolopendrium Theophrasti, quem rectius centipedia uertisset. Sine autem Citerach sit Asplenon, aut scolopendrium, siue Hemionitis dicta, quod uulgo hæc herba plurimum delectantur, parui est momenti, quum hæc omnes lienem diminuunt, & liquant, & substantiam renui sine calore lapides etiam in uesica frangant: phyllitis cum acerba sit, diarrheas & dysenterias pota iuuat.

Hemionitis.

A Hemionitis. Caput CXXIX.

Hemionitis, quam aliqui splenion uocant, folium emittit dracunculi, lunatum, radicibus cohæret multis, tenuibus: nunquam flores, neq; semen, neq; caulem gignit. in petrosis nascens, austero sapore. Ea ex aceto pota lienem absumit.

Vide Annotationes nostras in caput proximè præcedens.

Anthyllis. Caput CXXX.

Anthyllis duplex est. quædam enim lenti simillima, folijs mollibus, rectis ramulis, palmi altitudine: radice parua, tenui. Nascitur in falsis terris, & à sole illustratis, non insulso gustu. Altera est folijs ramulisq; aiugæ similis, hirsutioribus tamen, breuioribus & asperioribus: flore purpureo, odoris admodum grauis: radice cichorij. Pota drachmis quatuor urinæ difficultati, renibusq; plurimum prodest. trita, uulnæ pituitas * emolliunt, cum rosaceo & lacte impositæ, uulneribus medentur. quæ autem aiugæ similitudinem refert, præter alia, pota cum aceto mulso comitiales sanat.

* Inflammationes.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Anthyllis Dioscoridi duorum generum est. Primum hodie incognitum.

Alterum Græcis αἰδύλλης ἑτέρα. Latinis, Anthyllis altera.

Officinis sua non muscata. Germanica appellatione adhuc caret.

Gallis sua non muscata dicitur.

Alteram quæ chamæpitios, hoc est, aiugæ similitudinem refert, Paulus in tumore pedum utitur macerata. Eam ex iuarum genere putant esse, quæ pinum non oleat, arthriticam inde diciam, quod tumens articulis medeatur.


Anthemis. Caput CXXXI.

Chamomilla vulgaris.

B Chamomilla sativa.



Chrysanthemon.



Anthemidis

Anthemidis genera tria, tantum flore distantia: rami dodrantes, fruticosi, A
 alis multis concavi: tenuibus foliolis, parvis, numerosis: rotundis capitulis:
 floribus in medio aureis, forinsecus orbiculato ambitu candidis, melinit aut pur-
 pureis, magnitudine foliorum rutæ nascitur in asperis, & iuxta semitas colligitur
 uere. Vim habent radices, flores & herba ex calfaciendi, extenuandi q; potu, & in-
 fessione, pellunt menstrua, partus, urinam, calculosq; aduersus inflationes, & ne-
 tormenta bibuntur. Bilem suffusam expurgant, iecinorum uitia sanant, decocto ea-
 rum uescicæ fouentur. Ex omnibus his generibus ad calculos efficacissima est, quæ
 florem purpureum habet, cuius amplitudo maiuscula est. hanc propriè heranthe-
 mon uocant. Ea cui leucathemo nomen est, item quæ chrysanthemon dicitur, uehe-
 mentius urinam ciunt, ægilophs illitæ medentur, commanducata ulcerum eruptio-
 nes in ore sanant, nonnulli in clysteribus ex oleo utuntur. teruntur in farinam, ad
 abigendos febrium circuitus. Flores & folia recondi debent, & priuatim rusa, in
 pastillos digeri: radix quoq; siccari, dumq; ingruit necessitas, binæ partes herbæ
 dari, modò floris aut radices pars una, modò contrà, floris partes duæ, & herbæ una,
 permutatim duplicato pondere, alternis diebus bibere autem oportet in uino mul-
 so, diluto.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, ἀνθῆμις, χαμαίανδρος. Latine, Chamemelon, Anthemis. Officinis Camomilla.

Germanis, Camillen. Gallis Camomille dicitur.

Anthemidis tria genera Dioscoridi flore tantum distant, ea est quæ à Dioscoride propriè ἀνθῆμις
 dicta, melinit, aut purpureis, quæ foris in orbem candida folia obtinet, ea est quæ à Dioscoride propriè ἀνθῆμις

Parthenium.



ὄσπυον. Et uulgo hodie Camomilla uocatur. hæc duplex est. Vna horten-
 sis, odoris mali maturi suauissimi hybernium frigus illesa perferens, et
 ad nouum uer ex radice repullulascens in hortis colitur: altera uul-
 garis Camomilla, palmi altitudine, surculosa, cauliculis exilibus, capi-
 tellis primum urentibus, mox luteis, in aspero, secco, macroq; solo, et
 iuxta semitas atq; itinera proueniens. Quæ uerò luteis per ambitum fo-
 lijs constat, ea haud dubiè est, quam priuatim Dioscorides à suis flori-
 bus γουανθῆμις nominat. Germani autem pulchrè ad Græcam ap-
 pellationem alludentes, Goldtblām / Gelb Camillen / Stredtblā-
 men / Streichblāmen, appellant. Tertia species, si Hieronymo Tra-
 gorei Herbarie diligentissimò indagatori, credimus, nulla alia est nisi
 ea, quam hodie uulgo Schartenkraut appellat, & Scharten blā-
 men: eius historiam & delineationem uide in Commentarijs Tragi.

Tenuium partium est anthemis, quamobrem digerendi, rarefacien-
 di, & laxandi facultatem obtinet.

Parthenium. Cap. CXXXII.

Parthenium, aliqui amaracon uocant, folijs est co-
 rian dri, tenuibus: flore per ambitum albo, intus
 melino, odore graui, sapore amaro. Siccatum, cum a ce-
 ro mulso aut sale potum, non secus atq; epithymum,
 & bilem & pituitam detrahit. suspensiois prodest &
 melancholicis. herba sine flore à calculosis & anhelato-
 ribus magna utilitate bibitur. Valet decoctum ad
 insidendum in duritia uuluarum, & inflammationi-
 bus illinitur sacro igni, & collectionibus cum flore.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Parthenium aliqui amaracum uocant, folijs coriandri, tenuibus, flo-
 re per ambitum albo, intus melino, odore graui, sapore amaro. Offici-
 na simul & Herbarij hodie matricaria & febrifuga. Germani Met-
 tram, matrenam, Brabantii paddel bloemen / paddendille / Wido
 de Camillen uocant. Nascitur in sepibus & alijs per multis locis. Ma-
 tricariam inde diſſiam putauerim, quòd mulieribus uteri cauſarijs, &
 ſtrangulationi uulnus oportuni ſuo uiroſo odore medicatur. Nec aliter

A à Galeno, Pauloq; quàm amara deus vocatur, quod & parthenion aliquibus amarum dici testatur. Celsus apud nos muralem herbam parthenion & perdicion appellari perhibet, ego de alio parthenio muralem herbam dixisse autumo, quæ non in sepibus, sed in muris parietibusq; nascitur, ob id parietaria uulgo nominata. Hallucinantur qui cotulam uulgo dictam Parthenium esse putant, cum folium ei feniculi, parthenio coriandri tribuatur. Saporem etiam disident, qui in parthenio amarus est, non in cotula.

Buphtalmus.



Buphtalmum. Cap. CXXXIII.

Buphtalmon, quidam cachlam uocant, tenues emittit cauliculos, mollesq; folia feniculi: luteum florem, anthemide maiorem, oculi similitudine, unde nomen traxit. circa oppida nascitur, & in campestribus. Flores cum cerato tritici, tumores duritiasq; discutiunt. Aiunt epotam post exitum à balneis, regio morbo correptis, colorem tractu temporis reddere.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Βύφθαλλος. Latine, Buphtalmus.

Officinis inusitatum. Cotula non foetida quibusdam.

Germanis Biddill / Rindsaug / Binsaug / dicitur.

Hec herba, cuius picturam d. mus, delineationi buphtalmi adanussim respondet, si flores, ut chrysanthemi, lutei essent: quare intelligendum est, Dioscor. ad discum, medianus floris respexisse, quod luteum est, non ad ambitum, in quo folia radiata candida, ut in Chamemelo, existunt, alioqui flos à Diosco. pictura dissentire cognoscitur. flores buphtalmi acriores sunt Chamemeli floribus ob id calidiores.

Pæonia. Caput CXXXIII.

Pæonia, femina.

Pæonia, mas.

B



Pæonia siue glycysside. Græcis aliquibus pentoborondicitur. sunt qui idæos dactylos, radicem pæoniam uocant. caulis altitudine sesquipedis adulescit. comitantibus multis stolonibus. Huius duo genera. mas folia iuglandis habet: in femina uero smyrnæ more diuiditur. summo caule filiquas emittit, ueluti græcas nucas: in quibus, quum dehiscunt, multa granula rubra acinis puniceorum similia inveniuntur, & in medio nigra, quinq; aut sexo purpurea. radix maris tenuis, digitali crassitudine, & palmi longitudine, gustu astringens, alba: feminae radicibus ceu glandes circiter septem aut octo inhaerent, ut in hastula regia. Feminis à partu non purgatis

purgatis sicca radix datur. ciet menses nācis Græcæ magnitudine pota, sic uentris A
doloribus cum uino auxiliatur. ualet contra regium morbum, & renum ac uellicæ
dolores. decoctam uino aluum fistit. Rubra grana rubentis menses sistunt, decem
uel duodecim pota in uino austero & nigro. stomachicis & erosionibus ea esse pro
dest. a pueris pota, initia calculorum eximunt. Grana nigra auxiliantur suppressio
nibus nocturnis, uulue strangulationibus, & matricis doloribus, quindecim nume
ro pota, in aqua mulsa, aut uino *. Nascitur in altissimis montibus & præruptis. * Hæc clausula
est additua,

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcæ, Ρεονία. Latine, Peonia, Casta herba. Officinis Latinum nomen seruauit.
Germanis, Beningen rosen / Venedische rosen / Gichtwurcz / Pfingstrosen / Benedikten rosen.
Brabantis, Mastbloemen. Gallis Penoe sine dicitur.
Peonie maris radix longa, alba & amula. ea Hieronymo Trago creditur, quæ hodie Officinis falsò dipta
mi radix Germa. Wessse diptam dicitur, cui siquidem nota omnes, quibus peonia mas apud Dioscoridem
& alios ueteres Græcos delineatur, ad anuſim respondent, quare eandem esse neminem dubitare credimus.
Contra epilepsiam Peonie radix, & Melancholiam recens collo appendenda. Luna autem decreſcente hanc
legi uolunt, marem quoque sex uina præstantiorem: leniter astringit, subamaræ est, cum quadam dulcedine et
acrimonia: si diutius mandas, menses ciet, obstructa hepatis & renum expurgat.

Lithospermum. Caput CXXXV.



Lithospermum à seminis duritia nomen accepit.
folijs est oleæ longioribus, & latioribus, mol
lioribus: iacent humi, quæ ab radice exiliunt, ramu
lis furculosis, rectis, tenuibus, firmis, crassitudine
acuti iunci, in quorū cacumine bifidi exortus, caue
liculorum speciem exhibent. folijs longis, inter * Paruis, aliqui.
quæ paruum semen, rotundum,
erui magnitudine, duritia lapi
dea. Nascitur in asperis & ædi
tis locis. Vim hanc habet, ut se
mine cum uino albo pota calcu
los frangat, pellatque urinam.

Phalaris.

Byfar.

NOMINA ET
explicatio.

Græcæ, Λιθοσπερμ.

Latine, Lithospermum.

Officinis milium solis.

Germanis Weithut, dicitur.

Brabantis, Peerlecruyt.

Dicitur autem ab omnibus tum Offici
nis tum Medicis hodie milium solis, quod
ut reor, semen candore solaris ac lucis
splendore fulgeat. Super autem astric
tioriam qualitatem, adeoque exicatoriam
vim obtinet.



Phalaris.

Cap. CXXXVI.

Phalaris cauliculos emittit zæ culmis similes, minutis, ac nul
lius usus radicibus, multos, duum palmorum, geni culis cin
stos, graciliores tamen, ac dulces: semen candidum, oblongum,
milij magnitudine. Tunditur, & in aqua aut uino succus ad uesi
cæ cruciatus utilissimè bibitur. Semen cochlearis mensura po
tum, ad eadem efficax est.

A A

DIOSCORIDIS

EXPLICATIO.

Phalaris Germanie peregrina, ac nisi bortis sata, ea forma, qua depinximus, prouenit, thirsulos tenues fundens à radicibus frequentes, geniculatos, bipalmesq; calamos, similes zizæ, graciliores tamen, atq; dulces, folia quoq; similitudinem eius habent. Semen amplitudine milij oblongius, nomen apud Germanos nondum inueni.

Rubia. Caput CXXXVII.

Rubia satina.

Rubia sylvestris.



Erythrodanum radix rubra est, qua tinguntur lanae, una sponte prouenit, altera feritur, ut in Thebana Gallia, & Rauenna Italiæ. in Caria inter oleas, ut in aruis, solo creditur hanc non sine quaestu ferunt: namq; maximum ex ea sentiunt prouentum, aspericaules & quadranguli, longi, aparina non dissimiles, robustiores, & multo prorsus maiores: folijs per interualla certa circum articulos stellatim decussatis. Semen eius rotundum, inter initia uiride, mox rubrum, postea cum ematur uir, nigrum: radix tenuis, longa, rubra. Vrinam ciet: qua de causa regio morbo opitulatur, pota cum aqua multa, item ischiadicis & resolutis, crassam, copiosamq; urinam pellit, nonnunquam & sanguinem bibentes tamen quotidie lauare oportet, & excrementorum quæ redduntur differentiam spectare. aduersus serpentium morsus, ramulos cum folijs uino bibere prodest. Semen ex aceto potum, lienem absument. Imposita radix trahit partus, menses, secundasq; albæ utiligini illita ex aceto medetur.

Alij, Succum ex uino.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, ἐρυθρόδανον. Latine Erythronium, Rubia. Officinis rubia tinctorum.


Germanis, Fei ber rbe. Brabantis, Meccuyt. Gallis garence dicitur.

Dioscoridi Rubia altera sponte prouenit, altera feritur, in primis tingendis lanis & corijs necessaria. Scripi: humi uel gramen, locis umbris conficienda. Semen eius rubrum est, & radix rubra, altitudinis tanta, ut raro tota queat effodi. Rubia satina radice acerba, & amara, lienem & icterum expurgat, urinas crassas, multas, sæpe etiam cruentas, & menses mouet, albos albos cum aceto terget, Cortex rubie recipitur in Antidotis ad lienem, Aethiopia.

Lonchitis.

Lonchitis. Caput CXXXVIII.

A



Lonchitis folia habet porri, latiora, rubentia, plurima, ad radicem circumfracta, ueluti in terrâ procumbentia, pauca in caule, in quo flores, ceu galericuli, hiantibus comicis personis similes, nigri, & è rictu albam exerentes uelut linguam, quæ ad labrum inferius spectet: semen in uolucris clausum lanceæ simile, triangulum, unde sibi cognomen tum arrogauit. radix dauci. nascitur in sitientibus & asperis. Radix ex uino pota urinam ciet. Altera est lonchitis, quam aliqui asperam lonchitin dicunt: folia scolopendrij emittit, sed asperiora maioraq; ac multò magis diuisa. Vulneribus mirum in modum prodest, in eisq; inflammationes excitari non patitur. pota ex aceto lienem absumit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Lonchitis Dioscoridi duplex est. Prima habet folia porri, ut Dioscorides tradit, rubentia ad radicem, & plura quam in caule, capitula personis comicis similia, parua exerentibus linguâ, radicibus prælongis. nascitur in sitientibus, sepe in aridis & petrosis inuenitur: sed nullum succurrit nomen dignum, quo inscribatur. Pueri qui montibus oberrant, nigros capillos, quasi Galeros, Germanicè Sâzwartz kappen, nominant. Altera lonchitis, cuius picturam damus, quam asperam cognominant, Romani longuam aut colubrinam, Germani Steynsaren / Eptcant / filijs scolopendrij scabrioribus, amplioribus, diuisioribus quoq; maioribus, uulneraria herba, plagsq; inflammationes abigi, nec eas cingere uel morfu patitur, ut Dioscorides quoq; affirmat. Pota cum aceto lienem absumit. Hanc hodie quidam uerum esse scolopendrium falsò contendunt.

Althæa. Caput CXXXIX.

B

Althæa.

Herba Veneta, Venediger rößlin / Wetterrößlin.



Althæa, quam alij Albiscum uocant, in syluestrium maluarum genere est, cui folia ut cyclamino, rotunda, lanugine canescunt: flore rosaceo: bicubitali caule: radice lenta, intus alba. Althæa appellatur, quòd inter primas sit utilis, & pluribus polleat remedijs. Decocta enim in uino aut aqua multa, & per se cum imponitur tusa, efficax est contra uulnera: item ad firumas, parotidas, abscessus, mammarum inflammationes, fracta sedis, inflammationes, neruorū rigores: siquidem discutit, & excoquit, rumpit, & ad cicatricem perducit. cocta ut dictum est, adiecto suillo adipe, aut anserino, terebinthinæ, ut

A malagmatis lentor fiat, facit ad uulua inflammationes, preclusionesq; in pelsis subdita. decoctum eodem fungitur munere. onera uulua, reliquasq; a partu extrahit. decocta succus ex uino potus, succurrit urinae difficultati, calculosorum cruditatibus, dysentericis, ischiadicis, tremulis, ruptis: dentium mulcet dolorem, cum aceto decocta, colluto inde ore. Viride semen siccumq; tritum, uutiligines in sole perunctas emendat. eodem cum oleo & aceto peruncta, a uenenatis non feriuntur. ualet contra dysenteriam & sanguinis reiectiones, aluiq; profluuium. in posca aut uino decoctum bibitur, contra omnes uesparum, apum, similitumq; aculeatos ictus. Folia cum olei momento, morsibus, & igni ambustis illinuntur. Constat aquam trita radice addita, sub diuo addensari.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græci, αλδαλα. Latine, Althea. Ibisus. Officinis Euisus, bis malua, malua iscus.

Germanis, Risch / Reylwurz. Brabantis, Witte hoemst / witte Maluwe.

Gallis des guimauues dicitur.

Althea siue Ibisus, est malua agrestis, folijs, ut cyclaminus, rotundis, radice lenta, intus alba, substringente. Partibus suis omnibus digerit, laxat, phlegmone leuat, mitigat, coquit abscessus coctu difficiles, adipibus incocta & subacta. Radice autem & semine tenuiorum est partium, magisq; tum siccatur, tum terget.

Alterum genus Altheæ Hieronymus Tragus demonstrat, à loco unde ad nos allata est, Rosam Venetam uocatam. Producit semen nigrum, folia in cubiti altitudinem excrescunt, alceæ modo serrata, hirsuta capitella malua modo fert. Mense iunio florem subpurpureum subalbidū oblongum habet, cuius interiora lutea sunt. Radix odore, sapore, & operationibus altheæ per omnia similis est.

Alcea. Caput CXL.

Alcea.

Herba Vngarica,



Alcea syluestrium maluarum generi assignatur. folia habet diuisa, uerbenacæ proxima: caules tres aut quatuor, cortice canabino uestitos: flore rosæ, paruum: radices albas, latas, quinque aut sex, cum plurimum cubitales. quæ cum uino aut aqua potæ, dysentericis ruptisq; medentur.

NOMINA

LIBER TERTIUS
NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Ἀλκα. Latine, Alcea. Officinis Bismalua, seu Althea sylvestris, herba Simeonis.
Germanis, Feltiß / Lewenzian / Hochleuchten / Sygmars wurz / Simons wurgel.
Brabantis, Cattefaestfens. Italis herba Vngrica. Gallis Dimaue, ou guimaue sauvage.
Altera apud nos inuenitur in syluis, caulibus foliosis, cannabino cortice, minutis, fronde malue quasi cir-
cinata, & striguntis uerbenacæ profundioribus lacinia, flore rosæ, paruo, radicibus obliquis, quinis se-
minisue cubitalibus albis. Hic notandum, quod ea herba, quam Itali herbam Vngricam uocant, & Manardus
ueram alceam esse putat, à nostra uulgari Alcea diuersa est, ut præcedens ipsius pictura clare ostendit. Hæc
nisi malua hortensis fuerit, nusquam eam apud nos sponte prouenientem uidi, sed ex Italia allatam, in hortis
cultam, omnino ueram esse Alceam, & Dioscoridis delineationi proximè accedentem, arbitramur: cuius usus
esse debet in med. cinis.

Cannabis. Caput CXLI.



Cannabis sativa planta magni in uita usus ad ro-
bustissimos funes factitandos: folijs fraxini,
grauis odore: caulibus proceris, inanibus: semine ro-
tundo, quod largiore cibo genituram extinguit. Suc-
cus ex ea recente, conuenienter aurium doloribus in-
stillatur. Sylvestris cannabis uirgas fert althææ si-
miles, minores, nigriores & asperiores, cubiti altitu-
dinem æquantes: folio satiuæ, nigriore & asperio-
re: flore lychnitis, subrubro: semine & radice al-
thææ. Decocta radix, illitu inflammationes mulcet,
tumores discutit, tofos articularum dissipat. Huius
cortex torquendis funibus accommodatus.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Κανναβις. Latine, Cannabis.
Officinis Latinum nomen seruauit.
Germanis, Hanff. Brabantis, Demp.
Gallis chanure appellatur. Anagyris.
Cannabis leguminibus assi-
gnatur. Huius semen, ut Gale-
nus est autor, magno negotio
concoquitur, stomacho & capi-
ti aduersatur. prauos creat hu-

mores. Sunt tamen qui hoc quodq; totum insitumq; cum bellarijs, que se-
cundis mensis præbentur, usurpant. Admodum excofacit, & caput æ-
stuoso halitu sursum misso tentat.

Sylvestris Cannabis nascitur in syluis, uirgulas Altheæ fundens: di-
uersa ab hac, quam Germani. Wilden hanff appellant.

Anagyris. Cap. CXLII.

Anagyris frutex est arboris instar, grauis odore:
folijs agni, uirgisq; flore brassicæ. semen in cor-
niculis non breuib; gignit, subrotundum, firmiter, uer-
sicolori facie, simile renibus, quod durefcit uua matu-
rescente. Tenera folia trita tumores illitu reprimunt. si
partus hæreat, & secundæ mensesq; morentur, drachmæ
pondere bibuntur in passo. sic & suspiriosis dantur, &
contra capitis dolores in uino. difficulter parientibus
adalligantur, ita ut à partu statim auferantur. Radicis
cortex* concoquendis discutiendisq; adhibetur. Semē
commanducatum uomitiones uehementer ciēt.



* Alij succum.

A

NOMINA ET EXPLICATIO.

Anagyris recentioribus *malua terrestris*, quod humi *malua* modo iaceat, dicitur: rusticis putidum lignum. Arboris instar fruticat, folijs et ramis *amerina*, foedo odore, flore *brassicae*, siliqua terete, qua semen continetur renibus simile, cum menses maturefcens, etc.

Cepæa.

Caput CXLIII.



Cepæa portulacæ similis est, sed nigriora habet folia, & radicem tenuem. Folia in uino pota, urinæ stillicidio, & uesciæ scabie laborantibus opitulantur. maxime id præstat, si cum decocto radicis *asparagi* eius, quem *myacanthos*, hoc est, corruptam uocant, bibatur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Κηωδαία Græcis, Latinis *Cepæa*: quibusdam caputatur, quam Germani *Bachpungen* uocant: nascitur in aquis et littoribus arenosis.

Alisma. Cap. CXLIIII.

Alisma, alij *damasonion* appellant: folia ei *plantaginis*, nisi angustiora essent, *laciniola*, connexaq; in terram: cau

Plantago Italica.

B

le simpliciter tenui, cubito altiore: capitibus thyrsi: flore tenui, candido, pallente: radicibus tenuibus, ut ueratri nigri, acribus, odoratis, modicè pinguibus, aquosos amat tractus. Radix, si drachma una aut altera bibatur, his conuenit, qui leporem marinum deuorauerunt, aut à rubetis ranis demorsi sunt, aut opium hauserunt torminibus atq; dysenteria, per se, aut cum pari modo seminis dauci, potui datur. Conuulsis, & contra uitia uuluarum prodest. Herba sistit aluum, menstrua pellit tumores illita mitigat.

NOMINA ET EXPLICATIO,

Bali

Plantago aquatica.



Multibastenus pro vera Alisma plantaginis aquatica, quae et herba syluana, et Germa. Wasserwegrich. Brabant. Water wechbree dicitur. alij uero eam herbam, quam Herbarij et Officina pastorum fistulam, Germani Sietenpseiff appellant, nobis obtrusere. Sed harum neutra legitime Dioscoridis delineationi respondet, quare nos tertiam, scilicet ueram Alismam per amicum quendam ex Italia adferri curauimus, cum in Germania, quod equidem sciam, non proueniat: cuius picturam damus nomine Plantaginis Italicae. Hanc recte Italianisq; uenit wedrich Germanice dixeris folio arnoglosi est, sed angustiore, et semper in terram demisso, caule unico, sesquipedali, in cuius fastigio uiride alabastricolu in caulem concoloris floris dehiscit, ramis crebris, ut ellebori nigri, tenuibus, acerbis, pinguibus flore tenui in madidum pallescente: aquosos amat siccus.

Onobrychis. Ca. CXLV.

Onobrychis, folia habet lentis, longiora paulo: caulem dodrantale: florem purpureum: radicem paruum. nascitur in uliginosis & incultis. Herba suapte ui, si trita illinatur, tubercula dissipat. cum uino pota, strangurias sanat. illita ex oleo, sudores mouet.

Hec herba quae sit, non constat.

Hypericum. Ca. CXLVI.

Hypericum, alij androsamon, (alij corio, alij

Hypericon.

B

chamæpityn*) appellant, quoniam semen odore resinam imitatur, surculaceo frutice, dodrantali, rubente, folio rufo: flore alba uiolae, luteo, qui digitis tritus sanguineum succum remittit, quae ex causa androsamon cognominatur: sub hirsuta filiqua, & tereti, hordei magnitudine: semine intus nigro, resinosi odoris, gignitur in cultis & asperis. Urinam cit. menstrua pellit appositum, tertianis, quartanisq; tum uino potum liberat. Semen quadraginta diebus haustum, ischiadicis medetur. Folia cum semine illita, ambusta sanant.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Grecè. Ὠχρῶν. Latine Hypericum.


Officinis perforata.

Gallis millepertuis.

Germanis S. Johans Kraut dicitur.

Hec herba, cuius picturam damus, omnino Dioscoridis delineationi respondet, ut nemo, nisi talpa caecior. Hypericum esse deinceps reclamare possit. Siquidem surculosa est herba, dodrantalis, subrubens, folio rufo, flore luteo, quem si digitis libat terere, manus profecto sanguineo succo cruentabunt. Siliqua deniq; terete, hordei magnitudine, semine intus nigro, resinam olente. Duo itaq; in hac herba inueniuntur, quae esse hypericum, manifestè conuincunt, cruentus nempe floris triti succus, odorq; seminis resinaceus.

Alcerum



* Hec abunde.

A Alterum genus exilioribus uirgulis est, folia quodam modo esule similia, at minora, Contritum resinae odorem mittit, flore luteo.

Ascyron: Caput CXLVII.



Ascyron siue ascyroides, hyperici genus est, magnitudine distans, fruticosius, maiores habens ramos, surculosiores, rubentesq;: folia tenuia: flores luteos, & fructu resinofum, hyperico non absimilem. cuius attritu digiti ferè cruentantur, qua de causa androsæmon uocauerè. Vtus seminis ad ischiadicis. potum hydromelitis sextario, biliosa recrementa amplissimè detrahit. sed assiduè dare oportet, donec sanitati restituantur. illinitur & ambustis efficaciter.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, ἄσχυρον, ἢ ἄσχυροειδές. Ascyron Latine.

Officina & Galli, cum ceteris Hypericonis speciebus confundunt.

Germani Barthera / appellane, pulchrè ad Græcam appellationem alludentes. Græci enim à contrario huic herbe nomen imposuisse uidentur, ἄσχυρον enim illis asperitatem significat.

Hyperici species est Ascyron, magnitudine differens, maioribus, ramis fruticosius, puniceo colore, rubens. Flores fert luteos, semen Hyperico simile, odore resinae, quod cum attritur, digitos ferè cruentat.

Androsæmon. Cap. CXLVIII.

Androsæmon ab hyperico, Ascyronq; differt, quod fruticet ramulis surculosis, ac tenuibus: rubentibus uirgis, & folijs rutæ, triplo aut quadruplo maioribus, quæ trita uinoso succo manant: complureis alas habet in cacumine, utrinq; expansas, pinnatasq;: circa quas flores pusilli, lutei: & in calyculis semen pauperis nigri, insignè lineis. huius comæ trita resinofum odorem

Androsæmon.



reddunt. Semen tritum drachmis duabus potum, biliosa alui excrementa pellit ischiadicis maximè medetur: sed à purgatione aquam exorbere oportet. Herba ambustis illita medetur, uulneribus sanguinem cohibet.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis ἄνδρoςαμον. Latinis Androsæmon.

Officina & Gallicum uulguis cum hypericone confundunt.

Germanis Rânradt dicitur.

Dicitur Androsæmon, quod aut comæ, aut floribus eius tritis, hominis sanguinem referat. Differt ab Hyperico & Ascyro Androsæmon.

Frutex est prætenuis ramis, surculosis, puniceo colore, rubentibus uirgis, folijs triplo quadruplèue maioribus quàm rutæ, quæ contrita sanguineum succum emittunt. Alarum caua habet plura, in summo alarum auium modo pennata expansæ, circa quas flosculi pusilli lutei. Semen in calice, nigro papaueri simile, ueluti punctis depictum distinctumue. Comæ trita resinofum odorem reddit.

Coris. Caput CXLIX,

Coris

Coris, quod aliqui hypericon uocant. frutex est folio ericæ rubro, pinguiore, A
 cæ minore, non altior dodrante, suavis, odoratus, acris. Potum semen ~~men~~
 trahit & urinas. contra phalangiorum morsus ischiadicos & opisthotonicos ex
 uino potum auxilio est. horribus ex pipere, sed opisthotonicis ex oleo, aptissime
 illinitur*. Radix uino decocta potaq; defectis opem ferre creditur. sed laboran-
 tem inter potandum quàm optime cooperiri licet: siquidem corpus totum defu-
 dabit, ex qua re pristinam agilitatem recuperabit.

* Omnia hæc ad
 finem usq; capis
 sis à quibusdam
 omissa.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Plinius supradicta genera hyperici appellatione complectitur, duobus tantum fistigis contentus, cum tra-
 dat aliud hypericon esse, quod alij corin uel corion appellant, folijs tamaricis, & subea nascitur, sed pin-
 guioribus, & minus rubentibus, odoratum, palmo altius, suave, leniter aculeatum. Hippocrates Corem hanc
 uocauit, ut Galenus inquit, argumento seminis, quod pupillæ oculi similitudinem representat. Que sit hodie
 eius facies, aut quo nomine appelletur hodie, incertam.

Sunt qui Officinarum Carpopallamum unum genus Hyperici maximum scilicet faciant, ita quatuor ge-
 nera constituentes, quemadmodum & Dioscorides distinxit, &c.

Aiuga, siue Chamæpitys:

Caput CL.

Chamæpitys prima.

Chamæpitys tertia.



Aiuga herba in terra repens, incuruæ similis: folijs semperuiui minoris, multa
 tenuioribus, hirsutis & pinguioribus, circum ramos densis, odore pinus: flo-
 re tenui, luteo, uel candido: radicibus cichori. Folia septem diebus in uino pota-
 regio morbo medentur: & quadraginta diebus ex hydromelite, ischiadicos sa-
 nant. dantur peculiariter urinæ difficultatibus, iecinoris & renum uirij. tormino-
 sis profunt. Ea apud Heracleam Ponticam, perinde atq; antidoto contra aconitum
 utuntur, bibentes decoctum. ad antedicta illinitur, cum polenta iure decocti sub-
 acta. trita in farinam, & cum fico in pilulis sumpta, aluum emollit. excepta melle.
 cum

A cum aris squama & resina deijcit. apposita ex melle, uulnæ uitia extrahit. mamma-
rum duritias discutit, uulnera glutinat. ulcera quæ serpunt, cum melle illita, cohi-
bet. Alterum est genus aiugæ cubitalibus ramis, in anchoræ speciem incuruatis,
prætenuibibus, coma supradictæ: flore candido: semine nigro. hæc etiam pinum
redolet. Tertia mas nominatur, paruula folijs exilibus albis, scabris: caule aspe-
ro, candido: luteis floribus, semine iuxta alas. Resipit & hæc pinum. Hæc duæ uim
superioris obtinent, sed non usque adeo efficacem.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Χαμαίπυτος.

Latine, Parua pinus, Chamæpitys.

Officinis lue arthetica.

Germanis, Seld Cypressen, De lenger ye lieber / quamvis hoc nomen & ad amaram, dulcem, aut in-
nam speciem eustragæ pertineat, ut & aliæ multæ stirpes uno nomine nuncupantur.

Galli lue arthetices cognominant.

Chamæpitys, id est, pinus pumila, quod odore & folijs eam imitatur, Aiuga Idea Scribonio dicitur, alijs
Abiga, Officinis lue, calida secundo gradu, sicca tertio: amarior quàm acrior, terget, purgat, obstructum
iccur liberat, ictericis, ischiadicis cum mellicrato pota succurrit, menses, urinas, ciet, uiri-
dis uulnera magna glutinat, ulcera putrescentia sanat, mammarum durities di-
scutit. Huius radicem usurpat Asclepiades, succo tamen de-
cocto, semine, puluere, idem pollet, Galenus
libro octauo comp. phar.
part.

Finis Libri Tertij.

PEDANII

[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

PEDANII DIOSCORI^A

DIS ANAZARBEL, DE MEDICINALI MA-

TERIA, LIBER QVARTVS. IOANNE RVELLIO SVESSEONENSI IN-
terprete, cum figurarum debita appositione, & annotationibus in singula capita.
Per Gualtherum H. Ryff, Argentinum Medicum, ex doctissi-
morum lucubrationibus adiectis.

P R A E F A T I O.

TRIBVS antè libris, amantissime Aree, tradidimus odoramenta, olea,
arbores, unguenta, animalia, frumenta, olera, radices, succos, herbas,
feminaq;. In hoc autem Quarto differemus de radicibus, & eis quæ re-
stant herbis.

Betonica. Caput I.



Cestron psychotrophon uocitatur, quoniam fri-
gidis locis inueniatur. Latini betonicam appel-
lant. herba est caulem ferens tenuem, cubiti altitudi-
ne, aut maiorem, quadratum: folia quercus, mollia,
longa, in ambitu diuisa, odorata, prope radicem maio-
ra: in summis caulibus semen uelut tatur ei spicatum
inest. decerpta huius folia siccantur, plurimos ad u-
sus radicibus nititur, ut ueratri, tenuibus. quæ ex hy-
dromelite in potu, pituitosam uomitionem euocant.
Folia dari debent ruptis, conuulsis, mulieribus uel u-
malo opportunis, & ad laxandos uteri strangula-
tus, denarij pondere cum hydromelite, tres in uini se-
xtario drachmæ, contra serpentium morsus ebibun-
tur. Herba magna utilitate illatis à serpente uulneri-
bus illinitur. aduersus etiam uenena drachma ex uino
pota conuenit. præsumpta ea, si uenenum hauriatur,
nihil nocebit. urinam ciet, aluum subducit. medetur
comitialibus & infans, pota ex aqua: & iecinoris. lie-
nisq; uitij, drachmæ pondere in aceto mulso, conco-
ctionem adiuvat, si quis eam fabæ magnitudine secun-
dum cenam cum melle cocto deuorarit. modo confi-
mili acida ructantibus propinatur. Romachicis eam
manducare & succum deuorare proderit, si postea di-
lutum uinum sorbeatur. datur sanguinem excreanti-
bus, tribus obolis, cum diluti uini egelidi cyatho:
ischiadici, renum & uesicæ doloribus, ex aqua. aquæ
intercutem binis drachmis ex hydromelite, si febrici-
tant: sin aliter, ex mulso. regio morbo laborantes re-
creat. menses pellit, drachmæ pondere cum uino po-
ta, aluum purgant drachmæ quatuor potæ, in hydro-
melitis decem cyathis. facit cum melle ad rabem &
purulentam excreationem. Folia sicca tritaq; siccili
uase reconduntur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græci, Κισσός, ψυχότροφος. Latini, Betonica.
Officinis genuinum nomen seruauit.
Germanis, Betonten / Braun Betonten, / Weiß Betonten. Inueniuntur enim etiam floribus candi-
dis. Gallis de la Betonice.

A

Vetonica altilis.

Etenpreiß/ Grundtheyl



B

Betonica seu Vetonica, herba est nota, satis ab autore descripta, & quotidiani ac laudatissimi usus nostro tempore contra capitis morbos: praesertim flosculi ipsius saccharo conditi. Dicta autem est Vetonica ab inventoribus, ut Plin. lib. 25. cap. 8. testatur, inquit: Invenere Vetones in Hispania eam quae Etonica dicitur in Gallia, in Italia autem serratula. a Graecis cestron aut psychotrophon, ante cunctas laudatissima. Cestron vero uocata est Graecis à uarietate & copia remediorum, uarijs enim & plurimis morbis accommodata est. Psychotrophon autem causa ab autore satis reddita est. Betonica amariuscula, subacris, incidit, calculos renum frangit, pulmonem, thoracem, hepar, purgat ac tergit, menses mouet, epilepticis, acidum ruentibus, ischia dicis, pota prodest: admodum autem ulceri, omnibus bestiarum moribus, Betonica, de qua praesent cap. Dioscorides agit, *Ξαρχυδαρυ* Graecorum esse inde patet (quod locis aliosis gaudet) amariuscula est, ac subacris, incidit, calculos renum rumpit, &c. lib. 7. simp. Et aliud Betonice genus, ut Plin. lib. 25. cap. 8. abunde docet, & in aliquibus Dioscoridis codicibus huius quoque secunda Betonice mentio fit, haec Betonica siue Vetonica altilis aut coronaria dicitur. Germanis *Grassblumen*, *Wegblumen*, *Grassnegel* lin. Brabantis *Ginoffelkens*. Gallis, *grophles*, *oycelles*, hanc tam Officina quam Herbarij, medicij, Tunicam, detractis à Betonica duabus literis prioribus, nominant. Siquidem, ut eius pictura ostendit, folijs est porraceis, oblongis, per extremum mucronatis, concoloratu caeteris, teretibus cauliculis, sesquicubitalibus, geniculatis, coeuntibus pyxidatim internodijs, floribus omnium speciosissimis, cariphylorum odoratu, sed longè suauissimo, quandoquidem alius coccineus, alius saturata nixet purpura, alius emaculato blandius colore, alius uersicolore uariatur commistu. Omnibus teres longiusculusq; calyx spectatur, orbiculo superiore denticulatus, à quo quina senaue folia prodeunt, lente quidem subriata. Nonnulli tamen flores frequentiore coma stipantur, geminus utrinque emicantibus stammineis apicibus radice promissa, simplici geniculata. Vfus eorum in coronis propè nimius. Vires habet primae Betonice.

Sunt qui Pauli Aegnetæ Betonica eam herbam esse arbitrantur, quam Germani Etenpreiß, & à nostra sanandi uulnera facultate, Grundtheyl dicitur.

Britannica.

Capus 11.

Britannica

Colubrina.



Britannica aut uetonica, folia habet sylvestris lapathi, sed nigriora, & densiora, gustu adstringentia: radicem tenuem & breuem: caulem paruum emittit. Folijs ex-
primitur succus, qui igni aut sole cogitur. Vim habet ad-
stringentem, priuatim depascentibus oris & tonsillarum
ulceribus accommodatam. ualet etiam ad reliqua, quibus
adstrictione est opus.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Britannicam hodie Italia Piatamanam appellat, quidam Lapathum acu-
tum, quod folia rumicis habeat. Ceterum & longiora sunt & nigriora, caro-
nosiora & lanuginosiora, radice nigra & uesca. Sunt qui putant eam esse
herbam, quae Officinis bistorta, Germanis Waterwur, Genßampfer, as-
citur, cuius picturam hic damus.



Etenim folio est rumicis, à terra caeso, supernè uiridi: flore rubro: radice
concolori, contorta, nigricante, cui eadem quae Britannica uires à medicis
tribuantur.

Lysimachia.

Cap. III:

Purpurea.

Lutea.



Lysimachia, quam
aliqui lytron appel-
lant, caules emittit cubi-
tales, altioresue, frutico-
sos, tenues, prodeunti-
bus geniculatim folijs,
tenuibus, salicis figura,
gustu adstringentibus, flo-
re rufo, aut aureo-gigni-
tur in aquosis & palu-
stribus. foliorum succus
adstringente sua ui. san-
guinis reiectionem sup-
primit. dysentericis po-
tui datur, aut infundi-
tur. mensum abundanti-
am sistit, in pello. sangui-
nis profluuio subuenit,
si nares ea herba obture-
tur. uulnere cruorem
cohibet. acerrimum ni-
dorè suffita reddit. qua
de causa serpentes fugat,
& muscas interficit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Graecè, Ανορύχισος.

Latine, Lysimachia, uel Lysimachium.

Officinis Salicaria.

Germanis, Rot & gelb Weidenich appellatur.

Lysimachia duo esse genera, ex Dioscoride hoc loco & Plinio satis liquet. Plinij enim purpureum florem

A habet, hinc nos illam purpuream appellauimus. Germanicè Braun weydetich. Dioscoridis uerò rufus, hoc est, aureos, ut metipse interpretatur, flores obtinet, ideoq; luteam nominauimus. Germanicè Gelb weydetich. Et hec quidem altera magis astringit, inq; usu medico hoc nomine eidem preferenda.

Sanguinaria, seu Polygonum.

Caput IIII.

Polygonum mas, ramos habet teneros & molles, frequētib; geniculis cinctos, qui per terram, ut gramen, repunt. folia rutæ, sed molliora longioraq; semina

Polygonum, Weggras.



sub folijs turgescēte: unde marem appellari uolunt: flos eius candidus, aut puniceus. Vis epoti succi est spissare, ac refrigerare, prodest cruentæ excreationi, cholera, alui fluxionibus, & urinæ stillidid. urinam apertè ciet: cum uino potus, contra serpentium morsus auxiliatur. datur in febris per horam ante significationes. fœminarū profluua impositu sistit. idem succus purulentis auribus instillatur. facit eximie ad genitalium ulcera, cū uino, adiecto melle, decoctus. Stomachi feruori, sanguinis reiectionibus, ulceribus quæ serpūt, ignibus sacris, collectionibus, tumoribus, & recentibus uulneribus folia illinuntur. Sanguinaria i cœmina fruticat uno caule, arundini teneræ simili, densis geniculis. & in seubarum modo factis. articulos in orbem cingunt apices foliolis piceæ similes. radices nullus usus: nascitur in riguis Huic quoq; spissandi refrig

gerandiq; natura, ad eadem ualens, sed inefficaciōr.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Knawel.

Hippuris.

Græcè, Πολύγονον.

Latine Polygonū, Sanguinaria, Seminalis. Officinis Corrigiola, & Centūmodia. Germa. Wegdait, Weggras, Denna grass. Gallis de la corrigiole dicitur.

Vim adstrictoriam quandam obtinet Polygonum, ita sane uincit in eo aqueum frigidum, ut uidelicet secundi sit odoris medicamentum refrigerantium, aut etiam quodammodo in initio terij. Est etiam exicatorium.

Est & alia herbula cōsimilis uiribus polygono, Germanis Knawel uocata, gustu dulci, palmi altitudine, exilibus flauis folijs, instar chamæcyparisi, stoculo & semine subuirdi, milij similitudine, odore graui. nascitur a quosis agris. Haec herba uino cocta, uel aqua inde destillata, pota, calculis medetur. Est & gratum iumentis pabulum.

Polygonon fœminarum rura Gallia aquaticam pinum nouerunt nominare, namq; ea in humidis fruticat uno caule, arundini tenerissimuli, de bis geniculis in se tuarum modo factis, quorum torulos folia pinus in orbem cingunt, radice nullius usus. inuenitur in riguis.

Germani uocant Aleyn, Rosenwadel, & Rantenkraut.



Polygonatum.

Caput V.

Polygonatum nascitur in montibus, frutice cubito altiore: folijs lauri, latoribus & lauioribus, sapore mali coronei, aut punici, cum quadam adstrictione flores per singulos foliorum exortus promit, candidos, folijs numerosiores, incepta a radice

Polygonatum minus.



Clematis altera.

radice supputatione. radicem habet al-
bam, mollem, longam, crebro genicula-
tam, densam, graueolentem, digitū cra-
ssitudine æquantem: quæ uulneribus ef-
ficaciter illinitur: quinetiam maculas
in facie delet.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Πολύγονον. Latine, Polygonatum.

Officinæ & Herbarijs Sigillum Salomonis.

Germani: Weiswurz, Salomons figel.

Gallis Geniculice, quasi geniculata.

Nomen traxit, quod radix frequentibus geniculo-
rum nodis interuallata tumet. nam caulis nullis cin-
gitur articulis, sed enodis attollitur nullis brachia-
tus ramis. Galenus prior, & eo posterior Paulus, o-
dorem ei quendam assignant sine gustu falsiudendo,
qui ne explicari quidem recte possit. Duo eius genera
damus. Vnum uerum, latioribus folijs: alterum mul-
tò angustioribus. Valerij Cordi inuentum. A folijs
utriusque nomina sunt indita. Singulis annis accrescit
radici nouus geniculus.

Clematis. Cap. VI.

Clematis humi serpit. læto, pin-
guisq; solo prouenit, uiticulas spar-
gens crassitudine iūci, exiguas: folio lau-
ri figura & colore, multò minora. Ea cū
caulibus in uino pota, alui profluuiā & B
Vinea perunca.



A dysenterias sedant. subdita in pello cum lacte & rosacco, aut cyprino, cruciatibus suis medentur. Dolores dentium commanducata finit. imposita serpentium moribus, iuuamentum praestat. fertur etiam contra aspidem ictus ex aceto pota opitulari. Gignitur in terrenis. Est & altera clematis, quae uiticulosum emittit ramulum, rubescentem, lentum: folium gustu admodum acre, ac exulcerans repit per arbores, ut similax. Semen tritum, pituitam bilemque detrahit, in aqua aut hydromelite potum. folia eius illita lepras purgant. Cum lepidio conditur ad cibos.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Κλημῆτις δαφνοειδὴς. Latine, Clematis daphnoides. Officinis Vinca peruinca.

Germanis, Ingrün. Sireyt. Todten violn. Gallis du petit liseron, peruenca dicitur.

Clematis daphnoides si quis imaginem naturam, effigiem exquisitus exploret, ea censebitur esse, quæ Officinis & Herbarijs, vinca peruinca nominatur, namque prælongos spargit iuncos, folia laui colore & figura, multo minorâ pingui leuor; prociuit solo geniculata reptans flagellis, gracili & in terrâ sparsa tunc, floribus violaceis, colore hyacinthino, multum sed raro subpurpureo, cibus quæque; uincis, unde vinca peruinca nomen ductum putatur. ea semper utriusque in modum lineæ filius geniculatum circumdata, rotundiora laxis, inopiam tamen florum aliquando supplet. Sic utas in clematide. Paulo Aegnetæ teste, ceteris quatuor tribus præuolentis quod gustus etiam ostendit: gustanti enim adstrictionem quandam & amarorem habere uidetur. Adstringi autem modice, sed fortiter amara est. Sic itaque; ut citius mordicationem.

Alterâ Clematis, cuius Dioscorides meminit, Græcè, Κλημῆτις ἑτέρα, Latine & natis alterâ. Germanis, Welen. Waldraben. Gallis Viorna, hardea dicitur. Eius picturam supra habes.

Clematis alterâ mihi omnino ea uidetur, cuius nomenclaturam posuimus quod ramorum fascies ea perinde quasi uinculis ligantes distinguant; namque uiticulis prælongis asperis; cernitur, & lignosis, rimosis cortice filijs horientis solent longioribus ac latioribus, flore muscoso & capillaceo, fructu exiguo, iuuicis simili, ostenturitatem rubescere, acinus ferè panicis mali, quadantenus rotundus, &c.

Polemonia.

Caput VII.

Behen album.

Behen rubrum.



Polemoniam

Polemoniam alij philæteriam, Cappadoces chiliodynamin appellant, ramis A
exilibus, utrinque pinnatis. folijs paulò quàm rutæ maioribus, ac longioribus,
calaminthæ aut sanguinariæ proximis, quibus in summis uelut corymbi dependet,
nigro femine: radice cubitali, albicante, radiculæ simili: nascitur in montosis & a-
spersis. Bibitur in uino radix contra serpentes & dysenteriam, & ex aqua, aduersus
urinæ difficultatem, & coxendicum cruciatus. datur ex aceto drachmæ pondere lie-
nolis. eadem scorpionis plagæ alligatur. Tradunt, eum qui radicem gestauerit, à
scorpione non ferri: cumque si ictus sit, nihil molesti passurum. dentium dolorem
manu mitiga.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Πόλεμονιον. Latine, Polemonia, uel Polcomonium herba.

Off. cinis Beben album.

Germanis, Daubentropff (sed à sumaria diuersa) Lidweydy/Widerstoss/Spyßpettel.

Galkis sauge sauvage. Sabaudi Clacque, uocant.

Polemonium à certamine regum inuentionis appellatur, radix eius alba oblonga, flos albus folliculo inclu-
sus, folia polygoni multò maiora huius radice hodie in Officiis frequentissimus usus, nam hanc antidotis &
fieltonibusque suis miscent. Loco Beben Arabum, quod Serapioni duplex, album & rubrum, magnitudine radi-
cis cariotæ, calida, humida, odorata, semen augens: ex Armenia defertur. Eius loco ego, si id solum possum, E-
ringij radicem substituerem potius, quàm hanc polemonij radicem. Alterum becn rubrum Serapioni dictum.

Symphytum, siue Alus.

Caput VIII.

Symphytum petræum.



Symphyton petræon, id est Alus, nascitur in petris, ramis
tenuibus, paruis, origano similibus: capitulis thymi: fur-
culosum totum, odoratum, gustu dulce, saluam ciens: lon-
ga radice, subrufa, digitali crassitudine. Decoctum in aqua
mulsa & potum pulmonis uitia purgat, sanguinem reſcien-
tibus, & renum malis, ex aqua datur. ad dysenteriam, rubraque
fœminarum profluuia, in uino decoctum: ad conuulsa ue-
rò & rupta, ex aceto mulso bibitur. quin & commanducatū
fitim sedat. faucibus asperis subuenit. uulnera recentia ente-
rocelasque conglutinat, & illitu cohibet. carnes autem cum
symphyto decoctæ coalescunt. Est & alterum symphyton,
quod aliqui peſton uocant: id caulem emittit bicubitalem,
aut maiorem, crassum, leuem, angulosum, ut sonchi inanem,
circa quem breui interuacante spacio, folia exeunt angusta,
linguæ bubulæ proxima, oblonga, hirsuta: caule secundum
angulos quosdam striato: folijs tenuibus ex alarū sinu pro-
deuntibus, in quibus flores lutei* & circa caulem uelut herba
ſci ſemina emicant. tam caulis quàm folia, aspera lanugine
horrent, tactuque pruritus concitant. radices demittuntur fo-
ris nigrae, intus candidæ, uiscoſæ: quarum est usus. Tritæ &
potæ cruentis excreationibus, ruptisque proficiunt. recentia
uulnera illitæ conglutinant. carnes quoque si concoquantur,
cogunt additæ inflammationibus præſertim ſedis, cum ſe-
necionis folijs, utiliter illinuntur.

* Alij addunt, quia
tactis ſimiles,
præter rem.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Σύμφυτον πετράων.

Latine, Symphytum petræum.

Officinis Prunella.

Germanis Brunellen / dicitur.

Vulnerariam herbam esse euidentissimam est, quare etiam si non uerū Sym-
phytum petræum fuerit, tamen illi uiribus omnino simile. Succum eius cum ace-
to & rosacco mixtum, uehementes capitis dolores sedare recentiores uno con-
sensu tradunt, si temporè ex eo inunguntur. Aphthæ & oris ulcera, fauciumque uitia succus eiusdem sanat.

A

Symphytum maius.



B

Symphytum alterum Græcis Συμυτὸν ἰστέγον.

Officinis Consolida maior.

Germanis Schwarzwurz / Wallwurz / Schmerzwurz / Weynwell.

Sunt qui in Gallia oreylle dasne, id est, asini auriculam vocant. Apud nos Symphytum frequentius flore subrubro, uel leniter purpurascens, aut candido quàm luteo Symphytum conspiciatur: quamuis et melino nonnunquam inueniatur, hoc, ut reor, facit soli diuersitas.

Modicè ordine scilicet secundo, calfacit, exicat et contrahit.

Holoetium. Cap. IX.


Holoetion quadrantal herbula est, humi repens: folijs uiticulifq; coronopo aut gramine proximis: gustu adstringentibus: radice alba, prætenui usq; in capillamenti speciem, longitudine quatuor digitorum. nascitur in collibus terrenis. Vfus eius ad rupta, in uino potæ: nam et carnes coguntur, decoctionibus addita.

Sine duricia herba est holoetion ex aduersa appellata, sicut fil dulce, seu gramen, folijs angustis.

Stœbe. Cap. X.

Stœbe uulgaris est noticiæ, cuius semen & folia stringunt, quapropter decoctum dysentericis infunditur, auribus quoq; purulentis instillatur. illita folia oculis ab ictu cruentis profunt, erupentis sanguinis impetus cohibent.

Scabiosa.



NOMINA ET EXPLICATIO.

Stœbe herba, quæ apud nos nascitur, fruticosa est, calida, acris, odoratû quippiam respiciens, ad uini conseruationem ne accescat, aptissima, si calor huius folijs admotæ ignis calore excitatus, nra crudiora percoxerit.

Stœbe, quæ et Phleos dicitur, spinam habet in folio et caule Plinio lib. 22. cap. 15. Lib. autem 22. cap. 11. omnia ex hoc Dioscoridis capite mutuatur, quod astringat folijs et semine, ob id hæmorrhagæ, dysentericæ, oculis cruentatis, auribus purulentis conueniat, quæ uires Galeni Stœbe acris et calidæ non conueniunt, neutra tamen harum nostra est Scabiosa uulgo et Officinis dicta (cuius picturam damus) quod scabiei sanande sit idonea. Folio est cruce cum adoleuit hirsuto, aculeis tamen non horrente, flore cœruleo, quæ pulmone purgando et hepati confert, et carbunculum recens admota horis tribus perrumpit.

Psoram autem Aëtij non esse nostram Scabiosam, hinc apparet, quod huius uisæ fumo arborum cruce non moriantur, imò non moueri eas magis quàm stipularum fumo expertum se scribit Syluius, quam tamen facultatem Aëtius Psoræ tribuit.

Clymenum. Cap. XI.

Clymenum caulem fert fabæ, quadratum: folia plantaginis, folliculis supra caulem in sese inflexis, ut in polyporum cirrhis. Probatissimum est è mōtib. E fructo toto cum radice succus exprimitur, qui ad sanguinis reiectiones

lectiones in potu efficax est. celiacos, rubraq; fœminarum profluuia, refrigerando A
infrinat. sanguinem naribus erumpentem supprimit. Trita folia, aut filiquæ recti
tibus uulneribus impositæ, ea ad cicatricem perducunt.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Clymenon Ruellius eam esse arbitratur, quam Officina & Herbarij partim cypriam, partim saponalē,
argumento, quod elota pinguitudinem quandam in aqua saponis modo remittat. Vulgus Gallorum Dussēgo
appellat, non ignotam ijs e uulgo, qui uiculis ulceribus medentur, extremam oram leuissimè fimbriatam, folli-
culis supra caulem in sese inflexis, ut in iride, & crebris irretentibus inuicem polyporum cirrhis, &c.

Periclymenum. Caput XII.



Periclymenon, simplex fruticat, ex interuallis
parua folia habens ipsum amplectentia, sub-
candida, hederacea, inter folia turculi exeunt, in
quibus bacca, hederæ similes: flos fabæ, candidus,
aliquantum rotundus, & quasi in folium procum-
bens: semen durum, & quod difficile euellatur: ra-
dice rotunda, crassa, nascitur in aruis ac sepibus, cō-
uolens se adminiculis propter asidētibus. Semen
eius postquam ematurit collectum, & in umbra
siccatum, si drachmæ pondere detur in uino qua-
dragenis diebus, lienem absumit, lassitudinem di-
scutit, sed urinam ciet statim à sexto die cruentam,
orthopnœæ & singultui prodest partum accelerat.
Folia sunt eisdem uiribus prædita, quæ tricenis se-
ptenis diebus epota, sterilitatem facere prodūtur:
perunctis ex oleo, febrium algores abigunt.

NOMINA ET EXPLICATIO.

B

Græcè, Περικλόμενον. Latine, Periclymenum.

Officinis Caprifolium, mater sylus: licet confundatur hoc nomen à multis.

Germanis, Gilgen consort, multis corruptè uocatur, Scumling / Spedilgen / Waldtlilgen.

Brabantis, Mammeckensteyr Switfelbloemen. Gallis Viniboscum dicitur.

Nascitur in aruis ac sepibus, conuolens se adminiculis quibuscumq; enim uero ea amplexi caulis sicut ex est,
ramulis lignosis, rufis, geminis per interualla, umbilicatis folijs, à terra cæsis, superne herbosis, mollibus, bac-
cis syluestris myrti, uel quod idem est, ruscis, in cacumine duobus folijs truncato, ita ut difficulter eruat, ra-
dice crassa.

Periclymeni fructus & folia subamarâ, tandem aeris, adeò ualenter calfi ciunt, et incidunt, ut multò usu
eruentas urinas educant, lienosos, agrè spirantes, ex oleo admota iuuat. Vides quàm fœdè labantur, qui Ly-
cium ueterum ex hoc fructu representant. Nunc flores ferè utimur, & ex eo uel flore ligustri aqua capitello
destillata, ad oris & faucium aphtas & nomas colluendæ.

Tribulus. Caput XIII.

Tribuli genus unum terrestre, folijs ad effigiem portulacæ, tenuioribus uiti cu-
lis, in terra stratis, spinis secundum folia rigidis, præduris. iuxta amnes & ru-
dera nascitur. Est & alterum genus, aquis familiare, quod in fluminibus natū comā
exerit, aculeos condens: folijs latis, & pediculo longo: caule parte summa quā
ima crassiori, capillamenta quædam indidem exorta spicantur. semen durum, ab al-
tero non abhorrens. Vterq; refrigerantis & inspissantis est naturæ: ideo inflammations
omnes cataplasmate adiuuat, ulcera in ore erumpentia, putredines, gingi-
uas, consillasq; per sanat. Succus ex his colligitur ad oculorum medicinas. Semen
dum recens bibitur, calculosis iuuamentum affert. Drachma terrestri tribuli po-
ta, illitæue, ictes à uipera recreat, contra uenena cum uino aptissimè bibitur. deco-
ctum eius sparsum pulices necat. Thraces qui ad Strymona amnem habitant, ui-
renti tribulo equos faginant, & è dulci semine & esculento panem quo uestuntur
faciunt.

NOMINA

NOMINA ET EXPLICATIO.

A

Tribulus marinus.



Terrestri tribulo, ut Dioscor. tradit, folia sunt portulacae, tenaïora. & ramiacantes in terra exigui, iuxta quos spine difficiles praedurae. Germani Wegdorn appellam: secundum fluuios & in rudibus prouenit.

Alterum genus Aquaticū, Officinis Tribulus marinus: Germanis, Wassernüßle.

Gallis Macres dicitur.

Hoc genus uulgu nostrū satis nouit, quod sit apud nos palustribus & residuis aquis familiare, siquidem cubitorum quinū & amplius in uado confurgit, ulmeo super aqua extante folio, longo pediculo, capitulis sub aqua meris, caule per summa crassiori, inferne graciliori, qui capitula montis quibusdam spicacis fruticat, semine atro, duro, nucis fr̄e magnitudine, retusis aculeis aliquot cincto, cuius nucio accole non secus atq; castaneis uescuntur, &c.

Ex hoc etiam in farinam molito per inopiam ammonē, fiunt panes, ob id Ferrariensem castaneam Galliam Padanam audio uocare. Terrestrē quibusdam esse uidetur, quod uulgu Wegdorn / Officinē calca trippam uocant, quod cacumen ueluti muricibus muniat, & spinarum aculeis insigniter armetur, ramis humi procumbentibus, siliqua spinarum uallo muricata, in qua semen rotundum, nigrum, rudera, septa uillarum obsidens, &c.

Limonium. Cap. XIII.

Limonium folia habet betæ. tenuior Limonium.



* Μικρότερον, non μακρότερον, legendū forte ex Plinij lib. 20. cap. 8.

ra & * longiora, decem, saepe plura: caulem tenuem, rectum, lilio equalem, seminibus rubris scatentem, quæ gustata adstringunt. Semen tritum, & ex uino acetabuli mensura et potum, dysentericis cœliacisq; prodest. rubra foeminarum profluua sistit. Nascitur in pratis & palustribus.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Λιμόνιον.

Latine, Limonium.

Officinis Pyrola.

German. Wintergrün dicitur, & Waldmangolt.

In umbris & syluestribus locis prouenit, folia & semen gustu uehementer adstringunt, ita ut in tertio ordine siccitatis illud recte recētiore collocent, qui eius decocto ad interna & externa uulnera potandū uiliter prebent.

Semen acetabuli mensura dysentericis prodest, hæ uires à Limonij uiribus non discrepant, adstringit enim & uulneraria herba est, ut Limonium, pyrola: floribus & folijs quoq; huic omnino similis, quare citra ullum discrimen Pyrolam, cuius picturam damus, Dioscoridis esse Limonium, assenare licet.

Lagopus.

Lagopus:



Lagopus herba fistit aluum in uino pota: aut in fe-
bri, ex aqua, eadem inguini alligatur, in inflamma-
tione. Nascitur in fegetibus.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Grece, Λαγώπιδος Λαγώπιδος.

Latine, Pes leporis, Lagopus, Leporina herba, Lagopyros Hippo-
crati. Officinis musicata.

Germanis, Ranzentlee / Ransenpföelin.

Gallis L' herbe de la trinite, ou pied de lieure dicitur.

A nullo, quod sciam, Lagopus describitur. Herba autem quam
pro eo exhibemus, caules habet rotundos, hirsutos, folia lato trifolia
que in pratis gignitur similia, semen in paniculis muscosis. L. magno-
sisq; leporino pedi similibus admodum, adfirmisq; gustus, exsiccan-
do immobinet, Galeno teste.

Medium. Cap. XVI.

Medion in saxis & opacis nascitur. folia habet iri-
dis: caulem tricubitalem, & in eo florem gran-
dem, purpureum, rotundum: semine cucurbitulo. Ra-
dicem dodrantalem, crassitudine baculi, gustu acerbo.
Quae trita in farinam, & ex melle decocta, rubros men-
ses foeminari fistit, eclegmate per aliquot dies in pro-
Semen in uino potum, menstrua pellit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Medion Plinio folia habet iridis satius, caulem tripedalem & in eo
florem grande, purpureum, rotundum, minuto semine, ad magnam cru-
B
ei radicem semipedalem. Exemplaria sunt in quibus ei folia iridis redduntur. Verum cum Plinius iridis frons
de scripsit, cum satius adiecit, non de iride, quam nemo satium legit esse sed de seride putatur intelligi. Nis-
se, cuius constat duo esse genera, satium & sylvestre. Nam, ut ait Theophrastus, iris nullum desiderat, gla-
diolum hac tempestate plane incognitum est.

Gladiolus.

Epimedium. Cap. XVII.

Epimedium, caulis est non magnus, hederæ folijs, denis atq;
duodenis, neq; florem, neq; fructum ferens: radice tenui, ni-
gra graui odore, gustu saturo, nascitur in humidis, folia cum oleo
trita, imposito cataplasmate, mammas ineficere non sinunt.
Radix conceptum adimit. Folia trita quinis drachmis, post mē-
struas purgationes quinque diebus in uino pota, praestant mulie-
ribus ne concipiant.

Forsan idem Epimeton Theophrasti fuerit, hodie incognitum est.

Gladiolus. Cap. XVIII.



Xiphion, alij Phasganon, alij macharonion. Romani gla-
diolum uocant. Nomen inde acceptum, quod folium gladij
præbeat speciem. iridi simile erat, nisi minus & angustius uide-
retur, & gladij modo mucronatum, neruosumq; in caulem ex-
cubitalem, in quo purpurei flores, in ordinem digesti, inter se di-
stant: rotundo semine: radicibus geminis, una bulborum mo-
do, super alteram insidente: quarum inferior gracilis est, super-
na uberior, nascitur in aruis Superior cum thure illita, admisto
uino, spicula & aculeos de corpore extrahit, panos cum lolij tari-
na & hydromelite discutit: qua de re huiusmodi emplastris in-
seri solet. menses imposita trahit. superiori radice ex uino pota,
menicema

A ueneram stimulari, & inferiore sumpta sterilefcere tradunt. superiorum quoq; utilis ter infantium enterocelis, cum aqua potui dari præcipiunt.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, *Ξίφυο*. Latine & Officinis *Gladiolus*.

Germanis, *Bleytblae Schwertel*. Gallis *Glais ou glaitel* dicitur.

Folia *Xiphio*, ut Theophrastus scribit, lata, ad ensis effigiem exeunt, unde nomen herbe inditum.

Scolopendria eam herbam frequentes conueniunt, mirumq; in modum gaudent huius consuetudine frui. Floret cum uiola nigra: hodie nullius usus.

Sparganium. Caput XIX.

Sparganium, aliqui *Xiphidion* uocant. folia habet gladioli, sed arctiora, & in terram magis procumbentia. in summo caule ueluti pilula prominens, in quibus semen. Contra serpentis uenena, radix cum uino datur.

Sparganii picturam & descriptionem habes supra lib. 3. cap. 113.

Xyris. Caput XX.



XYris, folia habet iridis, latiora, & in turbinem mucronata: quorum medio caulis erumpit crassus, cubitalis, ex quo siliquæ triangulares dependent, in quibus purpureus flos, in medio puniceus: semen in folliculis, simile fabis, rotundum, rubrum, ære: radix longa, geniculata, rufa. Contra capitis uulnera, fractaq; efficax est. aculeos & spicula omnia citra molestiam extrahit, adiecia floris aris tertia parte, & radicis centaury ac mellis quæta, tumoribus & collectionibus illita cum aceto medetur. Radix ex passio bibitur, ad conuulsa, rupta, coxendicium dolores, strangurias & alui profluvia. Semen tribus obolis potum, urinam uehementius impellit: & cum aceto, lienem absorbit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, *Ξυρίς*. Latine, *Xyris*. Officinis *Spatula fetida*.

Germanis, *Wandelus* frant dicitur.

A necandis cimicibus appellant, circa sepes & diueta nascitur, Italia frequens, nusquam tamen in Germania, nisi sata, prouenit: uehementer ære qualitatem obtinet, adeo ut gustata, fauces quasi urere uideatur: proinde calidum & siccum admodum esse constat.

Anchusa. Cap. XXI.

ANchusa, quæ alio nomine calyx, auronœlia appellatur, folia habet lactucæ, in acumen fastigiata, hirsuta, aspera, nigra, multa, quoquo uersum humi sparsa, spinis horrida: radici crassitudo digitalis, quæ æstate prouenit, manus inficit sanguineo colore, læto solo nascitur. Radix adstringit, ad ambusta & uetera ulcera, ex oleo & cera efficax est. igni sacro cum polenta medetur, lepris & utiliginibus illinitur ex aceto, partus extrahit, uulua indita, eius decoctum renum uitis, lieni, & bile suffusis datur: & si febris sit, ex aqua mulsa. Siftunt aluum folia in uino pota. Radice pigmentarij utuntur ad unguentorum spissamenta. Est & altera, quam aliqui alcibidion, aut onochiles appellant. hæc à priore distat, quod minora habeat folia, sed simili modo aspera: ramulos exiles: florem purpureum in puniceum uergentem: radices rubras, oblongas, quæ melsibus sanguineum succum fundunt. in sabulosis nascitur. vis ei folijsq; inest, quæ contra uirus cum reliquorum serpentium, tum maxime uiperarum, auxilietur, siue cibo, siue potu, siue alligatu. nam si quisquam mandens, in serpentis os inspuat, eum necabit. Est & alia huic haud dissimilis, semine puniceo, minore. Cuius semen manducatum, si in serpentis fauces inspuatur, eam interficiat, radix acetabuli mensura cum hyssopo & nasturtio* pota, latas uentris tinas excutit.

* Alij eardemomo.

NOMINA

Lycopsis.

LIBER QVARTVS.

301

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, ἄνθησα. Latine, Anchusa. Officinas Buglossa rubra.

Germanus, Rot Ohfensung. Gallis Orchanette dicitur.

Mulieribus non ignota, quæ colorem faciei natium fæco mentiantur, quæq; ueritaculum genarum pallorem, genituiusq; uultus maculas hoc infectu osculunt: rectè malas eleganti commendat purpurisso.

Nam hæc caulem habet erectum, folia lactuce, in acumen excurrentia, hirsuta, aspera, nigricantia, copiosa, quoquoersum humi sparsa: spinis horrida: radicem paruccam, digitali crassitudine, per ætatem manus inficientem sanguineo colore, læto solo prouincit. Sunt & aliæ anchusæ species, sed hodie incognite.

Lycopsis.

Cap. XXII.

Lycopsis, quæ à nonnullis anchusa uocatur, folijs lactuca longioribus, asperioribus, latioribusq; crassius, ad radicis caput recidentibus: caule longo, recto, scabro, hirsutis adnatis multis, cubitalibus: flore paruo, purpureo: radice rubra, & adstringente, nascitur in campestribus. Cum oleo radix illita uulneribus medetur: & cum farina hordeacea, ignibus sacris, sudores peruncta mouet, adiecto oleo.

EXPLICATIO.

Multi Lycopsis hanc esse putant, nec ab re, quam uulgus Herbariorum appellat linguam canis, Germani Linde Zundszung, nam longioribus quam lactuca folijs, subhirsutis, ad radicis caput tendentibus, semine in lappacis umbilicis rufis & exili, radice rubra, &c.



Echium.

Caput XXIII.

Echium domesticum.

Syluestre.

B



DIOSCORIDIS

A Echion folia habet prælonga, hirsuta, aliquantum tenuia, anchusæ proxima, minoram tamen, subrubra, & pingua, spinulis tenuibus horridula: cauliculos exiles, numerosos: minutæq; utroq; latere folia, expansa, pinnatæq; nigra, in summo caule minuscule: flores secundum folia purpureos, in quibus semina capiti uiperarum similia insunt. radix nigricat, digito tenuior, quæ non percussis modò à serpentibus ex uino prodest, sed eos qui antea biberint, feriri non patitur. folia & semen idem præstant munus. lumborum dolores sedat. in uino aut sorbitione sumpta, lac extrahit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, *ἔχιο*. Latinis Echium. Officinis Buglossa vulgaris.
Germanis, Liebhäuglin, Gemeyn Wchsenzung. Gallus Buglosse sauvage dicitur.
Hac Officina quædam pro uera ueterum Buglossa utuntur, non tamen sine graui errore.

Ocimastrum. Caput XXIII.

O cimoides, Latini ocimastrum uocant, folia fert ocimi, & ramos dodrantes, hirsutos, siliquas hyoscyamo similes, semine, ut gith, nigro prægnantes. Vim habet semen in uino potum, quæ uiperarum cæterarumq; serpentium moribus medetur. datur ischiadicis cum melle, uino, myrrha, & pipere. Radice nititur tenui & superuacua.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Ocimoides, quod & ocimastrum, uulgo iacia alba, & pocularia, quòd pecillorum similitudinem pecicarpa gerunt, ex Ruellij sententia. Minus enim certas ob coniecturas esse uidetur ocimoides herba, quam hodiè multibon rubrum uocant, ob floris colorem, quamuis & albus inueniatur: non autem loquor de radice, quæ falsò sic uocant, ab Arabum descriptione longè diuersum. Sed crinon quoq; ocimoides aliqui uocant: de quo in capite sequenti plura. Quidam putant Basilicon syluestre.

Erinus. Caput XXV.

E rinus nascitur apud fontes & fluuios, folijs ocimi, sed minoribus, parte superna diuisis, quinis, senisue, dodrantalibus furculis: flore candido: semine nigro, & acerbo. folia & caules lacteo succo turgent. Semen drachmis duabus in quatuor mellis cyathis oblitum, oculorum fluxiones cohibet. Succus cum sulphure & nitro instillatus, aurium dolores sedat.

* Addunt quidam, uino.

NOMINA ET EXPLICATIO.

A recentioribus Herbarijs herba lactis appellatur, à quibusdam lacteis, & militaris, alijs ocimum aquatile, trient alibus ramulis, quinis senisue folijs ocimo longioribus, albo flore, semine atro, pusillo, acris, duro. Herba succo manat lactis, tum colore, tum dulcedine, unde lactariæ nomen apud uulgos inuoluit.

Gramen. Caput XXVI.

G ramen geniculatis serpit ramulis, à quibus crebrò radices spargit dulces. articulis præcinctas folia dura, & ut arundinis paruæ, lara, in exilitatem fastigiantur, eaq; iumenta & boues pascunt. Trita radix illitu uulnera conglutinat. decoctum eius in potu, torminibus medetur, & urinæ difficultatibus. calculosa etiam uelice excrementa comminuit. Est & arundinaceum gramen, priore multò maius, quod iumenta necare traditur, præsertim in Babylone: idq; iuxta uias nascitur. Quod in Parnaso monte gignitur, densius fruticat: folijs hederaceis: flore odorato, candido: semine paruo, non inutiles: radicibus quinis aut senis, digitali crassitudine, candidis, mollibus, & admodum dulcibus. Succus si in uino cum melle pari, & myrrhæ dimidio decoquatur, adicianturq; piperis & thuris tertiæ portiones, probatissimum erit oculorum medicamentum. id in ærea pyxide reconditur. Decoctum radicis, idem quod herba præstat. Semen uehementius urinam impellit, alui uomitionesq; sistit. Natum in Cilicia gramen, quod incolæ cinnam appellant, boues inflammatis, si eo uirenti sæpe pascantur.

Arundinaceum gramen

sumus

* Alias sagmas sue opplet.

NOMINA ET EXPLICATIO.

gramen

Gramen Parnasi.

Gramen.

A



Gramen pecori esculentum, radice est modicè frigida & sicca, parū mordaci, substantiæ tenuitatem exiguam sortita, qua calculos potu interdum frangit. Germanicè Rechgriß, Juncgrasß. Quod uerò in Parnaso gignitur, ea sortē est herba, quam Germanicè unselium appellamus.

Sideritis altera.


Sideritis.

Cap. XXVII.

Sideritis tertia.

Aleyu Bathengel/weible.

B



Sideritim aliqui he
racleam vocāt. fo-
lia habet marrubij,
sed longiora, satis ad
frondem quercus aut
saluix accedentia, mi-
nora tamen, & aspe-
ra. caules & dicquadra

Atos, palmum saepe excedentes, non iniucundi gustus, aliquantumque substringentis, in quibus per interstitia orbiculatae uerebrae, uti in marrubio, spectantur, & semina in eis nigrum nascitur in petrosis. Illita folia, suapte uis, uulnera sine inflammationis periculo iungunt. Altera Sideritis binum cubitorum, ramulis exilibus: folio filicis, numerofo, utrinque per oras diuiso: pediculo longo, prodeuntibus è summo alarum sinu furculis, longis, tenuibus: capitulo in cacumine orbiculato, aspero, in quo semen continetur, quam betae rotundius aliquanto, ac durius. Huius uis, foliorumque, ad uulnera praecipua est. Sideritin aliam esse tradunt, quam Crateuas heracleam uocat, in maceris & uineis nascentem, folijs corini, à radice numerosis: dodrantalibus cauliculis, lauibus, teneris, in rubore candicantibus: flore purpureo, paruo, gustanti amaro & lento. Huius ea uis est, ut quamuis recenti uulnere imposita, sanguinem supprimat.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Sideritis prima Latinis, Graecis Σιδερίτις dicitur: magna Officinarum pars, hac herba pro chamaetipy uera uittur, non sine errore, cum satis ex forma ipsius delineatione collata constet, non esse chamaetipum. Germanis Glidtraut appellatur. Sideritis uero nominata, quod glutinandis uulneribus apta, praecipuum in bello habeat usum. Alterius Sideritis historiam ac nomenclaturam quere lib 3. cap de Geranijs.

Tertia Sideritis Heraclea, Germanis Bleyen Barthengel / weible / & Seisfraut dicitur.

Sideritis habet quandam abstergendi facultatem, id quod amaritudo eius satis indicat: & pauculam adstrictionem. Plurima tamen eius pars humida est & mediocriter frigida, phlegmonam sedat, & glutinandum obtinet.

Achillea. Cap. XXVIII.

Achillea, quibusdam Achillea sideritis, dodrantales aut maiores gerit scapos, fusorum effigie, quasi minutulis folijs circumdatos, crebris in latere foliorum sectionibus, coriandri similitudine, sub* fuluo colore, odore multo, non insuauis, medicato & glutinoso. umbella in cacumine rotunda, floribus candidis, purpureis, & aurum amulantibus. prouenit laeto solo. Trita coma sanguinolenta glutinat, & ab inflammationum periculo tuetur. erumpentem sanguinem inhibet, & croenta uulua profluvia, in uellere decocto quoque insident foeminae fluxione uulua laborantes. ad dysenteriam bibitur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Graecè, Ἀχιλλέα. Latine, Achillea. Officinis Millefolium maius.

Germanis, Groß Garbentraut / Gerwel / Schaßkraut.

Gallus Mille feulle grande dicitur.

Millefolium hactenus Achilleae appellationem apud multos etiam eruditos retinuit, cuius delineationi tamen ad singula respondere non uidetur, quare haud immerito quidam arbitrantur achilleae speciem esse eam herbam, quam Germani S. Barbaren Fraut / Galli uero carpentariam appellant, nam huius etiam usus glutinandis uulneribus propè nimius.

Rubus. Cap. XXIX.



* Alij huc addunt, amaris.

B

Rubus, notitiae uulgaris. Vim habet siccandi & adstringendi: capillum tingit. Ramorum decoctum potu aluum sistit, & foeminarum profluvia. praeteris morui accommodatissimum. gingiuas firmat. Oris uitij folia commanducata medentur. cohibent ulcera quae serpunt, ulceribus in capite manantibus, oculisque proci dentibus remedio sunt: condylomatis & hemorrhoidibus folia illinuntur. cardiacis, & stomachi doloribus, trita conuenienter imponuntur. caules cum folijs tunduntur, exprimiturque succus, mox sole cogitur, singulari remedio contra omnia quae modo dicta sunt. Mori in rubo nascentis quam optimè maturi succus, ad oris medicamenta conuenit. sistitur aluus praematuri cibo, necnon flore in uino poto.

NOMINA

LIBER QVARTVS.
NOMINA ET EXPLICATIO.

305

Rubus.



Græc. *Βάρος*. Latine, Rubus, frutex spinosus.
Officinis genuinum nomen seruauit.
Germanis, Ein Drombeerstrauch / Tragbeer.
Brabantis, Braembesien.
Gallis Ronce dicitur.

Rubi seu Sentis, Græc. *Βάρος* genera Theophrasto tria sunt: *mag-
nus*, *rectus*, *humilis* & *medius*. Batus magnus seu rectus est Dio-
scoridi & Galeni *κνυρόστροφος* fructu oblongo, per maturitatem ru-
bent, cytho simili, in quo cuiusdam flocci arteriam si deuoerunt infu-
sant, hunc Germani *Heckrosen* ou geruch, Galli Engentier sans
odeur appellant: huic folijs, fructu, rosa similis est cynosboda, Ger-
manis Wolkechend Heckrosen, nam ipsa planta quoque, in differen-
tiam alterius odorifera, Gallis Engentier de bon odeur appellatur. Hu-
ius generis Rosa omnis, nisi quod fere geru folia florum magis multiplici-
bus & maiora arte opinor adiuta: sed, ynosbatus spinis hamatis horridior, rector, & altior assurgit, odo-
re caret, quem Cynosrhoda tota habet præstantissimum, ut supra diximus, Rosa uero frutex flore solo est o-
dorato, nunc albo nunc rubeo, nunc amborum medio (Germani *Leibstrotz* / Galli *Incarnat* appellant) nunc
etiam moschato, qui Germanis *Rosen von Damasco*, Gallis uero *Roses de Damasc* appellant. *Xapue-
Βεζ* & autem, id est, humilis rubus, Dioscoridi hoc loco & Galeno absolute tantum *Ράτ* & dicitur, folijs
multo maioribus quam Cynosb. tri, bicoloribus, per nodos ternis sarmentis idgissimis & firmis, quæ par-
te terram attingunt, radicem iterum facientibus, flore albo, tenui, racemoso. Cui succedant mora grandis
racemosa, multis granis coagmentata, per maturitatem nigerrima, *Βάτ* uero Galeno dicta, Germanis *Brem-
beren*, media denique *Βάρος* id est, de quopura capite proxime sequenti.

Rubus Idæus.

Caput XXX.



Idæus rubus appellatus est, quoniam passim in Ida proue-
niat. Est autem longè tenerior priore, ac minoribus spinis
horrens quamquam & sine spinis inueniatur. in super eadē præ-
stat quæ supradictus. Caterum flos cum melle oculorum colle-
ctionibus commodissime illinitur. ignem sacrum extinguit,
stomachicisq; ex aqua bibendus datur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græc. *Βάρος* id est, *Idæus*. Latine, Rubus Idæus.
Officinis inusitata. Germanis, *Sundberen*. Gallis *Framboise* dicitur.
Egros id est, Dioscoridis longa tenerior est rubo, qui simpliciter *Βάρος* dicitur, ac minoribus spinis
horrens, quamquam & sine spinis inueniatur: frequens is est in syluis, folia habet chamaebati, sed paulò mino-
ra, rectus fere surgit, ad duo aut tria cubita, scapo gracili & infirmo, & minimum spinoso flore simili, &
fructu, sed minore, & granis quinque, ut sex coagmentato, & per maturitatem rubro aut nigerrimo, sed in
coruleum inclinante ob aerium quoddam tectum, nigris uitis & prunis, & alijs multis fructibus innascenti-
bus: attingunt, siccam, resurgunt omnia rubi genera, maius & minus. Ad Rubum Idæum docti ho-
die reducunt hortensem (cuius picturam datus) rubi recti, breuis, parum spinosi speciem, quam Germanicè
supra diximus *Sundberen* appellari, folijs bicoloribus, fructu dum maturuit olfactu & gustatu iucundissi-
mo, fragri rubri (est enim etiam album) æmulo: quem fructum herba trifolia & bicolor fere acrem, præ-
fertim semine.

Helxine;

Caput XXXI.

Helxine cognomento cissampelos, folijs est hederæ, minoribus: ramulis exili-
bus, quibus complectitur quodcumque contigerit adminiculum. nascitur in se-
pibus, uinctis, & segetibus: foliorum succus, potu deijcit aluum.


NOMINA ET EXPLICATIO.

63

A

Helxine maior.

Helxine minor.



Græcè, Ελξίvy.
Latine, Helxine, cissimpeles.
Officinis uolubilis.
Germanis, Windē
& Saunglocken.
Brabantis, Clocx
Fensicuyt.

Hic nota, etiā mul-
tos doctos uiros eam
herbam quæ Officinis
peritari dicitur, cum

B

hac, cuius picturam damus, non sine graui errore, confundere.

Elatine. Cap. XXXII.

Elatine folia habet helxinæ minora, rotundiora, pilota: dodrantalibus ramulis, quinis fensicue, à radice foliosis, guta adstringentibus nascitur in segetibus & cultis. Oculorum fluxionibus & inflammationibus auxiliatur, folijs cum polenta tritis & impositis. Eadem cocta torbitionis usu dyfenteriam sistit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Ελατίνy.

Latine, Elatine, Chamecyssos.

Officinis τσίφοβήδρα terrestris.

Germanis, Gelandtreben/ Gündelkeben. Brabantis, On-
derhaue. Gallis Raux sauvage dicitur.

Officinis omnes habent: nus hac herba pro terrestri hedera usi sunt, omnibus reclamantibus notis, sed qui hanc cum legitima Elatine descri-
ptione consulerit, faciliè iudicabit eandem esse.

Eupatorium. Cap. XXXIII.

Eupatorium fruticosa herba est, unicum efferens
Ecaulem, lignosum, nigricantem, rectum, tenuem,
hirtum, cubitalem, interdum ampliorem: folijs per
interualla quinq; folij, aut cannabis magis similibus,
quinque-



LIBER QVARTVS.

Agrimonia.

Eupatorium Mes-
suc.

Eupatorium adul-
terinum.



quinquepartitò aut amplius diuisis, nigricantibus, per ambitum serratis, semen me-
dio caule erumpit, pilosum, deorsum spectans, quod siccatum uestibus inhaeret.
Contrita huius folia & cum suillo ad pe impesita, ulceribus qua a gricatrice m-
trahunt, medentur. herba aut semen in uino porum, dytenteria, & emoritis utijs, &
serpentium ictibus liberat. Nec desunt qui aberrantes, argemonem hanc appella-
runt, cum tamen longe alia sit, uti exposuimus.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Εὐπατόριον. Latine, Eupatorium. Officinis Agrimonia.
Germanis, Agrimonien / Odenmang / Leberfletten. Galis, Αἰγρεμόνη dicitur.
Eupatorium uel Hepatorium, uel Hepatitis, omnino agrimonia uulgaris uidetur Dioscoridis, hoc Eupato-
rium cum Scrapionis Agrimonia, & Mesuc Eupatorio conferenti.

Corruptum uerò nomen ex Argemone apparet, quam falsò Eupatorium quidam (ut Dioscorides quoque
testatur) putarunt: incidit, terget, tenuium est purium, sine manifesto calore, subastrungit, iecoris ob id ob-
structiones aperit, ipsumque roborat, unde & nomen inuenit: uel cum Cicerone ab Eupatore rege: hanc etiā
Pentaphyllum uocari, quòd folio sit quinq; partitò, scrii it Galen. lib. 5. comp. pharma. part. Eupatorii nunc
folia nunc radicem Actuarum miscet.

Habetur & uulgo Eupatorium adulterinum, Germanis Zitzflee / Bängunds Kraut & Wasser-
doß. Cannabis altitudine assurgit, folijs ebuli modo serratis, Mense Iulio stilosulos fert roseos, semine endiuie
uolatil. Fluminum litoribus & locis paludosis crescit, herba est amara sicca, & calida secundo gradus.
Vulneraria est cum flore, terget exicat, cit urinam & menses purgat pulmonem & pectus. Oppu-
tionis & leuiss soluit. Suffum eius fugat animalia uenena. Cerni uenerati feruntur hac herba p-
moderi.

A

Quinquefolium.

Caput XXXIII.

Pentaphyllon.

Heptaphyllon.



Quinquefolium ramulos fert surculaceos, tenues, drantales, in quibus semina. folia menthae, quina singulis pediculis, raro plura, in ambitu serrata: florem ex luteo pallescentem, auriculatum. nascitur in riguis, & aquarum ductibus. sub rubram habet radicem, oblongam, ueratro nigro crassior. Plurimis pollet remedijs. eius radices decoctae ad tertias, si in ore contineantur, dentium dolores sedant. putrida oris ulcera, colutione sistit. arteriarum scabritias, gargarizatu laeuigat. contra alui profluvia, & dysenterias auxiliatur. item articulorum coxendicumque cruciatibus potum.

Cocta in aceto, & illita, serpentia ulcera cohibet strumas, tumores, duritias, abscessus & collectiones discutit. ignes sacros, reduuias, condylomata psorasque sanat. Tenuis radice succus, contra

fecinoris, pulmonumque uiria predest. item aduersum uenena. Cum hydromelite autem uel diluto uino, & pipere exiguu, bibuntur folia, contra febrium circuitus, in quartana quidem, quaternum ramulorum: in tertiana uero, ternum: in quotidiana, unum. ea quoque folia, tricenis pota diebus, comitialibus prosunt. foliorum succus, tribus cyathis aliquot dies potus, celerrime regio morbo medetur. illita cum melle & sale, tum uulneribus quam fistulis remedio sunt, enterocelicis auxilium praestant. Quinquefolium sanguinis profluvia & poru & illitu sistit. ad expiationes, castimonias, & incantamenta inciditur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Graece, Πεντάφυλλον. Latine, Quinquefolium. Officinis genuinum nomen seruauit.

Germanis Fünffinger Kraut. Gallis Quinze feuille dicitur.

Pentaphylli radix siccata ordine tertio, sine morfu, tenuium est partium, nimium acris, & calida. Tormentilla quae Germanis Tormentill. & Blätwurze, Gallis Tormentille dicitur, putatur, Leoniceo, Maruardo, Ruellio, quae nunc quinque folia, nunc septem folia, bis & mihi saepe uisa est: uti & uulgare quinquefolium etiam, quod consilium frequenter est: uti & Eupatorium, de quo supra, quod etiam pentaphyllon Galeno dicitur, lib. 5 comp. phar. part. Haec radix in theriacen recipitur. & nostra Tormentilla uenenis & pesti resistere experientia multa est certissimum, ut si non sit eadem, eius loco usurpari possit.

Phoenix.

Caput XXXV.

Phenix folia habet hordei, sed breuiora. & angustiora, spicam lolio similem: calamos digitorum sensu, radici aduolutos: septenas octonasue spicas. In aruis

LIBER QVARTVS.

Phoenix.



testisq; recenter illitis nasci-
tur, harum uirium compos, ut
in uino austero pota, alui pro-
fluuium, & emanantem uul-
ua sanguinem listat, urinq; im-
petus infrenet. Sunt qui ad al-
ligatam in puniceo uellere &
suspensam, sanguinem suppri-
mere prodant.

NOMINA ET
explicatio.


Est herba Phoenix Plinio appella-
ta à Græcis, à Latinis hordeum mari-
num, Avena sterilis à multis hodie dici-
tur, Germanis Taubkorn, Meuse-
korn, Meusegersten, quandoquidem
ea sterilis auena, sola habet hordei, sed
breuiora & angustiora, spicam lolia
similem c. Imos digitorum seuum radi-
ci in orbem obuolutos, septenas octo-
narius spicas in subactis coctisq; recen-
ter illis inueniuntur.

Sunt & alia Tritici sterilis, auena,
& hordei, uilaginis, lolij, Aeglopis,
& similia genera, De quibus apud Plinium, Theophrastum, & alios.
Germanicus item Herbarios passim legatur, uarijs morbis & uisibus ac-
commoda.

Vilago,
Diandi.



Lolium, Dort.
Gauchhabern, Meusehabern.



Triticum uaccinum.
Rohweyssen.



Sachsenbror / Zidern / Bas
Kocheln / Jundtawhar.



Idas

A **Idæa radix. Caput XXXVI.**

Idæa radici folia sunt ea quæ rusco. adhærent his ueluti exigui pampini, in quibus flos. radix spissandi naturam habet, his cōueniens quibus adstrictione opus est. pota. citam aluum, mensesq; & omnem abundantiam sanguinis sistit.

Græcè, ἰδæα ῥίζη. Latine, Idæa radix, uel Idæa herba, folijs rusci, acerbæ gustu: misceri solita luctantium in palestra, ad ea quæ repercutere tantum oporteat, ut Paulus Aegineta scribit. Hodie planè incognita.

Rhodia radix. Caput XXXVII.

Ignitur Rhodia radix in Macedonia, costis similis, læuior, inæquabilis, quæ contrita, rosas redolet. utilissima capitis doloribus, si madefacta fronti & temporibus cū rosæ faci momento imponatur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Fuchsius in Herbario suo hanc facit, quam Germani radicem uocant rosarum, Rosewur, ab odore rosarum, quæ spirat, præsertim arida, & cum cruitur.

Recentior suauius olet. Ex Austria & Pannonia ad nos adfertur uirens, & uegeta diutissime seruat. Inæqualis est, cortice albescente, sapore acerbissimo, ut bistorta, acoris uulgaris, & ben rubecula Sepalsiariorum: quibus omnibus ut sapore, ita ferè crassamento etiam & colore rufis omnibus comparari potest. Folia sunt portulacæ quodammodo, aut telephij, in mucronem excurrentia, circa summum crenata, caules ab una radice plures exeunt.

Ceterum ex illo nouo repertarum insularum orbe, Liburnicarum remigata, lustrato, delatum nuper ad nos lignum crasso cortice & hulco multis tuberculis & nodis inæquale, ponderis eximij, ita ut immersum aquis pessum eat, nec sedens rursus emergat, tanta pollet grauitate, buxiq; colorem, crassitudinem & duritiem imitatur, hoc tritum uel in scobem derasum rosas odoris suauitate prouocat, quin potius de paritate certans, uincit iucunditate. Hoc

rosaceum lignum appellamus, cum barbarum regionis nomen audire non potuerimus.

Equisetum. Caput XXXVIII.

Equisetum in riguis & scrobibus nascitur. cauliculi prodeunt inanes, geniculati, in se fracti, rubescences, scabri, & iuncea circa eos folia, crebra, exilia, in sublimē equisetum attollitur, uicinos arborum caudices scandens, obuolutorumq; dependet, comis multis, nigris, ut equorum cauda. radix lignosa, dura. Vis herba spissare: quare sanguinem naribus erumpentem succus ipse sistit. prodesi dysentericis in uino potus, urinam cit. Sanguinolenta uulnera glutinantur, tritis folijs, & illitis. Radix cum sua herba tussim, orthopnœam, ruptaq; adiuuat. Foljs in aqua potis, dissectiones uesicæ & intestinorum, enterocelæq; in unum coalescere, cogiq; feruntur. Alterum equisetum caulis est rectus, cubitalis, aut maior, inanissimis comis per interualla breuioribus, candidioribus, & mollioribus. Id cum aceto tritum uulneribus re medio est, eademq; fungitur facultate.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, ἰσῆδος.

Latine, Equisetum.

Officina uerbum uerbo reddentes, cauda equina.

Germanis, Schaffthew / Bagenwadel / Rosschwanz / Bagenzagal / Bantentraut / Taubens roß.

Gallis Quene de cheual, ou prela dicitur.

Quæ hic à Dioscoride pingitur, uulgo Schaffthew dicitur propriè, non ignota materiarijs fabris, qui ligneam



figre in pectinum & aliorum minorum operum rudiatem huius herbae scabritia in nitorem expoliunt. B
Ranq; eam subline scandit, & uicinos arborum fruticumq; caudices improbo cirrhorum reptatu complecti
tur, proxima quaeq; uincens, ab ramisq; dependens instar equinae caulae, calamis geniculatis pyxidatim cor-
natis, capillamento potius quam folijs articulat, luncea cuspidē, in riguis & siccis inuenitur. Alterum
hippuris uel equiseti genus, quod equisetum cognominant, Germani Bagenwadel recto caule, equali, cu-
bitum excedente, uacuo, grauioribus per interualla & candidioribus comis mollioribusq; assurgit. Faciunt
& aliam Graeci Hippurim, grauioribus & mollioribus comis: inuenitur haec in pratis, nec sepe frequentius
occurrit inuisa scenis: hanc polygonij faciem esse, ut supra ostendimus, multi arbitrantur.

Coccum infectorium.

Caput XXXIX.



Coccum quo infectores utuntur, frutex est surculo
sus, paruus, cui grana ceu lentes adherent, quae ele-
sta congeruntur. Optimum gignitur in Galatia & Ar-
menia, deinde Asia & Cilicia, ultimum ex omnibus Hi-
spanicum. Vis huic spissandi, uulneribus neruisq; praeci-
sis, conuenienter ex aceto tritum illinitur. Nascitur
quoq; in Cilicia, querubus, cochlearum exilium simi-
litudine, quod illius regionis mulieres ore legunt, & co-
cum uocant.

NOTA ET EXPLICATIO.

Graec. Κόκκος & Βακίς.

Latine, Coccus Baphica.

Officinis Grana tinctorum, & Kermes, & Alhermes cum Mauris.

Germanis, Schmelchbe.

Gallis Vermillon dicitur.

Coccus baphica, uel coccum baphicum, bacula est asparagi annua, folijs innata fruticis aquifoliae ilicis.
Theoph. Plin. astringens, amara, siccata sine morfu, ob id ad uulnera magna etiam neruorum coeunt, roborat
partes

A. Tragoceram.

partes siue his qualitatibus manifestis, siue etiam (ut quibusdam placeat) lotus substantie familiaritate, quam dicunt habere cum corde præcipuam.

Tragium. Cap. XL.

Tragium nascitur in Creta tantum insula, lætisco semine, folio & ramis simile, singulis tamen minoribus. succus ei lacteus, gummi non dissimilis. Semen, folia, lachrymaque, illitu spicula è corpore eiciunt. omnia quoque corpori impacta euocant. pora stranguaria medentur. calculos uesicæ frangunt. menses trahunt. modus in sumptione est, drachma una. Fama est syluestres capras sagittis confossas, eius herbarum pabulo spicula excutere. Est & alterum tragium, quod tragoceros aliqui uocant, folia scolopendrij habet, & radicem syluestris raphani, tenuem, candidam, quæ crudam uel coctam esse dysentericis prædest, folia autem hirci uirus olent, exinde sibi tragi nomen adoptauit. Prouenit in montibus & præcipitijs.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Plinio lunipero similis, & semine & folio, & ramis; hodie, ut potest quam sola Creta insula gignit, passim incognita.

Alterum Tragium, quod tragoceram aliqui uocant, Dioscoride teste, huic nonnulla consentirent, quæ uulgo bursa pastoris, Germanicè Teschelkraut, uel Seckelkraut appellatur. quod & folia ferè scolopendrij ferat, radicem syluestri raphano non dissimilem, candidam, quæ in dysenterijs salubriter utuntur, nisi natales reclamarent, namque hæc nascitur propter uias in parietinis illa montibus & præcipitijs. hæc folliculis in exigua uulga similitudinem compressis, turbinata cordis effigie, semen gerit minutum.

Tragum. Caput XLI.

Est etiam herba tragos, quam aliqui scorpion aut raganon uocant, maximè in maritimis nascens, palinum alta, aut amplior, fruticosa, humilis, oblonga, sine folijs, pusillis circa ramos acinis, rufis, multis, magnitudine tritici, acuto cacumine, gustu multum adstringente. Racemorum acini decem ex uino poti, celiacis, & sceminis fluxione uulæ laborantibus auxiliantur. Tunduntur à pleurisq; & in pastillos digesti asseruantur, quibus uruntur cum opus est.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Τράγος. Latine, Tragos. Officinis uermicularis.


Germanis, Zagentrenble / Schnetttrauben.

Tragus herba nascitur in muris & petris, mæcrijsq; iunedrums & parietibus prouenit. Maio & Iunio mensibus, pallidis seu candidis floribus. Desiccatur modicè, uenter autem refrigerat, ideo ad Erisipellata, herpetas, & à fluxione uulæ phlegmonas prædest.

Iuncus: Caput XLII.

Iunci duo genera, unum læuis nominati, alterum acuti, qui in mucronem fastigiatur. Cuius etiam duo assignantur genera, unum sterile, reliquum fert semen nigrum.

* Addititia
clausula.





Scirpus.

grum, rotundum, & crassiore constat. **A** calamo, carnosioreq. Tertius est iuncus qui vocatur olofchenos, prioribus carnosior, asperiorq. is similem su pradieto fructum in cacumine parit. Semen utriusq. tostum, ex diluto uino potum, sistit aluum, & rubra fœminarum profluvia. urinam cit, capitisq. dolores facit. Quæ proxima sunt radi ci folia tenera, conuenienter illinuntur aduersus phalangiorum morsus. * *Euripici.* Aethiopici * iunci semine somnus allicitur. sed modus in potione seruandus est, ne sopor fiat.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Ξυῖνος. Latine, Iuncus.
Officinis Latinum nomen seruauit.
Germanis, Dingen/ Schmelten.
Gallis Iunc dicitur.

Tria genera Iunci apud nos inueniuntur. Vnus in aquis, crassitudine & magnitudine, fungosq. medulla insignis, Latinis mariscus, Græcis holofchenos dicitur. hic ut mollissimus, ita ad nitilia præstunt. Alter acutus à nostris, Græcis oxyschenos nominatur, sterilis idem. & mas, qui regenerat se quotannis, cacumine in terram defixo, ex quo cepit radix de nouo pullulat. Tertius melanocranus, quasi atriceps dicitur, fructum gerit uuarum coherentium modo, in quibus cussidatum semen clauditur. **B** hoc nihil in uliginosis occurrit frequentius. Videtur autem palustris Iuncus idem cum scirpo esse. Nec in fruticum, inquit Plinius, nec in uesprium cauliumue, neq. in herbarum alioue ullo quam suo genere numerentur iure, leui ac enodi stilo in exile cacumen fastigiat o, fungosa medulla, qua ad lucernarum utuntur lumen, ut plâta tota ad operiendas tegetes, neq. non contextus natarum, quallorum, aliorum utilium nexus.



Lichen. Ca. XLIII.

Lichen qui saxis est familiaris, aliquibus bryon appellatur. asperginosis petris adhæret, ut muscus. Is illitus sanguinis profluvia sistit, inflammationes arceat, impetigini medetur. iuuat regio morbo correptos, cum melle illitus. oris & linguæ defluxiones inhibet.

NOMINA ET explicatio.

Græcè, Λαγύλι τῶα.
Latinis, Lichen, & Bryon.
Officinis Hepatica. quamuis id communis cum alijs quibusdam nomen habeat.
Germanis, Lebertraut/ Steyn oder Brunn lebertraut.
Gallis Hepatique, pourcorau dicitur.
Lichen nomen inuenit ab eo, cui peculiariter medetur, impetignis morbo: aut

A

Pulmonaria.



etiam, at puto, à re ipsa nomen ducit, quoniam saxa quibus haeret lingua modo lambat: hodie omnibus tum Officinis tum Herbarijs hepatica dicitur, quod iocinerum fibris similis conspicitur. Abstergentem ac modicè refrigerantem facultatem, utramq; uerò resiccantem habet. Abstergentem quidem atq; exiccantem à petra, refrigerantem autem ab aequo humore. Est & aliud genus hodierni temporis, Medicis & Herbarijs pulmonaria, Germanis uerò Lungenkraut appellata in quercu arbore ac saxosis locis proueniens. Folia mollia habet, inuicem incumbencia, leniter laciniata, caulis multis praedita, superiore parte uiridia, inferiore in luteo albicantia, ac uelut punctulata, potissimum autem pulmonis &c.

His aut pustulis quibusdam notata, atq; hoc nomine aliquam pulmonis humani formam representant, unde etiam pulmonariam dictam esse conijcimus. Admodum adstringit & desiccant, quamobrem uulnera & ecchymata glutinat, potissimum autem pulmonis &c.

Paronychia.

Paronychia. Lunaria italica.

B



Caput XLIII.

Paronychia exiguus frutex, in petris nascentis, peplo similis, minor longitudine, maioribus folijs. Illita paronychijs atq; duritijs, remedio est.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Paronychiam esse conijcio eam, cuius picturam damus, quam Itali lunariam à noctu lucentibus folijs uocant, herbam odoratam, in montium saxis nascentem, folijs peplo similem, sed dice hirsuta. Quidam unguinalem herbam, Germanice Nagelkraut appellant.

Chrysocome. Cap. XLV.

Chrysocome palmi altitudine fruticat. coma specie corymborum, hyssopo simili. radice hirsuta, ueratri nigri modo, tenui, cyperum æquante: gustu non iniucundo, ex austero dulci. in petrosis opacisq; nascitur. Radix excoquit, & adstringit, his conueniens, quos iecur aut pulmonis inflammatio male habet. contra purgationes uulua, decocta cum hydromelite assumitur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Chrysocome alijs chrysanthemon, & amaranthū, chrysitis Plinio. Latinam non habet appellationem. Palmi altitudine est, comantibus fulgore auri corymbis, in petrosis opacisq; emicat. Proximè ad eam accedit, quam Herbarij nostri pullegum montanum uocant.

Chrysogonum. Caput XLVI.

Chrysogonum densè fruticat, quernis folijs: flore coronarij uerbasci, radix ut rapum extuberat, intus ruber, ima, foris nigra. Quæ trita cum aceto, atq; imposita, muris araneis moribus auxiliatur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Chrysogonum

LIBER QVARTVS.

315

Chrysogonum.



Græcè, Χρυσόγονον.

Latine, Chrysogonum.

Officinis, Chariophyllata, & herba benedicta.

Germani Benedikten wurzel appellant.

Radix eius luto & sordibus clota, siccatur, & imbre aceti respersa, arcat. & uestes iucundo commendat odore. Decoctum huius sumitur ad perficiendas concoctiones, sedandosq; coli dolores. Radix eius pectoris laterisq; dolores & cruditates iucundo sapore discutit. Manuscriptus Herbarius facultatem habere dissolendi, digerendi, & obstructions tollendi scribit. Fomentum idem ex uino decoctionis eius mensis ciere. Contra uenena tritam cum uino sumptam ualere. Concoctionem præterea roborare, dolorem uentriculi & intestinorum à frigidityte aut flatibus ortum, decoctam in uino sanare ait. Mirifice etiam ad interna uulnera huius herbe decoctum confert. Externa uerò ex ea collui debent.

Elichrysum. Cap. XLVII.

Elichryson.



Elichryson quidam chrysanthemum, nonnulli & id amarantum uocant, quo deorum simulachra coronant. ramulum habet candidum, uirentem, rectum, firmum: folia intercedentibus spacijs angustata, abrotano similia: coma aurea lucis, in orbem, umbella rotunda ueluti siccis corymbis dependentibus: radice tenui. nascitur in asperis, & torrentium alueis. Contra serpentium ictus, coxendicum dolores, urinæ stillicidia, ruptaq; coma è uino pota opitulatur. ciet menses. Sanguinem concretum uentris ac uescicæ absumit, pota cum mulso. ieiunis, trium obolorum pondere, nitit distillationes, dato in uino albo diluto. uestibus inferitur, ut eas ab erodentium iniurijs tueatur.

Amaranthus purpureus.

NOMINA ET explicatio.



Ελίσχυρον Dioscoridi, Galeno & Paulo Amarantus, Officinis & imperitis Stuchas citrina, uel, ut ipsi loquuntur, sticados citrinum. Germanis Rheimblumen, Mattenblumen. Elichryson uerò dictum, quod ad solis repperit comantibus in orbem florum folijs, fulgorem auri præseferat. Alter (duplex enim Amaranthus est) purpureus, qui hodie flos amoris, & Germanis Blümle von der lieb, Gloriamor, & Sametköpfe dicitur, quibusdam etiam Taufentstöhn. Amaranthus autem dici ceperunt duo hæc genera, quod flores eorum nunquam marcescunt. Recentiores purpureum amarantum uehementer siccare tradunt, ideoq; cum uino sumptum, maxime uerò semen, alui fluxiones sistere scribunt. Lutei floribus in uino decoctis, ad lumbricos educendos utuntur, & ad pediculos emendandos, in lixiuio coctis.

Chrysanthemum. Cap. XLVIII.

Chrysanthemum aut caltha, nonnullis buphthalmos. Herba est tenera, fruticosa, læues proferens caules, & multifida folia: flores supra modum splendentes, luteos, orbem oculi imitantes, unde buphthalmi nomen traxit. pro

d

A

Wisselblüm.



Merzen Zanenfuß.



Süß Zanenfuß

B



Geel Zanenfuß.



pter oppida nascitur,
cuius caules oleris uis
ce manduntur. flores
cum cerato triti, steato
mata discutere prodū
tur. regio morbo cor
reptis, colorem breui
reddunt, si sequente lō
go balnei usu, post exi
tum ebibantur.

EXPLICATIO.

Græcè, Χρυσάνθεμον.

Latine, Chrysanthemum.

Officinis incognitum.

Germanis, Schmalz
blām / à pinguedine, quæ con
trito digitis fosculo apparet,
& Moßblām / Geel Wiß
blāmen / Mattenblāmen /
Drahtblām / & Dorte
blām nominatur. Chrysan
themum à flosculis auri splen
dorem & colorem præ se fe
rentibus, dictum est. nascitur
prope urbes, in pratis humi
dis, & alijs locis aquosis.

Fortasse Caltha Vergilij in A-

lexide, ut putat

Hic. Tragus.

Calidum est sic

cum. Chrysan

themum, inquit

Cordus, du

plex est, vñ

flores omnino

luteos habet,

Goldblāmē,

alterum in me

dio luteos, &

per ambitū cā

didos, S. Jo

hans blāmē.

Sub hoc cā

put referūt quī

dam ranuncu

li genera quæ

dam, firma nō

admodum disti

mili. gūstus ta

men certō ar

guit, Germani

cē Zanenfuß

uocata, de qui

bus suprà lib.

2, cap. 168.

Age

LIBER QVARTVS.

Ageratum. Caput XLIX.

Ageraton fruticosa herba est, palmari longitudine assurgens, simplex, humilis, origano maximè similis, umbellam gerit, in qua flos bullis aureis emicat, elichryso minor. Nomen ei inditum est, quoniam diutissimè flos in sua coloris specie conseruetur. Vis decocti feruens. huius usum nidor urinam cit, & uulnè duritias emolliit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Sunt qui Ageratum arbitrantur came esse herbam, quam suprà capite de Heliochryso descripsimus, & amaranthum luteum appellauimus.

Verbenaca. Caput L.



Peristereon, siue uerbenaca, nascitur in aquosis. Nomen ex eo duxisse uidetur, quòd columbæ circa hanc perquam libenter uersari soleant. dodrantis altitudine, & interdum amplius adolefcit: folia è caule prodeunt incisa et subalbida. ea singulari ramo, radiceq; sola consistere saepius inuenitur. Folia cum suillo adipe recenti * aut rosaceo imposita, uulnarum dolores finire putantur. ignem sacrum illita ex aceto reprimunt, * putrida ulcera cohibent. uulnè ra glutinant. ueteraq; ex melle, ad cicatricem perducunt.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, πειστερεών ὄσφι. Latine, Verbenaca recta.

Officinis Verbenaca simpliciter.

Germanis, Eisenkraut / Eisenhart.

Gallis Veruaine appellatur.

Verbenaca recta, id est, πειστερεών ὄσφι, præsertim uiridis & recens, sed cum sicca, cum radicibus oleo incocta, persusaq; capiti, dolore meius omnem diuturnum à frigore, aut crassis humoribus omnium maximè digerit, & caput roborat.

Verere.

* reprimi &c. ad herbam referenda.

B Gal. lib. 2. comphar. part.

Sacra herba. Cap. LI.



Sacra herba, quæ & peristereon nominatur, ramulos emittit cubitales, aut maiusculos, angulosos, in quibus ex interuallis folia quercus, sed minora angustioraq; eisdem diuisuris in ambitu, colore aliquatenus cæcio. radix longa, tenuis, flores purpurei, graciles. Folia cum radice in uino pota, illitæ, aduersus serpentes polent. eadem dra chmæ pondere cum thuris obolis tribus, in uini ueteris hemina, quadragenis diebus, ieiuno ore, contra regium morbum bibuntur. ueteres tumores & inflammationes mitigant. sordida ulcera purgant. Tota in uino decocta, tonsillarum crustas abrumpit. oris nomas gargarizatu cohibet. Aiunt, si aqua spargatur tricliniū, qua maduerit, latiores conuictus fieri. Datur potandum in tertianis febribus, tertium à terra geniculum, cum folijs circundantibus: quartanis, quartum. Sacram uocant herbam, quoniam multum ad amuleta, expiationesq; commendetur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, ἱεροσότῳ. Latine, Verbenaca supina, siue Herba sacra. Officinis Consolida media.

Germanis Gulden gunfel / Consolen. Gallis Consolle dicitur.

A Caulem habet quadrangulum, latuginosum, ex quo per intervalla folia bina ex singulis geniculis in extremitatibus laciniata, quernis similia, sed minora, angustioraq; colore caesio, à medio caulis ad fastigium usque ex singulis foliorum alis flores sex aut septem in purpureo cœrulei exeunt. Radix illi subest lignosa, quæ multas à se exiguas radices capillamentorum instar per terram latè serpentes, propagat. Gustu astringit, & amarâ est, ut calidam & siccam esse nemo dubitare possit. Vulnèra, ut recentiores tradunt, glutinat. Sanguinis grumos ex casu, uel contusionibus coactos in corpore dissicit & dissolvit. Præsens remedium est aphthis, & ulceribus in ore serpentibus. Decoctum eius tumoribus illitum, eos dissipat. Vfus etiam eius ad intertrigines, ulcera pudendorum, & intestinorum exulcerationes prodest.

Astragalus: Caput LII.

Astragalus, parvus à terra frutex, folijs & ramis ciceri similis: flore purpureo. paruo: radice rotunda, raphani modo, grandi, quæ adnatas appendices firmas habet, nigras, præduras, ueluti cornua inter se implicatas, gustu adstringentes, nascitur in uentosis, opacis, & in niualibus. eo Memphis * Arcadiæ scaret. Aluum sistit radix in uino pota. urinam mouet. uetustis ulceribus, sicca efficaciter inspargitur. sanguinem supprimit, agrè, propter duritiam, tunditur.

* Phœnec.

Astragalus, qui à Dioscoride describitur, frequens est in Gallia: rura cicer montanum, uel rusticum cicer, eorum uerò idioma Cices sauages, ou cices de montaigne nominant, fruticem folio & ramis ciceri similem, flore purpureo, paruo, tereti radice, raphani modo grandi, quæ uelut adnatas habet appendices, præduras, ueluti cornua inter se implicatas, gustu adstringentes. inuenitur in petrosis, & locis uento perflatis: cicerum esse dices, nisi radix lenta subesset, Germa. Erdmören / alij Christianwurcz appellant.

Hyacinthus. Caput LIII.

Medius.

Minor.



HYacinthus folia habet bulbi: dodrantalem caulem, minimo digito tenuiorem, herbacei coloris: comam procumbentem, florum purpureorum plenam, in curuam;

Hyacinthus maior.



Papauer erraticum.



LIBER QVARTVS

219

curuam: radicem bulbacam quæ ut creditur, pueris cum A
uino albo illita, pubertatem coërcet, & non patitur erum-
pere. sistit aluum, pota urinam impellit. phalangiorū mor-
sibus auxiliatur. Semen adstringentius est, theriacis expe-
titum. regium morbum emendat, cum uino potum.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Ὑακινθός. Latine, Hyacinthus, & ut quidam uolunt, uacel-
nium. Officinis incognitus.

Germanis, Mergblumen / Großblae Mergenblümlin.

Gallis uacietum dicitur.

Duplices sunt Hyacinthi, albi & cœrulei, ut ex hoc Columelle carmine
colligi potest: Necnon uel nivosos uel cœruleos hyacinthos. albos uero non
intelligas proflus eandem, sed eos potius, qui, si cum cœteris cœruleis con-
feras, pallescere uidentur, quemadmodum pictura affabre tibi demonstrat.
Sunt qui ad etatem hanc differentiam coloris referre uolunt, quorum ego
sententiam ueritatem esse existimo: cum enim adolescunt, pallescere incipi-
unt. Cœruleum autem Hyacinthum natura triplicem producit, maiorem scilicet,
minorem, & medium: in illo enim maiores ac patentiores, in hoc au-
tem minores & quasi orbiculati sunt flores, ut ex eorum pictura cernere li-
cet. Vere mensis nimirum Februario & Martio, cum uiola purpurea.
Theophr. lib. 6. de stirpū historia cap. ult. teste, erumpit. bina Martium flo-
rem Germanis dictum esse conijcimus, Hyacinthi radix bulbosa est, & diuisa
primum in desiccando, secundum uero completi aut incipientis in refrigeran-
do. Semen autem tertio quadantenus ordine desiccatur, in medio caliditatis & fri-
gilitatis consistens.

Papauer erraticum. Cap. LIIII.

Papauer erraticum, quod rhœcada uocant, uere qui-
dem in aruis cum hordeo nascitur, flore protinus de-
ciduo, unde & nomen apud Græcos accepit. folia eruca-
e, aut origano, aut cichorio, aut thymo similia spectantur,
sed longiora, diuisa, scabra. iuncus ei caulis, rectus, cubi-
talis, alper: flos syluestris anemones, puniceus, interdum
albus: oblongum caput, sed quam anemones minus: se-
men rufum. radix longa, subalbida, minoris digiti crassi-
tudine, gustu amara. Huius capita quinq; aut sex, in uini
cyathis tribus ad diuicias decocta, potui dabis quibus
somnia exercendus est. Semina acetabuli mēsurā ex aqua
mullā pota, aluum leniter emolliunt. ad idem præstandum
mellitibus placentulis, & dulciariis libis admiscuntur. Folia
cum calycibus illita, inflammationes sanant. eorundem so-
tu & perfusione, somnus allicitur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Ῥόη, ἢ Ῥόη. Latine, Papauer erraticum, rhœcada.

Officinis Papauer rubrum.

Germanis, Wild moen / Blazen / Rousrosen / Blappetrosen.

Gallis coquelourdes.

Nos Rhœcadis picturam damus. Vnus atq; ad eodē primi quod eruca-
e filia habet, alterius quod cichorii. Florem proferunt puniceum, & aliquando can-
didum. Nascuntur in aruis & segetibus passim: refrigerant ut alia genera
papaueris. Recentioribus sacro igitur medetur. Mulierum menstrua proflua
compescit. Sanguinem è naribus fluentem iccori impositum sistit. Lingua ex
decocto eius lota, ardorem faucium sanat. Pudendorum tumores detumesce-
re facit. Temporibus illitum, phreneticis somnum conciliat. Calidos oculorū
dolores luto impositum, mitigat.

4 4



E Satiui papaueris genere, quod horrense est, semen in panem densatur, qui fanis in usu sit. eo etiam ex melle pro sesama utuntur, thyllacitin uocant, capitulum habet longum, & semen candidum. Sylvestre uero, caput infidens demissumque, & nigrum semen, quod pithitis nominatur, nonnullis tamen & ipsum rhceas dicitur, quoniam eius scapo lacteus succus emanat. Tertium magis sylvestre, & ad medicinas ualentius, multo his longius, productiore capitulo. Omnium in commune natura refrigeratrix. quare si capita ipsa & folia decoquantur in aqua, somnum totum conciliabunt, bibitur decoctum contra uigilias. Calyces cum polenta triti, & cataplasmatibus admisti, ignibus sacris, & inflammationibus prosunt, tunduntur quoque uirides, & digeruntur in pastillos, qui siccati ad usum receduntur. Capita quoque per se in aqua coquuntur ad dimidias, iterumque adiecto melle, dum humor coeat in eclegmatis lentorem, id medicamentum intus, arteriarum fluxionibus, & celiacorum affectu, doloris leuamentum praebet, efficacius tamen redditur, addito hypocistidis succo & acacia. Papaueris nigri semen tritum cum uino bibitur contra citam aluum, & foeminarum profluvia, in peruigilijs fronti temporibusque illinitur, ex aqua. Opium eius magis refrigerat, in spissat, siccatque, sumptum erui magnitudine, dolorem

^B Abundare putatur.

finis, concoquit, & somnum allicit, tussi atque celiacorum ualitudini auxiliatur, uerum si copiosius hauriatur, nocet, cum lethargicos efficiens interimat. ad dolores capitis cum rosaceo perfrictum efficax est, aurium dolori, cum amygdalino, myrrha, & croco instillatur, inflammationibus oculorum cum torrefacto ouo luteo proficit: igni sacro & uulneribus cum aceto: podagris, cum lacte mulieris & croco, somnum accersit, subditum sedi pro balneo. Optimum habetur graue, & densum, gustu amarum, odoratu saporiferum, quod facile aqua diluitur, laue, candidum, neque asperum, neque grumosum, quod inter colandum non ut cera coeat, & in sole diffundatur: dein ad mortuum lucernis, non atraluceat flamma: extinctum denique odoris uim conseruet. Sed opion glaucio, gummi, aut sylvestris lactuca succo, adulterant. Verum glaucio fucatum in dilutione croci colorem reddit: lactuca vero succo fictum, exiliter spirat, & asperius spectatur: gummi uitiatum splendet, & infirmum est. Nec desunt qui eo dementiae deueniant, ut adipem ei admiscerent. Fictili nouo torretur ad oculorum medicamenta, dum mollius atque rufius appareat. Diagoras, ut Erasistratus autor est, usum eius damnauit, oculorum lippitudinibus & aurium uitij infundi uetans, quoniam uisus aciem hebetaret, & saporem gigneret. Addidit Andreas, illitos eo protinus excacari, si non adulteraretur. Mnesidemus usum duntaxat olfactandi probauit, quoniam ad conciliandum somnum conueniret, alioqui nobis ut noxio interdicat. Quae commentitia esse, experimento deprehenduntur, siquidem effectus, uirium huiusce medicamenti fidem faciunt: quare non alienum fuerit scriptis mandare, quoniam modo is excipiat succus. Aliqui capita ipsa & folia tundunt, & praelo exprimunt, terentesque in mortario, digerunt in pastillos, id meconium uocatur, multum opio ignauius. Porro opij faciendi ratio haec est: Cum ros in eo exaruerit, cultro decussatim in stellas, ne penitus adigatur, ex obliquo in rectum summam cutem incidere oportet, lachrymam exeuntem digito in concham abstergere, nec multo post redire, ut concreta inueniatur, etenim quae tum aut postero die etiam offenditur, in uetere pila teri debet, & in pastillos cogi. Cum tamen inciditur, retrocedendum est, ne uestibus succus deradatur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Grati

LIBER QVARTVS.

Græcè, Μῆκων ἡμερῶν.
Latine, Papauer satium.
Officinis Papauer.
Germanis, Wagsamen/Woen/ Slnag.
Brabantis, Snel faet.
Gallus du pauot dicitur.

Plura Papaueris genera hoc capite Dioscorides recenset, sed quò clarius horum generum discrimen habeatur, sciendum est, papauer prima sui diuisione secerni in satium & agreste. Et satiu iterum tria genera esse, Vnum propriè perse, & uerè satium appellatum, quod Dioscorides ab utris forma thylacite, id est, utricularium, Plinius candidum, Apuleius usuale & folliculosum uocat, cuius semen in sanitatis usu pani interspersum compinsecatur, & cum melle in secunda mensa apud antiquos edebatur, Dioscoride teste & Plinio: quæ causâ etiam est, ut usuale sit uocatum ab Apuleio, quemadmodum à uasculi ipsius in follis siue utris modum formati effigie, folliculosum. Alterum genus est, quod Dioscorides sylvæstre, & à dolij forma pithite, id est, doliare & rhœada. Plin. nigrum, Apuleius agreste, sylvaticum & rhœada uocat, & ex hoc opion fiebat & meconium. Tertium genus est his sylvæstrius & medicamentosius, quod Plinius contrâ quam Dioscorides & Apuleius tradiderunt, rhœada à Græcis, à nostris erraticum uocari dicit. Et hæc duo posteriora genera, natura quidem agrestia sunt, humano tamen opere, studio & usu tantum satia fiunt, quæle est ceratites, id est, corniculare, & aphrodes, id est, spumeum heracleumq; uocatum. Inter quæ tamen omnia satia, & agrestia modum genus est, ut tradit lib. 20. Plin. quod nisi in aruis esset, sponte nasceretur. Rhœam uocauimus & erraticum, quod quidam decerptum protinus cum toto calice mandunt. Et hoc est quod inter satia tertio loco numeratum est, ceu ex descriptione & historia ipsius apud autores manifestè patet, omnibus in hoc concordantibus & de ipsâ consimiliter tradentibus Dioscor. cap. præcedenti antequam hoc loco de satio ageret, quare inter satia non opus erat Diosco. descriptionem ipsius repetere. Theophrasto quidem lib. 9. de plantarum historia. Item Plinio naturalis historiæ lib. 19. cap. 8. & Apuleio cap. 53. Qui uolet habet loca unde illa requirat. Sed de his nunc satis.

Opium est lachryma ex inciso papauere nigro defluens, hodie etiam ex albo distillat. Ex Apulia defertur: refrigerat, siccat, inspissat. Dioscor. incidendi & colligendi modum docet hoc loco. Presertur Thebaicum, hispanicum opium usurpatur lib. 7. comp. pharma. particul. Opium calidis dispositionibus medicatur, ut alterum, & similia: medicamentis additur ad sedandum dolorem, somnum conciliandum, siccandum. Opium etiam stomachicis misceatur, ad sensum stomachi hebetandum, & somnum conciliandum. Vehemens autem refrigeratio ex opio, corrigitur castoreo, pipere, & similibus. Opij drachmas duas arteriæ æq. misceat Andromachus. Cum multi sunt opoi, id est, liquores, solus papaueris opois, neuro genere opois, à medicis propriè nominari solet. Opium omnium quæ sensum stupefaciunt, & somnum torpidum inducunt, ualentissimum est, libro eodem.

Μῆκων ὁ ἡμερῶν & ὁ ἄγρος, succus ex folijs & calyce papaueris tuis expressus, pro Opio à multis supponitur: alia cius adulterina hoc loco Dioscorides, Μῆκωνος ὁ ἄγρος, & γανκῶν διuersa facit Asclepiades apud Galenum lib. 2. antido.

Corniculatum papauer. Caput LVI.

Papauer ceratites, id est, corniculatum, folia habet candida, hirsuta, uerbasco similia, in ambitu sylvæstris papaueris more serrata: caule non dissimili: flore pallido: calyculo fœnigræci, in corniculorum modum inflexo, unde nomen mutuatur. semine papaueris, pusillo, nigroq; radice per summa cespitem nigra, crassa, nascitur in maritimis & asperis. Radici ea vis inest, ut in aqua decocta ad diuidias coxendicum & iecinoris affectus potu sanet. prodest his qui crassa quadam, aspera, aut arenosa cum lotio reddunt. Aluum leniter purgat semen, acetabulo in aqua mulla potu. Crustas emarginant, illita ex oleo folia, floresq; argema acnubeculas iumentorum perunctas abstergunt. Sunt qui glaucium, hoc papaueris genere facitari existimarunt, falsi quadam foliorum cognatione.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Μῆκων κερατῖτης.
Latine, Papauer corniculatum.
Officinis Papauer cornutum.
Germanis, Geel Wagsamen/Geel Slnagen/oder Woen.

Herbarij

A

Corniculatum papauer.



B

Herbarij quidam baud propriè memitham uocant, quidam glaucion, alij paralion, sed perperam.

Papauer Corniculatum nominatum quidem est à fructu, leuem inuersionem habete, ueluti & focum grecum, ut bonis cornu simile esse uideatur: habet uim incidendi & abstergendendi. Dioscorides in maritimis, & asperis locis prouenire ait. In Germania passim in hortis scriitur, cum tamen etiam citra culturam in monte prope oppidum Oppenheim uocato, ad Rhenum sito, Germanis Dier Rot berg copiose proueniat.

Vidimus etiam papauer cornutum proferre flores rubros aut puniceos.

Spumeum papauer.
Cap. LVII.

Aliud papaueris genus aphrodes, id est, spumeum uocatur, ab alijs heracleum, caule dodrantali. folijs admodum paruis, radicle similibus: fructu inter ea candido. Nam herbula alba est, & spumea tota: radice in summo cespite. Legitur æstate semen, cum integrè adoleuit, deciditq; exiccatum. Datum acerabuli mensura in aqua mulsâ, uomitione expur-

gat. priuatim huiusmodi purgatio comitialibus prodest.

Hec herba hodie incognita est.

Hypecoum. Caput LVIII.

Hypecoon, aliqui hypopheon uocant. nascitur in segetibus aruisq; folijs rutilis, exilibus ramis. Natura eadem quæ papaueris succo.

Et hoc, quod sciam, hodie nemini cognitum.

Apollinaris, siue Hyoscyamus. Caput LIX.

Hioscyamus, frutex est caules emittens crassos, folia lata, oblonga, diuisa, nigra, hirsuta. flores è latere caulis ordine prodeunt, tanquam puniceorum cythini, scutulis septi seminum plenis, ut papaueris. Tres eius differentie: una semine nigro, floribus penè purpureis, simlacis folijs, cytinis præduris & spinosis. alterius semen subflauum, ut irionis. flores lutei. folia & siliquæ simpliciore. ambo infaniam gignunt & soporem, ideo in communi usu damnantur. tertium genus, ut quod mitissimum esset, medici recepere, pingue, lanuginosum, molle, candidi floris seminisq; in maritimis rudibusq; nascens. cuius occasio si non adfit, rufum usurpari oportet. niger, ut deterrimus, improbat. Recenti semine, caulibus folijsq; tuis, succus in sole exprimitur, & exiccato humore, usus ad annum usq; prorogatur: nam facile corruptionem sentit. Extrahitur etiam ex sicco semine separatim in aqua calida tuso, & expresso. liquamentum autem succo lacteo præstantius est, & magis dolo-

res

LIBER QVARTVS.

Weg Wilsen.

Wilsentrant.



res finit. Contusa herba recens, addita tri-
mestri farina, digeritur in pastillos, & re-
conditur. Liquamētum primum, & quod
à secco semine exemptum est, collyrīs que
doloris sensum auferunt, commodissime
inferi solent. contra acutas calidasq; flu-
xiones, dolores aurium, atq; uuln̄a mala,
orofunt. cum farina aut polenta,
peulorum, pedum, ceterarumq; partium

inflammationes placant. Semen eadem præbet. tussi, destillationibus, oculorum flu-
xioni, & doloribus, efficax. contra mensum abundantiam, & erumpentem aliunde
sanguinem, oboli pondere cum papaueris semine, & aqua mulsā, bibitur. podagris
subuenit. testibus inflatis, mammisq; tumentibus à partu, tritum ex uino illinitur.
alijs quoq; cataplasmatīs, quæ doloris leuamentum præstant, admisceri solet. Folia
omnibus medicamentis dolorem sedantibus, per sese, & ex polenta, utilissimè im-
ponuntur. recentia ad mitigandos omne genus dolores oblinuntur. cum uino ter-
na, quateruāue pota, sanant algidas febres, quas epialos uocant. cocta olerum mo-
do folia, si acetabuli mensura manduntur, mediocrem insaniam gignunt. idem effi-
cere tradunt, si colo ulcus sentiente infundantur. Radice in aceto decocta, dentes in
dolore colluuntur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, ὕσσανθος.

Latine, Hyoscyamus, Apollinaris, Plinius Altercum uocari testatur.

Officinæ corruptè Iusquiumum.

Germanicè Wilsen, & Wilsentrant.

Galicè de la Hauebane appellatur.

Ceterum quod ad nominis Apollinaris rationem attinet, sciendum hoc nomine insignitam esse hanc her-
bam, ab Apolline Medicinæ deo facta nomenclatura, idq; ob eam causam, quod doloribus mitigandis quasi
diuino beneficio, & ab Apolline concessam uim habeat: quæ causa etiam fuit, ut à quibusdam Pythonion à
Pythio Apolline, & Ὑσσανθος, id est, Ὑσσανθος, hoc est, Iouis faba, appellata sit. Hyoscyamus ne-
rō, id est, faba porcina, dicta est, ut Helianus refert, quod pastu eius conuellantur sues præsentis mortis peri-
culo, nisi copiosa aqua statim se foris & intus proluerint. Symphoniaca quoq; dictione Græca, Latine tamen
usitata quibusdam appellatur, seu Dioscoridis interpres Marcellus Vergilius suspicatur & credit, quod quā
admodum ad Musicæ, quæ symphonia constat, & symphonia etiam dicitur in hydraulicis organis, quæ à
Vitruuio, lib. 10. architectura & descripta sunt, regule due scalariformis cretæ cymbalis, quædam dispo-

A disposita sustinebant, quibus deinde spiritus & aque impetu pulsus modulatio fiebat: sic in caulis herbæ huius exturi illi dispositi demceps symphoniaci instrumenti illius imaginem aliquam ostenderent. Hyscymus Dioscoridi & Galeno triplex: primus flore purpurascens, semine nigro, uenenosissimus: alter flore & semine luteo, mitior, sed etiam deleterius: tertius flore & semine candido, ad sanationes aptissimus: frigidus ordine tertio, sicus primo.

Psyllium. Caput LX.



* Luxatis.

B

Psyllion folijs coronopæ non dissimilibus, hirsutis, longioribus: sarmentosa sceni modo, in totum herbula: ramis dodrantalibus. comma à medio caule exoritur, duobus tribusue conuolutis in cacumine capitulis: in his femine duro, nigro, pulicum simili: unde & nomen in aruis & incultis nascitur. Vis ei ad refrigerandum, inspissandum, & molliendum conueniens, articulorum morbis, parotidibus, tuberculis, tumoribus, uulsi, * illitum auxiliatur, imponitur in dolore capitis, cū rosaceo, aqua, aut aceto, enterocelis infantium, & prominenti umbilico, illitum ex aceto medetur, teritur acetabuli mensura, & in aquæ sextario madefactum, ubi concreuit aqua, illinitur: siquidem uehementer refrigerat, & in feruentem aquam deiectum calorem reprimat, contra ignes sacros efficax est. Fama est, si uirens domum importetur, non sinere in ea pulices gigni. cum adipe tusum, fouda ulcera, & quæ cacoethe uocantur, expurgat. Succus uermiculosis auribus, aut fluxione laborantibus, ex melle prodest.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Ψύλλιον. Latine, Psyllium.

Officinis nomen retinuit. Germanis, Welscher Flöhe samen/Flöhekraut.

Gallis L' herbe à pulce.

Psyllium dictum, ut Dioscorides tradit, quod semen habeat effigie pulicis, humido siccō temperatum, frigidum ordine secundo: ne putes cum Arabibus corticem frigidum gradu quarto, medullam gradu quarto calidam.

Hæc herba olim Germaniæ peregrina, hodie in hortis satâ passim copiosè prouenit.

Hortense solanum. Caput LXI.

Hortense

Hortense folium.

Halicacabon.

325

A



B

Morion Theophrasti.



lati, fuluo intus acinō, ut ficulis simili, rotundo, laui, quo coronarij utuntur, & cō-

Hortense folium, frutex cibus idoneus, exilis, pusillus, multis concauus alis: folio nigro, maiore quā ocimi, & latiore. fructu rotundo, uiridi, qui post maturitatem nigricat, aut fuluescit. herba innocentis gustus. Natura ei refrigerandi, quare folia ulceribus quæ serpunt, & ignibus sacris, conuenienter cum polline polentæ illinuntur. agilopia, capitisq; dolores, trita & imposita per se sanant. æstuantī stomacho auxiliantur. parotidas, cum sale detrita, illitu discutiant. Valet succus eius aduersus ignem sacrum atq; ulcera quæ serpunt. cum cerussa, rosaceo & argenti spuma, ad agilopas. cum pane, infantium aduersioni, quam syriachin uocant, cum rosaceo perfusus proficit. in collyrijs, aque uel oui uicem exhibet, contra acutas fluxiones illitus. aurium dolori instillatus prodest. Mensum abundantiam sistit, in uellere subditus. succus fuluo gallinarum cortalium simō subactus, & linteo appositus, agilopijs præsentaneo est remedio. Est & aliud folium, quod peculiari nomine halicacabon, id est, uescariam, aut physalida uocant, folijs antedicto latioribus. cuius caules, posteaquā adoleuerunt, prona terram spectant folliculis orbiculatis,

A rallas facitiant. Vini usumq; hortensis solani habet, uerum cibis nequaquam expetitur. regium morbum purgat, semine potio, & urinam pellit. Ex utraq; herba succus extrahitur, qui siccatus in umbra, reconditur, ad eadem ualens.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Solanum hortense, siue satinum & urbanum, Græcè Στόνιον & κηρόν. Officinis corruptè solatrū Germanis Nachtschad. Gallis Morella dicitur.

Aliud solanum, quod peculiari nomine Græcis Στόνιον & ἀνέκατος, Latinis Vescarium, seu Vescaria, Officinis Mauritanos sequitis, Alcaqueng dicitur, corrupto nimirum Græco uocabulo, Germanis Tudentissen / Tudentöle / Schlotten / & Bocerellen. Brabantis Ertecken van ouer zee. Gallis Concret dicitur.

Hortense solanum uulgo cognitum, in hortis & satis omnibus prouenit, acinis racematim coeuntibus, rotundis, primum uiridibus, a maturitate nigris aut rubris. A multis nationibus estur in holere. Sullatius eius liquor, hodie nullam non incandescentem ardoribus inflammationem restingit. Aliqui uescariam dici putant, quod folliculi speciem uesciarum imitentur, uel quod uescie calculis medeatur. Calculosi enim cum uitis maturis acinos miscem, ut uinum habeant acinaticum, Germanis ein Rappis oder Beerwein / contra ritum & uescie mala. Hoc propinatum magnam arenularum uim deturbat.

Solanum somniferum. Caput LXII.

Solanum somniferum, aliqui etiam halicacabon appellant, fruticat muleis ramis, densis, caudicosis, fractu contumacibus, pinguium foliorum, coroneaq; mali similibus plenis: flore grandi, rubro. fructu in folliculis croceo. radice longa, sub rubro cortice uestita, nascitur in saxis, non procul à mari. Radicis cortex, in uino drachmæ pondere potus, somnificam uim habet, opio mitiorem. Semen uehementer urinam cit. Corymbi duodecim hydropicis dantur, si quid numero adijciatur, alienationem mentis faciunt. Remedio est aqua copiosa mulsa, potui data. Succus pastillis inferitur, & medicamentis quæ doloris leuamentum præbent. decoctus in uino, si in ore contineatur, dentium doloribus auxiliatur: radicis succus cum melle illitus, oculorum hebetudines tollit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Στόνιον & ὕπνιον, id est, Solanum soporiferum, id dormitorium uel marinum cognominant, Germani Schlaß beerlin uocant: ea non est, quam quidam falso hoc nomine depingunt, folio luglandis, caule scipionis crassitudine, proætro, grandioribus ramis brachiato, flore inferius herbaceo, labris supernè purpureis, bacca primum uiridi, loculosa, per maturitatem nigra, quæ debescens, uel sponte distiliens ostendit acinorum semen, uix modo accuratim collectum, quinis myrrhi foliis, stellatim decussatis, baccam fulcentibus, huius genuinam nomenclaturam & picturam quare cap. de Mandragora.

Manicum solanum. Caput LXIII.

Solanum manicum, aliqui perision, alij thryon appellauere. huic folium etruæ simile, maius aliquanto, satis a cantho, quem pederota uocant, accedens. caules à radice proceros emittit decem aut duodecim, ulnæ altitudine adulescentes: caput in cacumine oliuæ figura, sed ut platani pilulæ, hirsutius, uerum maius, latiusq; florem nigrum. postquam eo exiit, racemus exit rotundus, niger, dens aut duodecim acinis constans, similibus hederæ corymbis, ut uuæ mollioribus. radice firmatur candida, crassa, caua, cubitali gignitur in montibus, uento perflatis, & planetis. Radix drachmæ unius pondere potæ ex uino, facit species uanas, imaginesq; non iniucundas obuersari. sed duplicatus hic modus, ad treis usq; dies mentis alienationem affert. quadruplicatus, interimit. Remedio est aqua mulsa copiosius potæ, & uomitione reiecta.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Manicon & Manice uocatum est, quasi furiosum, siue furiale, eo quod furorem excitet, & insaniam faciat, paruo etiam succo: quanquam & Græci autores in locum uertere, ut scribit Plinius, Drachmæ enim potæ lasmus pudoris gigni dixerunt, species uanas imaginesq; conspicuas obseruari demonstrantes. Duplicatum hunc modum legitimum insaniam facere. Quicquid uerò adijciatur ponderi, representari morem. Et hoc de radice testantur Dioscorides & Theophrastus.

Dorycnium.

LIBER QVARTVS.
Dorycnium. Caput LXIII.

227

A

Dorycnion Crateuas halicacabon, aut caleam uocat. frutex oleæ nuper prode-
untis similis: nascitur in petris, non procul à mari, ramis cubito minoribus, fo-
lius oleæ similibus colore, minusculis, firmioribus, præter modum scabris: flore cæ-
dido. filiquis in cacumine, ceu ciceris, densis, rotundis, quinis intus aut senis femi-
nis, exigui erui magnitudine, lauibis, firmis, uersicoloribus. radix ad digiti crassie-
tudinem & cubiti longitudinem adolefcit, id somniferum esse constat. Copiosius
haustum mortem adfert. Nec defuere qui dicerent, semen in amatoria expeti.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Halicacabus peregrinus.

Stramonia.

Dorycnion appella-
ta est hæc herba ab in-
fectione, quæ Græcis
κρυός dicitur, & à fer-
ratil lancearum cuspidi-
bus, quas idem dorata
uocant, eo quod succo
ipsius etiam cuspides in
præliis tingerentur, &
inscicerentur, non mi-
nus quàm alterius, quod
furosum proprie dici-
tur. & insaniam facit,
solanum: de quo sic feri-
bit Plinius: Hoc est ue-
nenum, quod innocentis-
simi autores simpliciter
dorycnion appellauerunt, B
ab eo quod cuspides in
præliis tingerentur illo
passim nascente &c.

Ceterum plantatur
hodie in Germania hortis aliæ duæ herbæ ex Italia allatæ,
quarum nemo antiquorum scriptorum, quod equidem scia-
mentionem fecit, primam Itali Stramoniam, & pomum spi-
nosum appellare, & inter solani species numerant, non quod
Quibusdâ uocatur Nux Metel,
Germanicè Thoren Spissel. Alteram plantam est pergulis operiendis aptissima, latissimè enim suis clauiculis
se se diffundit: folia habet oblonga, & laciniata. Flores candidos, uesiculas Halicacabo similes, in quibus semen
includitur pisit aut ciceribus simile, in cuius medio effigies ueluti cordis insculpta & incisa manet: nos di-
scriminis gratia Halicacabum peregrinum appellauimus, Welsch
Schlitten/German. Brabantis Roomsche Cnecht en ouer zee.

Hoc loco harum picturam inferre libuit, ut alijs occasione dare-
mus cogitandi de his plantis, uidentur enim uiribus parum à solani ge-
neribus distare.



Mandragoras. Cap. LXV.

Mandragoram aliqui antimalum, alij circæam
uocant, quoniam uideatur radix ad amatoria
conducere. duo eius genera. niger, quæ femina exi-
stimatur, thridacias appellatus, angustioribus folijs,
ac minoribus quàm lactuca, graueolentibus, in terra
sparsis. mala gerit forbis* similia, pallida, odorata, in
quibus semen ueluti pyrorum. radicibus inhaeret be-
ne magnis, binis, ternisue, inter se conuolutis, nigris

*Quorum m. luteis.

A

Dollicrant/ Schlafkranz.



B

foris, intus albis, crasso cortice uestitis. uerum is mandragoras caule uiduus est.

Alter candidus, qui mas dicitur, nonnullis morion uocitatus. huius folia magna, alba, lata, laeua ut betæ: mala quam alterius duplo maiora, colore in crocum inclinante, iucundè cum grauitate quadam olentia. horum pomorum cibo, aliquantum opilio- nes soporantur. radix, alterius similis, maior & candidior, orbata caule. Succus fit è cortice recentis radiceis tuso, & prælis subiecto: qui insolatus ubi concreuerit, fistili reconditur. Malis quoq; succus depromitur, sed aliquanto ignauior. Delibratur radix, & traiectus lino cortex, ad usum suspenditur. Aliqui radices in uino ad tertias coquunt, & defæcatum ius seruant: cyathosq; uno utuntur in peruigilijs, & doloribus, & antesectiones uisionesq; ne sentiantur. Succus duobus obolis ex mulso potus, ut ueratrū, per uomitiones bilem atram puitamq; extrahit. uerū potu largiore, uita adimitur. medicamētis ocularibus, & his quæ dolores finiunt, pelsis quoq; emollientibus, admiscetur. semiboli pondere inditus, per semenses & partus expellit. subditus sedi pro balano, somnificus est. Radix eburi emollire fertur, quæ senis horis cum eo decocta sit: & ad accipiendam, quam effingere optaueris, formam, ipsum facillè præstat. Folia recentia conuenienter oculorum inflammationibus, & collectionibus quas

ulcera citant, cum polenta illinuntur. duritias omneis, suppuraciones, strumas & tubercula discutunt. stigmata sine exulceratione delent, si quinis sensus diebus sensim perfricentur. folia seruantur in murijs eisdem ad usum. Trita radix ignibus sacris ex aceto, & serpentium ictibus ex melle aut oleo, medetur. strumas atq; tubercula, cum aqua dissipat, articulorum cruciatus, cum polenta sedat. Fit citra coctionem uinum è cortice radiceis, ad hunc modum: Ternæminæ in uini dulcis metretam cōijciuntur. Dantur ex eo terni cyathi, ijs qui secari aut amburi debent, ut antè dictum est: si quidem nullo tunc afficiuntur dolore, sed ueterno quodam pressi, torpescunt. Mala soporem afferunt olfactu, & etiam si mandantur, item expresius ex eis succus, nimio tamen odore percussus, obmutescunt. Semen malorum potum, uulvas purgat: appositumq; cum sulphure ignem non experto, rubra fœminarum profluvia sistit. Scarificata punctisq; multifariam *aperta radice, erumpens lachryma cauo uase recipitur. liquamentum autem succo lacteo præstantius est: sed non ubiq; ut experientia docet, radices lacteum succum delachrymant. Alium tradunt esse mandragoram, nomine morion, in opacis iuxta specus enatum, folijs albi mandragoræ minoribus, albis, dodrantalibus, radicem ambientibus: quæ mollis est & candida, paulo maior palmo, pollicemq; crassitudine æquat. Tradunt eam in pane, *ossa obsonio uè, drachmæ pondere deuoratam, usum rationis intercipere. Obdormiscenim homo eo ferè quo comederit habitu, sensus impos, ternis quaternisue, ex quodata est, horis. Hac medici utuntur, cum sciendendi, urendiq; necessitas adest, Anudo tum esse uolunt radicem, cum maniculo solano potam.

* In testudinis
morum.

* Polenta.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græci, Μανδραγόρας. Latine, Mandragoras.
Officinis Mandragora. Germanis, Nollraun.

Gallis de la mandegloyre appellatur.

Duo Dioscoridi & Plinio, Mandragore sunt genera. Mas candida est, μωζογρæci uocant, huius hic effigiem damus: femina nigra, Grecis βοτρυχίας, à similitudine foliorum appellata. Theophrastus autem lib. 6. de historia plantarum capite secundo, tertium quoddam genus Mandragore constituit, cuius fructus sit μείλας, καὶ παρὰ τοῖς καὶ ἀνδρῶν ἡ τῶν γυναικῶν, hoc est niger, acinosus, & succo uiuosus: huius picturam quoque damus, Germani Doli et aut, & Schlassi bey appellant.

Mandragore maris seu præstantioris, cortex crassus, lino tractatus ad usum suspenditur: refrigerandi ualensissima, ut ordine tertio, & sicandi primo.

Gal. lib. 7. simp.

Mala insana.



Nec sunt hoc loco pretereunda silentio, mala insana uulgo uocitata, quæ Hermolaus Barbarus in suo Corollario, Mandragore speciem, quam Morion uocant, arbitrat &c. Quam tamen sententiam cur non probem scit, præcipue quod Morij fructus letalis sit, mala uero insana minime, de his pomis nihil ueteribus fuisse scriptum, de iis mirari, quod multa huiusmodi reperio, sicut permulta quondam fere, quæ hodie uel ignorantur, uel certe non habentur. Galli amorum poma, Germani Melanzan, nominant. Mala ergo insana è frutice uulgari dependens, qui Perfonaceam frondibus & caule prorsus amulatur: is passim nascitur filijs propè ficulneis, flore oblongo, specioso, candido, fructu poma gitudine, in orbem absolutum circinato, colore uel puniceo, uel nuceo, in quibus cartilago, granis intercepis cucumeracis, cõtinetur: quæ edendo fit. Estur uulgo pomum ex oleo, sale, pipere, fungorum modo coctum. Alij ubi paulum inferbuit, signi in orbiculos uel taleolas digerunt, & in aceto: is ex oleo, uel pipere & aceti memento mandunt. Salsamarij in muria acida seruant, cibo per hyemem & uerori non ingrato, sed tamen qui ægrius concoquitur.

Aconitum. Cap. LXVI.

Aconitum, aliqui pardalianches, alij cammeron, alij thelyphonon, alij myocitonon, alij theriophonon uocant. folia habet cyclamini, aut cucumeris, tria aut quatuor, minora & subhirsuta caulem palmo altum, radix scorpij caudam æmulatur, & alabastris modo splendet. Torpescunt, ut fama est, scorpiones ad mora radice, stupentq: qui rursus hellebori contactu excitantur. oculorum medicamentis leuandi doloris gratia adijcitur. enecat pantheras, fures, lupos & feras omnes in carnibus obiectum. Est & alterum aconitum, quod aliqui cynoctonon, alij lycoctonon appellant. * Huius genera sunt tria: unum * Omnia hæc à quatuor uenatores, alia duo in usum suum uertere medici. è quibus tertium, quibusdam desiquod Ponticum nominatur, plurimum in Italia, montibus Iustinis exilit, à priore derantur. distans, quoniam folia faciat effigie platani, crebriore diuisura, longiora, & multo nigriora: caulem filicis, leuem stylium, cubitali altitudine, aut ampliorem. semen in siliquis oblongis recondit. radices in modum squillæ marinæ cirrhorum nigrescunt, quibus ad uenationem luporum utuntur, insertæ siquidem crudis carnibus, & deuorata, lupos enecant.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, παρδαλιανχες, ἀκόνιτον.

Latine Pardalianches, quod Pardi eo necentur: & Scorpionum, quod radicem Scorpioni similem habeat.

Officine Vnam uersam, & uulpinam.

Germani Wolfstoback, & Döllwurcz.

A



Blawe Eisenhütle.



Galli de la Tora appellant.
Alterum lycostonon Græcis dicitur, quoniam deuoratum lupos
constitit interficit.

Officine Lupariam.

Germani Wollswurz.

Gallipate louine appellant: hæc in Germanie hortis duplex ed
spicitur, Vna flore luteo, folijs latioribus, altera floribus caeruleis, fo
lijs subnigris: hanc à florum similitudine, qui galcerum representa
re uidentur, Eisenhütle / & Münchstappen appellant.

Erosione & putrefactione enecant. Aconita ideo toto genere
letalia sunt.

Tertium genus semine & siliquis huic simile, floribus co
ruleis.

Cicuta, Cap. LXVII.

Cicuta caulem ædit geniculatum, ut fœniculi,
grandem, in cacumine ramosum: folia feru
la, angustiora, graui odoratu. rami, mox umbellæ
in summo prodeunt: flores quoq; albicantes, & se
men aniso candidius: radice non alta, concaua. Ci
cutæ

LIBER QVARTVS.

Cicuta.



cicuta letale uenenum est, suaty
ui refrigeratoria necat. Re-
medio est uini meraculi po-
zus. Succus exprimitur con-
tusis cacuminibus, priusquam
semina & coma siccescant:
qui sole densatur in pastil-
los, multus ad medendi ra-
tionem usus est aridi. com-
modè miscetur collyrijs,
quæ leuandi doloris gra-
tia temperantur. ignes sa-
cros, & ulcera quæ serpunt,
illitu restinguit. Herba cum
coma trita, & testibus cir-
cumlita, libidinum imagi-
nationes in somno compe-
scit: sed genitale resoluit,
lac puerperarum mammis
apposita extinguit. in uirgi-
nitate mammas coarctet, &
increscere non patitur. pue-
ris præstat, ut eorum testi-
culi cibum non sentientes,
intabescant. Efficacissima
uis Creticæ, Megarensi,
mox Atticæ, & in Chio &
Cilicia nascenti.

B

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Κύαορ, τὸ. Latine, Cicuta, Conion. Officinæ & Herbarij Latinum nomen seruant.
Germani Sygerkraut / Schierling / Wütrich / Wilde petersilge.
Galli Cigue, siue segue appellant.
Dioscorides, Theophrastus, & Plinius uno cicute sâligo sunt contenti. Recentiores faciunt duo gene-
ra, aquaticæ frigentis naturæ, terrestris calidæ: uerum quoniam nullum idoneum præferunt autorem, uerbor-
ne, ut serè solent, hallucinantur. Cicuta uis est, si Celso credimus, exedendi corpora, ut forsitan seminebus
Taxus.
& folijs frigida sit potestas, cauli feruida, ceterum semini, &
folijs refrigeratoria uis. Cicuta uenenum est, publica Acha-
niensium poena iniussa, ad multa tamen usus non omittendus.



Taxus. Cap. LXVIII.

SMilax à Græcis, taxus à Latinis appella-
tur, arbor abietis magnitudine, & folio-
rum eiusdem figura, in Italia & Narbonensi
Gallia Hispaniæ contermina nascens. Auicu-
læ quæ Italicæ taxi baccas deuorant, denigran-
tur: & qui ederint easdem homines, alij pro-
fluuiis corripuntur. Narbone tam præsentis
est ueneni, ut si qui dormiant sub ea, aut in
eius umbra subsideant, lædantur, & sæpenu-
mò moriantur. quare de taxo hæc traduntur, ut
ab ea caueamus.

164

A

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græci, *Σύλαξ, Τάφος*. Latine, *Taxus arbor*. Officinis inusitata.

Germanis *Eybenbaum* dicitur. Gallis arbor quæ non appelle yf.

Taxus ad *Herciniam* syluam satis frequens, perpetua fronde, abietis aspectu, sed humilior, alisq; frequentioribus sinuosa, folio pinguiore, sed molliore, baccis rufis, rotundis, mollibus, gustu non insuani, radice breui, gracili per summam cespitum. In medicina nullum usum iniucio, præterquam ut suffitu mures enecet. Sunt tamen qui tradant eius baccis aluum resolui, & alites & cohortales gallinas saginari. *Arcus* apud nos elegantiores, & pulchros puniceo serè colore fabricant, quæ uulgo *Eybenbögen* dicuntur: inde & ea arbor, cuius picturam damus, passim in Germania, *Taxi* nomen sibi usurpat falso, quod ex hac quoq; tales fabricantur arcus.

Apocynum. Caput LXIX.

* Longis.

A *Pocynon*, siue *cynocrambe*, *brassica canina*, frutex est paruis* uiticulis constans, malè olentibus, lætis, uiliumq; modo obsequiosis, tractu serè inuictis: folio *hederæ*, mollioretamen, & per extremum acutiore, lento, graui odore. id luteo succo turget. *Siliquæ*, ceu *fabarum*, folliculari specie, digiti longitudine protenduntur: semine intus albo, duro, paruo. Folia cum adipe in panes coacta, canes, lupos, uulpes, & pantheras enecant, in cibo data, & prorinus eorum coxendices resoluunt.

EXPLICATIO.

Galeno quoq; *Cynocrambe* dicitur. Canes & omnes quadrupedes necat, si uestantur, hodie incognitum: aliquibus *Hippomanes* dicitur: hanc, ut *Hesiodus* scribit, si ederint equi, in furorē aguntur, &c.

Nerium, seu Rhododendrum.

Caput LXX.

* Crassioribus.



N *Erion* aliqui *rhododaphnen*, alij *rhododendron* vocant, frutex est uulgaris notitia, longioribus quàm amygdala folijs, asperioribus*: flore in rosam conformatos fructu nuci Græcæ simili, corniculato, qui patefactus quandam lanosam naturam ostendit, spinarum pappos representantem: radice longa, acuta, lignosa, gustanti salsa. nascitur in amoenis, maritimis, & secus amnes. Flores & folia mulis, canibus, asinis, & quadrupedum plurimis uenena sunt: hominibus uerò contra serpentium morsus præsidia, & uino pota: eò magis ruta addita. imbecillæ etiam animantes, ut pecus & capræ, si aquam bibant in qua folia ea maduerint, moriuntur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, *Νέριον*.

Latine *Nerium*, *Rhododendrum*: & ut *Plinio* placet *rhododaphne*.

Officinis & Barbaris *Oleander*.

Germanis *Olander*.

Gallis *rosagne* appellatur.

Nerium apud nos in hortis ex Italia aduectum plantatur, folijs lauri nunquam decidentibus, amaris, rose flore leuiter in puniceum urgentes, sed modico, fructum amygdalæ similem, ueluti cornu, qui dehiscens lanæ natura semine plenus est, radice longa, gustu salsa. Si *Luctano*, & *Apulcio* credimus, huius & flores & folia cunctis quadrupedibus perniciofa sunt. Emoriuntur autem ueluti comitiali morbo

in herbo correpti, quod & Alexandro res in India gerente constitit. Mirum tamen folia eius quadrupedum no-
perum esse, homini uero contra serpentes praesidium, ruta adita & uino pota.

Fungi. Caput LXXI.



Fungorum differentia du-
plex: aut enim manduntur,
aut perneciales sunt. Multis de
causis uenenosi gignuntur, ubi
uidelicet clauus terreus, in quo
sit rubigo, aut panni marcor
adfuerit: aut si iuxta serpentis
cauernam, arborisue, quæ pri-
uatim patiunt noxios fructus,
erumpant. Continent qui talis
sunt, nescio quod strigementum cōcretamq; pituitam, terraq; eruti, quam celerrimè
computrescunt, atq; marcore uitiantur. Sed qui ueneno imbuti non sunt, suauem in
iuribus gratiam habent, largius tamen sumpti nocent, & ægrius concocti strangu-
lāt, aut choleram morbum citant. Remedio est nitri potus, aut lixiuium cum acida
muria, aut feruēfactæ satureiæ, aut origani iusculum. debellantur etiam gallinæ ei
fimi potu ex aceto, aut eiusdem delinctu cum melle multo. Corpus alunt, sed ægrè
dissoluuntur, cum magna ex parte integri ipsi, cum recrementis alui reperiuntur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Colchicum.



Græcè, Μύκωγ. Latine, Fungus. Officinae Latinum nomen seruauerunt,
Germanis Schwem / Pfifferling / Keyssen.

Gallis ung champignon, ou potiron dicitur. Aquisanis ung Mousseron.

Fungi frigidi, pituitosi & mali succi sunt, si Paulo Aegy credimus, ex his bo-
leti, innocentes sunt, & manifestæ qualitatē experies, probè ad summum
elixi. Qui uerò amara dicuntur, secundum post boletos honoratis locum ob-
tinent. A ceteris abstinere conuenit. Plures enim eorum mortiferi, ut qui uul-
go Stiegenschwem appellatur, ac ipsi quoq; boleti, nisi percocti edantur,
præsens periculum sepe minantur. Ceterum pratenses ante omnes laudati,
quod procul ab arboribus nati in liore ex terra succo, quam ex arborum pi-
tuita gignuntur. Superius candidi, inferius nigricantes. De his moratus in Ser-
monibus sic decernit: Pratensibus optima fungus Natura est: alijs malè cre-
ditur. Et hi boleti intelliguntur, qui inter fungorum genera præcipui habentur.
& de quibus lib. 10. capit. numeri eiusdem Plinius tradit. Solum gule satisfā-
ciebant olim (quantum hodie esculenti sint) ob quam quantū olim estimā-
ti fuerint, indicat uel illud Martialis:

Argentum atq; aurum faciliè est, lenamq; togamq;
mittere, boletos mittere difficile est.

Plinius pediculos uocat, quibus corpus & caput infidet, & qui terre in-
herentes, boletum sustinent, alij coliculos & thyrsos.

Colchicum. Cap. LXXII.

Colchicon, aliqui ephemerum, sunt qui agrestem bul-
bum uocant, autumnū exitu florem ædit croci, candi-
cantem: ab eo tempore folia bulbi, sed pinguiora: caulem
palmo altum, ferentem rufum semen: radicem foris è nigra
rufescentem, quæ delibrata, candida & mollis spectatur, la-
cteo succo madet, atq; gustatu dulcis inuenitur. bulbus eius
mediam habet rimam, fissuramq; qua flos erumpit, pluri-
mum in Messenia, & Colchis enascitur. Ea comesta, fungo-
rum more, strangulando enecat. Hanc autē depinximus, ne à
quoquam imprudenter pro bulbo deuocetur: mirū enim in
modum

A modum saporis uoluptate imperitos allicit. Remedio sunt eadem quæ fungis. bulbum etiam lac potum auxiliatur. itaq; cum adfuerit, non aliud desideratur auxilium.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Scrapio hermodactyli nomine principio, Dioscoridis Colchicum representat, deinde etiam Ephemerum. Colchicum Græci κολχιδόν. Officina perperâ Hermodactylum, Germani Zentloß / Zerbstblumen / Zundsoden / Wild Safran blâm. Galli Canineca appellant. De omni hoc genere plura in annotationibus, in caput proxime sequens, et Musa in examine, et Tagaultius suis in Mesue simplicia annotationibus doctis pariter ac luculentis plura.

Ephemerum. Caput LXXIII.

Ephemerum, aliqui syluestrem irin appellant, folia habet liliâ, sed tenuiora: caulem parem: florem candidum, amarum: semen molle: radicem unam, digitali crassitudine, longam, astringentem, odoratam, nascitur in syluis & opacis. huius radix dentibus præcipua, si decocto colluantur. folia in uino cocta, ducuntur tumores, & tubercula, quæ nihil adhuc humidi contraxerunt.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Hermodactyli duo fastigia facit Mesues, Vnum radice digitali longitudine, quod Ephemerum esse uidetur Dioscoridis, Galeni, et Pauli: radice oblonga, digitali crassitudine, odoratum, iris agrestis appellatum, repellendi, et digerendi facultate præditum. Alterum radice rotunda, et castorei uel nigra (quod Colchicum est ephemerum, et deleterium, prædictis autoribus passim frequens, flore croci per autumnum erumpente, de quo in capite proxime præcedente) uel rubente, uel alba, ut intus, quam eligit solam, si crassa sit, ac modice dura, et ex loco edito lecta: calida sicca initio secundi gradus, stomacho adac-

Hermodactylus Officinarum.



Hæc omnino est quam Hermodactylum uocat, et ab utroque Ephemero separat, ueteribus indicta radix, uti quæ rubens Mesue dicitur. An uero quæ in Officinis ostenditur.

Horum utrum sit Hermodactylus, uel Colchicum, discernere non est difficile his qui legunt, aut integras habent radices, nam delibratæ ad nos conuehuntur. Cuius tamen largam eius copiam depastus innoxie, et multorum tutò hac radice purgatorum experientia quotidiana facit, ut credam uel Hermodactylum hunc esse Mesue, et neotericorum, ueteribus indictum, uel saltem non esse Colchicum.

Helxine, id est, Muralis herba. Ca. LXXIII.

Helxine nascitur in parietinis, sepibus & macerij. folia ei mercurialis insunt, hirsuta: cauliculi subrubentes, et circa eos ueluti semina aspera, adhaerentia uestibus. folia refrigerandi spissandiq; naturam habent, quæ ex causa sanant illitu sacros ignes, adusta, condylomata, panos incipientes, tumores, inflammationesq; Succus eius cum cerussa, ignibus sacris, & ulceribus quæ serpunt, commodè illinitur, imponiturq; podagris cum hircino adipe, aut cerato cyprino. ueterem tussim emendat instar cyathi haustus. tonsillis inflammationem sentientibus utiliter & gargarizatur, & oblinitur. aurium dolori cum rosaceo instillatus leuat.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, ἑλξίνη, ἢ περδίκιον. Latine Helxine, Vrecolaris, Perdicia, Officinis Parietaria.



GERMANIA

Germanis, S. petra traut/ Glasstraut/ Tag vnd nacht/ quamuis & alia herba hoc nomine ap- A
pellatur. Gallis parietaire dicitur.

Qualis herba sit helxine, satis ab hoc descriptum est. Helxine uerò dicta est à uerbo Græco ἥλκω, quod
est traho, eo quod asperitate sua tenaci nexu uelites, quibus adhaerit, ad se trahat: habet enim & caules &
lappas in quibus semen continetur & filia aspera. Vrecolaria & uiriaria autem est nuncupata, quoniam
ureculos & ultra cateraq; uasa pulchrè mundat & purificat. Et Germani ob hanc causam à uirris ipsam
Glasstraut uocant. Perdiciam autem uocant à notissima aue perdice, eo quod illa semine eius præcipue
nescatur, & herbam eruens in illa uolūtetur. Muralis & parietaria Officinis & uulgo dicta à natalibus,
eo quod in maris & parietibus nascitur frequens. Monendi sunt hoc loco Medici, ut rectum Helxines u-
sum discant: nam pleriq; eam non rectè frigidis morbis aut affectibus pro fomento usurparunt, cum refrige-
randi constringendiq; facultate prædita sit. Ceterum cum abstergerendi quoq; illi facultas insit, potest etiam
valculosis, & ijs qui difficulter urinam reddunt, exhiberi, potissimum si aliquid consimilem facultatem obte-
nens ei admisceatur.

Alfine.

Caput LXXV.

Alfine minor.



A Linen, aliqui anthyllion, nonnulli myos ora uocant, quoniam musculorum
aures folia imitantur. Lucis opacisq; gaudet, unde alfine dicta est. Hæc erat
eadem quæ helxine, nisi humilior esset, & folijs longioribus, nec hirsuta. cum teri-
tur, odorem cucumis reddit. Vim refrigerandi adstringendiq; obtinet. oculorum
inflammationibus cum polenta illinitur. Succus aurii doloribus infunditur. quin
& emendat omnia quæ helxine, id est muralis herba.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Eam esse hodie arbitrantur, quam ætynulo sermone Germani Sinerdarm/ Vogelskraut/ Zinner-
ferb. Galli mouronen, quasi murærem, uel potius muris aurem, appellant. ita pauciorum, quod anseri-
bus gratum pabulum subministraret. Auiculas caueis inclusas, cum fastidiunt escam, aucupes solent hoc cibo re-
creare, quandoquidam helxine similis est, minoribus tantum folijs minusq; hirsutis. In hortis quoq; prorepi-
t, & maceris opacisq; letatur. Vita semestri contenta. Herba cucumis, cum teritur, odorem remittit, sed non
illam peponis maturi iucunditatem, sed herbaceum cucumeris utrius subolet, quanquam id, quod de odore me-
morant, multis exemplaribus Dioscoridis non legitur.

Altera minoribus est folijs, ad eandem tamen usum cum priore est.

Lenspalustris.

Caput LXXVI.

Lens



Lens palustris inuenitur in aqua non flatoria naturæ. Propter quod conuenienter collectionibus, igni sacro, & podagris illinitur per se, & polenta glutinat & procidentia puerorum interanea.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, *δακός ὡς τὸ τελευτάριον.*

Latine, Lens uel lenticula palustris.

Officinis Lens aquatica.

Germanis, Wasserlinsen / Merlinsen.

Gallis lentille de mer. Itali Zen appellant.

Lens palustris sine radice conspicitur, sine folijs, etiam si id quod in ea fructificat, sit simile folio, minus habili humore, quam ut in eo folium constari possit. Quidam aliud genus, non in aqua, sed uliginosis dilutisq; nascentis, maius eo tradunt, carens folio, agrariam phacam, hoc est, syluaticam lentem uocantes.

Semperuium, seu Sedum.

Caput LXXVII.


Maiores.



Minus.



Medium.



Semperuium magnum ideo nominatur, quoniam perpetuo folia uireant: cuius caules cubiti altitudinem implent, interdum excedunt, pingues, crassitudine pollicari, uirentes, characiæ tithymali modo infecti: folia pingua, carnosa, longitudine pollicari, in cacumine linguæ similia, alia in terram conuexa, alia in capite stantia inuicem, ita ut ambitu effigiem imitentur oculi. nascitur in montibus, & testaceis, supra domicilia etiam feritur. Eius uis refrigerare, & astringere: medentur igni sacro, nomis, ulceribus quæ serpunt, oculorum inflammationibus, ambustis igni, podagris per se, & cum polenta illita folia. Succus capiti, in doloribus, cum polenta aut rosaceo perfunditur. datur in potu contra phalangiorum ictus, dysenteriam, aluiq; profuua, teretē tineas porus in uino excutit, subditus in uellere, mulierum abundantiam sistit. succus oculorum lippitudinibus, sanguinis uitio conceptis, inungitur. Semperuium paruum in petris, parietinis, & maceris, necnon scrobibus opacis nascitur, caulibus ab una radice multis, tenuibus, crebro foliatis: exilibus folijs, rotundis, pinguibus, mucronatis: caule à medio emicante, palmum alto, umbellam herbidosq;

herbidosq; flores & tenues gerente. Folia eisdem cum priore uiribus prædita sunt. **A**
Tertium uidetur temperuuii genas, quam aliqui andrachnen agriam, aut telephi-
on uocauerunt. Romani illecebram: pusillis, crassibusq; folijs, hirsutis, portulacæ
proximis nascitur in faxis. Vis ei ex calfactoria, acris, exulcerans, illita cum axungia
strumas dissecuit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Sedam maius Græcè ἀλκυονίδες. Latine Sempervivum: æt enim semper, ἀλκυονίδες, significat.
Officinis Latinum nomen seruauit.

Germanis, Hauswurcz, Tinddenweygen, Zunderl hinnen.

Brabantis, Winderbaert. Gallicis ionbarbe.

Dioscorides huius tria genera statuit; primum cuius non nomen, sed in indicauimus. Nescitur in montanis
& fidelibus. A quibusdam autem in telluris domorum scitur. Alterum, in muris & petris, & sepibus,
oppidorumq; sejis nascitur situ umbroso, caule uis pluribus. Huius radice, folio denso, minuto, pingui, longo,
mucronato, in medio caule altus palmo, umbellam & florent herbæ æcem sustinet tenuemq;. Huius folijs ca-
dem que sedo maiori natura est. Germani uocant Alcyon Hauswurcz. Tertium genus capite de Te-
lephio descripsimus, capite ultimo libri tertij.

Vmbilicus Veneris.

Caput LXXVIII.

Cymbalaria.



Coryledon, siue
Cumbilicus Ve-
neris, folio est in a-
cetabuli formam cor-
nato, ineuidenter
concauo, breui in
medio cauliculo, in
quo semen inest: ra-
dice oliuæ modo ro-
tunda. Succus cum
uino circumlitus, in-
stillatusque, contra
genitalia nudat, in-
flammationibus, sa-
cris ignibus, stui-
mis, perniciosis, il-

litu auxiliatur. Stomachi ardorem refrigerat. Folia cum radice comesta, calculos frā-
gunt, ut inam ciant hydropicis ex melle dantur. Herba utuntur ad amatoria. Est &
alterum genus eiusdem, cymbalaria, huiusmodi pinguis folijs, latoribus, ligu-
larum modo densis, circa radicem medium oculi ambitum describentibus, ut in ma-
iore semper uiuo, adstringentis gustus, cauliculo tenui, in quo flores & semina hy-
perici: radice manifestula facit eadem que semperuium.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Κορυλλίδες. Latine Coryledon. Romanis Vmbilicus Veneris.

Officinis Vmbilicus Veneris, & Cymbalaria. Germanis Wabelkraut.

Gallicis cymbalaria herba, Rotundata, Rondela.

Folio tenui est, anguloso, hederaceo, flore paruo, purpureo, in muris terre nascens, omnino eandem esse
puto eam, cuius picturam damus, cum & similitudo constat. & filium hederæ habuerit: nam ei tribuitur
orbiculatum, inuidenter concavum, quod non longè abest ab hederaceo: reliqua paria ferè comperiuntur,
nec radix oliuæ modo rotunda, nec natales dissentiunt.

Alterum genus eiusdem quidam falso Telephium purpurascens faciunt. hoc Germani uocant Wunder-
kraut/weible, folijs sordidis, latoribus, densis, densioribusq; circa radicem uelut oculum cingentes, gustus
asper, in eo flos & semen hyperici à multis genus aizoi reputatur. Huius usu Hippocrates in cibo semina-
rum sexum concepi, sicut priore masculinum prodidit.

Vrtica.

Caput LXXIX.

f

A

Urtica.



B



ptisana, uitia pectoris extrahunt. mulierum menses euocant, cum myrrha modico pota. Inflammatione turgentem uiam, gargarizatus succus exprimit.

DVo urticae genera: sylvestris, asperior, latioribus, nigrioribusque folijs: femine lini, sed minore. altera non æquæ aspera, minuto semine. Folia utriusque illita, canis moribus, addito sale, medentur. gargarizant, carinomatæ, fordida ulcera, & quæ cacoethe uocantur, item luxata, panos, tubercula, parotidas, suppuratio nesque sanant. lienosis cum cera to imponuntur, faciunt ad profuuiarum, cum succo trita, & naribus indita. menses ciunt, eadem detrita cum myrrha, & imposita. procidentes uulvas, recentia contactu resilire cogunt. Semen potum ex passo, uenerem stimulat, uulua ora patefacit, cum melle delinctum, or thopnceæ, lateris & pulmonum inflammationibus prodest, thoracem expurgat. erodentibus medicamentis admiscetur. Cocta cum conchis folia, aluum emolliunt, urinas mouent, inflationes discutiunt, decocta cum

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, *Kvidy, ἀγκυλίφυ*. Latine Urtica, ab urendo ducta, Officinis Latinum nomen seruauit. Germanis, *Nessel*. Gallis de l'ortie grièche, ou piequante. Dioscorides Urticæ duo genera facit. Vnam asperam, quam hodie Officinæ & Herbarij Romanæ, Germani Römisch oder Welsch Nessel appellant. Huius quidem semine in Officini utendum, non aliterius quæ passim in sepibus ac dunetis nascitur. Alterum genus maius est, minuto semine, sed ut Dioscorides tradit, non æquæ aspera: hæc nisi ca fuerit, cuius picturam damus, quam Germani Brennen Nessel & Heyter nessel uocant, caule uidelicet glabro: aliam in Germania propius delineationem accedentem, me uidisse non memini: præter hæc duo genera alia plura inueniuntur, uiribus tamen haud multum à Romana discrepantia, cum haud secus atque hæc pungere uideantur. Urticæ fructus, id est, semen, & folia præcipue, utilia sunt, nam uehementer calfaciunt: tenuium sunt partium, digerunt, phymata & parotidas, crassos & lentos humoribus pulmones purgant.

Galiopsis. Caput LXXX.

Galiopsis frutex in totum caulem & folia habet urticæ, leuiora, & quæ grauent odorem trita reddant: flore purpureo, tenui, nascitur circa sepes, & edificiorum areas, ac semitas ubique. Folia, caules, semen, succusque, durities & carinomatæ dissipant: strumas, panos, & parotidas discutiunt. oportet bis die tepidum ex aceto cataplasma imponere, & eius decocto fouere, ad putrescentia, gangrænas, & nomas cum sale efficaciter illinuntur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, *Γαλιόψις*. Latine, Galiopsis, urtica labæ, Lamium, anonium.

officinæ



Galeopsis.



Urtica mortua.

Officinis Urtica alba, & mortua: ar-
changelica. Germanis Traub nessel / Weiss
nessel / Dyrnsang.

Gallis Orties mortes appellantur.

Urtica que iners & mortua uulgo dici-
tur, herba cognita est, folijs non mordentibus,
folijs mordacis minoribus, candidioribus, ta-
ctu innocentibus: flore albo, luteo, aut purpu-
reo, cauliculos coronante. A multis Galeopsis
esse ea herba putatur, que Officinis Scrophu-
laria maior, Ficaria, Millemorbia & Castre-
gula. Germanis Sawwurz / Drüsenwurz /
Braunwurz / Groß feigwurzgen Frant
dicitur. Brabantis, Speneneyt. Galls ue-
rò agri palma, nanq; frutex est thyrso ac fi-
do urtica leuioribus, que detrita grauem su-
dunt odorem, flore purpureo, cacumine cau-
lis aspero. nascitur propter uias in sepibus
& ruderatis. Huic recentiores quoq; facul-
tatem tribuunt sanandi ulcera putrescentia,
& mariscas. Succum eius multum deformati
faciei iam ferè elephantice in dunt. Semen in
expellendis & euocandis lumbricis esse effi-
cax adijciunt, id quod ab eius amaritudine nō
abhorret. Non carene ea matrone in Gallia,
uulue uitio opportuna, nanq; suo graui odo-
re reuocat, & uelut exanimes recolligit. An
hec sit eadem cum Galeopsis, peritioribus in-
dicandum relinquo.

Gallion.

Gallion. Cap. LXXXI.

Gallion nomen ex eo traxit, quod in contrahendo
lacte, coaguli uicem impleat. ramulum foliumq;
habet aparinae humillimum, rectum: florem in cacumine
luteum, tenuem, densum, copiosum, odoratum. Flos i-
gni ambustus illinitur, sanguinis profluvia sistit. Cera-
to rosaceo gallion admiscetur, infolatum usq; dum albe-
scat. lassitudines reficit, radix uenerem concitat. Nasci-
tur in palustribus.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, γάλλιον.

Latine, Gallium uel Galium, alijs galerion, alijs galation.

Officinis neglecta & incognita.

Germanis, Unser feawen betstro / Megerkraut / Wallstro / uo-
cant. Nomen inuenit à lacte, cui additum pro coagulo est.

Galli petit muguet, hoc est, muschetum minus appellant, quod flos iu-
cundo placeat odore. Nanq; ramulum foliumq; profert aparinae simili-
mum, rectum: florem in cacumine luteum, exilem, densum, frequentem
odore gratum. In aruis & humidis prouenit.

Senecio. Cap. LXXXII.



f 2



Senecio cauliculo est cubitali, sub rubro, folijs et
sciniis, diuisura eruct, sed minoribus multo: lu-
teis floribus, qui celeriter dissecti uanescent in pap-
pos. nomen uero sibi uendicauit, quoniam flores ca-
pillorum ritu, uere canescant. radice superuacua
nascitur maxime in macerijs, & circum oppida. Fo-
lia cum floribus refrigerant. quare illita cum uini
modico, uel per sese, testium & sedis inflammatio-
nes sanant. quin & ex manna thuris medentur cum
reliquis uulneribus, tum ijs quæ nerui acceperunt.
Illiti per se cum aceto pappi, idem munus præstant:
uerum recentes epoti strangulant. Totus caulis, si
coctus in passo potui detur, stomachi dolores à bilis
contractos per sanat.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, ἀνιπέριον. Latine, Senecio.

Officinis Scutum coeli.

Germanis, Creuzwurz, quamuis & alia herba hoc nomine appelletur. Brabantis, Senesfon.

Gallis du fenecion appellatur.

Nomen Græcum inuenit, quod uere canescat. Callimachus acanthida appellat, alij pappum: nascitur in
tegulis & muris. Nec deficere, qui alterum genus facerent, nec quale esset demonstrarem, dantes contra ser-
pentes bibendum. Sine qui senecionem intellexisse Nicandrum putant, cum geraon pogena dixit, quasi hirci
barbam: cum uerisimilius sit, herbam hirci barbule similem notari, quæ uulgo Boctobart dicitur: de qua
alio loco diximus.

Thaliætrum.

Caput LXXXIII.

Thaliætrum.

B



Thaliætron folia coriandri habet, pinguiora paulò:
caulem rutæ, in quo folia. Quæ trita, illita antiqua ul-
cera ad cicatricem perducunt. Nascitur maxime in cam-
pestribus.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Θάλιτρον. Latine, Thaliætrum.

Officinis Cotula foetida.

Germanis Krotendill / Strindend Camillen.

Brabantis paddelbloemen. Gallis l'herbe appelee argentine dicitur.

Nascitur ubiq; præsertim in campestribus. Dioscorides rutæ caulem
ei tribuit, nō papaueris, librarijs similitudine uocabulorum deceptus, in quos
Plinius incidit. Medentur ulceribus folia cum melle.

Marinus muscus. Cap. LXXXIII.

Marinus muscus nascitur in scopulis, testaceisq;
haud procul à mari, gracilis, capillaceus, caulis ex-
pers. præcipua ei spissandi uis, & collectiones cohibendis
& podagras, quas refrigerare opus sit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Βρύαζ δαλασσίον.

Hodie uulgo Græci χαλίο βοτάνιον.

Latine, Muscus marinus.

Officinis corallina: quia ut Corallus in aqua nascitur, & eodem cum
corallus loco: unde fors aliqui falsi, & corallorum folia esse rati, nomen
hoc indiderunt. Germani Wermstz uocant. Galli Coralline. Plura uide in
annotationibus nostris in cap. 20. lib. 1.

Verum non solum inter fucus
sed etiam etiam dicitur. Hinc affligit 31. hinc dicitur dicitur.

Fucus marinus. Caput LXXXV.

E Fucus

E Fuci marini generibus, quoddam latum, & alterum sublongius, & rubens. ter A
etium candidum, nascens in Creta, floridum ualde, quod nulla corruptionis la-
be polluitur. Omnia uim habent refrigeratorem, non podagra modo, sed etiam in
flammationibus, in cataplasmatibus efficaciter utile. uerum q̄s uti humidis conue-
nit, priusquam exarescant. Nicander, pūiceum aduersus serpentes dedit. Hoc fu-
co quidam putant mulieres suum colorem mentiri, cum tamen sit radícula eiusdem
nominis, qua sese fucant.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græci, φῦκος θαλάσσιον. Latine, Eucus marinus. Officinis incognitum.
Germanus, Meergras. Gallis feullet de mer, appellatur.
Nulla complectitur genera: refrigerandi uim habet, ut Dioscoridi placet, uiribusq; haud multum dis-
tinet a nostra palustri lenticula.

Potamogeton.

Caput LXXXVI.



Potamogeton, folium betæ si-
mile, hirsutum, paululum su-
pereminens extra aquam. Refri-
gerat & inspissat, pruriginibus u-
tile, & cōtra ueterum ulcerum no-
mas. Nomen ex eo inditum est,
quod palustribus & aquosis ena-
scatur.

NOMINA ET
EXPLICATIO.

Græci, Ποταμογενος.
Latine, Potamogeton, & Fontalis.
Officinis incognita.
Germanus, Seebalden / Sametant / B-
diciur. Brabantis, Sonreincuyt.
Potamogeton autem quasi fluminibus ui-
cins dicta est: siquidem aquosis & palu-
stribus locis nasci amat. Stachytes uerò
quasi spicata, ob caulem quem ex se mittit
floribus & semine spicatum. Astringit &
refrigerat similiter Polygonum, sed essentia
eius et̄ p̄ior, quàm polygoni est.

Stratiotes. Ca. LXXXVII.

Stratiotes in aquis nascens, iis-
dem supernatat, & sine radice
uiuít: unde cognomentum traxit.
Herba semper uiuo similis, ni ma-
iora haberet folia, quæ refrige-
rant, sanguinem qui defluit à reni-
bus, pota hñunt. uulnera quæ in-
flammationem minantur, intume-
scere non sinunt. ignibus sacris &
tumoribus ex a ceto illinuntur.

NOMINA ET EX-
PLICATIO.

A Græcis celebratur stratiotes. Et ea, ut Plinius auctor est, in Aegypto tantum & inundatione Nili nasci-
tur, aizoo similis, ni maiora haberet folia: hodie planè ignota herbula est.

Stratiotes millefolium.

Caput LXXXVIII.

A



Stratiotes millefolium exiguus frutex, palmi altitudine, aut amplius assurgit. folijs aucularum pennas imitantibus, breui admodum dissectisq; foliorum exortu. folia sylvestre cuminum simulant, præsertim breuitate atq; scabritia, breuiora paulò, densiore umbella, & pleniore. Surculos in cacumine gerit exiguos, & capitula in modum anethi: flores paruos, candidos. Nascitur in asperis agris, præcipuè circa seinitas Eximij usus ad ulcera uetera, recentiaq; profluentem sanguinem, & fistulas.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Στρατιώτης χυλιδόφυλλος. Latine Stratiotes chiliophyllos. Officinæ Millefolium. Germanis Garben / Schaffirp / Schaffgarben / Er Gerwel. Galli millefeuille appellant.

Quibusdam tamen hodie citrinum syluaticum, alij anethum sylvestre, alij asinum daucum uocant, sed falsò, si uirò doctiss. Eurtio Cordo credimus, qui Stratioten chiliophyllon nostrum esse millefolium, in suo Botanico clare demonstrat: recentiores quoq; ad eisdem usum, ad quos ueteres suum chiliophyllum, adhibent: ad sananda nimirum

omnis generis uulnera, dissoluendum sanguinem concretu. & ad cōstringendos menses. Unde à Stratiote millefolio nō esse diuersum, omnibus perspicuū fit.

Verbascum. Cap. LXXXIX.

Zünigs Kerg.

Digitalis purpurea.



Verbascum differencias summas habet duas, hoc nigrum, illud album: in quo mas & femina intelligitur. Fœminæ igitur folia sunt brassicæ, pilosiora multò, & latiora, candida: caulis albus, cubitalis, aut amplior, subhirsutus: flores albi, aut ex luteo pallescentes: semen nigrum: radix longa, gustu acerba, crassitudine digiti. nascitur in





Primula veris.

Verbascum sylvestre.



tur in campestribus. Verbascum, qui mas appella-
tur, oblongius, albis folijs, & angustioribus, tenui
caule. Sed nigrum prorsus albo simile esset, nisi ni-
griore latioreq; constaret folio. Sylvestre folia fert
saluia, altas virgas & lignosas, & circa eas ramulos
quales marrubium: flores luteos, auri æmulo. Sūt
& phlomidæ duæ, hirsutæ, rotundis folijs, humi-
les. Tertialychnitis appellatur, ab alijs autem thry-
allis, folijs ternis, aut quaternis, uel paulò pluri-
bus, asperis, crassis, pinguibsq; : apta ad lucerna-
rum lumina. Radix priorū duarum astringit: qua-
re quod magnitudine ludicrum talum equet, in alui
profluuiō conuenienter ex uino datur. decoctum
ruptis, conuulsis, fractis, antiquæ tussi, auxiliatur.
Dentium dolorem collutione mitigat. Verbascum
cui flos aureus, capillos tingit, & quocunq; abijcia-
tur, blattas in se cōtrahit. Cocta in aqua folia, ad-
uersus tumores, inflammationes oculorum, tyde-

M 46.

A



Lychnitis,
Ficaria
vulgata.



Verbasu-
lum,
Waldst
Forn-
blum.



LIBER QVARTVS.

Blattaria.
Goldtinspflin.



rata ulcera, ex uino & melle illinuntur. cū aceto quoq; uul-
neribus medentur. contra scorpionum ictus sunt auxilio.
Syluestris folia ambustis igni sunt cataplasmata. Aiunt in
folijs eius, quam fœminam dicimus, aridos ficus omnino
non putrescere.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, ὀλόνος.

Latine, Verbascum, Candelaria, Candelæ regis, Lanaria.

Officinis Tapsus barbatus.

Germanis Wulffkraut / Bergenkraut / Vnholden Ferg.

Gallis de Bouillon.

Verbascum omnium ueterum testimonio duo habet summaria genera.
Candidum uinum folijs, alterum nigrum est. Candidum rursus in marcm
fœminam digeritur. Præter tria hæc, & syluestre habetur, Wild Wulff-
kraut Germani appellant. Galli de bouillon s. uisage. Sicut etiam uerbascu-
la duo, quæ à nostris Herbarijs herbe paralytis, & uulgo arthetice, Offi-
cinis primule ueris nōcantur. Germanicè Schlüsselblumen. Gallicè Bra-
cha cuculi, & primi ueria. Horum unum est odoratum, alterum odoris ex-
pers. Est & tertium genus, Verbasculum ueteribus, quod lychmitin abis,
alii autem Thryallida appellant. Germani Weiß & braun Stawen röß-
lin, & Marien rößlin uocant. His uerbasci generibus annumeramus
nos ex Cordi sententia eas herbas, quas Fuchsius nomine digitalis pœlas de-
dit, unam purpureis floribus, alteram luteis, prima digitalis purpurea. Ger-
manicè Blauner Fingerhût / altera digitalis lutea, Gelber Finger-
hût, à forum similitudine appellatur. Denum & huius generis sunt, quæ
quibusdam Verbasculum, Germanicè Wild Fomblum, & Blattaria,
Germanis Goldtinspflin, dictæ. Omnia uerbasci genera cum eiusdem
sint effectus, Plinius ea distinguere supernacuum putat. Priorum duorum ra-
tissimum autem eius quæ aureos flores obtinet. Verbasculo odorato (nam inodorum inutile) recentiores hos
effectus assignant. tritum imponitur efficaciter articulorum doloribus. Radicis decocto uesicae, renumq; ob-
structiones soluantur. Ius herbe propinatur & illinitur aduersus rupta, luxata & tumentia. Præterea cali-
dum & siccum esse constat. Lychmidis sup. mentionem fecimus.

*Hex gustu acerba est, & fluxionis affectibus prodest folia digerendum habent. Sic etiam aliorum folia, po-
tissimum autem eius quæ aureos flores obtinet. Verbasculo odorato (nam inodorum inutile) recentiores hos
effectus assignant. tritum imponitur efficaciter articulorum doloribus. Radicis decocto uesicae, renumq; ob-
structiones soluantur. Ius herbe propinatur & illinitur aduersus rupta, luxata & tumentia. Præterea cali-
dum & siccum esse constat. Lychmidis sup. mentionem fecimus.*

Aethiopsis.

Caput XC.

AEthiopsis folia habet uerbasci similia, perquam hirsuta, densaq; in orbē cir-
ca radicem inam redacta: caulem quadrangulum, scabrum, simile apiastro,
aut arctio, multis concuum alis: semen erui magnitudine, geminum, in uno conce-
ptaculo: radices ab eodem cespite numerosas, longas, plenas, glutinosas gusta, quæ
sicca nigrescunt duranturq; ut cornua possint uideri. plurima nascitur in Ida mon-
te Troadis, & in Messenia. Auxiliatur purulentis excreationibus, ischiadicis, pleuri-
ticis, arteriæ scabritijs, decocta radix & pota: quin & cum melle, eclēgmatis uiscem
præbet.

Herba est hodie Germanis incognita.

Arction.

Caput XCI.

ARction, aliqui potius arcturon uocant, similis est uerbasci folijs, nisi quod hir-
sutiora & rotundiora sunt: caule longo, molli: semine cumini, paruo: radi-
ce tenera, alba, dulciq;. Decocta cum semine radix in uino, dentium dolorem mul-
cet, si contineatur ore decoctum, ambusta pernionesq; fouentur eodem. bibitur ad-
uersus coxendicum dolores, & stranguriam, è uino.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, ἀρκύον. Latine, Arction, prosopion maius, uel arcturus. Officinis Lappa, siue Bardana ma-
ior. Germanis, Klein Kletten. Gallis petit Bardana, & gleteron appellatur.

Arction ab urso nomen habet. Hallucinantur qui ungulam Caballinam, Officinis dictam Arction esse sen-
tiant, cum, ut supra demonstrauimus, bechion sit, & tusilago quam ungulam uocant caballinam.

Personata.

A

Personata, siue Lappa.

Caput XCII.



Personata folia habet cucurbitæ, maioræ & hirsutiora, & crassiora: caule albicantem, quanquam & interdum uiduo caule reperiatur: radice intus candida, foris nigra. Hæc drachmæ unius pōdere pota, cum pineis nucibus, parulenta & cruenta extulsientibus auxiliatur: trita dolores à contorsionibus artuum contractos, illitu sedat. Folia utiliter antiquis ulceribus illinuntur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, ἀρτεσιον, & ἀρτεσιον, ἀρτεσιον.

Latine, Personata, uel Personatis, Arction, Prosopion, Dioscoridi Arction. Officinis Bardana maior, Lappa maior, in differentiam præcedentis, quæ folijs est multo minoribus, nec ita rotundis. Germanis Groß Flettenkraut, Bücholtz uocant. Erubanti Groot Elissen. Gallis Gloton, Bardane dicitur.

Herba, cuius picturam damus, folio cōstat omnium lapparum maximo, parte aersa herbido, aduersa cano: caule oblongo, interdum caule uiduo, grandibus lappis, quæ transcuntium uestibus adherescunt, in quæ flos purpureus nascitur, non euident, sed occultus intra se germinans, radice grandi, candida intus, foris atra. Digerit simul & desiccat: sed & astringit nominatim.

Petasites, Pestilenz wurzel.

B



Petasites. Cap. XCIII.

Petasites pediculus cubito maior, crassitudine pollicis, à quo prægrande folium, galeri modo amplum, ceu fungus dependet. Cōtra phagedænas, & ulcera quæ cacoëthe uocant, efficaciter illinitur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, πετασίτης. Latine, Petasites herba.

Officinis musicata.

Germanis Pestilenzwurz appellatur.

Petasites à petaso, piliū significante, dicta est, quod folium eius pediculo superpositum, petasi modo amplū, ut fungus dependeat. Germanicum nomen ab effectu sortita est: experimento enim comprobatum, ut uir doctiss. Hieron. Tragus asserit, radicem hanc mirificè cōferre pestilentialibus febribus, quod sudorem uehementer moueat, si in puluerem redacta cum uino sumatur.

Nec

Nec minori officia bibitur à mulieribus, quas uteri tormina & præsecutiones exercent. Valet etiam unice ad euocandos lumbricos. Succurrit quoque ijs qui spiritus difficultate laborant. Ducit urinam & menses. Efficiat exest ad vulnera præhumida, & ad reliquas cutis sordiditates. hæc uero posse docet eius amaritudo, cuius quidem hæ sunt facultates.

Epipactis. Caput XCIII.

Epipactis, ab alijs helleborine, parua herba, fruticosa, exiguis folijs. Iecinoris utriusque utilis, & contra uenena pota.

Nulli hodie, quod sciam, herba hæc cognita.

Fumaria.



Capnos, seu Fumaria. Cap. XCV.

Fumaria fruticosa herbula est, pratensis, coriandri similis: folijs candidioribus, undique numerosis, cineracei coloris: flore purpureo. huius succus claritatem facit oculis, de lacrymatione enim: unde nomen traxit. illitus cum gummi, cuiusdam palpebras renasci prohibet. Commanducata herba biliosam urinam trahit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Καρνός.

Latine, Capnos. Fumaria.

Officinis Fumus terre.

Germanis, Eiderauch, Taubenkropff, Katzenkerbel.

Brabantis, Gryscom.

Gallis Fume terre appellatur.

Lotus, Sibengezeyt.



Fumaria acris, amara, subacris, urinam biliosam & multam commanducata aut pota prouocat, hepar obstructum purgat & roborat, scabiem & pruritus inde sanst: siccata uentriculum cum uino roborat, cum meliorato alium subducit, succo suo oculorum claritatem, & de lacrymatione simili modo molitur, unde illi nomen Officinis & uulgo; herba hodie usitissima.

Lotus urbana. Caput XCVI.

Lotum urbanam, alijs trifolium uocant, nascitur in hortis. extractus succus, addito melle, oculorum argema, nubeculas, cæterasque caligines discutit.

NOMINA ET EXPLICATIO:

Latine, Lotus urbana & satia.

Officinis Trifolium odoratum.

Germanis Siben gezeit, Wolrichender Flee.

Gallis du treffle odorifrant. Vide annot. nostras sup. in cap. de Trifolia.

Syluestris Lotus. Caput XCVII.

Syluestris lotus, quam trifolium minus appellant, plurimum in Lybia gignitur, caule bicubitali, & sæpe maioris, realis multis: folijs trifolij pratensis: semine scenigraci, multo minore, gustu medicato. Vim calfaciendi & leniter adstringendi obtinet. vitia cutis in facie, maculasque, cum melle peruncta expurgat, trita per se aut cum maluz semine.

in uino

A *Lotus sylvestris*, Steynflee.

in uino aut passo bibitur aptissimè contra dolores, qui uesicam malè habent.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Λωδός ἀγρία.

Latine, Lotus sylvestris.

Officinæ falsò pro meliloto utuntur.

Germanis Steynflee dicitur, & Guldenflee.


Brabantis Steen clauer.

Caulis fert bicubitalem, & sepe maiorem, folia fenogracosimilia, in quous pediculo tria: floribus pisi, multò ianum minoribus, luteis aut candidis, odoratis, deorsum nutantibus, semine per ramulos diffuso fenograci, sed multò minore, gustu medicato, radice subcandida, quæ notæ delineationi Sylvestris lotæ ad amissim respondens, nulla penitus reclamante, at eandem esse nemo sanæ mentis deinceps dubitauerit possit.

Cytisus. Cap. XCVIII.

Cytisus, frutex est albus in totum, ut rhamnus, ramos spargens cubito longiores, in quibus folia fenograci, aut loni trifolia, minorâ, dorso medio prominente. ea digitis trita eucam olent, guttaraq; cicer sapient. Folia refrigerant. tumores inter initia discutiant, si cum

Cytisus.

B *Cytisus Tragi. Trifolium magnum.*
Grosser Geyfflee.

pane

pane trita illinantur. decoctum potu urinam ciet. Nonnulli, quod apes alliciat, pro-
pe alucaria ferunt.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Multi eruditi uiri cum fruticem, qui hodie passim in Germanie hortis seritur, nomine Sene Arabum, sed falso, uulgo Verbasitum, ueterum esse Cytisum putant: siquidem folium mittit sœnograceo non absimile, ramis exilibus, membranaceo folliculo, pellucente, prætumido, & ueluti quodam spiritu discedente, turgendo, ita ut si digitis prematur, crepitans dissiliat, in quo semen pullum, durum, latum, lentis magnitudine, ceteris gustu, quæ notæ omnes non male conueniunt cum delineatione Cytisi: an idem sit, doctioribus iudicandum relinquo.

Hieronymus Tragus uerò Cytisum exhibet, Germanicè Grosse Geyfflee.

Lotus Aegyptia. Caput XCIX.

Est & in Aegypto lotus, quæ in campis flumine inundatis prouenit, caule fabæ: flore paruo, candido, liliæ simili, quem tradunt occidente sole comprimi, occludi, ad ortum autem aperiri: ad lucem caput ipsum uespera aquis condi, & ad exitum solis emergere. Caput quale papaueris, maximum: & intus grana ceu milii, quæ Aegyptij exsiccant, & in panes eogunt. Radicem lotos hæc habet mali cotonei similitudine, quæ cruda coctaq; manditur: decoctaq; lutei oui qualitatem exhibet.

EXPLICATIO.

Loti nomen uagum est per herbas & arbores aliquot, quæ uerò Aegyptia sit, apud Theophrastum, Ashe-
metum, & Pansianum, uam cum nobis peregrina planta sit, non est cur frustra de hac plura uerba facere ueli-
mus.

Millefolium. Caput C.



Triphyllum, siue millefolium, caulis est tener, singularis, unica nixus radice: plurimis folijs, læuibus, freniculo similibus: unde nomen accepit. caulis flauentis uariis, ac ueluti ex industria delimatus. nascitur in palustribus. uulnera recentia ab inflammatione uindicat, si uel uiride, uel siccum ex aceto oblinatur. præcipitatis in potu cum aqua & sale datur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Millefolium seu Millefolia, Hetruria hoc nomine appellat herbam in pratis tenuem, à lateribus capillamenti modo foliosam, eximij usui ad uulnera: bonum uentos abscissos uomere solidari casus uisq; iungæ addita axungia affirmans. Germanicè Garb/ Schaffgarb/ Tausentblat. Brabantis, Gerwe. Alia est millefolia, Grecis χυλόφυλλον, inter sideritides, Achillea etiam dicta. Est & stratiotes chiliophyllos: de quibus ordine suo diximus.

Myrrhis. Cap. CI.



Myrrhis simillima est cicuta, caule folijsq; radix ei oblonga, mollis, rotunda, cibo non insuauis. Quæ pota in uino, phlangiorum moribus auxiliatur. cit menstrua, & partus secundos, purgatq; à puerperio feminas. subuenit & phthisicis cocta in sorbitione. Aiunt quoq; eandem bis die terue potam ex uino, in pestilentia salutarem esse, & ne morbi contagia sentiantur, ob stare.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Grecè, Mygdis. Latine, Myrrhis.

A Officinis & Herbarijs cicutaria. Germanis Wilder Kerffel. Gallis persil dasne dicitur. Herba cuius picturam damus, omnino cum delineatione Dioscoridis, qua myrrhim depingit, nulla reclinante nota, respondet, ut eandem esse nemo deinceps dubitare possit, siquidem simillima est cicuta, caule & folijs, radice oblonga, molli, rotunda, cibo iucunda. Hanc Plinius smyrthizam, alij myrrham uocant. Falluntur qui cherephyllon, item qui Robertinam Officinis dictam, Myrrhim esse rentur, cum & folio similes possint uideri, non tamen caule nec floribus.

Myagrum. Caput CII.

MYagron, aliqui melampyron uocant, herba est surculacea, folijs rubis, pallidis, tripedanea. semen oleosum, fœnogræco simile. Quod contusum igni torrent, perunctisq; uirgis ad lucernarum lumina utuntur. hoc pingui, scabritias corporis leuigari, atq; expoliri constat.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Myagrum, siue Melampyrum.



Μελάνθρον, uel Myagros, Officinis & uulgo incognitum: Galli uocant du ble frime, & Carmeline: herba surculosa est, folijs rubis, pallidis, tripedanea, semen oleosum, fœnogræco simile, in utriculis conceptum. Hoc in arcis pauitis, rursus flagris decutunt, & uanis in auram uento silentem iactant, dum siliquarum recerementa uanescant, tum trasalibus molis subiiciunt, uersandoq; subinde oleum exprimunt, quo non ad lumina tantum lucernarum, sed & ciborum quoq; condimentis pauperes utantur: magno huius olei prouentu, sunt qui eam esse uolunt, quam nos uulgo Lindortex appellamus.

Onagra. Cap. CIII.

ONagra, siue onothera, aut onuris, frutex est arboris instar, prægran- dis, amygdalino folio, sed latiore, lilio non dissimili: flore rosaceo, magno: radice candida, longa: cum ficcata est, uinum olente. nascitur in montibus. Aquâ in qua radix maduerit, in potu data, feras mitigat, & cicures facit. illitu quoq; tetra ulcera mulcet.

Frutex est Germanis incognitus, Oenochora Theophrasto dictus.

Cirsium. Cap. CIIII.

CIRSIUM, caulis est tener, duorum cubitorum, triangulo similis: ab imo foliola, rosæ speciem referentia: angulispinosi, per interualla molles: folia

buglosso similia, maiora, subcandida, modicè hirsuta, partibus extremis aculeata. ca- cumen caulis orbiculatum, hispidum, in quo capitula purpurea, quæ soluuntur in la- nugines. Radicem huius loco laboranti adalligatam, dolores uaricum sedare An- dreas scripsit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Cirsium, si Ruellio credimus, ea est cuius picturam damus, scilicet ea, quam nunc uulgo Buglossam dicunt Germani Ochsenzung, alia ab ea, quæ borago uocatur, de qua postea agetur cap. III. Est autem duplex Buglossa, unum Germanicum Echij species. alterum uero italicum, in quo omnia sunt maiora, ea Cirsion est cum ei delineationes totæ, paucis exceptis, subscribant, siquidem caulis ei tenet bicubitalis, folia buglosso similia, longiora tamen, subcandida, leniter hirsuta, in partibus extremis aculeata, cacumen caulis circinatum.



A
Cirsium Ita-
licum.
Welsh
Chysens-
zung.



Cirsium sylvaticum, Wild Chysensung.

B

cirsium, hirsutum, in quo capitula purpurea, quæ fati-
scunt in lanugines, quæ oculata fide in herba, dicta nobis bu-
glossa maior, deprehenduntur. Dicta est autem cirsion à ua-
ricibus, quos Greci Cirsos uocant, quoniam doloribus illorū
medetur adalligata. Sunt autem uarices uenarum dilatio-
nes, quæ ex atræ bilis materia fiunt, aliquando in tempori-
bus, aliquando sub umbilico, nonnunquam circa testes, sepi-
simè autem in cruribus, fiuntq; plurimum in his, qui diutius
sunt, aut iter facere consueverunt. altera sylvaticis et do-
mestica buglossa: Species sunt Echij.

After Atticus, seu Inguinalis.

Caput CV.

Aster Atticus cauliculus lignosus, florem
in cacumine habens purpureum, lute-
timus. & in ambitu diuisum, anthemidis mo-
do, capitulum: sed ea quæ caulem ambiunt fo-
lia, stellæ modo radiata, oblonga, hirsuta. Fer-



C



DIOSCORIDIS

A

Aster Atticus.



uenti stomacho, oculorum inflammationibus, pro
cidua sedi, ac inguinibus illitu auxiliatur. Tradit
purpureum florem, si ex aqua bibatur, anginis, &
pueris comitiali malum sentientibus, opitalari.
inguinum inflammationi recentem illinire conue-
nit. Si aridus flos sinistra dolentis manu decerpa-
tur, & inguinibus adligetur, dolore liberat.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græci, ἀστέρις ἄλκωνος. Boëtius.

Latine Aster Atticus, Inguinalis. Officinis inusitata.

Germanis Sternkraut, Klein Negerkraut.

Gallis Aspergoutte mineur dicitur.

Asteris nomen non à foliorum in caulibus, sed in floribus poti-
us figura & situ, accepit, siquidem foliorum in huius herbe flora
numerus & forma, stellam præ se ferunt: uel ut Plinius ait, capi-
tula per ambitum diuisa, folijs pusillis, stelle modo radiata sunt. Er-
rant itaq; qui singula folia in caulibus stelle formam representare
putant. Bubonium & inguinalis, quod inguinum præsentaneum
sit remedium, dicta est. Germanis Bruchkraut, qui ad herniam
puerorum utuntur flores fert purpureos, nascitur in collibus, mō-
tibus, & altis syluis. Augusto mense ut plurimum floret. Mixta
est potentia, uti rosa: refrigerat enim, non tamen uehementer, &
digerit atq; exiccat, quod illi scilicet amara insit qualitas.

Isopyrum. Caput CVI.

B

Isopyron aliqui phasiolon ob similitudine uo-
cant, quoniam folium, quod est aniso simile, in
pampinos torquetur. capitula sunt in summo cau-
le tenuia, plena seminis, melanthij gustum imitantis. Contra tussim, & cetera pesto-
ris uitia, semen ex aqua mulla bibitur, hepaticis, & sanguinem excreantibus utile.

EXPLICATIO.

Isopyrum Plinius quoq; describit folijs anisi, capitulis in summo tenuibus, plena seminis melanthij: quæ uo-
rō, aut quo nomine hodie appellatur, ignotum est.

Viola purpurea.

Caput CVII.



Viola purpurea folium habet hedera
minus, tenuius ac nigrius, nec mul-
to dissimile. cauliculus à radice medius
prodit, in quo flosculus, suauiter olens,
purpureus, opacis & asperis nascitur. Re-
frigerandi naturam habet. Folia per se
& ex polenta illinuntur aptissime stom-
acho æstuanti, & oculorum inflatio-
nibus, sedi q; procidenti.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Isop. id est, uiola omnis, & præcipue nigra, seu
purpurea, quamuis in eodem genere est alba, etiā uul-
go martia dicitur, & quadragesimalis. quod Martio mēse, & quadragesima floreat. Germanis Mäerzen vio-
len, Vionle, Blaw, Weiss violen. Brabantis, Violetten. Gallis violettes, & uioles de martz, ou carême
dicuntur. Est etiam multifolium, ob id Dasipodium Græcis. Germanis Gessülte violen, dictum, concolor præ-
ma, sed plenior: frigida est, & humida primo ordine. Syrupus ex multis florum uiola nigra recentium, ut ro-
sarum, flore Persici, infusionibus soluit aluum. Quin & semen uiolæ nigrae, album, rotundum, milij æmulum
apertè cholagogum est. Est quoq; eius generis syluestrior toto habitu strigosior, magis serpens, flore purpu-
reo, in albū languescente, inodoro, hanc Germani, Hundes violen, Wild violen, Galli uiolette sauages uocant.
Cacalia.

Cacalia. Caput CVIII.

A

Cacalia Italica.



Cacalia, quæ leontice uocatur, folia fert magna, alba: è quibus medius caulis emicat, rectus, albus, florem ferens robori aut oleæ similem. nascitur in montibus. Radix in uino madefacta, ut tragacantha, delinctu aut manducatu per se rufisibus, scabritijs arteriæ, medetur. Grana quæ post excussum florem innascuntur trita, & cum cerato illita, faciem erugant, & cutem extendunt.

Musca.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Lilium conuallium.



Græcè, Κανθαλία.

Latine Cacalia.

Officinæ Lilium conuallium.

Germanis Weiblînlin / Meyenröslin.

Galli du muguet, muschetum maius, appellant.

Sua sponte nascitur in opacis & lucis, unde nomen lilij conuallensis: caule multo tenuiore, flore candido, suauiter olente, unde Galli muschetum appellant. gustu subamaro, semine molli, radice singulari, longa, adstringente: interdum ceruleo flore conspicitur. Plurimè profectò, quin potius omnes Cacaliæ, à Dioscoride descriptæ notæ, ferè huic lilio conuallium respondere cognoscuntur, quapropter à Dioscoride Cacalia appellari putandum est: fallitur

Bunium.

qui hanc esse Ephemeron non letale arbitrantur, radice o portissimè reclamante, nec huic uita adeò brevis, ut ephemero, quod uno aut altero die commoritur, cum in tres septimanas etiam decursum uitam humore refecillatum prorogare possit cacalia. Hanc Galenus Caucanon uocauit. Paulus cacaliæ, non Caucanon, sed caucano similem esse tradidit.

Bunium. Cap. CIX.

Bunium caulem ædit quadrangulum, procerum, digitigrasitudine, in quo ramuli minutis folijs ac floribus scatent: folia proximè radicem, apio similia, longè tenuiora, coriandrinis proxima: flores anethi: semen odoratum, hyoscyamo minus. Urinam ciet, excoctum facit. secundas euocat. lienis, uesciæ, renibus utile. tam humidi quàm sicci, expressi succi caulibus, folijs, radicibusq; usus inualuit ex aqua multa. Pseudobunium palmiti altitudine fruticat in Creta, folia ramulosq; nappi ferens, acris gustu. Tormina, atq; stranguriam, laterumq; dolores, sanant quaterni rami eius poti in aqua. illiti quoq; cum sale & uino, repentes, strumas discutunt.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Βύσιον. Latine, Bunium. Officinæ inusitata.

Germanis S. Barbaren Kraut.

Gallis Herbe au charpentier, dicitur.

Plura uide suprà in annotationibus nostris in cap. 109. lib. 1.



B 3

A

Chamæcissus. Caput CX.

Hedera terrestris,

Chamæcissos folio est hederæ, tenuiore, longiusca-
lo, ramulis à radice quinis senisue, dodrantalibus
foliosis flore uiolæ albæ simili, candidiore, ac tenuiore,
gustu supra modum amaro radice tenui, candida, inutili.
nascitur in cultis. Bibunt convenientissimè ischiadici fo-
lia, tribus obolis in aquæ cyathis tribus, tricenis qua-
dragenisue diebus. eodem pota modo, senis aut septenis
diebus, regium morbum purgant.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Χαμαίσις. Latine, Chamæcissus, Hedera pluvialis.

Officinæ Hedera terrestris, Corona terræ.

Germanis Grundtreben, Erdcrenglin, Erdtuolen.

Brabantis, Onderhate.

Gallis Lierre terrestre dicitur.

Dubium est apud multos, an hæc herba, cuius picturam damus, uera
Chamæcissos sit, cum aliquot notis delineatione omnino non respondeat:
quare aliqui elatinen maluerunt appellare, ut supra monuimus.

Chamæleuce. Cap. CXI.

Chamæleuce lumborum doloribus propitia est, her-
ba uirens, incuruis folijs, furculisq; flore rosaceo.
Vide annotationes nostras in cap. 105. lib. 3.


Buglossum, seu Lingua bubula.

Caput CXII.

Sylvestre buglossum.

Waldt Ochsenzung.

Buglossum.



* Omnia hæc
quidam non ha-
bent.

Buglossum (* nascitur
in campestribus, & sa-
bulosis. Iulio mense colligi-
tur. Aiunt eam quæ treis
thyrsos emittit, cum semi-
ne & radice trita, potamq;
contra terrianos horrores
prodesse: quæ quatuor, ad
quartanos. ea in uino deco-
quitur. herbam abscessi-
bus utilem esse uolunt.)
Verbasco simile est, folium
in terra sparsum, nigrius,
asperum, bubulas imitans
linguas. Quod in uinum
deiectum, animi uolupta-
tes auget.

NOMINA

LIBER QVARTVS.
NOMINA ET EXPLICATIO.

359

Buglossus, bubula lingua Catoni dicta, Grecis ἡ Βόγλωσος. Germanis Borretsch/Ochsenzung/
Buglossen, Borrich. Gallis borache appellatur: Calida humida, ob id uinis iniecta letitiae ac hilaritatis
causa esse creditur, unde cuphrosinum quoque Grecis uocatur. Officinis Corago, corruptè Borago, una multa
litera.

Cynoglossum. Caput CXIII.

Cynoglossum Officinarum.

Germanis Hundszung.

Cynoglossa uera.

Lind Hundszung.

Cynoglossum.

Hundszung.



Cynoglosson folia latifolia plantaginis habet, arctiora, minora, lanuginosa:
caule necat, & humi sternitur. prouenit in sabuletis. Folia cum suillo adipe ue
teri inuentur morfibz canum, alopecij, & ambustis. emollit aluum, decoctū her
ba ex uino potum.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Grecè, Κυνόγλωσσο. Romani linguam caninam appellant. Officine Grecum nomen seruant.

Germani Hundszung. Galli Herbe au chien uocant.

Cynoglossum non esse eam canis linguam, quam Officine circumferunt, cuius picturam sub nomine Cyna
glossi Officinarum damus, euidentius est, quam ut probari desideret: cum uidua caule proditur à Dioscori
de, quam strata, folio latifolia plantaginis. Nam Officinarum canis lingua, nec plantaginis effigie, sed angusta
prolonga, subiectis lanuginosa gerit folia, nec uenosa, molliaque, caule cubit. ali. surculofo, flore purpureo, semen
in lappaceis umbilicis rufis, & exili. Altera, cuius picturam damus, nominæ ueræ Cynoglossæ, inuenitur in
subiectis, folio molli, uenoso, latiusculo, lanugine molli, canescens, primo anno sine caule, hanc omnino ueram
Dioscoridis Cynoglossam esse putauerim, uulgo etiam ob similitudinem canina lingue, ac foetidum canis odo
rem hoc nomine cognita.

Phyteuma. Caput CXIII.

24

A P Hyteuma folia habet radiculæ, minora: copiosum semen, perforatum: radice paruum, tenuem, per summam terræ nitentem: quam ad amatoria conuenire, nonnulli scriptum reliquerunt.

Herba peregrina & incognita, quam Plinius describere supernacuum habuit, cum sis usus eius tantum ad amatoria.

Leontopodium. Caput CXV.

* Odoratiora.



L eontopodion duum digitorum herbula est, folia ferè angusta, longitudine ternum quaternumue digitorum, hirsuta, quæ iuxta radicem lanosiore flocco * canescunt, capitula in summo caule quasi perforata: flores nigri: semen usque adeo spissa lanugine inuolutum est, ut sæpe fallat: radice parua cohæret, quam tradunt appensam ad amatoria prodesse, & tubercula discutere.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Ruellio uidetur esse leontopodion. Ea quæ cruciata dicitur Herbarijs, & Officinis, Germanis Aleyn vergißt man nit, & Blaer augentrost, huius ferè serpit, digitali longitudine, folio angusto, longo ternos ferè digitos, hirsuto, ab radice lanoso, & canescente, in cauliculorum cacuminibus capitula tanquam pertusa, in quibus strobili dehiscunt nigricantes, semen spissa lanugine, radice exili, &c.

Laurus Alexandrina.



Hippoglossum. Ca. CXVI.

H ippoglosson frutex est folia habens rusci tenuis figura, & spinosam comam, & in summo ceu linguas è folijs exeuntes. Capitis dolorem corona ex comis imposita minuit. malagmatis radix succusq; admiscetur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, ἵππογλωσσον.

Latine Hippoglossum, Laurus Alexandrina.

Officinis uularia.

Germanis Seppflin kraut / Beelkraut.

Gallis Lingua pagana.

Italics Bonifacia appellatur.

Vide plura in annotationibus nostris in cap. de Laurus Alexandrina.

Antirrhinum. Cap. CXVII.

A ntirrhinon, alij anarrhinon uocant, herbam caule & folijs anagallidi similem: flore alba uiolæ, purpureo:

Antirrhinum.



reo: ideoq; syluestris anagallis A
nominata est: semine vitulina-
rium simili. Tradunt perunctos
ea, cum oleo lilino, uenustiores
fieri: nec ullo medicamento læ-
di posse, si quis appisum gesser.

NOMINA ET
explicatio.

Græcè, ἀντίρρινον. Latine, An-
tirrhinum. Officinis incognita.

Germanis, Orant / Streichkraut/
Streichkraut. Gallis Oculis catti,
moron uolot dicitur.

Galenus hanc & bucranon, hoc est,
bubulum, uel vitulinum caput dici men-
nit. Florem uiole albe ei attribuit Diosco-
rides. Plinius hyacinthi: nescio an ianthi-
no, hoc est, uioleæ potius esset legendū:
nam ea quæ rura nostra Orant uocant,
uioleæcum florem præ se fert herbula, cau-
le & folijs anagallidis, flore purpureo, par-
uo, semine vitulina-
rium, nam fructus ex-
cussio flore vitulina-
rium rudimen-
ta quædam exprimit.

Catanance. Ca. CXVIII.

Exe genere una, folia coro-
nopii habet, longa, radicem B
iunci modo prætenuem: capitu-
la sena, septenaria, in quibus erui
semen inest. Arescens in terram
flectitur, & se contrahit ad spe-

ciem unguium milui exanimati. Altera mali parua magnitudinem explet, radice
exiguæ oliuæ magnitudine: folijs quoq; oliuæ colore, & figura, mollibus, diuisis,
humili inclinatis: semen, ut cicer, minutum in uirgulis depedit, puniceo coloris, mul-
tis foraminibus pertusum. Vtramq; narrant in amatoria expeti. Thessalicæ mulie-
res his uti traduntur.

EXPLICATIO.

Harum cognitio, ut herbarum pauci usus, ad amatoria & phyltra tantum expetitis planè desijt. Plinius
quoq; qualis esset, à se describi superuacuum duxit. Illud non ab re est dixisse, ad detegendas magis uanitat-
es, electum ad hunc usum coniecturam, quoniam arescens, contraheret se ad speciem unguium milui exanimati.

Tripolion. Caput CXIX.

Tripolion in marinis nascitur locis, quæ allidit unda, recedensq; dimittit, neq;
in mari, neq; in secco: folio glasti crassiore: palmeo caule, in mucrone diuiso.
Eius, ut tradunt, flores colorem ter die mutant, manè candidi, meridie purpurei, se-
ro punicei conspiciuntur. radice alba, odorata, calidi gustus. Quæ drachmis duabus
in uino pota, aquam, urinamq; per aluum extrahit. in medicamenta digeritur, quæ
uenena arcent.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Dioscoridis Tripolium, Serapionis Turbith est. Tripolij nomen retulit, quod flores eius (Dioscoride te-
ste) ter die mutantur, candidi manè, purpurei meridie, punicei in occasu. Nascitur in maritimis, ubi allidit
unda, iterumq; retro comseat. hoc Arabum aliquos Turbith cognominasse constat. Actuarius tamen duo à
tripolio diuersa turpeta esse apparet, alterum uocari alypiam turpet album exponit. Alibi uerò
pitryus

A pityusæ radicem (quæ Officinis dicitur Esula) turpeton cognominat, quasi alterius coloris, hodie peregrina, & incognita radices sunt, nec temerè pharmacis commiscendæ.

Adiantum. Caput CXX.

Adiantum album.

Adiantum nigrum.



A Dianton, polytrichon, pusilla gerit folia, similia coriandri, in summo incisuris diuisa, cauliculi, quibus exoriuntur, nigro colore nitent, prætenues, palmum alti: radice superuacua, neq; caulem, neq; fructū, neq; florem profert. Decoctū herbarum potum, prodest spirandi difficultati, suppuriosis, lient, & felle suffusis, & urinæ difficili, calculos frāgit, aluum sistit, serpentium moribus auxilio est. Contra stomachi fluxiones in uino bibitur. Secundas ciet, & mē

strua, sanguinis reiectiones inhibet. Contra serpentium morsus cruda herba illinitur, alopecias densat, strumas discutit, furfures, & manantia capitis ulcera, ex lixiuio emendat. defluentes capillos continet, cum ladano & myrtino, & susino, aut hyssopo, uinoq; Decoctum eius cum lixiuio, & uino infusum, idem præstat. conuincet & gallinaceos pugnatiores facit, in cibos eorum additum. Seritur gratia utilitatis pecorum, circa ouilia. Umbrosis, & palustribus, circa parietum aspergines, & fontium specus enascitur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, ἀδωνίς. Latine, Adiantum, quidam politrychon, alij callitrychon appellant, ab effectu, tingit enim capillum. Duo genera eius, candidius, & nigrum, breuiusq; Theophrastus assignauit. Triplex Dioscoridi esse uidetur. Primum speciatim polytrichon uideat, Adiantum album Theophrastus, Gaza cum uulgo

Politrychon Apuleij.

Guldin widertodt.



& Officinis

Rot Steynbied.



Officinis capillum Veneris, Germani Steynbied, A. Mauraut. Alterum trichomanes, nigrum Theophrastus, vulgus, & Officinis adiantum nigrum, Germani Frauwenhart, Stembder, & Welscher Steynbied. Tertium similitudine filicis, & filijs lenticule, vulgus, & Officinis Polytichon, Germa. Rot Steynbied, &c. Quartum addi potest, quod Apuleij polytrichon appellabimus, ne quisquam Dioscoridis & aliorum Grecorum intelligeret, hoc Germanice Wixerode, Wixerthon, & a colore aureo, quæ habet, Guldmer widerthe n. appellatur. Galenus adiantum non diuisit, forte quod omnium eadem sit facultas. Callitrichon à nonnullis trichomanes dicitur: tamen qui de herbis scripserunt, adiantum uocant, callitrichon potius

quàm trichomanes: Polytrichon autem, & callitrichon diuersa facit Gal. lib. 1. comp. pharma. part. Recens melius, nisi cum siccatum, & astringendum ualentius. Adiantum seu polytrichon, calido, frigido temperatum, gustu acerbo, siccatur, tenuatur, digeritur, ob id strumis confert, lapides frangit in nobis, crassa & lenta ex puluone educit, capillos reddit, præsertim uisum.

Fidicula, seu Trichomanes.

Caput CXXI.

Trichomanes nascitur eisdem in locis, quibus adiantum, filici simile, sed exilius: folijs lenticulæ, tenuibus, in ordinem utrinque digestis, aduersis in se, in ramulis tenuibus, acerbis, fusco colore splendentibus. Eadem quæ & adiantum præstare posse constat.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Grecis Τριχουανθίς. Officinis Polytrichum uocant. Vide plura in annotationibus nostris in caput proxime præcedens.

Xanthium, siue Lappa.

Caput CXXII.



Xanthium nascitur læto & pingui solo, & la cubus exiccatis, caule cubitali, anguloso, pingui, prodeuntibus ex eo crebris alis. folia arripicis habet, insecta, nasturtium odore imitantia: fructum grandis oliuæ modo, rotundum, & ut platani pilula, spinosum, qui contactu uestibus adhærescit. Is antè collectus quàm perfectè siccet, tunditur, & fictili uase reconditur. Flauos autem facit capillos, si acetabuli instar tepida aqua madescat, mox caput, nitro antè perfrictum, illinatur. Alij in uino tidunt, & ita asseruant. Semen aptissimè tumoribus imponitur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Grecis Ξανθίου.

Latine, Xanthium, nomen ab effectu inditum, quod rufet capillum.

Officinis & Herbarijs hodie lappa minor, & lappa inuersa.

Germanis Beetlers leus, Spitz Fletten.

Brabantis, Clissen. Gallis Gloton dicitur.

Cum discutiendi uires habeat, facillè colligitur temperamento esse calido & sicco prædium, id quod ex sapore etiam, qui est amarus, & subacris, deprehendi potest.

Aegilops,

A

Aegilops, siue Festuca. Caput CXXIII.

* Hec ad finem
capitis usq; qui
dā non habent.

Aegilops herbula folia tritici habens, sed molliora, in summo capite semina bina ternāue rubra, quibus aristæ quasi capillacæ exeunt. Illita cum farina herba ægilopis medetur, duritias discutit. Succus farinæ admixtus siccatur, & eorundem gratia reponitur. * Bromus herba ægilopi similis, exicatoriam uim habens, decoquitur cum sua radice in aqua ad tertias, & iuri colato par modus mellis adijcitur: rursus incoquitur, dum liquidi mellis crassitudo fiat. Linteum eo humore imbutum, & naribus inditum, contra graueolentiam ulcerum efficax est. Aliqui tritam aloë addunt, & eo modo utuntur. Cum siccis rosas cocta in uino, graueolentiam emendat.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, ἀγίλωψ, festuca, secundum genus auenæ, Gazæ festucago est autem auenæ sterilis, de quo plura in annotationibus nostris supra libro 2, in capite de auenæ. Hoc caput uidetur in Dioscor. omnino superfluum.

Glaux. Caput CXXIIII.

Glaux cytiso & lenticulæ folijs similis, quæ superne uirent, auersa; candidiora spectantur. ramuli à terra exiliunt quini senue, tenues ab radice, dodrātem alti. flores ceu uiolæ albæ, purpurei exeunt, minores tamen. nascitur iuxta mare. Coquitur cum hordeacea farina, sale & oleo in forbitione, ad reuocandam extingui lactis ubertatem.

EXPLICATIO.

Glaux, ut Ruellio placet, frequens in Gallia iuxta specus aquosos, & in ueteribus foueis: sed adhuc nullum inuenit nomen.

B

Aleya Bibenell.

Polygala. Cap. CXXV.

Polygala palmi altitudinem perit: folijs lenticulæ, gustu adstricto. Quæ pota, lactis abundantiam facit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, πολύγαλα, quod lactis abundantiam faciat.
Germanis Bibenel die Kleiner uel, ut alijs placet, Wangeltraut
Brabantis, Aleya Beuernelle.

Osyris. Cap. CXXVI.

Osyris frutex est niger, ramulos ferens tenues, lentos, fractuq; cōtumaces: & in his folia, quaternaria, quina, senāue, ceu lini, nigra in initio, dein colore mutato rubescentia. Decoctum eius potum, iuuat arquatos.


NOMINA ET EXPLICATIO.

Osyris, ut Plinius scriptum reliquit, ramulos fert nigros, tenues, lentos, & in ijs folia nigra ceu lini, seminaq; in ramulis, nigrum initio, deinde colore mutato rubescens. Ea Officinis hodie incognita, osyris nomine, namq; à similitudine nouum emendicarunt nomen, si nariam appellantes, quo nemini non noscitur. Germani uocant Bachtraut / Flachtraut / Leinttraut / Brottensflachs / Flachs / Flachspflanz.





Smilax aspera.



flachs/Wilflachs/ Tzabelkraut/ Scheiffkraut/ si-
militudine esulae decepti.

Est & linaria hortensis, vulgò flos S. Catharinae, flo-
ribus partim phaeuceis, partim caeruleis, & albis, nigro
semine in oblongis folliculis. Tertium genus, linariae simi-
le, gracilius tamen, floribus in summo Stoechadis citrine in-
star, uillosis, rubicundioribus, fortasse heliochryson Diosc.

Aspera smilax. Ca. CXXVII.

Smilax aspera, folia habet periclymeni:
sarmenta tenuia, multa, rubi modo aut
paliuri aculeata, arbores scandit, ab imo ad
summa perreptans, se conuoluens eis. fert
racemos exiles, qui maturi rubescunt, gu-
stumq; leniter mordent. nascitur in paluistri-
bus & asperis: radice dura, crassaq;. Folia et
acini, & antè & post epoti, uenenorum anti-
dota sunt. Tradunt, si infantibus nuper in lu-
cem editis, quid ex his tritum propinetur,
nulla postmodum uenena nocitura. Incidi-
tur etiam ad alexipharmaca, id est, ad ea me-
dicamenta, quibus uenena arcentur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Smilax aspera hodie Germaniae peregrina & incogni-
ta, nam ea cuius picturam datus, Germani inter genera
uolubilis referunt, & Stedhende, siue Scharpffe win-
den, uel Range. Brabantii Dranghe, appellane.

Læuis smilax. Cap. CXXVIII.

A



Ruscus.

Læuis smilacis folia hederæ similitudinē habent, molliora, læuiora, tenuiora. huius sarmenta nullis horrent spinis. conuoluitur arboribus, ut prior. fructum parit lupini modo nigrum, exiguum, floribus in cacumine perpetuis, multis, rotundis. Hac smilace, quadam topiariorū arte, tectoria contra æstus molestiam faciuntur. folia per autumnum decidua. Semine cum dorycnio potio, ternis singulorū obolis, uaria & tumultuosa in somnis obuersari traditur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Læuē smilacem, Dioscoridis Cissampelum maiorem esse, suprā ostendimus suo loco, quæ autem uera smilax læuis fuerit, hodie nemini quod equidē soiam cognitum, nisi fortē ea fuerit, quam Padani Ligures Balsaminam, Hierosolymitanum pomum Hetruria, Mirabile Gallia, uulgus Garantiam, quoniam septi modo in hortis fenestrisq; per cancellos opere topiario digeritur, de qua nihil apud ueteres inuenio. Ea tenuibus prælongisq; flagellis ultro citroq; reptantibus euagatur, folijs hederæ, molliora, læuiora, tenuiora, articulatioribus, exilibus pampinis, ex alerum sinu prodeuntibus, quibus illigantes sese cancellatim uicinis implicant statuminibus, flore cucumeris, ex albo in luteum languescēte, turbinato utrinq; fructu, carnosa cute, ex per uersus uerucosa, ac rigidioribus bulbis intumescēte, cucumeris pusilli, uel citrij similitudine, malo uerius ac tubere quā grandi bacca, aut folliculo: aureus maturi color, cartilago intus punicea, uel lutea, sanguineusq; succus. Pomum maturitate dissilit, inanisq; confrecto patet, semina intus aliquot lenticule figura continens, ruberrima, ex quibus oleū exprimitur, ad uulnera præcipuū &c.

B



Ruscus. Cap. CXXIX.

Ruscus arborescens.



Syluestris myrtus, aliquibus oxymyr sine, aut myrtacātha. Latinis ruscum appellatur. folium fert myrti, latius in formam lanceæ mucronatum. bacca per maturitatem rubescunt, rotundæ, à medio folio dependentes, osseo intus nucleo. cubitales ramuli ab radice

radice exeunt, uutilium modo lenti, fractu contumaces, foliosi: radice graminis simi
li, acerbâ, & subamara. Folia & baccae in uino potæ urinam cient, mentes pellunt, ue
sicæ calculos frangunt, stillicidio urinæ medentur, dolores capitis sanant, & regiū
morbum. In asperis & præcipitibus locis enascitur. Decoctum radicis in uino po
tum, eisdem præbet effectus. Cauliculi recentes, asparagorum uice, in cibo sumun
tur: amari autem sunt, sed urinam mouent.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, ὄξυρριζον. Latine, Ruscus. Officinæ corruptè Bruscus. Germanis Bûsch dicitur.
Bruscum hodie, addita litera, licet corruptè, uocant Officinæ: humilis herba est, fruticosa, folijs acutis, &
mucrone rigentibus, dependentibus à medio baccis quæ per maturitatem rubescunt, osseo intus nucleo, rami
lis cubitalibus, uutilium modo lenti, foliosis, fractu contumacibus, radice graminis acerbâ, subamara. Alterum
genus nonnulli faciunt, quod proceritatem arborum æquat, folio lato, duro, & per angulos aculeato, im
mortalis quoque uirore, baccis rubentibus, & racematim collectis, hæc Ger
mani Siechend palmen / Galli bousson uocant. Scio rusci fructum, cu
bebas Mauricæ uocatas credi. Sed ab his dissentio, qui hoc adfirmant, in
testimonium citans Actuarius, Aëtium & Galenum. Nam cubebas, nec
oxymyrines seu myrti sylvestris fructus, nec cubebas Galeni esse, cum
Serapione apertè harum descriptio ostendit, & conferenti patet.

Caposium Galeni.



urinam mouent, & renum calculos expurgant. Non adeo tamen sunt
tenuium partium, ut Cinamomi loco usurpari possint, cum Quinto:
cum multò sine deteriora optima casta. In Side Pampiliæ loco, quia
luxuriat carposium ibi, est uilissimum.

Laurus Alexandrina. Cap. CXXX.

Laurus Alexandrina folio est rusci maiore, mol
liore, & candidiore: semine inter folia rubro, ci
ceris magnitudine: ramos spargit in terra, dodranta
les, interdum longiores: radice sylvestri myrto simi
li, maiore, molliore, odorata. inuenitur in montosis.
Difficiles partus accelerat, radice pota sex drachma
rum pondere in uino dulci, & stillicidio urinæ auxilia
tur, sed sanguinem extrahit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Hanc omnino eandem esse puto, quam superius Hippoglossum ap
pellauit, quod mihi non credens, eius historiam conserat cum ipsa her
ba, cuius picturam datus, intelliget singulis notis adamussim responde
re, nulla prorsus reclamante. Siquidem frutex est folijs oxymyr sine cō
cauis, è quibus folium exit minutum, lingue forma. Nec me fugit nullā
in ea, qua uue medeatur, familiaritatē inueniri, à qua tamen hoc ei no
men inditum, ut hinc etiam Germanicè Sauchblat / Beelkraut / &
Dapffentkraut, id est, uulue folium dicatur. Imò ne aliquem foliorum
quidem usum. Fuisse tamen olim non paruum illum ex hippoglotti &
hypoglossidi nomenclatura cōstat, quæ hinc proculdubio facta illi est,
quod sub lingua teneri solita sine folia, ut uel hodie, non tantum apud
Insulres, ut Vergilius Marcellus ait, aliasq; alibi gentes, sed etiam in
Germania nostra fit, quoties abundantem puerorū saluā et destillatē in fauces humiditatem, unde uel præ
h 2



A lixa columella, id est, muila, uel fauces balbutie lingue impedimentum oritur, cohibere: & sic de opus est.

Daphnoides. Caput CXXXI.

Daphnoides cubiti altitudine fruticat, ramis flexilibus obsequiosisq; multis, inde sursum uersus foliosis. cortex supra modum uiscosus ramos uestit. folia lauri, graciliora, & molliora, fractu contumacia, quorum gustatu os & fauces incendantur: flores candidi: bacca, cum ematuruit, nigra. radix inutilis. nascitur in montosis. Pituitas extrahit folium recens uel aridum in potu. menses ciet, & uomitus caput inanit commanducatum. sternutamenta mouet. Baccae quindecim potae, aluum resoluunt.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Officinae hanc laureolam uocant, siquidem laureola frutex nascitur ramosus, cubitalis, molliori angustioriq; quam laurus folio, tristi aspectu, flexilibus uirgis, supra modum uiscosis, uersus cacumen foliosis, flore candido, bacca cum percoxit atrii coloris, fronde fractu contumaci, cuius gustatu mordetur os, incensumq; guttur uellicatur, radice inutili, &c.

Chamaedaphne. Caput CXXXII.

Chamaedaphne uirgas emittit cubitales, singulari ramulo constantes, rectas, tenues, leues: folia lauri similitudine, leuiora multo, ac uiridiora: semen rotundum, rubens, annexum folijs. Illinuntur capitis doloribus: trita folia, stomachi ardores mulcent ad sedanda tormina, cum uino bibuntur. Potus cum uino succus, menses & urinam ciet. idem facit pesto appositus.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Hanc, ut priorem, Officinae & Herbarij uocant Laureolam: namq; uirgo ramulo & cubitali, erecto folijs, laureo, tenui, multo leniore, acini rubentes, rotundi, folijs annexi quibus adnascantur.

Veratrum album. Caput CXXXIII.



Helleborum album. Latini ueratrum albu uocant, fert folia plantaginis, aut betulae syluestris similia, sed breuiora, & nigriora, rubescentia: caulem cauū, quadrantale, tunicis conuolutum cum arescere cepit. radicibus nititur multis, tenuibus, ab obliquo & exiguo capite exeuntibus, ceptum modo fibratis. nascitur in montibus & asperis. radices menses colligenda. Optimum habetur candidū, friabile, carnosum, modice extensū, nec tamen iuncto modo mucronatū, quod frangendo puluerē emittit, & tenuē habet medullam, gustu uero ad modū feruens, neq; saluam subinde ciet, huius scemodia aut strangulat. Primatum Cyrenaicū tenet. Galaticū autē & Cappadociū, candidiora, & puluere quodā obfusa, celerius strangulatus mouet. Vomitione aut uarios extrahit humores. collyrijs admiscetur, quae caligine oculorum discutiunt. partus impositum necat. menses pellit. sternutamenta excitat. mures interficit, cum melle & polēta subactū. absomit carnes, si coquatur unā. datur per se ieiunis, & cū sesama, aut prisanæ succo, aut halicæ, aut lentis cremore, cum aqua mulsa, aut pulvere, aut quauis alia sorbitione. Cogitur eum pane, & ita inassatur. Preparatio corporum, ac uictus ratio, diligenter tradita est, cum ab his qui de medica eius portione scripturarunt, tum maxime a Philonide Siculo Ennensi, cui nunc assentimur, quippe longum nimis esset, in hac præterim editione

additione de materia. simul medicam curandi rationem exponere. Dant nonnulli in A
pulis forbitione, aut copioso halicæ cremore: aut paucum antea cibum dari præ-
cipientes. statim ueratrum offerunt, ijs præsertim, quibus strangulationis suspi-
cio imminet, aut si ualendo corpus infirmat. hoc enim modo deiectionis nihil pericu-
li minatur, quod cibo munitis non intempestiue medicamentū corporibus offera-
tur. Vomitiones concitant subditæ ex eo balani, cum aceto.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, ἐλεβοῖον ἁλὼν. Latine, Elleborus albus. Officinis Latinum nomen seruat.
Germanis Weisniefswurz, Weisniefkraut. Gallis duuiraire, ueratrum dicitur.
Elleborus olim terribilis fuit: postea tam promiscuus, ut plerique studiorum gratia sumpserint: albus au-
tem multo terribilis nigro. Radicula graciles, breues, & uelut decuritate ex ceposo uelut capite proceden-
tes in usum sole ueniunt Dioscor. nec hæc totæ, sed harum cortex deligendus, carnosus, speciosus, medullasam
intus partem, que eximenda est, habens tenuem, gustu acer & feruidus, spheris tumulis & locis siccis, qualis
Anticyra est, natus, in frangendo puluerem emittens Plin. Semen tamen à quibusdam purgationibus adhibe-
tur: summa quoque radix, que uelut cepe canibus datur purgationis causa. Mesibus albi radices leguntur Dio-
scor. & Plin. Albus amarior est, & minus acer nigro Gal. Albus eligendus gustu feruens, non tamen uehe-
menter, sed saluam particulatim, non simul mouens, mediocriter exentus, candidus, fragilis, carnosus, non acu-
minatus aut iuueus, nec dum frangitur, puluerulentus, medullam internam habens exilem, qualis Cyrenai-
cus. Improbatur Galaceus, Cappadocius, Italicus, albius & magis puluerulentus. Pauli tempore utebantur elle-
borismo per album, & nunc quoque: si enim bonus est, ueneuosus non fuerit. Quin ellebori nomine apud Hip-
poc. & Gal. albus uenit, ut à ph. lib. 5. Apud Arabes contra Ellebori nigri cum alijs melle usum non est diffi-
nitus. Sepe magno successu in melancholia morbo usus est Iac. Syl. hac tempestate doctiss. medicus Syropo sa-
poris, largo satis elleboro nigro incocto, & loh. Mamaridus non difficilem eius usum expertus est, & dra-
chmam integram solam potam parum profecisse. Paulus infundit aquæ dies quinque, uincit duas: ergo multus sa-
tis manna, uel melli, uel alij incoquatur. Si in radicem raphani immutatur albus elleborus, ellebori nomen
simplicior est Paulo.

Veratrum nigrum.

Caput CXXXIII.

B

Veratrum nigrum.

Christwurz.



Elleborum nigrū
appellatur mela-
podion, quoniā capra-
rum pastor, nomine Me-
lampus, furtes in Præ-
tidas, primus purgasse,
& sanasse fertur. folia ei
uiridia, platani similia,
minora, folijs sphondy-
lij proxima, subaspera,
nigriora, pluribus diui-
suris incisa: caulis asper:
flores purpurei, candi-
di, racematim coheren-
tes: semen enici, quod
in Anticyra sesamoides
uocant, quo deiectiones
moliuntur. radicibus co-
hæret nigris, tenuibus,
à capitulo cepæ simili
confibratis, quarum est
usus. in collibus, aspe-
ris, & sitientibus locis enascitur. Optimum est quod ex huius-
modi petitur terris, ut ex Anticyra. Nigrum inibi probatissi-
mum gignitur. Eligi debet corpulentum & plenum, in quo te-
nui sit medulla, acce gustu, feruensque. cuiusmodi est in Heli-
cone, Parnaso, & Aetolia natum, attamen Heliconium præcellit. Veratrum nigrum

h 3

A purgat uentrem, detrahit bilem pituitasq; datum per se, aut cum scammonia, & tribus obolis, siue drachma salis. decoquitur cum lente & iusculis, quæ purgationis causa sumptantur. prodest morbis comitialibus, melancholicis, infanientibus, articularijs doloribus, & resolutis. menses inditum trahit. partus necat. purgat fistulas impositum, & tertia die detractum. item contra gravitatem auditus in aurem demittitur, ibiq; in alterum aut etiam tertium diem esse finitur. scabiem sanat, illitum cum thure, aut cera, & pice, & cedrino oleo. uiriliginibus, lepris, impetiginibus, ex aceto medetur. dentium dolorem collutione mitigat. erodentibus medicamentis commiscetur. hydropicorum uentri utilissimè imponitur factum ex eo, farina hordeacea, & uino, cataplasma confitum proximè radices uitium, uinū purgandi facultate donat. Huius resparsum domos expiari arbitrantur: quare inter fodiendum stantes, Apollinem, Aesculapiumq; precantur, ac uitant aquilæ uolatus: aduolare enim non sine periculo tradunt. namq; si auis effossionem hellebori conspexerit, moriturum qui succidit, augurium est. Celeriter effodiatur oportet, quoniā halitu caput aggrauat, quapropter, ad id arcendum, fossuri allium præsumere, & uinum bibere cōsueuerunt. nulli ita noxæ opportuni redduntur. Veratri albi modo emedullatur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, ἐλέβορ νίλος. Latine, Veratrum nigrum. Officinis elleborus niger, Germanis Schwarz Nieswurz, Elleborus niger coquitur cum lente, aut iure aliquo Diosc. albus autem datur per se, & cum sesamo, aut thapsie succo, aut alicæ, aut mulla, aut pulce, aut lenticula, aut sorbitione alia. Nigrum cum scammonio & sale dat idem. Album debilibus cum succo ptisanæ, aut alicæ, aut alio simili Paulus. Niger pituitam & bilem infernè purgat, Diosc. bilem maximam flauam, Pau. Albus autem uomitus purgat res uarij coloris, Diosc. Rem uisum terribilè in uarijs coloribus uomitionem. Pli. Elleborus bonus ad exanthemata, impetignes, lepras, herpesas, erysipelata, icterum, Pau. Albus oculorū collirijs contra caligines imponitur, Diosc. Oculorum caliginem fortitudiscutit, Pli. Niger auri inditur, & post biduum aut triduum eximitur in difficili auditu. Nigri obolos tres, aut drachmam unam dat Diosc. adiecto etiam scammonio. Manardus quoq; drachmam unam dedit, & granis duobus scammonij in malo cydonio asis, minusq; & leuius purgant quàm in ista dosi pilularum, quas aggregatius uocat. Albi Themison dabat drach. duas, sequentes quattuor, antiquorum uitium cognoscentes, qui ob metum parcius dabant, cum celerius erumpat, quo largius sumitur. Vetant tamen dari senibus & pueris, & mollibus, ac foemineis corporibus. Paulus dat à drach. una ad drach. duas, debilioribus in succo alicæ, aut ptisanæ, fortioribus in aqua calida aut melicrato: sectiua tamen non in puluerem tritum, ut antè monuimus. Albo non est usus Manardus, ex illis tamen robustos ferre posse putat: non dandum tamen nisi in diuturnis & ualentibus morbis, per alia remedia non sanatis, ut hydropi, cachexia, elephantos, paralyti, epilepsia, podagra, morbo Gallico, qui pessimus & longissimus esse consueuit, & auxilia communia uel contemnere.

Aliam herbā, ab aliquibus hætenus pro ueratromi gro habitā, Germa. Christwurz, quod circa natale Domini flores edere soleat, Brabantis Kerstcruyt, siue Viercruyt, uocatam, uerisimile est. Consilignè esse Ruellij, cuius & Plinius meminit.

Sesamoides magnū, Ca. CXXXV.

Sesamoides magnum, in Anticyra helleborem uocant, quoniam albo ueratromi in purgationibus misceatur. simile est senecioni aut ruta: longo folio: flore candido: radice gracili, ignaua: semē gustu amaro, cætera sesamæ simile. Ventri detrahit. datur tritum ad bilis pituitæq; deiectiones,

B



lectiones, quantum tribus digitis capitur, addito ueratri albi sesquibolo, ex aqua A
mulla. Sesamoidi paruo cauliculi sunt dodrantes: folia coronopi, minora, hiri-
tiora: & in cauliculorum cacumine capitula, florum penè purpureorum, medio eo-
rum albo: semen sesamæ, fuluum, amarum: radix tenuis. Detrahit bilē pituitasq;
semen ex aqua mulla potum dimidio acetabulo. illitum ex aqua, tumores ac tuber-
cula discutit. Nascitur in asperis.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Sesamoidem quidam eleborum nigrum ob similitudinem appellant. huius speciem esse eam herbam, cuius pi-
turam damus, multi haud meriti uiri arbitrantur, quamuis eius delineationi ad omnia non respondere ui-
deatur, uiribus autem parum differat: nigro ueratro omnino similis planta est, nisi quia caulem obtinet cras-
siorem, foliaq; minora. Florem etiam etsi herbaceum habet, tamen è medio eius, folliculi aut siliquæ duæ, aut
tres, in quibus semen est, exeunt: floret uere & initio æstatis, in montibus, asperis, lapidosis ac sublimibus nas-
cens. Calidus atq; siccus ordine tertio, quod pediculos enecat, Germani Leusstrant uocant, purgat inferio-
rem uentrem uelementer, pituitam & flauam bilem ducens.

Syluestris cucumer.

Caput CXXXVI.



Cucumis sylvestris fructu solo distat à sa-
ctiuo cucumere, quem longè minorē pa-
rit, oblongis glandibus non dissimilem. folia
atq; sarmenta satui refert: radice cā dīda, ma-
gna, nascitur in sabuletis, & ruderibus, fruti-
ce in totum amaro. In stillatus foliorū succus,
aurium dolori cōuenit. Illita ex posita radix,
ueterem omnem tumorem discutit. imposita
cum resina terebinthina, tubercula rumpit.
ischiadici infunditur. podagras discutit, de-
cocta ex aceto, & illita eius decocto dentes in
dolore colluuntur. arida farina impetiginē,
lepras & uirilignes absterget. nigris cicatrici-
bus colorem reddit, & in facie maculas expur-
gat. Radicis succus sesquiboli pondere, &
item cortex, acetabuli quarta parte, bilem pi-
tuitamq; deiciunt, præsertim in hydropicis.
deiectiones autem citra stomachi iniuriā mo-
uet. radicis selibra, in uini præsertim Libycl
hemina conteritur, danturq; ex eo terni cya-
thi triduo, dum tumor abundè deprimi cerna-
tur. E fructu huiusce cucumeris, fit medicamē-
tum quod Elaterium uocatur, ad hunc mo-
dum: Decerpti cucumeres, qui tacti protinus

exiliunt, seruantur nocte una: postridie imposito supra craterem rariore cribro, u-
triusq; manibus prehensi, sigillatim supino cultro, sursum uersus aciem habente, sin-
duntur: atq; per cribrum humor in subiectum uas exprimitur: simulq; carnosum
quod hæsit cribro, quò facilius excidat, eliditur. quod ita pressum est, residere fini-
tur, atq; in uicinam peluim demittitur. coaceruata autem in cribro segmina, dulci a-
qua perfunduntur, & denuò pressa abijciuntur. humor in pelui agitatur, & linteò
opertus, soli exponitur, dumq; steterit, tota supernatans aqua cum humore conct e-
ro, effunditur. hoc uerò identidem fieri solet, donec existens aqua liquecat: qua stil-
latim exhausta, sedimentū mortario suscipitur, & conterendo cogitur in pastillos.
Sunt qui ad hauriendā protinus succi abundantiam, cribratos cineres humi inspar-
gant, & medium cauantes, triplicatum linteum obrendāt, per quod elaterium cum
sua humilitate diffundit, siccatumq; in pila, ut dictum est, cōterunt. Aliqui pro dul-
ciaqua marinam perfundentes, ita eluunt. Alij in nouissima lotionem mullam aquā
respergūt. Elaterium optimum esse constat, leue, nō ponderosum, cum cādore leni-
ter humectum, gustu amarissimum, quodq; lucernarum luminibus obiectum, facillè
flagret. Porraceum tamen scabrumq; si turbidum spectetur, atq; erui cinerisq;

A plenum * sit, graue & uitiosum esse solet. Nec desunt qui cucumis succo amyllum im-
 * Alij colore misceant, ut candorem ipsum & leuitatem imitentur. A bimatu ad decennium deie-
 medium. ctionibus utile est. Integer modus, obolus est: minimus, semiobolus: pueris, chal-
 ci duo: siquidem copiosius, periculum adfert. Bilem ac pituitam utrauis parte ex-
 trahit. optima suspensio est purgatio, quod si in animo sit deiectionem moliri, adie-
 cto salis duplo, & sibi quod colorare sufficiat, ex aqua, erui magnitudine catapo-
 tia dato, postea cyathus unus aquæ tepidæ sorbeat. ad citandas tamen uomitio-
 nes aqua diluens elaterium, subiectas linguæ partes penitissimè pinna oblinito.
 quod si quisquam difficiliter euomat, oleo aut unguento irino resoluito, somnum in-
 hibeto. porro his qui eximie uacuantur, continuè uinum & oleum dari conuenit,
 etenim uomendo restituuntur. quod si uomitiones non finiantur, aqua frigida, po-
 lenta, posca, poma, & quæ stomachum densando corroborant, offerenda sunt. Ciet
 elaterium menses, partus enecat, in pello subditum morbo regio medetur, cum la-
 cte naribus infusum, diuturnis capitis doloribus liberat, efficacissimè anginis illi-
 nitur, cum uetere oleo, melle, aut felle taurino.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, *Zivus* & *zōi*. Latine, *Cucumis sylvestris*. Officinis *aspinus*, *anguinus*, *erraticus*.
 Germanus, *Wild springend Kürbelen* / *Hunds Kürbelen*. Brabantis, *Wild Concommeren*.
 Gallis *cocombre sauvage* appellantur.

Germaniæ peregrina herba, ex Italia ad nos translata, hodie passim in hortis seritur. Elaterium succus ex
 huius fructu quomodo trahatur, Dioscor. docet, amarus extreme Galen. Paulus dicit uacuare ut scammonium
 tribus obolis, tritum cum lactis cotyla. A trimatu incipere, & nullum ex medicamentis longiore aëno durare,
 & quo uetustius eò melius, scribit Plinius, & ducentis annis seruatum testatur Theophrastus.

Staphis agria.

Caput CXXXVII.

Staphis agria.

Leusfiant / Rodel.

B



Staphis agria, siue herba pedicularis, folia habet labruscæ, diuisa: & cauliculos
 rectos, molles nigrosq; fert florem glasti: & folliculos uirides, similes ciceri, &
 in his nucleum triangulum, scabrum, ex nigro subfuluescentem, intus album, gustu
 acrem.

acrem Grana quinddecim*, si trita in aqua mulsam dentur, crassum humorem per uo-
mitum purgant, sed qui hauserunt, ambulare debent, prudenter tamen attendere o-
portet, & aquam mulsam continuo potui dare: quoniam pericula strangulationis
inferunt, & fauces adurunt. Trita, & ex oleo illita, phthiriali prodest: item prurigi-
ni & psoris, cit plurimam pituitam commanducata, cocta in aceto, dentium dolori,
colluto ore, subuenit. rheumatismum gingiuarum sistit: ulcera oris manantia, cum
melle sanat. urentibus malagmatis imponitur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Grecis σαπής ἀγρία. Latinis Staphis agria. Officinis corrupte, staphis agria & pituitaria.
Germanis Staphis Edmer / Leusfraut / Leusffamen. Gallis de l' estaphis agrie, herbe aux poules.
Plinius staphin agriam, uel staphin uiam Taminiam ab aliquibus, ut Celso, uocari falsò existimat, suum
enim genus habet cauliculus nigris rectis, folijs labruscæ, fert folliculos uerius quam acinos, uirides similes ci-
ceri, in ijs nucleum triangulum. Maturescit cum uindemia, nigrescitq; cum Tamneæ rubentes nouerit. Plin-
ius acinos: scinerrit illum in apricis nasci, hanc non nisi opaco.

Staphis agria semine est uehementer acri & urtice, quod mansum pituitam in os ex capite plurimam de-
trahit, & illud ex oleo capiti puerorum pediculos enecat: unde pedicularis quoq; herba dicitur.

Est et alia herba, Germanis Leusfraut / sue Rodel, uocata, humidis pratis nascentis, floribus puniceis,
instita urtica mortua, quam uocant, semine rotundo, folijs incisjs, gerano quasi similibus. Alterum illius genus
est, floribus citrinis, folijs tamen non usq; adeo incisjs.

Thapsia. Caput CXXXVIII.



Thapsia nomen ideo accepit, quòd
in Thapso, eiusdem nominis insu-
la, primum inuenta sit. tota uero natura
ferula similis est: graciliore caule: fo-
lijs sceniculi: umbella anethi in cacu-
mine, à singulis furculis erumpente. flo-
re luteo, semen quale ferula: latum, sed
aliquanto minus. radix foris nigra, in-
tus candida, longa, acris, crassiore libro
uestita. Lactis extrahendi ratio hæc est:

Facto in ambitu scrobe, cortices inciduntur: aut radix in fornici speciem in se ex-
cauata cooperitur, quòd merus succus confluat, oportet illuc sequenti die se conferre,
& congestum succum extrahere. Tunditur etiam radix in pila, & succus organo per
quallum expressus fictili crasso insolatur. Aliqui folium unà terunt: sed inualidior
huiusmodi succus. Hoc autem inter est, quoniam qui ab radice manauit, grauius
oler, & humidus permanet: è folijs autem extractus exiccatur, atq; teredinum iniu-
riam sentit. Qui succum colligit, stare debet non obuersus uento: aut potius, cum
dies apricus est, & à statu silet: quoniam ob halitus acrimoniam facies uehementer
intumesceat, nudaq; corpora inuadunt pustula: ob id prius liquido cerato & adstrin-
gente, nudas partes illinunt, & ita muniti accedunt. Tam cortex radicis, quam suc-
cus, purgandi uim habent. lacteus succus in aqua mulsam potus, utrinq; bilem extra-
hit. Radicis modus, quaterni oboli, cum tribus feminis anethi drachmis: succi, ter-
ni oboli: lactis obolus unus, quod eo amplius assumitur, periculosum est. Huiusmodi
di purgatio conuenit suppuriosis, & diuturnis laterum doloribus, reititionibusq; da-
tur in cibis aut obsonio, quibus difficile sit uomere. Tam radix quam succus omnium
maximè, quæ pares cum eis uires adepta sunt, uim habent extractoriam ex alijs, ubi
ex imo aliquid euocanda est, aut meatuum laxitas aliò transferenda est. unde suc-
cus illitione, aut radix recens affricu, alopecias explent. Radix succusq; cum aquis
ceræ thurisq; portionibus, sugillata liuoresq; tollunt. sed non plus binis horis di-
mittantur: locus deinde aqua maris calida foueatur. Vitia cutis in facie emendat
cum melle illitus succus, lepras tollit tubercula discutit, perunctus cum sulphure in
diuturnis pulmonum, laterum, pedum, articularumq; uoletudinibus utiliter illini-
tur ualeat ad integendam colic glande, ijs qui natura, non circumcisione, curri sunt,
tumorem enim excitat, qui pinguium fortè emollitus, præputij iacturam refecit.

NOMINA

NOMINA ET EXPLICATIO:

A Radix quam Officina prothapsia uendunt, cuius picturam exhibemus, thapsia esse ab effectu demonstratur, nam in puluerem redacta soluit, & praesertim corticis pulvis, ut Dioscorides inquit: in Thapso eiusdem nominis insula primum inuenta est: nascitur & in Apennini Alpibus, ubi uulgo Craffegnana dicitur. Errant qui ex folijs succum seruare, quoniam, ut inquit Dioscorides, nullus momenti est.

Spartium.

Caput CXXXIX.

Genistella.

Genista.

**B**

Spartion frutex est longus, ferens uirgas, sine folijs, firmas, fractu contumaces, quibus uites uinciuntur. Semen lenticulae, in folliculis phasiolorum modo nascens: florem, ut albae uiolae, luteum. Purgant per superna uehementer, hellebori uice, citra periculum flores & semina. quinisobolis in aqua mulsa pota. Semen deiectionem mouet. Ramis in aqua maceratis, mox tufis, extractus succus, ischiadicis & angina laborantibus auxiliatur, si cyathi modum ieiuni bibant. Quidam marina aqua macerare malunt, & infundere ischiadicis clystere. Strigmenta autem elicit cruenta.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Graece, Σπάρτιον.

Latine, spartion uel Spartos.

Officinis Genista nomine saltem cognita, ut Germanis & Gallis, qui haec tria genera, quorum picturam damus, confundunt, pfrummen / Ginst / oder Genist, appellant. Brabantis Drem.

Sparti uerò quo uites ligantur, cuius hoc loco Dioscorides meminit, uirgas longas profert, sine folijs, validas, difficultes fragiles, quibus uites ligant. Siliquis phascolorum modo fert, & in ijs seminibus lentis formam habentia, florem luteum ueluti Leucoium, semen & flores cum aqua mulsa si bibuntur pondus obolorum quinq; per superna purgant, ut Elleborus albus, sine periculo. Semen autem per inferna purgat. Virgae uerò ischiadicis prosunt: easdem uires Galenus quoq; tribuit genistae, unde perspicuum omnibus sit. Sparto & genistae, non obstante quòd forma nonnihil distent, eandem inesse facultatem. Genistella uerò quam Germanice Stechend ginst / Erpfrummen / & Aleyr Streichblumen appellamus, astringentem cum amaritudine facultatem possidet, ac proinde ualenter simulq; citra mordacitatem exiccantem.

Silybum.

Caput CXL.

Silybon lata spina est, folia ferens Chamaleonis albi. Haec recens cum sale oleoq; cocta estur. Radicis succus drachmae pondere potus, uomitiones ciet.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Silybon nisi ea spina fuerit, quam supra Chamaleontem nigram appellauimus, Germanis Eberwurz dicta, quod tamen uerisimile non uidetur, cum, ut Plinius tradit, in medicina usum nullum habeat, hodie peregrina ac incognita est.

Glans unguentaria.

Caput CXLI.

Glans unguentaria, fructus est arboris myricae similis, magnitudine auellanae nucis, cuius nucleus graecarum nucum more tritus, humorem reddit, quo ad preciosa

preciosa unguenta pro oleo utitur. nascitur in Aethiopia, Aegypto, Arabia, & Petra oppido secus Iudæam. Præfertur plena, recens, cãdida, quæ faciliè delibretur. Ea drachmæ pòdere pota, lienem absument. cum lolij farina & aqua multa, podagricis illinitur. pforas leprasq; decocta in aceto, uutiligines & nigras cicatrices cum nitro, emendat. & cum lotio lentigines, uaros & papulas in facie, & cutis uitia tollit. uomitiones mouet. alui cum hydromelite resoluit. stomacho aduersatur. Olei quod ea exprimitur, aluum potu ciet. Cortex eius magis adstringit, uerum tusa & expressa succus abstergentibus medicamentis adiicitur, quæ aduersus pruriginis & scabritias idonea sunt.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Βάλανος & μυρεψικός, id est, glans unguentaria, Myrabolanus quoq; Plinio dicta, ex Barbarica regione allata, ben Arabibus dicta, hodie frequens, stomacho aduersatur, cum hydromelite pota carnis huius drachma una est uomitoria: cum oxycrato autem tecur & lienem purgat, cum doxicrato item (quo maxime gaudet ad agendum) lepras, pforas, lentes, uutiligines, prurium exierget, lienem & hepatis indurato illinitur cum farina aliqua siccante, ut erui, lolij, lienem etiam prodesse scribit Gal. in theriaca ad Pisonem. Carnis huius succo scultate calido utuntur aromatarij: id enim in odorum cum sit, omnibus suscipiendis odoribus est apusissimum, ut insipidum saporibus, & coloris expers coloribus. Id oleum Balaninum Dioscoridi dicitur, ut supra suo loco ostendimus. Oleo expresso quod reliquum est magna, terream, & amarum, incidit, terget, contrahit, stipat, ad prædicta etiam efficax, sed minus, id autem uidetur esse μυρεψικός & νίσσα, id est, expressum, quod cataplasmatibus miscet Galen. lib. 11. & lib. 13. Meth. & bis lib. 9. comp. phar. part. Spleneticis remedijs, & ad circrhosos lienis affectus adhiberi scribit Gal. Quo in loco μυρεψικός tantum, aliquando μυρεψικός & σαρκός, aliquando Βάλανος & μυρεψικός leges, aliquando μυρεψικός & αλός, id est, farina & puluis, & μυρεψικός & λεπτόχονα, id est, putamen & cortex, & μυρεψικός & λεπτόχονα & κενός, id est, σισομένα, id est, myrabolani testa & cortices incisi & tusi cribratiq;.

Omnia hæc ad splenicos scribuntur, ut sit credibile maxime de fructu eodem, scilicet Balano myrepsica, & eius partibus, omnia hæc intelligi.

Quam uero myrabolanum Arabicam intelligat Dioscorides, cui similem facit fructum palme Aegyptiz, de qua nunc dicam, planè ignoro.

Nam Arabum recentiorum Myrabolani quinque generibus distinctæ ueteribus indistincte putantur, & prunorum generi potius, quam Balanorum, id est, glandium, assignande sunt. Sunt uero hæc.

Citrini: Luteæ.

Nigra & Inda.



Empellica, Emblici.

Kebuli.



Belectzica: Bellirica.



Lutea seu citrina refrigerant cholagoga.
Inda & nigra, melancholiam purgat & exhilarat.
Cepula phlegmagoga, uisum illustrat, coctionem iuuat, pectus purgat, hydropicis confert.

Empellica (quæ Actuario ἀμπελίσκα & ἐμβέλι, quoq; dicta uidetur) etiam phlegmagoga, uentriculum purgat & roborat, appetentiam reuocat, uomitum sistit.

Belectzica empyos iuuat, hemorrhoides & capilli defluuium. De his plura leges in Arabibus.

Narcissus.

A



B



Verus Narcissus.
Narcissen rôflin.

Narcissum

Narcissum sunt quatuor lilium, liliū appellarint. folia po, ro similia, tenuia, mul-
to minora, & angustiora: caulis uacuus, & sine folijs, supra dodrantem attol-
litur, flos albus, intus croceus, in quibusdam purpureus: radix intus alba, rotunda,
bulbosa: semen uelut in tunica nigrum, longum, probatissimum nascitur in monti-
bus, uani odore. ceteri porrum imitatur, atq; herbaceum uirus olent. Radix cocta,
siue estur, siue bibitur, uomitoria est. ambustis igni prodest, cum exiguo melle trita,
præcisos nervos illitu glurinat. luxatis malleolis, diuturnisq; articulorum dolori-
bus trita ex melle & imposita, subuenit. uitia cutis in facie, utiliginesq; cum semi-
ne urtica & aceto emaculat. cum eruo & melle, ulcerum sordes expurgat. abscessus
rumpit concoctioni repugnantes infixa corpori extrahit, illita cum loli farina &
melle.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Dioscorides hoc loco, ut Plin lib. 21. cap. 5. & 10. Narcissi duo genera facit, licet à Theophrasto & A-
pulcio non nisi unum genus constituantur: nisi ex floribus dux sitate duplex eius genus facere uoluerint. Est au-
tem Narcissus plantæ congener aut silem similis illo, quare quidam ipsum non minus quam lilium, lilion
uocant, ut tradit Dioscor. Sunt qui hermodactylum esse uelint Narcissum, quorum opinio nos non subscri-
bimus, cum sciamus uulgarem hermodactylum esse hermodactylum, qui & colchicon dicitur: de quo supra e-
genus.

Non tamen omnino negamus, ex hermodactylorum genere esse posse narcissum, cum & ipsum plura ge-
nera hodie referantur, ut supra depicta uides.

Ceterum dictus est Narcissus, a uoce Plinio, non à fabuloso pæro, ut fingunt poëta, sed à narce, quod
torpor est, quoniam dolores & corporis capitis grauitates facit: idemq; testatur Symplicij lib. 2. Plutar-
chus, dicens: Et Narcissum appellauerunt quasi nervos hebetantem, & torpides facientem grauitates: qua-
propter & Sophocles ipsum autopsia uagorum ducunt, id est, subterraneorum coronamentum uocauit.
Veram Narcissum præter omnes, Hieron. Tragus exhibet, Dioscoridis descriptioni potissimum similem.
Germanis 17. Narcissus uelut uocatur.

Hippophaës. Caput CXLIII.

Hippophaës, quo fullones uestes interpolant, in sabuleosis maritimisq; nascitur,
surculaceo frutice, undiq; denso & largo. folijs oleæ, longioribus, molliori-
busq; inter quæ candicantes spinæ emicant, licæ, angulosæ, interstino quodā di-
stantes. flores hederae corymbis similes, racematim coherent, minusculi tamen, &
molles, candidi, ex parte rubescetes. radix lacteo succo madet, crassa, mollis, ama-
ra gustanti, ex qua, perinde ac thapsia, succus eximitur, qui per se, & cum erui farina
subactus, siccatur, & ad usum reconditur. Syncerus pituitas, bilem, aquasq; detra-
hit, oboli pondere: erui uerò farina subactus, quatuor obolis, cum aqua multa di-
midia hemina tritus datur. Radice & herbaliquamentū depromitur, uti in thapsia
huius in purgationibus modus est drachma.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Hippophaës, aut Hippophyce, Lappago, Græcis ἵπποφαῖς: quidam Plinio asperuginem dictam pu-
tant. Theophrastus etiam ex tithymallo hippophaës optimum apud Tegeæ confici scribit. Debent accom-
modate esse equorum nature, neq; ex alijs causis nomen accepisse: quippe quædam animalium remedijs na-
scuntur locupletati diuinitate ad gerenda præsidia: Quæ hodie sit, ignoratur.

Hippophæstum. Caput CXLIII.

Hippophæstum, id quod aliqui hippophaës appellant, nascitur eisdem locis qui-
bus Hippophaës, estq; spinæ fulloniæ genus, humilis herba, sine cauliculo, si-
ne flore: inanibus tantum capitulis: folijs paruis, spinosis: radículas habens mol-
les, crassas. Succus radice, folijs & capitulo exprimitur, & exiccatur. Datus, cui uo-
les, tribus obolis, in aqua multa, aquam pituitasq; detrahit. priuatim comitialibus
morbis, neruorum uitijs, & orthopnææ conuenit huiusmodi purgatio.

Et hec hodie peregrina & exoleta.

A



B

Ricinus. Caput CXLV.

Cici, aut croton, nomen accepit à ricini animalis similitudine. arbor prouenit parua: ficus altitudine, folio platani, maiore, lauiore, & nigriore: ramis, caudicibusq; cauis, in arundinis morem: semine in uuis asperis, quod corticibus exutum, Ricinum animal representat: ex quo oleum, nomine cicinum, exprimitur, cibis foedum, lucernis emplastrisq; utile. Grana triginta numero purgata, trita potu, pituitas, bilem, aqua que per aluum extrahunt. uomitiones mouent. sed in iucunda admodum est, & molesta purgatio: siquidem stomachum uehementer subuertit. Tusa & imposita, uitia cutis in facie, uarosq; expurgat. Folia cum polenta trita, inflammationes oculorum, tumoresq; leniunt, rigentes mammas cohibet. eadem ex atero illita, ignes sacros restinguunt.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Κρότον.

Latine, Ricinus, Cici.

Officinis Kerua, manus Christi, palma Christi, Catapuita maior.

Germanis Wunderbaum/ Kreuzbaum/ Seckentäner.

Brabantis Tollencruyt.

Gallis palma Christi appellatur.

Itali uocant, Mirasole, & Girasole.

Ricinum à similitudine animalis foedi (uulgo ein Seck) cum semine fruticis huius, appellane Ricinos.

Nusquam non scribitur: apud nos in hortis ad arcendum effodiatum talparum, ut uolunt, iniuriam, instar arboris parue proficit, folia platani, maiore, uel uiti, ramis caudicibusq; cauis, & in arundinis modum fistulosis, semine in uuis asperis, quod corticibus exutum: Ricinum animalis effigiem representat tam proximè, ut si uita adesset, plantæ Ricinus uideretur. De Ricino oleo lib. primo egimus.

Tithymali. Cap. CXLVI.

Tithymalli genera septem, quorum masculus characias appellatur, ab aliquibus amygdaloides: alter, myrtites, qui semina existimatur, eumq; myrsinita aut caryita uocant: tertius, paralius, quem tithymalida appellant: alius, helioscopius: quintus, cyparissias: sextus, dendroides: septimus, platyphyllos dicitur. Characia caules supra cubiti altitudinem attolluntur, rubri, lacteo succo atq; acrimadentes. folijs oleæ circum ramos, angustioribus, & longioribus, radice crassa, lignosa, pendet in cacuminibus caulium, coma iunci, sub qua caueola foliolis balnearum similes, in quibus semen continetur. nascitur in asperis & montibus. Succus aluum purgat. trahit pituitam bilemq; binis obolis in posca sumptis. & cū aqua multa, uomitiones mouet. Appetente uindemiarum tempore, succus congestis ramulis, mox dissectis, & uase conclusis, excipitur. Aliqui adiciunt farinam erui, & in pastillos digerunt, qui erui magnitudinem impleant. Alij in aridas ficos, ternas quaternasue guttas instillant, ut cum his inarescant: quas ad usus recondunt. Per se etiam tufus in pila, & in pastillos coactus reponitur. Porro cū extrahitur lac, neq; quouentus aspiret, stare quenquam, neq; manus oculis admouere conuenit: sed antequam colligas, corpus, præsertim faciem, collum, scrotumq; genitalis, adipe aut oleo cum uino perungere. Fauces autem exasperat. quapropter cataportia cera aut decocto melle oblini par est, & hoc modo dari. binas tamen ternasue ficos, purgationis gratia sumpsisse, satis est. Recens lac ex oleo, perunctis in sole capillos euellit, renascentesq; flauos & exiles efficit. deniq; omnes perimit. Dentium cauernis inclusum, leuat dolores. sed cera dentes oblinendi, ne suo delapsu, fauces & linguam uitiet: tollit illius impetigines, formicantes uerrucas, penhiles, & quæ thymali

flore

Platophyllos.

Dendroides.

A



Cyparissias.



Helioscopius.



florē representant. ualet aduersus pterygia, carbunculos, phagedanas ulcerum, gangrenas, fistulasq. Legitur semen autumnō, & siccātum sole leuiter tunditur, terrā factumq. loco munda reponitur. Folia item siccantur. Semen & folia lactes

A

Radix uonica.



Sitz Wolffsmilch.



Wald Wolffsmilch.



bus. frutex totus cum radice lacteo succo turgēt. Similes ad usus reconditur. Helioscopius dicitur, folijs portulacæ, tenuioribus, rotundioribusq; ramulis prodeuntibus à radice, quatuor aut quinque, rubentibus, dodranali altitudine, tenuibus, lactia copiosi plenis: capite anethi, semine uelut in capitulis incluso. Helioscopij nomen accepit, quoniam comas cum sole circumagat, circa oppida nascitur, potissimum in ruderibus. Colligitur succus seminq; ut aliorum. Eadem quæ superioribus uires, non tamen usq; adeo ualida. Cyprisias in caulem exit dodrantalem, uel maiorem, subrubrum: ex quo folia piceæ similitudine exoriuntur, molliora tamen, & tenuiora. & in totum nascentem piceam æmulatur, unde nomen traxit. candido succo madet, cui eadem uis quæ superioribus. In petris nascens, dendroides cognominatur. ampliter opacat. in cacumine frondosam spargens comam, succo lacteo prægnans, cauliculis rubentibus, folijs myrti tenuioris: fructu characiæ. Eiusdem effectus, cuius superiores, similisq; modo reconditur. Platyphyllos, uerbasco similis est. Radix, succus, & folia, per inferna trahunt aquas. Pisces necat, tufus & aqua in partibus. Reliqua rithymalorum genera quæ supra scribuntur, idem efficiunt.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Septem statuuntur Dioscoride & alijs ueteribus testibus, Rithymalorum genera. Prima Characiæ, hoc est, uallaris. ut dicitur quod uallis ex sepiis muniendis apta sit, à uallo, quod Græcis χερσας dicitur: quæ sepium iungendarum identitas causa fuit, ut baltheum etiam, id est, cinctura sit dictum: forte ea quæ Cermani uocant Bärenmilch. Secundus myrtites, quasi myrtacea, à foliorum myrti figura. Sicut à nucibus quibus

fucci effectum præbent, di-
midio acetabulo pota sunt
qui in ueterat, admisto cum
lacte lepidio, & caseo con-
tuso. Radix drachmæ pon-
dere in hydromelite pota,
per inferna trahit, decocta
cum aceto, dentium dolori
auxiliatur, colluto ore. Fœ-
mina, quam mirsyniten, aut
caryiten uocant, similis
suapte natura daphnoidi:
folijs myrti, sed maioribus,
firmis, in cacumine acutis,
& pungentibus: ramulos
ab radice mittit dodrantales.
fructum fert alternis an-
nis, nuci similem, mordaci
gusto. nascitur in asperis.
Succus, radix, semen, folia,
consimilem antedictis forti-
untur facultatem. sed ad ci-
tandas uomitiones inuali-
dior hæc est. Aliud rithyma-
li genus dicitur paralios,
quem rithymalida, aut me-
conali qui appellauere, na-
scitur in maritimis, ramis
subrubentibus, palmum al-
tis, quinque semitæ à radice
excurrentibus: folijs lini, angu-
stis, paruis, oblongis, in uer-
sus quosdam digestis: capi-
te in cacumine orbiculato
in quo semen et eruum, ua-
rio colore emicat. Flos al-

quibus similem fert fructum caryites & myrsites. Hunc fructum sunt qui nucem uomilem, Germanis Kraen Auglin uocatum esse putant. Tertius paralius, id est, maritimus dicitur, eo quod maritimis nascitur locis. Quartus Helioscopius, id est, solis equus appellatus est tithymallus, eo quod coma eius ad solis cursum circum agatur. hic Germanis quibusdam dicitur Sonnenwendende Wolffsmilch. Quintus Cyparissius nuncupatus est, a foliorum cupressi similitudine. Germani imitatione Latina Cypressene Wolffsmilch appellat. Sexta dendritis siue dendroides, id est, arborefcens, a ramorum copia, & quod sepe arborefcit, Germanis Die grofse Wolffsmilch dicitur. Septimus platophyllus, id est, latifolius, a foliorum latitudine nominatur. Zasyt bletterete Wolffsmilch.

Turbiti Officinarum.



Ex Tithymallorum generibus tria tantum depicta damus, proferens forte alij longè plurimum: cisi Dioscorides pluris species descripserit nobis incognitas, habemus tamen nos uicissim alias multas, quas ipse non descripsisse uidetur.

Turbiti Mesue quibusdam uidetur secunda species tithymalli. Laudant Arabes eius corticem album, gummosum, macuum, arundinaceum, recentem, friabilem: corrigunt zinzibere, & formati ex eo trochiscis.

Genera tithymallorum habent acrem calidamque facultatem, in est uerò & amaritas, ex quarto itaq; calfacientium sunt ordine, & ualenter desiccant.

Pityusa.

Caput CXLVII.

Pityusam specie à cyparissia differre constat, & si tithymalorum generi assignetur, caulis supra cubiti altitudinem assurgit, geniculatus: folijs piceis, acutis, exilibus: flore paruo, uelut purpureo: semine instar lenticulae, lato: radice crassa, candida, succo referta. quibusdam in locis frutex hic prægrandis inuenitur. Detrahit per aluum radix, drachmis duabus data in aqua mulla. item seminis drachma. succi cum farina subacti cochlearium in catapodio datur, modus foliorum drachma tres.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Pityusa, hoc est, pityusa hodie omnibus herbarijs Officinisq; ac recentioribus medicis incognita. fruticosa est, caule supra cubiti altitudinem assurgente, geniculato: folijs piceis, acutis exilibusq; flore paruo purpureo, semen latius forma lenticulae, radice madidam succo, quam quidam rhizotomi circulatores pro albi bellibori radicibus diuident. Scaphoni Germani appellant. Aëuarius turpention uocauit simpliciter. Pityusa bilem & pituitam per aluum detrahit, radix decocti hemina, aut seminis ligula in balanis etc.

Lathyris.



Lathyris. Caput CXLVIII.

Lathyris, quam aliqui tithymalum appellant, eamque tithymalorum numero adscribunt, caulem emittit cubiti altitudine, & digitali crassitudine, inanem. gignuntur in cacumine alae, & folia in caule oblonga, amygdalini proxima, latiora, & laxiora. quæ autem in summis ramulis exierunt, minora conspiciuntur, aristolochiæ, aut oblongæ hederæ figura. In cacumine fructum summis furculis gerit, triplici loculamato insignem, rotundum, eui capparin, in quo grana* intercurrentibus membranis inter se distincta continentur, eruis maiora, rotunda, quæ dum corticibus exuuntur, candida sunt, & gustu dulcia. Nullus radice usus. totus frutex lacteo succo turget, uti tithymalus. Grana sex aut septem in catapodio, aut cum ficis aut palmulis deuorata.

* Adde, tria pte
pures.

Aluum purgant: sed aqua frigida postea sorbenda. trahunt autem bilem, pituitam & aquas. Succus tithymali modo exceptus, eundem effectum præbet. Cum gallinaceo aut oleribus folia decoquantur ad eisdem effectus.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, *Αδύολε*. Latine, *Lathyris*. Officinis *Cataputia minor*.
Germanis, *Springkorn* / *Treibkorn*. Gallis *espurge* dicitur.

Sunt qui *Lathyrin* dicant *Tithymali* speciem esse, tum quod similiter illis succum habeat, tum quod eodem modo purget, uniusq; illis facultate similis sit, nisi quod semen gustantibus uideatur dulce: quod sanè etiam maximam uim purgatoriam obtinet. Calidam in tertio, & in primo humidam statuitur.

Peplus. Caput CXLIX.

Peplos frutex est lactei succi plenus, folijs paruis, ut rutæ, paulò latioribus: rotunda coma, ferè dodrantali, humi reperia: semine sub folijs rotundo, minore quam candidi papaueris, pluribus scater auxilijs: unicam radicem habet, superagcum, ex qua fruticat, nascitur inter uites, & in hortis colligitur mensesibus. siccat in umbra, & continuè uersatur. fructus tusus & feruifacius reconditur. Bilis ac pituita detrahatur, acetabulo eius in hydromelitis cyatho poto. obsonijs inspersa cocturbar aluum, muria conditur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Peplum, Officinæ *Efulam rotundam*. Germani *Runde Wollfamilch*.

Galli *Vineale reuelum* uocant.

Græcis *Πεπλός* dicitur: inter uites & in hortis inuenitur frutex lactei succi, folijs rutæ paulò latioribus, circinata coma, palmati, humi procumbente, fructu sub folijs rotundo, tribus locis discreto, in quibus semen nigrum, papaueris magnitudine continetur. Semine poto alius soluitur, ac pituita detrahatur.

Peplis. Caput CL.

Peplis, quam aliqui sylvestrem portulacam uocant, Hippocrates peplion, in maximis maximè nascitur, latè opaco frutice, candidi succi pleno: folijs satiuæ portulacæ, rotundis, infernè rubentibus: semine sub folijs rotundo, uti in peplo, feruente gustu: radice singulari, superuacua, tenui: Colligi, & reponi ac dari, uti peplos, & sale condiri solet. Eisdem habet uires.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *Πεπλός*. Latine *Peplus*, herba maritima, quæ & *peplion*, & *portulaca sylvestris*: hodie plantæ incognita, nisi ea fuerit, quam hodie Officinæ omnes *Soldanellam* appellant, ut quidam arbitrantur.

Chamæfice. Caput CLI.

Chamæfice aliqui *sycen* nominant, ramos emittit quaternum digitorum, teretes, succosos, in terram deiectiones: folia lentis, parua, peplum planè referentia, tenuia, quæ à terra non atolluntur. semine sub folijs rotundo, ut in peplo: neq; caullem, neq; florem promit. radice firmatur tenui, superuacua. Rami ex uino triti uulnè dolores sedant, in pello appositi, tollunt tumores ac uerrucas omnium generum illiti, decoctorum cibo alius resoluitur. Succus simili effectû prodest illitus contra scorpionis ictum auxiliatur, aduersus caligines oculorum utilis, & hebetudines, incipientes suffusiones, nubeculas, cicatrices, cum melle inunctus. In squallidis petrosissq; nascitur.

De hac hodie nihil certi constat.

Scammonia. Caput CLII.

Scammonia ramos ab una radice emittit trium cubitorum, multos, pingues, & qui nonnihil crassitudinis præ se ferant folijs helxina, aut hederae, nonnullioribus tamen, hirsutis, & triangulis: flore candido, rotundo, in calathi modum cauo, graueolente: radice prælonga, crassitudine cubitali, cædida, graui odore, succo grauidæ.

uida. Legitur ad hunc modum succus: Capite exempto, radix in testudinis speciem A
cultro excavaatur, quo fitur in cauum cōfluat succus, qui conchis demum excipitur.
Alij scrobes in terra concamerato sinu fodiunt, in quos, subiectis rōg. laudum fo-
lis, profundunt succum, siccatumq; extrahunt. Laudatur autem scammonium leue,
nitidum, rarum, & colore quā simillimum taurino glutini, fungosum, renuibus fi-
stulis, quale ex Myfia regione Asia deportatur. Nec attendere solum par est, si lin-
guæ tactu albescat (hoc enim euenit adulterato, quod admisso fit tithymalli lacte)
sed longè magis antea annatis. item si non uelementer linguam exurat, id quod mi-
sti tithymalli argumentum est. natione autem Syriacum & Iudaeum deterrima ha-
bentur, grauiora, densa, erui farina & tithymalo uisitata. Succus drachmæ unius aut
quaternum obolorum pondere hauritus, ex aqua pura uel mulla, per inferna bilem
& pituitam obolorum pondere hauritus, ex aqua pura uel mulla, per inferna bilem
ne, sumptis fatis est dantur efficacioris purgationis causa, succi tres oboli, cū duo-
bus ueratri nigri, & aloës drachma una. Funt purgatorii sales, drachmis uiginti
succi scammonia, in senos salicyathos adiectis: Horum modus proportionem uiri-
um: integer quidem, tria cochlearia, medius duo, minimus unus. Radix drachma
una aut altera purgat, cum ijs quæ retulimus. Nonnulli decoctum radice exhibunt.
Coquitur in aceto, & cum hordeacea farina teritur, at a plaimate ischia dicitur uilli.
Partes emecat succus, uulua in lana subditus, tubercula ducunt cum melle aut oleo
illius decocto in aceto perunctæ lepræ abiguntur. diuturni capitis dolores ex ace-
to & roiaceo perfunduntur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Scammonium quoniam ceteris prestat, quod in Colophone (que insula est ionie, Apollinis oraculo nebi-
lis) gignatur, ideo & Colophonum nominatur, itaq; eiusmodi succus, qui in quotidiano in dicant usu ad pur-
gationes præstantem & maximam uim habet, quatuor modis colligitur apud Mesum, duobus tantum ut se.
Vis bino nec antea nec postea. Medicinas omnes excutit, & stomacho (ut Galenus scribit) immensum est,
atq; eius dissolutionem facit. Recentior autem Grecia & Officina nostra, lachrymam hanc, quo minus sto-
machum offendant, in cotoneo malo decoquunt, atq; tum illam Ciscridion, quasi dicas, lachrymam uocant: B Dacrydion.
Purioris specie nitidum, & quā simillimum taurino glutini, fungosum, renuissimum fistulis, citò liquef-
cens, uis redolens, gummosum, lingue tactu lactescens, quā leuissimum, cum diluitur albescent. De his ultima
& ammonij per se. Mesus sunt grana 12. Aëto serupuli duo, uel ut inquit pro uirtutis ratione maior aut mi-
nor. Galeno & Oribasio exhibetur pondere drachmæ unius. Dioscorides quoq; integram drachmam non uo-
retur offerre: sufficere tamen ad soluendum alium dicit duos obolos. Quod si efficacius purgare, uel ut ipse
inquit, quaternum oboli, cum duobus ueratri nigri, & Aloës drachma una, si ipsum Dioscoridem sequamur,
dari possunt. Ego, inquit Manardus, licet nunquam sim ausus tantum dare, duodecim tamen grana transcon-
dere non sum ueritus, scioq; quodam serupulum integrum haurisse sine noxa.

Chamelæa. Caput CLIII.

Chamelæa surculosa fruticat, ramis dodrantalibus, folia oleæ similitudinē ha-
bent, renuiora * & amara, quæ gustata linguam mordent, & arteriam deradit. * Alij addunt
Detrahit pituitam bilem, folijs præsertim in catapota deuoratis: nat. q; dux ab-
finib; partes, adiecta chamelæa una, hydromelite excipiuntur, & in cata per a co-
guntur: ea autem in uentre non liquefunt: siquidem quotquot fuerit deuorata, re-
geruntur. Folijs cum melle tritis fordida ulcra & crustoia repurgantur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Officinis & recentioribus Herbarijs Leo terre, aut Linum syluestre, item Oluella,
Germanis Zylandi. Gallis boys gentil appellatur.
Plura uide in annotationibus nostris in caput proxime sequens.

Thymelæa. Caput CLIIII.

Thymelæa est, quæ granum gnidium, quod est semen ipsius, colligitur hoc Sy-
ri apolinum uocant, quoniam satini frutex suapte natura similitudinem * Euboeæ
referat: uirgas & diti pulchras, multas, renues, tripedaneas: folijs chamelææ angu-
i 4

A *Thymelæa.*

stioribus, & pinguioribus, uiscosis, gummosisq; si mordeantur: flore candido: fructum myrti in modum rotundo, qui inter initia uiret, & tandem rubescit: inuolucrum fructus durū, foris nigrū, intus album. Hoc per inferna bilem, pituitam, aquasq; detrahitis, si uiginti granorum pars interna bibatur: uerū fauces adurit. Itaque cum farina aut polēta, aut in uinū acino dari debet, aut melle cocto obductum deuorari. qui ægrè desudant, trito semine cum nitro & aceto, inunguntur. Folia quæ peculiariter cneorum appellantur, per messes colligi debent, & siccata in umbra recondi. Quibus dare libeat, antea tundere, & neruos eximere conuenit. illitum acetabuli modo cum diluta uini potione, aquam extrahit. mediocrius purgat, addita lente cocta, aut cōtritis oleribus. Thymelææ farina uinū acerbæ succo excipitur, & in pastillos diuiditur. herba stomacho infesta. partus imposita necat. Nascitur in montibus & asperis. Hallucinatur qui coccon gnidium fructum esse chamelææ existimant, decepti quadam foliorum similitudine.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Thymelæa cuius mentionem hoc loco Dioscorides facit, est Mezereon Mesue & Officinarum, ut patet conferenti fructum, myrti bacca æmulum utriq; quod Granū gnidium dicitur Dioscoridi, Officinis Coccum gnidium. Germanis Kellershals. Foliaq; oleæ similia faciunt ambo sed angustiora Dio스코. maiora Mesues, ramos Mesue bicubitales. Dioscoridi tripedaneos. Cum hi Chamelææ (quam nonnulli Mezereon putant) sint dodrantes & palmo tantum alti: unicam autem thymelæam facit Dioscorides: multas Mezerei species facit Mesues.

Sambucus.

Cap. CLV.

B

*Ebulus, Attich.**Sambucus, Zolder.*

Sambuci duo genera. Vnum in arborem assurgit, furculos spargens arundinaceos, teretes, cauos, candicantes, proceros. folia iuglandis, terna quaternæue, ex interval-
lis circa ramos exeunt, grauiā odore, minus in ambitu secta: & in ramulorum cacu-
minibus cauliculisq; circinatæ umbellæ, quæ
florem candidum pariunt, mox acinum tere-
bintho similē, in nigredine subpurpureum,
racemosum, succo madentem, uinumsumq;
Alcyon

LIBER QVARTVS.

Alterum genus, chamaeste uocatur, Romanis ebulum, lōgè humilius est, magisq; A
herbaceo generi assignandum, caule quadrangulo, geniculato, folijs amygdala, ex
intervallo longioribus, geniculatim expansis, pinna inq; graecolentibus, in ambi-
tus ferratis: muscario sambuci, flore & acino eiusdem: radice nititur longa, crassi-
tudine digitali. Eadem utriusq; uis, & usus exiccans, aluo derrahens aquam, stoma-
cho inutilis. Folia olerum more coquuntur, ad pituitam bilemq; detrahendā. Cau-
les teneri in patinis cocti, eadem efficiunt. Radix in uislo decocta, & in cibis dara,
hydropicos adiuuat, prodest uiperarum moribus, eodem pota modo. uulnas emol-
lit infidentium decocto: patefacit earum spiracula, & uitia corrigit. Acini in uino
poti eodem funguntur munere, denigrant capillos illiti. Folia si praeterea ac mol-
lia ex polenta illinantur, inflammationem mitigant, ambustis & canis moribus il-
litu profunt, ulcera quæ dehiscunt in fistulam, agglutinant, ipsi qui podagra tentan-
tur, cum seuo taurino aut hircino profunt illita folia.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Sambucus uel Sabucus Graecis Anθ. Officinis Latinum nomen seruauit.
Germanis Solde, Fladee. Brabantis Vlier. Gallis, Sen-fuseau dicitur.
Ebulus Graecè Χαμᾶστυς. Officinis graecum seruauit nomen. Germanis Hieble.
Brabantis Hieble. Gallis Hieble appellatur.
Vtraq; Sambucus, ex arbore cens & herbacea, exiccandi, congelandi, modiceq; digerendi sicut etem
obtinere. Paulus Aeginaeta haec adijcit: Pote & manducata aquam per aluum educunt, propter quam col-
lem quā purgatoriam uim habent, de ipsis hoc libro agit Dioscorides, cum alioqui recenseri debuissent inter
arbores.

Picnocomum. Caput CLVI.

Picnocomon constat eruae folijs, acrioribus, scabris & crassis: caule quadran-
gulo: flore ocimi: semine marubij: radice nigra, aut pallida, rotunda, exigui
mali figura, terram redolente. Inuenitur in saxosis locis. Semen grauius somnia & ra-
metuosa facit, drachmae instar potum, tumores discutit, illitum cum polenta spicu-
la, ad actosq; corpori a culcos, extrahit. Folia illita tubercula, panosq; discutit. Ra-
dix eius in aqua multa duum drachmarum pondere, aluū soluit & bilem extrahit.
Picnocomon hodie plantæ neglectum & incognitum.

Apios. Caput CLVII.



Apios iuncos duos siue tres spargit, ru-
bros, tenues, qui à terra parum attollū-
ur: folijs rursus, oblongioribus tamen, & an-
gustioribus, herbaceis: semine paucis, radi-
ce hastulae regiae in formam pyri turbinata,
rotundiore tamen, succi fecunda, intes ha-
bet corpus candidum, extra cortices nigros.
Superior pars eius uomitione bilem pitui-
tasq; extrahit: inferior per aluū, tota uirgū
purgationes mouet. Succum si libet eximere,
tusa radix in fictili mergitur, & agitata aqua,
quod supernatat pinna selectum, exiccatur.

Purgatur atq; parteis succus, sescuibolo potus.

NOMINA ET EXPLICATIO.

*Apion, cuius picturam damus, hodie apud Germanos Erdmuss / Erdseigen / Erdmandeln appella-
tur, Brabantii Mussen mer steerten, uel Steensche castanen.*

Colocynthis. Caput CLVIII.

Colocynthis sarmenta foliaq; satini cucumeris emittit, per terram repentia, di-
uisa, fructum in speciem mediocri pilae conglomeratū, uehementer amarum:
quæ legere oportet, cum coeperit in pallidū colorē permutari. Medulla fructus pur-
gatoriam

DIOSCORIDIS

A

Colocynthis.



gatoriam uim habet, si quatuor oboli cum aqua multa, melle cocto, myrrha & nitro excipiantur, & cogantur in catapodium. Arefacta pilateruntur, & infusa clysteribus profunt neruorum resolutioni, coxendicum doloribus, & coli uitijs, ut quæ bilem, pituitam & strigmenta, interdum etiam cruorem eliciant. foetus admota enecant. dentium dolore tollit, si unâ repurgetur, & luto oblita cum aceto & nitro inferuiscat, hocq; iure decocti dentes colluantur. si aqua multa aut passum in eadem incoquatur, & sub diuo refrigeret, potum crassum humorem & strigmenta alui detrahet. stomacho supra modum aduersatur. subdita ex ea balano, alui excrementa eiciuntur. Virentis succo utilissimè ischiadici perfriantur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Κολοκύνθις.

Latine, Colocynthis, Cucurbita sylvestris.

Officibus corruptè Coloquinida. Germanis Coloquint. Gallis Courge sauuage, coloquinte.

Mesue duplex genus Colocynthidis constituit, Nempe marem & foeminam. Mas grauis, durus, asper, & griculus, & lanuginosus est. Foemina eadem auctori praefertur mari, praesertim magna, siue ut dicunt, grossa, leuis, laxa, candida, leuis, & perfectè matura: & cuius pars interior, siue medulla, pulposa, laxa, leuis, hoo est, non aspera & insigniter alba est. Optima Venetijs emittit Colocynthis, & quæ ex orientaliibus regionibus, ut pote calidioribus, ad nos aduehitur. Quæ apud nos nascitur, inefficacior est, & ægrè alium soluit. Ceterum probatissima sylvestris huius Cucurbitæ medulla, siue, ut loquuntur, pulpa, antequam in usum assue matur, primum incidenda est, deinde terenda diligenter, & sapius cribanda. Ad usum tempore rursus cum multa mortario exquisitissimè subigenda, id enim illi, inquit Aëtius, peculiare est, ut trita antequam madescat, subtilissima appareat: sed post mulsæ infusionem ita intumescat, ut qui uideat, cribratâ minime putet. Quodam igitur frustulum eorum quæ intumuerint, sepe uentri aut stomacho inhaeret, saepius tamen intestinorum anfractibus implicatur. Cumq; sit naturaliter acris & mordax, ulcerat intestina, parit & contractiones. Propterea exquisitissima diligentia ad ultimam minutiam redigenda est. Sed mulsæ prius aut rursus decoctâ infunditur, tum exiccata in puluerem redigitur. Paulus & Auicenna, quem est Mesue secutus, ipsam Colocynthida etiam plurimum teri uidetur. Serapion autem, sed male, contrarium asserit, eam uidelicet non multum esse terendam. Dosis pulpe colocynthidis ad summa est, decem ceratia, Mesue. Paulus drachmam integram dare non ueretur, quæ eiusdem sententia pendet ceratia decem & octo. Datur Aëtio Colocynthidis medulla scrupulorum duorum pondere, ex duobus mulsæ cyathis, Imbecillibus tamen inquit, scrupulus sufficit. Quatuor obolis sumptu purgat hoc loco Dioscoridi, melle cocto, myrrha & nitro excepta, atq; in catapodium coacta.

Epithymum.



Pituitam, bilem, & strigmenta Diosco. purgat: bilem uerò & mucosam non à sanguine, ut elleborus scammonium, sed à neruis & ueruosus partibus, Paulo. Danda quibus caput est laesum, & meningis, aut pericranionis, uertiginosis, hemigranicis, epilepticis, apoplecticis, cynico, spasmo, asthma ticis, orthopnoicis, Paulo.

Cum oleo spinæ affricatum lumborum & coxarum dolores sanat, & alia multa potest, Dioscor. Plin. Galen. Paul.

Epithymum. Cap. CLIX.

Epithymon, flos est è thymo duriore, saturiore simili capitula habet tenuia, & leuia, & in eis caudiculas, quasi capillamenta. Potum cum melle detrahit pituitam, bilemq; atram, per inferna. Priuatim prodest melancholicis, & inflatis, acetabuli mensura, ad quatuor drachmas cum melle, sale, & aceti exiguo. Plurimum in Cappadocia & Pamphilia gignitur.

NOMINA


LIBER QVARTVS.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Epithymum Grecorum est flos thymi saturie similis, calidus siccus gradu tertio: omnia potest que thymus, sed efficacius, ob id illius penuria hoc uti licet, mensura tamen maiore. Datur *Epithymum* drach. 4. cum sero lactis uel mulsæ, ad educendum humorem melancholicum. Horum loco si *Arabum* *Epithymo*, hoc est, casta thymo innata, ut saturie seu thymbræ, *Epithymbrum* *Aëuario* dictum, et *hysso*, et maioranæ *epysopum*: et orobo orobranchæ, et lino linanchæ, uti libet, quia uires cum thymi flore easdem illi *Plinius* uetorum solus tribuit: dabitur cum *Mesue* ob imbecillitatem a drach. quatuordecim ad drach. uiginti. *Epithymus* autem *Arabum*, ut thymus, est duplex, hortensis, et hoc calidior, siccior montanus.

Alypum.

Caput CLX.



Alypon furculosa herba est, subrubra, gracilibus ramulis: tenuibus folijs: flore molli, leui, & copioso: radice betæ, tenui, referta, acrisucco: semine *Epithymi*: gignitur in maritimis, maxime *Lybiæ*, quam largissima: quanquam alibi quoque plurima prouenit. Semen atram bilem deiecit, si mensura *epithymo* pari cum sale & aceto sumatur, uerum interanea leuiter exulcerat.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Alypon uel *pituyus* am *Dioscoridis* esse *Turbith*, uel *Turpetum* *Aëuarij*, quidam arbitrantur, quam etiam *Turpet* a barbaris uocari scribit *Dioscor.* nec fortè uox ea cum *Leoniceno* et alijs quibusdam expungenda ex *Dioscoride* fuerit, quum alijs plerisque appellationes barbaras interponat, *Turbith* autem dicitur: ut suprà monuimus, ab hoc diuersum est, et quibusdam uidetur secunda *tiethymali* species. *Alypon* uel *Alypia* alium soluit, in aqua mulsæ, *Plinio*, addito sale modico. Minima potio est duarum drachmarum: media quatuor: maxima sex, ea purgatione, quibus datur ex gallinaceo iure. Depellitur atra bilis semine, *Diosco.* si mensura *Epithymo* pari, cum sale et aceto sumatur, purgat autem maxime bilem atram, qua purgata animi tristitia in melancholicis pellitur, a qua uel seu facultate potius illi nomen fieri. Est enim *Græcis* *Alypon*, quod tristitia doloris caret, aut liberat.

Empetron.

Empetrum, seu Calcifraga.

Caput CLXI.



Empetron aliqui phacoides uocant, nascitur in montibus & maritimis, falso gustu: sed quo propius terreno fuerit, amarius sentitur. Trahit bilem, picuram, & aquam, si bibatur in iure aliquo, aut hydromelite.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Ab alijs describitur herba sesquipedalis, geniculatis cauliculis, succulentis, folio marum roris, nisi quod multò carnosius et rariius, semine corymbis dependentibus, semiculi effigie, strobulo luteolo, singulari radice, exili et breui, odore gustuque salis. Gallie uulgus quod medijs erumpat saxis, perce picre, hoc est perforipetram. Sanctones rumpe picre, id est, rumpe petram, multi marinam cristam, quod montium iuga et scopulorum crepidines ea uetustate cristentur, Aliam tamen omnino ab ea, quam cretam appellant marinam. Frequens est in *Asiæ* litoris ora, neque non in maritimo *Sanctonum* tractu. Germaniæ uerò peregrina. Hallucinantur qui eam herbam *Officina* saxifragam albam, Germani *Weiß* et *hoben steynbrech* appellant.

tant. Empetrum esse contendunt, notis omnibus supradictis apertissime reclamantibus, nempe caulum

A Saxifraga alba.



habet lanuginosum, subrubicundum, folia exigua, rotunda, in extremitatibus incisa, flores candidos, radicem exilem, cui granula Coriandri seminibus quantitatem referentia adherent, partim alba, partim rubra, quibus Officinae pro semine eius utuntur. haec urinam mouet, calculos frangit & conterit. Stranguria itaq; confert: absterget enim expurgatq; & quae in uenis est crassiciem, sicut alia omnia, quae amara sunt, incidit. Menses quoq; cit, crassaq; ac glutinosa ex thorace educit. hanc quidam arbitrantur pseudobumum esse Dioscoridis.

Vitis sylvestris. Cap. CLXII.

Lycen / Tyelen.



B

Vitis sylvestris sarmenta uitis modo praelonga emittit, aspera, lignosa, rimoso cortice: folijs hortensis folani, longioribus ac laetioribus: muscoso flore, & capillaceo: fructu exiguis uuis simili, post maturitatem rubente, rotunda est acinorum facies. Feruescens radix in aqua & in cyathis duobus uini aqua marina diluti pota, humorum alui ciet, ideo hydropicis datur. Vuae eius, uitia cutis in facie, & maculae omnes expurgant. Enascentes uiticulae, cibi gratia, sale condiuntur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Sylvestris uitis quibusdam ea uidetur, cuius picturam exhibemus, uidelicet quam supra clematis alteram fecimus, uulgo Lycen / Tyelen. Brabantis Wondwijngeert. Gallis hardea & uioria appellata.

Vitis alba. Caput CLXIII.

Vitem albam aliqui bryoniam uocant. Folijs uiticulis, pampinisq; satiuam uitam imitatur, sed hirsutiora sunt omnia. ea quos prope se nata sit frutices, suis clauiculis complectitur. fructus rubens in uua dependet, quo coria pilis spoliatur. Ex ea asparagi, qui prima germinatione exeunt, decocti in cibo, aluum & urinam cient. Folia, fructus, radix, acrem uim sortiuntur. itaq; ulcerum phagedenis, gangraenis, chironijs, putrentiam tibi arum radice, efficaciter ex sale illinuntur. Radix corpus absterget, & cutem erugat. uitia cutis in facie, uarosq; lentigines & cicatrices nigras emendat, cum eruo, creta Chia, & foenograeco, totidem effectum prodest decocta



lius si cum scammonia aut ueratri nigri totidem obolis detur. sed qui sumunt, alia prae gustare debent. laborantes lienis incremento recreat. radix & potu & illitu cum axungia uulneribus sagitta arundinea factis, est auxilio. Cuius rei probatio talis fertur: Peribit filix, quam per ambitum sata copiosior arundo coronet. & contra, euanescent abibitarum do, quam obsepiens multa filix in orbem cinxerit. Filix femina folijs est filicis, surculosis, altioribusque, & quae non singulari, ut illa, pediculo fulciantur: radicibus longis, pluribus, obliquis, quae ex nigro in luteum flauescunt, aliquae etiamnum rubrae inueniuntur. Pellunt lata interancorum animalia cum melle eclegmate sumpto. potu cum uino drachmis tribus, teretes tineas eijciunt. datae feminis, sterilitatem faciunt, & praegnantibus abortum, si supergrediantur. Farina humidis ulceribus, & cicatrici repugnantibus, inspargitur. iumentorum ceruicibus medetur. Folia recentia in oleis cocta manduntur, ut ventrem emolliant.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Filicis Plinio ut Dioscoridi duo genera, nec florem habent, nec semen: unum $\pi\eta\epsilon\lambda\epsilon\varsigma$ Graecis. Latini Filices, bina etiam cubita excedentes, non graues odore. Alterum genus Graecis $\beta\alpha\delta\upsilon\pi\eta\epsilon\lambda\epsilon\varsigma$. Latini Filix femina. Germanis Hader farn . Gallis fugera , seu fuchiere dicitur.

Nascuntur ubique, maxime uero frigido solo. Filicis radix maxime utilis, amara, substringens, lumbricos latos necat, partum mortuum eijcit, ulcera ualenter, sed sine morsu siccat imposita, hepatis meatu probe terget sine manifesta calfactione aut refrigeratione.

Filicula, seu Polypodium.

Caput CLXVI.

Polypodium.



Filicula nascitur in montosis petris, & uetustis arborum caudicibus, praesertim quercuum, palmi altitudine, filici similis, subhirsuta, non tenui perinde diuisura, radix pilosa, in qua continentur cirrhi, seu polyporum, crassitudine digiti minimi, coloris intus herbacei, austera aliquantum, & gustu subdulcis. Purgandi uim habet, coquitur cum gallina, aut piscibus, aut beta, aut malua, ad aluum soluendam. arida farina aequae mulsae insparsa, detrahitis bilem & pituitam, trita luxatis efficaciter illinitur, & aduersus rimas quae inter digitos fiunt.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Graeci, $\pi\sigma\lambda\upsilon\pi\acute{o}\delta\iota\sigma\tau\omicron\upsilon$. Latine Polypodium.

Genuinum nomen Officinis retinuit.

Germanis Engelsfuss . Gallis Polypode dicitur.

Melius & efficacius est Polypodium, quod in uetustis arborum, & maxime montanarum quercuum nascitur, quam quod in petris inuenitur, de quo hoc loco Dioscorus agit. Hoc enim superfluum habet humiditatem, & (ut inquit Mesue) indigestam, quae statim, nauseam & stomachi subuersionem excitat. illi autem querno polypodio, de quo in capite max sequenti, bonitatis notas octo Mesue attribuit, sed obscure multum, & non conformiter.

conformiter bonis auctoribus. Deligendum itaq; censemus Polypodium illud, quod eas habeat proprietates, A
quas alij iam assignauimus. Dosis Polypodij est Mēsus a drachmis duabus usq; ad aureos quatuor. Aënis ex-
purgat: radicis scrupulos sex, qui in aqua mulla præferbuerint, exhibet. Oribasius drach. duas coquit in
pitifane succo, datq; bibendum succum. Sunt qui anciam integram dederunt sine noxa. Polypodij radix dul-
cis, & auctera, multum siccans, sed sine morfu, purgandi vim habet Galen. bilem, pituiti amig. trahit, Dioscor.
In quo non bilem sed Melancholiam legit Serapio: sic & Mēsus, & alij post eos pleriq;. Melancholice pur-
gatricem vim tribuunt. Sic crassum, solidum, circ. hof. m. in rubro nigrescens, colore intus herbaceo, ut pisti-
tum recens, quercubus inuatum potius quam saxis & muris: cuius contra uideri, nisi astringendum sit.

Dryopteris.

Caput CLXVII.

DRyopteris nascitur in ueterum roborum musco, filici similis, multò minore
foliorum incisura, radicibus inuicem implexis, hirsutis, gustu acerbis, in dul-
cedinem uergentibus. Psilothrum est cum radicibus trita: illinitur enim primum
usquedum sudorem educet, innox sudor abiuitur, & recens imponitur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Hec omnino ea uideretur, quam hodie Officina & Herbarij Polypodium quercinum, Germani *Psilothrum*
appellant, nisi miribus eam ab hac seiunxisset. Psilothrum enim non est nostrum Polypodium.

Cnicus.

Caput CLXVIII.



CNicus folijs constat
oblongis, per ambi-
tum diuisis, alperis, spino-
sis, caule sesquipedale: ca-
pitulo magis uicinis gran-
dis oliua: flore croci: fe-
mine candido, aliqui ru-
fo, lōgo, anguloso. Huius B
flore in obliquis uidentur.
Seminis tui & expressi
succus, cum aqua mulla,
uel iure gallinacei, aluum
purgat: sed stomacho ad-
uersatur, ex eo autem fiūt
offulæ, quas placentulas
uocant, adiectis succo a-
mygdalis, nitro, aniso, &
melle decocto, quæ aluū
emolliunt. Hæ in partes
quatuor finduntur, quæ
nucis iuglandis magnitu-
dinem impleat: & quibus
ante cenam duas uel tres
sumpsisse satis est. Ratio
temperandi hæc est: Cni-
ci candidi sextarius, amy-
gdalorum rostorum & de-
libratorū cyathi tres, ani-
si sextarius unus, aphroni-
tri drachma una, cum car-
nibus triginta caricarum.

Seminis succus laccogit, & magis ipsum resoluendæ alui facultate donat.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Greci, *Κνικος*. Latini, *Cnicus* uel *Cnicus*. Officinis *Carthamus*, *Croci hortensis*.

A Germanis Wilder Safran / Seldtsafran / Floz. Gallis Safran basart appellatur.

Semen Carthami, ex sententia Mesue, eligendum est candidum, planum, hoc est laue, grandiusculum, plenum, cuius medulla est unctiosa & pinguis, cortice tenui. Paulus coquit drachmas quinq; medulle Carthami, cum Prissana, & paucis salibus, ut educat aquam. Cnici semen calidum, ordine tertio, purgat pituitam, ut cap. 5. lib. 2. simp. docet Galen. & lib. 5. sanitatis tuende: in diacuci compositione: nihil tamen aut minimum harum utrium in consueto nobis semine Cnici expertus, forte quod à regionibus calidioribus non sit allatum, sed in nostro agro natum, Carthamus Gaze cum iulgo appellatur.

Mercurialis.

Caput CLXIX.

Fœmina.

Mas.



LYnozostis, aliqui parthenion, alij hermu botanion appellant, folijs constat octo mi, minoribus, helxinæ cognatis: ramulis duplici geniculorum nodo cinctis: alarum cauis multis, fructu fœminæ, copioso, quandam racemorum speciem præbente: mari, è foliorum sinu dependente, paruo, rotundo, ceu binis testiculis unâ cohærentibus, frutice dodrantali aut maiore. Vtraq; in oleribus manditur, ad aluum clemens, cocta in aqua, epoto iure, bilem aquamq; detrahit. constat ut mares gignatur: hunc facere, ut fœminæ, illam: si à purgatione bibantur, & trita folia genitalibus admoveantur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Duo Mercurialis genera, masculus & fœmina, que efficacior: utriusq; picturam damus. Mas qui Græcis ἐπὺς πῶς, à διόζωσις ἀγγέλιω uocatur. humilior, folio nigriore constat, foetu propter genicula rariora breui, contorto, in binos ueluti testiculos coeunte, fœminæ coma albicat, fructu copioso, soluto & candido, quandam racemulorum imaginem præsentante, Græcis διόζωσις θύλαξ dicitur. Vtraq; Officinis Latinum nomen seruauit. Germani Bingelkraut / Bengelkraut, & Scheißkraut appellant. Mercuriali omnes duntaxat ad uentris purgationes utuntur. Verum enimuero si quis eius facere periculum uolet in cataplasmate, sanè digerentis admodum facultatis esse experietur.

Cynocrambe

Cynocrambe. Caput CLXX.

A



CYnia aut Cynocrambe, cauliculus binarius dodrantum altitudine emittit, mollem, subalbidum. folia mercuriali aut hederæ similia, certis interstitiis subalbida. semen folijs adhæret, paruum, rotundum. Folia cum caulibus pota, aluicent. oleribus commendantur. Ius decocti & pituitam & bilem aquamq; detrahit.

* Caput hoc ad diuinitatem uidetur

NOMINA ET EXPLICATIO.

Officinis nostris nota sylvestris atriplicis nomine, casiquidem cauliculus habet diuin palmorum, folia herbe mercurialis, aut hederæ, subcandida ex interuallis, semen prope folia paruum, rotundum. Germani uocant Wilde milken, & Sypeimilken. Aliqui existimant sylvestris esse bliti genus, cum more illius seminifolium sit, ceterum crenatum huic folium, ut Mercurialis, aut hederæ modo in angulos exis, quod non in blito sylvestri reperitur.

Heliotropium. Cap. CLXXI.

Heliotropium magno flos est effigie scorpionis caudæ, unde scoriuro ei nomen. & quoniam folia cum sole circumagat, heliotropion dicitur. folia oimi habet, hirsutiora, candidiora, & maiora. ramuli à radice terni, quaterni, aut sæpe quini exiliunt, multis alis concaui: flos in cacumine candidus, aut subfuluus, incuruatur ut scorpionis cauda. radix tenuis est, & inutilis. nascitur in asperis. Decoctum herbæ ex aqua, fasciculo manus plenæ potu pituitam bilemque per aluum extrahit. contra scorpionum ictus ex uino potum & illitum prodest. ad alligatur ad conceptus arcendos. Aiunt per horam unam ante accessiones feminis grana quatuor cum uino quartanas finire: tria uerò, tertianas, illitum semen formicantes uerrucas pensilesq; & thymos, & epinyctidas exiccat. Folia infantium destillationibus, quas syriales uocant, podagris, luxatisq; utilissimè illiuntur. menses cient. partus trita & imposita pellunt. Heliotropion paruum nascitur in palustribus, iuxta lacus, folijs antedicto proximis, rotundioribus: semine, acrochordonum uerrucarum modo, pensili, rotundo. Herba cum suo semine pota, adfecto nitro, hyssopo, nasturtio, & aqua, latas tineas teretesq; excutit. Pensiles uerrucas, quæ acrochordones uocantur, cum sale illita tollit. Scorioides herbula est, folijs paucis, semine caudæ scorpionis effigie. Illita scorpionum ictibus presentaneo est auxilio.

* Nigriora.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Dicitur est heliotropium similiter & heliostrophon, eo quod ad solem se uertat, & ad motum ipsius circumagatur herba. Scoriuri uerò nomen habet ab effigie scorpionis caudæ, à Cello Solaris herba dicitur, à paucis hodie ne medicis quidem, pace semper eruditorum dixerim, cognoscitur, nouo ab herbarijs indito nomine: uocant enim herbam cancri, quod flores in cauda cancri similitudinem inflectantur, namq; scorpionem & scori rarius uident, à re potius nota, cancro scilicet, potius quàm Scorpione ignota, traxerunt appellationem. Namq; herba cancri, ut singulas prosequar notas, pingui solo cultaq; maxime nascitur. Florere incipit circa solstitium. Folia ab ortu in occasum solem sequuntur, ita ut quacumq; coeli parte sedem teneat sydus, in eam conuersa spectent, eoque nullo etiam celo dirigantur: folia octimo similia, hirsutiora, maiuscula, candidiora: ramuli à radice terni aut quaterni sæpius exiliunt, multis alis concaui. Flores in cacumine candidi aut fuluifcentes, instar caudæ scorpionis, incuruantur. Radix tenuis & superuacua. Floret medio Augusto in exitum autumni: qua depicta nunc effigie nusquam in agris per id tempus conspicitur. Heliotropion minus omnino priori simile, folijs tantum minoribus: in palustribus & circa lacus inuenitur, scorioides uerò que sit hodie ignoratur: sunt qui dicant radice & semine scorpionis effigiem hanc herbulam representare &c.

Finis Libri Quarti.

k 3

PEDANII DIOSCORI- DIS ANAZARBEI, DE MEDICINALI MA-

TERIA, LIBER QUINTVS. IOANNE RVELLIO SVSSIONENSI IN-
terprete, Cum figurarum debita appositione, & annotationibus in singula capita,
Per Gualtherum H. Ryff, Argentinum, Medicum, ex doctissi-
uorum lucubrationibus adiectis.

P R A E F A T I O.



Vperioribus quatuor libris, amicissime Arce, tradidimus de aromati-
bus, oleis, unguentis, & eorundem lachrymis ac fructibus: item anima-
libus, melle, lacte, adipe, cerealibus, oleis, necnon de omni radicū,
herbarum, succorum, seminumq; ratione. In hoc autem totius ope-
ris Quinto, differemus de uinis & metallicis, à uite nostram commen-
tationem auspicari.

Vitis uinifera.

Caput I.



Folia uitium & triti capreoli, capitis dolores illitu mi-
tigant: & inflammationem stomachi ardoremq; cū
polenta. folia etiam per se, ut quæ refrigerent & adstrin-
gant, imponi solent. Potus eorū succus dysentericis, san-
guinem excreantibus, stomachicis, & gravidarum mala-
cia medetur. Eadem efficiunt madefacti in aqua capreoli
& poti. Lachryma uitium, quæ ueluti gummi in caudici-
bus concreuit, ex uino pota calculos pellit. illita lichenas
& psoras leprasq; nitro prius perfrictas sanat: eadem cū
oleo sæpius pilis illitis, psilothri effectum habet: maxi-
meq; sanies, quam accensa sarmenta uitium uiridia exu-
darunt qua & perunctæ uerrucarum infectiones ex-
trahuntur. Cinis fermentorum & uinaceorum, detractis
in sede condylomatis, & thymijs, illitus ex aceto mede-
tur. prodest luxatis & uiperarum moribus: contra lienis
inflammationem illinitur, cum rosaceo & ruta & aceto.
Labrusca duorum generum est, alterius uua non matu-
rescit, sed flore tenuis ænanthen nominatam perducit. al-
tera ad frugem peruenit, paruis acinis, nigra, & adstrin-
gens. Folia, caules, & clauiculæ quibus repunt, uim habet
cultæ uiti similem.


NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ἀμπελὶς καὶ ὄρυς, ὄρυς, ὄρυς, ὄρυς. Latine, Vitis urbana, uinifera.

Germanus Weinreben, Weinstock, Weintrauben. Gallis uigne appellatur.

Innumera uitium reperiuntur genera, quæ singula persequi superuacaneum esset. Si quis tamen illa disquisi-
tere desiderat, rei rustica scriptores, Pliniumq; lib. 13. natural. historiae, qui diligentissime de ijs scripsit, le-
gant. Labrusca Græcis ἀμπελὶς ἀγρία. Germanis Wild vngespflanzt Reben. Gallis Vigne sauvage
dicitur.

Vua. Caput II.



* Plinius edita
sentit lib. 33. ca-
pit. 1.

Vvæ recentes aluum turbant, & stomachum instant. innocen-
tiores, quæ decerpæ diu pependere, ideo quod in eis copia
humoris exiccatur. utilesq; sunt stomacho ægrisq; atq; cibi au-
ditatem excitant. in uinaceis & ollis seruata, ori & stomacho
grata sunt. aluum hñunt, sed uescam & caput tentant, & san-
guinem excreantibus conueniunt. Similesq; quæ in musto sue-
re. Sapa aut passo condita, stomachum magis infestant. At quæ solem prius passæ in

In aqua coelesti conduntur, minus uinosæ sunt, siticulosi, ardentibus & longis febri-
bus salubres. Reconditi uinacei inflammatis mammis, rigentibus ac præduris, cum
sale illinuntur. decoctura eorum dysentericos, celiacos, & foeminas fluxione uul-
uæ laborantes iuuat infusa, ad descesiones, ac fetus assumitur. Nuclei acinorum ad-
stringendi uim obtinent. Stomacho utiles sunt. inspargitur farina tostorum, polentæ
modo, dysentericis, & celiacis, & solutis stomacho. Vua passa alba adstringentior
est. prodest esitara caro earum tussi, faucibus, renibus, ac uescicæ. estur in dyenteria
per se cum nucleis, & decocta in patinis cum melle, admista mili ac hordei farina et
ouo. ualeat ad purgandum caput, eiusdem gratia cum pipere commanducatur. testiu
inflammationes sedat, illita cum lomento fabarum, aut cumini farina. fauos, epiny-
ctidas, carbunculos, enatas in articulis putredines, & gangranas, sine nucleis trita,
& cum ruta imposita sanat. podagræ conuenienter cum panacis succo illinuntur.
mobiles ungues illita, celerius extrahit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, Σταφυλή. Latine Vua præcipue in uite dicitur ab uuido, id est, liquore contento.

Germanis Weintraub, Weinbeer. Gallis Raisin appellatur.

Vuarum genera omnia explicari hoc loco nihil opus fuerit, cum pleræque ex uitium generibus à Plinio et
reirustice scriptoribus enarratis facile possint cognosci. Omnium partium uitis temperamentum ex facul-
tatum enarratione apud cosidem patet. Vua tamen immatura & acerba frigida & sicca sunt, maturæ
autem calide & humide in primo gradu, autore Simone Sethi.

Vua satius uitis coquit, astringit, leuiter digerit: Vua passæ, quam Germani Wertreubel, & Rosin.
Galli raisin en caput uocant, caro, tantum astringit quantum eget hepatis affectum. habet præterea facul-
tatem coquendi crudos humores, & emittendi malignos: egrè corrumpitur, tota substantia familiaris est
hepatis, & usu crebro consuetæ est: ob id felicissime miscetur medicamentis hepaticis. sæpius res noua dicitur
et uenas, id est, exemptis uinacis, dicitur.

Oenanthe.

Caput III.

Oenanthe uocatur uitis syluestris fructus, cum floret. Recondi debet fictili non
picato, collecta quoque substrato linteo, in umbra siccatur. Laudatissima in Syria
& Cilicia & Phœnice. Vis ei adstrictoria, quare pota stomacho ac ciunda urinæ uti-
lis, aluum sistit, ac sanguinis excreationes. contra fastidia & acorem stomachi, sic-
ca & illita efficax est. capitis doloribus tam uiridis quam sicca, ex aceto & rosaceo
perfunditur. sanguinolenta uulnera cataplasmate, & incipientes agilopas, oris ulce-
ra, & genitalium nomas, trita cum melle, croco, myrrha, & rosaceo, ab inflammatio-
ne uindicta. pelsis miscetur, ad sistendum sanguinem. contra oculorum delachry-
mationem, & stomachi ardore, cum polline polentæ & uino illinitur. Cinis cre-
mata in testa, candentibus prunis, facit ad oculorum medicamenta, reduuias & pre-
rygia, abscedentes gingiuas, cruentasque, cum melle sanat.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè, οenanθη, & μωιάς & γέλας αὐδός.

Latine Oenanthe, Labrusca, Vitis syluestris fructus, cum floret.

Germanis Wild reben, Holztrauben blüet. Gallis Grappe de uigne sauvage dicitur.

Labrusca alterum genus, ut Dioscorides quoque testatur, uias ad maturitatem non perducit, sed ad florē
tantum dictum Oenanthum promouet. Altera perficit paruis acinis. Vis huic eadem que satius, folio, capreo-
lis & caulibus, sed nigra astringentioris est naturæ.

Omphacium.

Caput IIII.

Omphacium succus est acerbæ uux, nondum maturescens, è Thasia uite aut
Aminæ. Oporteret autem ante canis ortum, expressam melliginem in rubro
re, linteo cooperto, in solare, usquedum cogatur, semperque quod ceruici uasis con-
cretum hæsit, reliquo humori permiscere: noctu à subdialibus locis in lectu refer-
ri, quandoquidem nocturni rores ipsum concrefcere non sinunt. Eligendum est fla-
uum, friabile, uehementer astringens, & linguam mordens. Sunt qui coquendo mel-
liginem cogant. Prodest contra tonsillas, uiam, ulcera oris, humida gingiuarum uitia.

A purulentas aureis, cum melle aut passo, item ad fistulas, uetera ulcera, nomasq; ex aceto: dysentericis, & mulieribus fluxione uuluarum laborantibus clystere infunditur. oculorum claritati, & scabritate, & erosionibus angulorum conuenit. bibitur ad recentem sanguinis excretionem, etiam si rupta parte aliqua contingat: sed paucos, & aquatior est utendum: ualde siquidem exurit.


NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ἀμφάκιον. Latine Omphacium. Officinis agrestia. Germanis Agrest.

Gallus uerius dicitur.

Omphacium sic à uino differt, ut oleum omphacinum à dulci: secato inter dum utitur, ut Heraculus apud Galen. lib. 6. comp. phar. part. ad quia repellit, incipientibus phlegmonis est salubre.

Vini natura. Caput V.



Vino uetere nerui laxantur & reliqui sensus, quod tamen gustu suauius est. quare cauendum his qui intestina alicuius partis imbecillitatem sentiunt. attamen in secunda ualitudine paucum, aqua dilutum, innoxie sumitur. Nouum inflat, ægre coquitur. insomnia parit graua, & urinam ciet. Aetate medium, utraq; uitia fugit: quare ad uictus sanorum ægrorumq; usurpatur. Album, tenue, stomacho utile est, ac facile in membra distribuitur. Nigrum uero, crassum est, & concoctum difficile. carnem alit, & ebrietatem creat. Giluum, utpote quod medium est, medius inter utrumq; uires habet. In secunda tamen & sinistra ualitudine, cum primis laudatur album. Quin & uina sapore distant. siquidem dulce crassis partibus constat, & difficilius à corpore expirat. stomachum inflat, aluum & interanea, ut mustum, turbat: sed minus inebriat, renibus, & uesicæ aptissimum. Austerum, per urinam celerius transit: sed caput dolore tentat, & temulentiam gignit. Acerbum, ad ciborum per membra digestionem accommodatissimum. aluum, & cæteras fluxiones cohibet, minusq; urinam expellit. Nouum neruos minus tentat. Vinum à aqua marina factum, stomacho aduersatur, sitim stimulat, neruos infestat. aluo aptum, à ualitudine se recolligentibus inutile. Passum, quod uis sole siccatis in area, aut in farnento torrefactis exprimitur, Creticum cognomine, aut pramnion, aut protropion, & sapa, quæ fit musto igni decocto, Græci sirion aut heplema appellant: nigra quidem, & quæ dicuntur melampsinthia, crassa sunt, & corpora multum alunt: candidum, tenuius: & heluola inter hæc media, medias sortiuntur uires. Omnia tamen adstringunt, & pulsus reuocant, faciunt aduersus uenena quæ exulcerando necant, ex oleo pota, & uomitionibus reddita, contra cicutas, meconium, pharicon, toxica, & concretum in grumos lac, item contra renum, ac uesicæ pruritus, rosiones, exulcerationesq; inflant tamen, & stomacho aduersantur, priuatim prodest melampsinthium, si uenter rheumatismum sentiat, album, magis cæteris emollit aluum. Gypso conditum neruis officit, caput aggrauat, & incendit, ac uesicæ aduersatur. contra uenena cæteris aptius. Picata, aut resinata, excalfaciunt, concoquunt, sanguinem excreantibus inimica. Quæ uero aparachyta uocant, ut quæ admixtam sapam recipiunt, caput implent, temulentiam gignunt, ægrius in halitum expirant, stomachum malè habent. Inter Italica uina Falernum principem locum obtinet, quod inueteratum perquam facile coquitur, pulsus exulcerat, aluum adstringit, stomacho utile, sed uesicæ nocet, atq; his qui uisus hebetudinem sentiunt: & ad potus crebros minimè idoneum. Albana crassioribus constant partibus, dulcia, stomachum inflant, uentrem emolliunt: sed concoctionem non æquè adiuuant, & neruosa minus infestant. uetustate, eadem austerum saporem concipiunt. Cecubum, cum sit dulce, est & Albano crassius, corpus & colore malit: ægre tamen coquitur. Surrentinum, ualde austerum est: quare intestinorum & stomachi fluxiones cohibet, & cum tenuis sit, caput minus tentat, inueteratum suauius redditur, & stomacho utile. Adriahum & Mamertinum in Sicilia æquè crassis partibus gignuntur, modicè adstringunt, & ocysimè inueterantur, minusq; ob suam tenuitatem, neruos tentant. Parætypianum, quod ex Adriatico

alio sinu defertur, odoratum ac tenuius est: quare liberaliter epotum fallit diu ser-
uat ebrietatem & soporem adfert. Isticum Parætypiano simile est, sed urinam ue-
hementius pellit. Chium tamen antedictis mollius, & aptum potui est, bene alit, &
minus inebriat, fluxiones cohibet. oculorum medicamentis utile, Lesbium facile
membra subit, Chio leuius, & aluo idoneum. Ephesium eandem uim habet, quod
phygelites nominatur. uerum Asianum è Tmolo monte, Mesogites appellatum,
capitis dolores ciet, & neruos lædit. Coum uerò & Clazomenium, quoniam multā
sibi maris aquam uendicant, facile corrumpuntur. flatus mouent, aluum turbant.
neruis officiunt. Vinum omne (ut reliqua in commune dicantur) merum ac synce-
rum, & sua natura austerum, exal facit, facile in membra distribuitur. stomachū ad-
iuuat, appetentiam ciborum inuitat, uires alit, ac robur augeat, somnum conciliat, &
commendat colorem. potum liberalius auxilio est contra assumptam cicutam, co-
riandrum, pharicum, ixiam, meconium, argenti spumam, taxum, aconita, fungosus,
contra serpentium morfus, & omnium ictus quæ refrigerando necant, aut stomachū
in uomitiones effundunt. facit ad longas inflationes, rosionesq; præcordiorum, ac
distentiones, stomachi resolutionem, & si uenter aut interanea rheumatismum sen-
tiant. Conueniunt sudatoribus, & quibus corpus immodico sudore digeritur, ma-
ximè alba, uetera, & odorata. Quæ tamen uetustate dulcescunt, renibus ac uesicæ ac-
commodatiora redduntur, uulneribus, inflammationibusq; in succida lassa impos-
nuntur, terra ulcera, & phagedænica, & fluxionibus obnoxia, commodè perfundū-
tur. Quæ marinam non receperunt, austera & alba, ad sanorum uictus usurpantur.
In his præstant Italica, Falernum, Surrentinum, Cecubum, Signinum, & permulta
Campaniæ, & Parætypianum ab Adriatico sinu, & Siculum quod Mamertinum ap-
pellatur. Ex Græcis Chium, Lesbium, & Phygelites ex Epheso. Crassa uerò & ni-
gra, stomacho negotium exhibent, inflationem pariunt, corpus augent. Tenuia ra-
men & austera stomacho profunt, & minus carnes alunt. Vetera ualde tenuia, & cā-
dida uehementius urinam ciunt, & dolores capitis mouent, neruosq; largius pota-
rentant. In media ætate, ut à septimo anno, potui saluberrima sunt. Modus autem
pro ætate, & tempore anni, & consuetudine, & qualitate uini definiatur. Non sibi
re, & modicè cibos proli, optimum est præceptum. Nocer ebrietas omnis, & maxi-
mè assidua, siquidem obfessos neruos quotidie remittit: largiorq; potus, acutorum
morborum adfert initia. Mediocris tamē uinolentia, aliquot diebus, maximè post
aquæ potus, utilis: namq; modo quodam ex alto euocat, sensilesq; expurgat excre-
tus, & per cæca corporis ducit spiracula, sed aquam post uinolentiam bibere oportet:
siquidem ualetudinis alicuius gratia factæ temulentia remedium affert frigida.
Omphacites nomine, peculiariter fit in Lesbo, siccata sole acri uua, paulò ante ma-
turitatem decerpta, triduo aut quadriduo, donec racemi in rugas contrahantur, ex-
pressumq; uinum cadis insolatur. Vim adstringendi habet, prodest dissolutis, stoma-
cho, & ilei dolore laborantibus, item prægnantium malaciæ, & crudis, in pestilenti-
a quoq; sorptum auxiliari dicitur. Huiusmodi uina non nisi post multos annos
bibì possunt. Lora, quam deuteriam, alij potimon appellant, fieri solet, adiectis me-
trets tribus aquæ, in uinacea, quibus triginta uini metretæ extractæ fuerint: calca-
tis uinaceis, expressoq; decocto ad tertias partes, additis in singulos congios mo-
di eius qui remansit, binis salis sextarijs, post hyemem transfunditur in uasa. Lora
intra annum utendum: etenim celeriter exolefcit. Conuenit agris quibus timemus
noxam uini, coacti sæpe desiderijs eorum obtemperare. item à longa ualetudine se
recolligentibus. Fit & uinum quod adynamon uocant, loræ uires habens, hoc mo-
do: Pares aquæ & musti mensuræ coquantur molli igne, donec absumat aqua,
quod, ubi refrixerit, elutriatum, picato uase reconditur. Alij marinæ & celestis a-
que, mellis & musti pares miscent portiones, decapulant, & quadraginta diebus in-
solant, quo ad annum utuntur ad omnia eadem. Vinum è syluestri uua nigrum ad-
stringit, prodest alui & stomachi fluxionibus, & cæteris quibus constrictione &
contractione opus est.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Vinum protropum, id est, quod ab uinis desinit, antequam calcantur.
Germanis Der vorschupf,

Gal. lib. 8. com.
phar. part.

Callis Lib. 8. Simp.

A Gallis l' mere goutte, medium inter calidum & frigidum, hepaticis saluberrimum, praesertim cum hepate lupi: qui proprietate substantiae haec nutriunt, nec calfaciunt, nec refrigerant.

Vinum mustum calidum primo ordine, uetus tertio, medium secundo, calori proportionē respondet siccitas. Ex musto coctio fit & aqua, id est, sapa. Germanis Gesotten most / lib. 7. comp. phar. part. Nescio quomodo neglectum est, quod a nostris Asiae Graecis & Lycaea dicitur, ab his qui Attico sermone magis utuntur, σίσιππος, id est, sapa: quamvis etiam σίγοσπος dicitur, quod pinguibus siccis in aqua coctis efficitur, Officinis mel passulatum dictum, quod magis digerit & terget. Mustum uero coctum magis est emplasticum, non rodens, libro 7. comp. phar. part. Ex sapa dissolutum castoreum cum opio, dolorem aurium inflammatarum magis sedat, quam uinum dulce, initio lib. 2. eiusdem. Facultatium uini differentiae sunt permultae: à substantia tenui, crassa: colore albo, fuluo, rubro, nigro: odore imbecillo, ualenti, sapore uario, sumende: de quibus Galenus lib. de uinis: lib. 4. & magis quinato de sanitate tuenda. Aph. 17. 13. 21. lib. 2. methodi. 7. maxime. 12. libro 1. antidot. lib. 3. alim.

Vinum medicamentis stomachicis, celiacis, hepaticis, feliciter miscetur, si absit phlegmone, erysipelas, abscessus, intemperies calida. Nam totius substantiae similitudine alit, coquit, roborat, putredinibus resistit, temperiem frigida uel humidam si qua adsit, tunc persanat, libro 3. comp. phar. part.

Vinum melitides. Caput VI.

Melitides datur in longis febribus, quae stomachum infirmarunt. namque aluum leuiter emollit, urinam citet, stomachum expurgat, prodest articulo morbo, renum uitijs, imbecillo capiti, & mulieribus abstemijs, odoratum siquidem est, & corpus alit. Distat à mulso quod fit è uino uetere, austero, & melle exguo. Melitides autem adiecto ad quinque congijs austeri multum, mellis congius, & talis cyathus, corutinis magnis, quod magis ad effervesendum locus pateat, fieri oportet, scilicet alperfo sale: cumque effervere desierit, in alia uasa transfunditur.

Vinum hoc neglectum, ac minime in usu est.

Mulsum. Caput VII.

B



Mulsum è uetere uino austero, & bono melle factum, praefertur. minus enim in usu est, leuiter id genus in usum uenit, uetus corpus alit, media aetate, aluo prodest, urinam pellit, à summo cibo sumptum nocet. & inter initia potum, implet, dein appetendi auiditatem reuocat. Fit mulsum duabus uini metretis admixta una mellis. Aliqui, quod celerius praebere possit, mel cum uino coquunt, & ita transfundunt. Alij utilitatis gratia, ad lextarios sex musti feruentis, unum mellis adijciunt, & ubi ferbuerit, uase recondunt, dulce autem permanet.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Cenomeli Gal. podagricis, arthriticis, nephriticis, & senibus, ex melle, & uino Sabino, aut simili, & petroselino componit, adiecta bethonica, & sarxiphago in nephriticis. Qui uero curiosius proponunt, etiam spicacardi aliquid iniiciunt: hodie uero eidem magnam aromatum muscellam immittunt. Olim fuit in usu celebris ad cerebri, neruorum, & aliarum partium affectus frigidos, sed id medicamentosius, quale à ueteribus, Mesuae praefertim, scribitur: nunc magno harum frigidarum regionum incommodo, in usu esse desijt, praeterquam quod circa natalem Christianum in Bacchanalibus uulgaribus, plebecula ad palati gratiam, non ad intemperatae frigida propulsionem, etiam largus bibit, & Claretum uocat: magnates uero praeciosius, diuotaxxex: parctore tamen mensura, quod ferè ex sacho. unc. quatuor, & Cinamomi unc. dimidia in lib. uini singulas conficitur, & Hippocraticum uinum appellat, tanquam Hippocrate inuentore dignum, ob uirum & saporis excellentiam: cui etiam mellis parum addunt quidam, praesertim si uinum austrius ad saporis gratiam, & coloris: clariorem euadit colatum.

Aqua mulsa. Caput VIII.

Aqua mulsa easdem quas mulsum uires possidet. Cruda utimur, cum molliri deiectionem, aut uomitionem incitare uolumus: ut ijs qui uenena hauserunt, ex olco




ex oleo. Decocta datur imbecillis, & hominibus elanguescen-
tis pulsus, quos illi dixere microphyctos, tussientibus, peri-
pneumonicis, & ijs qui immodico sudore digeruntur. Iam pa-
ratum condituumq; quod aliqui hydromeli propriè uocant,
media ætate adynamo uino, aut lora in recreandis uiribus re-
sponderet, & similem uim adipiscitur. quare inflammationi-
bus alicuius membri plus quam lora prodest. inueterati ta-
men usus damnatur inflammatis, aut constrictis, sed labora-
ti stomacho, aut cibum fastidienti, sudatoribusue conuenit.
Fit, duabus pluuiæ aquæ ueteris ad unam mellis partem addi-
tis, & insolatis. Alij fontanam aquam adijciunt, & ad tertias partis decoquunt, &
ita recondunt. Nec desunt qui hydromeli appellent, quod à melle elutis aqua fauis
conficiat seruari soleat. sed meracius confieri* conuenit. Aliqui id decoquunt. * gto-
Biberet.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Melapocetop recens, & Joazele sepositum ut seruetur, Dioscoridi dicitur: alijs confunditur pro aqua
mulla, seu mellita, quam Germani Honigwasser, hydromeli uero Meder nocant. Cruda mulla inflationes
& tormina maxime excitat, quoniam in aqua tantum calfacta mel dissoluitur: qualem mullam crudam se-
rapio uult dari dormituri mulieri, quam concepisse suspicamur, nisi eius potui sit assueti. In arthritide cali-
da, pro mulla, aqua saccharata est præstantior. Quod si uel à mulla, uel saccharata aqua post usum septem
dierum, aut uires nimis collabantur, aut uentriculus male coquat, ad unum redeundum, uel potius uinum mel-
lis transeundum. Secundum hydromelitis genus à Dioscoride descriptum, infinis partibus ualentius & gene-
rosius est, & idem quod uinum mellis uocat Plinius. Colore enim & calore, & saporis gratia uinum exoti-
cri, & partium nervorum frigidis, paralyti, apoplexia, epilepsia, lethargo, colicis item, & nephriticis, &
uentris inferioris intemperie frigida, seruaturq; & ualentius euadit tempore & loco calido. Vires eius mi-
nimo expositis. Exponitur etiam æstiuo & autumnali, nec infeliciter, nisi quod interdum in acetum longè
euolutum. Fermentum non miscendum, ut hodie solent, ut nec Plinius, id tamen accelerare feruorem, & augere
acrimoniam certum est, quanta uero mensura sit miscendum ex Mosue corruptis codicibus difficile est con-
iectare: bi enim unc. tres in lib. centum aquæ & mellis expetunt: alij in singulas libras aquæ, & mellis si-
mul mistarum uncias tres fermenti miscent: alij ad mellis lib. unam, aquæ lib. octo fermenti, unc. unam. Meli-
cratum Hippocrati est naxium biliosus, & quibus magna sunt uiscera, Galen. etiam febribus colliquantibus: a-
quosius urinas, & sputa magis promouet, minus aquosum aluum magis subducit.

Aqua.

Caput IX.



DE aquis in uniuersum decernere, propter
locorum proprietates, & peculiare na-
turas, cælum, & alia pleraque, difficile est. Ma-
gna tamen ex parte optima est dulcis, syncera,
nullius omnino qualitaris particeps, & quæ ne-
minimo quidem tempore in præcordijs com-
moratur. ad hæc, quæ & facili uia fertur, & ci-
tra molestiam, nec inflationes creat, & minime
computrescit. Aqua maris calida est, & acris.
Stomacho aduersatur, aluum enim conturbat.
pituitam expellit. si uero calida ad foras adhibeatur, elicit & discutit. neruorum ui-
rijs, & perniciosis, ante ulcera prodest. miscetur cataplasmati ex hordeacea fari-
na, & emplastris, & discutientibus malagmati. ad mouendas deiectiones tepefacta
infunditur: ad tormina calida pforas, pruritus, imperigines, lentes, & mammas ri-
gentes, foueri utile est. liuores foris discutit. ad uenenatos ictus, qui tremorè & refri-
gerationem adferunt, salutaris intelligitur, maxime scorpionum, phalangiorum,
aspidumq;. Etiam si quis in calidam descendat, auxiliatur, & malo habitu confectis
iamdum

A iamdiu corporibus, neruisq; balneæ ex ea utiles. hydropicos, capitis dolores, aurium grauitates. feruentis uapor leuat. syncera, & sine potabilis aquæ mistione repofita, uirus deponit. Sunt qui etiam præcoquant, & ita recondant. Datur ad purganda corpora per feſe, aut ex poſca, aut cum uino, aut melle. uerum poſt deiectionem, dant gallinæ aut piſcium iuſcula, ad domandam morſus acrimoniam.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Aquarum bonitatem Galenus à tribus ſenſibus primò æſtimat, nempe guſtu, uſu, & odoratu. Guſtu purà dicit, ſi nullam offerat qualitatem, ſed ad unguem expers maneat ſingularis alicuius guſtus. Viſu, quum ſyncera fuerit, ac planè perlucida: ſic nec odoratu ullam præ ſe ferre qualitatem debet, ut ſunt quædam extremæ prauitatis, quæ aut acidum, aut acre, aut falſum aliquid, uel putridum, uel aliquod aliud uitium uix eſſat ſingulari nomine præ ſe ferunt. ſi à loco unde erumpant aquarum bonitatem uelimus cognoscere, Galenus & Hippocrates uolunt aquam potabilem exurgere à loco ad orientem ſpectante, quæq; per meatus mundos celeriter currat, per terramq; puram coletur, æſtate frigida, hyeme tepida: quæq; eadem celeritate caleſcat & refrigeretur: hanc omnibus ætatibus uolunt accommodam &c. De aquarum bonitate uide plura apud Palladium lib. 1. rei ruſticæ. C. Celſum lib. 2. cap. 17. Aegnetam lib. 1. cap. 50. Oribasium lib. 2. de ſa. ſimpl. Hippoc. de acre, aqua, & reg. Galen. lib. 7. de curand. morb. Actua. lib. 9. cap. 12. & Platonem lib. 5. de legibus. De marina aqua uide plura in annotationibus noſtris in caput de muria.

Thalaffomeli. Caput X.

Quod thalaffomeli uocatur, uehementer purgare cõſtat. Temperatur autem æquis portionibus, maris, mellis, & imbris ex alto, deſcæatis, & picato uale per canis æſtus inſolatis. Alij ad binas marinæ coctæ ſingulas mellis adijciunt, & uale ſe condunt. huiusmodi moderatius eſt aqua marina, & mitius.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè θαλασσομέλι, temperatur æquis portionibus, maris & mellis. Confectionem eius aliam lege apud Plin. lib. 31. cap. 5.

Acetum. Caput XI.



Acetum refrigerat, & adstringit. ſtomacho utile, appetentiam excitat. erumpentem undecunq; ſanguinis, potu inleſſiue ſiſtit. prodeſt alui fluxionibus coctum cum cibis. cruentis uulneribus inditur. inflammationes arceat, in ſuccidis lana aut ſpongia impoſitum. reprimat procidentia ſedis, uuluaq; item abſcedentes gingiuas, & ſanguine manantes. ad nomas, & ignem ſacrum, ulcera quæ ſerpunt, lepras, impetigines, pterygia, cum aliquo conuenienti efficaç eſt phagedanas ulcerum, nomasq; ſotu continuo cohibet. podagricis calido ſotu, cum ſulfure auxiliatur. ſugillationes rapit, cum melle illitum contra capitis ardoreſ cum roſaceo in ſuccidis uelleribus, aut ſpongia imponitur. ad aquam intercutem, grauitatem aurium, & ſonitus, ſibilosq; feruentis uapor proficit. inſtillarum quoq; aurium uermes necat. panos coarctet tepidi ſotus, aut ſi imbuta aceto ſpongia admoueatur. pruritus permulcet, contra uenenatos ſerpentium icthūs, qui refrigerando nocent, calidum commodè fouetur: & frigidum, hiſ quæ exurens uirus eiacularitur. calidum potum, atq; uomitionibus redditum, aduerſus omnia uenena efficaç eſt, præſertim contra meconium, & hauſtam cicutam, conglobatum in uentre ſanguinem, lac coagulatum, fungos, ixiā, taxumq; cum ſale. hauſtu uoratas hirudines, ſi ſorbeat, eiicit, tuſſim ueterem mitigat, & recentem laceſſit. in orthopnea calidum commodè ſorbetur. gutturis fluxiones gargarizatum inhihet. anginis & uulua procidenti conuenit. contra dentium dolorem, calidum colluitur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Gal. lib. 1. ſimp. Acetum craſſis partibus, ſæcibus, ſeu ſæci proportionē reſpondentibus, calidum uidetur, non tamen cauſa cum tenuibus uerò partibus frigidum, idq; magis quàm calidum, aut ſortè frigidum per ſe, calidum per acciſdens. Nam ſpongia aceto madida, plebeo cuidam admota in principio & poſt horam unam, duas, tres, frigus percipit: ablata deinde ſpongia, ſenſim naſcentis in parte caloris phantaſiam & opinionem habet, acris

¶ uini

monie mordentis ratione. In eadem uero calore inducit: omnino autem siccatur. idem purum, idem aqua non mistum, & per lucidum maxime est partium tenuium, libro 1. comp. phar. gen. Acetum incidit, tenuat, digerit, refrigerat, reprimat, ac repellit influxum. Nam substantia modice calidum est, plurima parte frigidum, tenuium est partium, si est acre admodum, & nihil uini qualitatis representans. Idem solum ob sue uirtutis uehementiam capitis afflicto non adhibetur, sed mistum alteri: album magis est tenuium partium, libro 6. comp. phar. part.

Acetum atram bilem parit, & in massam attollit, biliosis salubre, Hippo. lib. 3. rat. uic. acut. & ibidem Galen. tamen quartanis datur ad incidendum & tenuandum.

Acetum mulfum.

Caput XII.

A Cetum mulfum, quod oxymel uocant, hoc modo temperatur: Aceti hemina coquito, decies effervescente cortina: atque ubi refrigerit, diffundito. Sumptu crassos humores extrahere, & ischiadicis, comitialibus, & articularum morbo confectis prodesse creditur. contra morsum eius uiperæ, quam sepa uocat, haustum metonium, ixiamae, auxilio est anginis utiliter gargarizatur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Oxymeli Græcis, nobis acetum mulfum, crassa in uentriculo, & uenis tenuat, lenta incidit, ac strenue terget, obstructa liberat, sine manifesto calore: ob id nec febres accendit, sputum euocat, sitim sedat, aliæ per multa efficit. Hippo. lib. 3. rat. uic. Si tamen immodice utatur, intestina rodit, nervosa lædit, tuum exiccat, Hippo. lib. 3. rat. uic. Si diutius uis seruare, coque perfectius, donec aceti & mellis qualitates plane fuerint unites, nec acetum adhuc crudum gustanti appareat. Insurgit substantiam cum Mesue coquunt ea ratione nostri pharmacopole, cum liquore dissolendum, ut potabile fiat. Quod autem cum Galeno, quadrisariam coquunt ad tertiam, uel etiam quartam partem, parum diu, ut dies octo, uel circiter, & state præsertim, etiam si loco frigido aëre accidit, tamen longè est omnibus medicis potionibus idem iucundius, ut id etiam uino ægri plerique præferant, præsertim si paulo est aquosius, quæde astate & in febribus coquere soles, aut aqua cocto mista parare, B ferè autem aqua mensuras sex lib. ij. mellis igni lento desumo, ut sit clarius, post aceti quartaria tria in coquo cetera, ut in libro nostro de componendis pharmacis in usum Officinarum Germanicarum conscripto copiosius leges. Oxymeli aliter inquit Dioscor. & post cum Plinius. Oxymeli & hydromeli incoquere potes, que eius actionem intendunt, tenuantia, incidentia, tergentia, ut hyssopum, thymum, saturiam, origanum, pullegum, calamintum, & que ipsius uini ad partem affectam deducunt, ut asplenium, tamaricem, in obstructione lienis, eupatoriū, cichorium, obstructio hepate, Vnde Paulo est oxymeli splenicum, & oxymeli calculo sis efficax. Quinetiam purgantia eidem in cocta clementius & efficacius uacuunt, ut minus, agaricus: pituitam, epithymus, polydium, chamaedrys, chamæpitrys, elæborus niger: melancholiam, rhubarbarum, scammonium: bilem flauam, cortex radicis sambuci: colocynthis, aquas: ut id unum pro omnibus propè eum uulgaris, tum syrupis esse possit, si quis cognouerit uti. Vnde & Mesue est oxymeli cholagogum, phlegmagogetum duplex, & melancholiam uacuans. Id oxymeli qua ratione sit coquendum, lib. 4. sanit. tuend. docetur, quas vires habeat, ibidem, & locis alijs permultis, præsertim lib. 3. uic. acu.

Ut uero mulfum multum cocta est calidior, magis incidens, tenuans, tergens, quia mel retinet largius, aqua in uaporem magna parte solum: sic oxymeli, quod pharmacopole ad consistentiam syruporum coquunt, ut seruari possit, est potentius quam aquosius, & minus coctum: sed hoc est gratius: & citius ob fluxibilem consistentiam penetrat, quam uini aceti tenuitas non minus quam aquæ fluxibilis substantia inuat, ut lib. 1. simpl. aquam uero, ut cetera humida iuuare distributionem, docet Hippo. aph. 1. lib. 2. & Galen. initio lib. 4. u. fus. part. illud autem uix potabile, nisi aqua, uel cruda, uel alia diluatur.

Acida muria.

Caput XIII.

A Cida muria, quam Græci oxalmen uocant, contra nomas fori, putrida ulcera, canum morsus, & uenenatos ictus auxiliatur. sanguinis fluxiones post excisos calculos sistit, si statim calida in uulnus iniiciatur. prociuum sedem reprimat, dysentericis, si nomas sentiant, infunditur, oportet autem ex læste instillare. hirudines sorbitione aut gargarizatu necat, furfures & manantia capitis ulcera exterget.

A Oxalme olim fiebat ex aceto & muria mixtis, hodie exoletum ac planè inusitatum.

Thymoxalme. Caput XIII.

Thymoxalme ueteres utebantur, dabantq; laborantibus imbecillitate stomachi, ternos quateruôsue cyathos, aqua calida dilutos, in articularibus morbis, & inflationibus, crassos humores, atrosq; trahit. Hoc modo facitatur: Thymi tri-
ti acetabulum, salis idem modus, ruta, pulegij, polentæ, singulorum exigua portio-
nes in uas coniunguntur, aquæ terni sextarii, & aceti terni cyathi infunduntur, & cir-
cumposito linteo sub dio madescunt.

Res peregrina & exoleta.

Scillinum acetum. Caput XV.

Scillinum acetum hoc modo fit: Scilla, quæ candida fuerit, expurgata concidis-
tur, traiectaq; lino segmenta modicis interuallis, ne se contingat, siccantur in
umbra quadraginta diebus, mina eorum in aceti boni sextarios duodecim immer-
gitur, & uase diligenter operto septenis diebus in sole madescit. post eum numeru
dierum scilla eximitur, & expressa abijcitur. defæcatum acetum transfunditur &
reponitur. Aliqui scillæ minam, quinq; aceti sextarijs miscent. Alij citra exiccatione
repurgantes, parem mensuram adijciunt, & senis mensibus macerari patiuntur. Id
multo magis humorum lentitias digerit. gingiuas humore pragnantes collutione
stringit firmatq; & motos dentes stabilis. putredines oris, & graues halitus tollit.
durat fauces sorbitione, & callosas facit. uocem expedit, & lympidam canoramq;
reddit, datur stomachicis, a grè cibum cõcoquentibus, melancholicis, comitialibus,
uertiginosis, mente captis: item uuluarum strangulationibus, lienis incremento la-
borantibus, ischiadicisq; imbecillos admodum recreat. corpus fanum reddit, &
bonum colorem præstat. oculorum aciem exacuit, tarditatem quoq; aurium infu-
sione purgat, in summa, ad omnia efficax. Cauendum tamen intestinis exulcera-
B tionibus, in capitis dolore, aut neruorum uitijs. Datur quotidie ieiunis sorbendum,
inter initia exiguum, paulatim adaugendo, ad cyathum usq;. Nonnulli binos dan-
cyathos, aut largius.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Acetum scillites ueteribus frequens usu, hodie rarum per se, ob amaritudinem, & acrimoniam mordacem
idq; multi cum melle, & fit oxymeli scilliticum: alij cum saccharo in syrupo formam percoquunt. Id acetum
incidit, tenuat, terget humores crassos, lentos, putres, quales pituitosi & melancholici in omnibus partibus
corporis: ob id affectibus ab eorum copia excitatis, & diutinis conducit, epilepsie, uertigni, auditui obtusus
asthmatis, rauicitati, familiaribus senectuti uitijs, & ceteris, ob hæc à morbis præcauet, & sanitatem tuetur
si per se sumatur: melius autem cum melle in syrup. datur à drachma una ad drachm. octo. manè cum aqua
aut decoctis aptis: in affectibus autem thoracis paulatim lambatur.

Si tamen æstas est, aut febris hectica, uel alia adest, absq; huius usu ob scillæ caliditatem, aqua ex aceto scil-
litico destillata est gravior, & efficacior. Vomitu etiam ualenter purgat humores in uentriculo crassos, len-
tos, putres, datum ad seiscunciam cum mellis aut sacchari rub. uncijs tribus, aquæ hordei cyathis tribus.

Eodem propè modo quo ueteribus acetum scillites fiebat, hodie nobis sunt ex floribus siccatis rosarum,
saluæ, sambuci, lauendule, roris marini & c. acetum rosatum, saluiatum, sambucatum, lauendulatum, roris ma-
rinatum dictum, & præter hæc uuatam, ex uuis passis.

Scillinum. Caput XVI.

Scillinum uinum fit hoc modo: Dissectam, uti dictum est, scillam, & sole sicca-
tam contundito, minam eius tenui cribro incernito, & linteo raro illigatam, in u
cenos sextarios musti recentis ac boni demergito. ubi trimestri spacio maduerit,
elutriatum uinum, obstructo diligenter uase, recondito. Licet quoq; sic humida scil-
la uti: In orbiculos, rapi modo, dissectam duplicato pondere, quadraginta diebus
in solari oportet, & ualde inueterascere. Alia parandi ratio: Scillæ dissectæ & repur-
gatæ tres minas, in Italicam metretam musti demittito, & senos menses in uase obs-
tructo macerari finito: post id tempus defæcatum & excolatum uinum recondito.

Vtilis

Vtile est contra cruditates, & ciborum corruptiones: item ijs qui reuomunt cibum, & si pituita in uentre, aut stomacho coierit, prodest lienosis, malè habitis corporibus, aquæ inter cutem, regio morbo, difficili urinæ, torminosis, inflationibus, resolutione neruorum, horroribus longis, uertiginosis, & uulsis, menses pellit, minimè neruos infestat. Hoc uinum uetustate fit melius. Cauendus in febre usus, aut si in æreana ulcus sentiant.

Marinā.

Caput XVII.

Marina uariè facitiantur. Aliqui enim statim quum decerpitæ sunt uuæ, aqua maris admiscunt. Alij in area uuas sole siccant: quibus calcatis, marinam adijciunt. Alij passas prius uuas in dolijs marina aqua macerant, mox calcatas expriment, id magis passis generibus adscribitur. Quæ tamen austeriore gustu temperantur, contra febrium aduentantium indicia ualent, si modò meliora non adsint. alium subducunt, profunt purulenta extussientibus, aut si dura aluus exerceat. Quæ ex Aminæis uuis fiunt, caput tentant, stomacho aduersantur, flatu creat. Verum quo plenior habeatur historia, ijs qui huius studio tenerentur, non inutile existimamus uarias uinorum compositiones adferre, non quòd frequens eorum aut necessarius existat usus, sed ne quid omisisse uideremur, quod ad eorum rationem attineret. Sunt autem quædam ex ijs factitia, minoris curæ ac impendij, quæ cadunt in usus: uti quæ ex cotoneis malis, pyris, filiquis, item myrti baccis compo-

Cydonites.

Caput XVIII.



CYdonites, nomine alio melites appellatur, & ita fieri consuevit: Mala cotonea exemptis seminibus, frustatim rapi modo scinduntur, & duodecim minarum pondo, in musti metretam, triginta diebus macerantur, postea defæcatum uinum reponitur. Alia faciendi ratio: B Oportet ad singulos mellis sextarios, denos succi cotoneorum tusorum pressorumq; adijcere, & ita recondere. Vinum hoc adstringit, prodest stomacho, dysentericis, hepaticis, renum uitijs, & urinæ difficultati. Melomeli, quod & cydonomeli nominant, sic fit: Cotonea magna seminibus suis castrata, in quam plurimum mellis, quo penitus demersa contingantur, conijciuntur: id post annum mitescit, multo non dissimile. Præstat eadem quæ superior compositio.

NOMINA ET EXPLICATIO.

• Hodie desierunt esse in usu, eorum loco parant Officinæ Syrupum de cydonijs, qui dysenteriam hepaticam mirè sanat, modicè per cassiam aut mammam uacuato corpore. Sed ualentior est ex succo cydoniorum paruorum, quæ mascula uocamus, & quæ acerbiora sunt, quam ex succo strutorum seu prægrandium, quæ femine uulgo dicuntur. Hoc recentiores quidam *μυλοφόλας* & *κυδωνίον χύμας* uocant: Alijs minus cydoniorum simplex dicitur. Paulus etiam hunc hydromelum uocat.

Hydromelum.

Caput XIX.

Fit hydromelon duabus mensuris aquæ coctæ, & sub caniculæ tydis insolatæ, additis ad unam melomelitis, facti ex cotoneis. Vis huius eadem est.

Omphacomelites.

Caput XX.

Omphacomelitis faciendi ratio hæc est: Acerbæ uuæ adhuc immaturæ, & tribus diebus insolatæ exprimuntur, & ad ternas succi partes, mellis optimi despumati singulæ partes adijciuntur: & insolatur in uasa transfusum. Vim reprimendi ac refrigerandi habet, stomachicis cœliacisq; conuenit, usus post annum est.

Apjtes.

Caput XXI.

A *Fr* & *pyris*, perinde atq; *cotoneis*, uinum, ap̄tes nomine, sed ita ut pyra non magnopere maturescant. Ex filiquis etiam, *mespilis*, *forbis*, simili modo temperatur. Omnia hæc genera acerba sunt, & adstringunt. Stomacho utilia sunt, atq; intestinas fluxiones cohibent.

Oenanthinum. Caput XXII.

F *It* è feraci uite syluestri, quod uocatur *oenanthinum*: Sicci flores minis duabus musti cado macerati, post triginta dies mutantur, mox colatum uinum reconditur. Facit aduersus stomachi imbecillitatem, cibi fastidia, *cœliacos* & *dyfentericos*.

Rhoites. Caput XXIII.

F *It* è puticeis malis maturis, quod rhoiten nomināt, succo expresso ab acinis eorum, quibus lignosus nucleus abest, apyrena uocant, ac decocto ad tertias, & ita reposito. Efficax est contra fluxiones internas, & febri cum alui profluuij exortam. Stomacho utile. adstringit aluum, & urinam mouet.

Rhodites. Caput XXIIII.

R *Hodites* sic fit: Rosarum siccarum tusarumq; minam linteo lo deligatam in sextarios octo musti demergito, & post tres menses, defæcatum uinum trās fundens recondito. Vtile ijs qui febricarent, & ad stomachi coctiones, & dolores à cibo potum, & contra humidas aluos, & dyfenterias. Fit quoq; ex succo rosarum, addito melle, quod rhodomeli uocant, quod arteriæ scabritijs conuenit.

Myrtites. Caput XXV.

B *Myrtites* fit, baccis nigris, quæ maturitatem excederint, tussis, & organo expressis. Aliqui ad tertias coquunt. Alij baccas prius sole torrēt, & quaternis sextarijs contusarum, ternas aquæ heminas adijciunt, & uini ueteris parem modum postea exprimunt, & seruant. Magnopere astringit stomacho utile. fluxionibus uentris ac stomachi prodest: & contra intestinas ulcerationes, & profluuiā, denigrat capillos.

Myrsinites. Caput XXVI.

M *Yrsinites* sic temperatur: Rami nigri myrti cum suis baccis & folijs tussis, decem minarum pondo, in tribus musti congijs feruescunt, donec duo super sint, aut certe dimidium. id uinum colatum ad usum reconditur. Contra furfures, ulcera in capite manantia, eruptiones papularum, gingiuas, tonsillas, & purulentas aureis efficax est. sudores sistit.

Lentiscinum & terebinthinum. Caput XXVII.

L *Entiscinum* similiter ut *myrsinites* temperatur, nec secus *terebinthinum*. Namq; bacciferi eorum rami sumi debent. Similes insunt uires. adstringunt stomacho accommodantur, & defluxionibus intestinorum, uescicæ, & stomachi, & sanguinis profluuij, ulcera omnia fluxionibus obnoxia, fotu ad cicatricem perducunt. Fluxiones uuluarum ac sedis, in seissione cohibent.

Palmeum. Caput XXVIII.

P *Almulas* maturas, quas uocant *chydras*, in urceolum imo pertusum, & obstructum picata arundine, demittito: lino foramen sit obrutum, & quadragenis sextarijs ternos aquæ congijs infundiro. quod si ipsum ita dulce esse non libeat, quinque congijs infudisse satis est. post decem dies detracto ab arundine linteo, assumito uinum crassum & dulce, & reposito. Suaue illud quidem, sed capiti noxiū. contra fluxiones, propter adstrictoriam uim, efficax. stomachicis, *cœliacis*, sanguinem expuentibus conuenit. Aliqui idem addita aqua iterum capiunt, & tertio, quarto, quinto, sextone faciunt, quod tandem acore utiatur.

Carorchites.

LIBER QUINTVS.

Catorchites.

Caput XXIX.

Catorchites, aliquibus sycites uocatur, in Cypro fit, ita ut palmeum. sed hoc interest, quoniam pro aqua tantundem humoris adiungunt, in quo recenter preserta uinacea maduerint. Caricae quae chelidoniae aut phoeniceae appellantur, praesertim nigrae macerantur, uti diximus, & post decem dies humor excipitur. atque iterum aut tertio, idem modus aquae in qua uinacea maduerint infunditur. similimodo in tercedente spacio, quarto aut quinto assumitur. demaceratarum liquor non secus acorem contrahit, & acetum usum praebet. Id tenue est, status gignit, stomacho aduersatur. fastidium parit. aluo tamen prodest. urinam ciet, menies trahit. lactis ubertatem facit. uitiosum sanguinem creat, & elephantiasin adfert, ut potio quam xytho appellamus. Aliqui sex amphoris, decem salis sextarios adiungunt. Alij muriae amphoram, quod non facile uitatur, & aluo idoneum fore censent. Alij thymum & fenuculum imo subiungunt, & caricas sepeponunt: & ita uicissim, donec uas expleuerint. Fit & sycomoritis eodem modo uinum, sed in acetum acre degenerat, quoniam non ita praeualet uis eorum, ut fluentis liquoris dulcedinem retinere possit.

Resinatum.

Caput XXX.

Resinatum uinum populatim factitari solet. copiosum in Galatia: quoniam uinum illic coacescat, uua non maturescens, ob caeli algorem, nisi picea resina temperetur. Resina autem cum cortice tunditur, & amphorae dimidiata hemina permiscetur. Aliqui ubi effertur, excolant, separantes resinam: alij relinquunt. Hec uina uetustate dulcescunt. Omnia capitis dolorem, & uertigines faciunt. concoctionem tamen adiuuant urinam ciet, tussientibus, ac destillatione uexatis conueniunt, item coeliacis, dysentericis, & hydropicis, & foeminis fluxione uuluae laborantibus, altis exulcerationibus infunditur. In hoc autem genere nigricans magis albo confringit.

Strobilites.

Caput XXXI.

Strobilites fit maceratis in musto nucibus pineis, recentibus, fractisque, praebetque resinati effectus. Si quis madefactas nuces pini musto decoquat, potum assatim conuenit ijs qui tabitudine conficiuntur.

Cedrinum.

Caput XXXII.

Cedrinum, iuniperinum, cupressinum, laurinum, pineum, aut abiegnum, similiratione fiunt. Diuisos recenter ramos, cum fructum addit, aut soli, aut balneo, aut igni, admouere oportet, uti confudent, congiosque uini minam unam permiscere, & post duos menses transfundere, & antequam recondantur, insolare. Factitiorum uinorum uasa impleri debent: namque non plenis uasis, uina in acorem corrumpuntur. Medicata autem uina, recte ualentibus insalubria. Omnia excalfaciunt, urinam ciet, & substringunt. Laurinum tamen uehementius excalfacit. Fit quoque de fructu cedri maioris uinum, congio musti adiecta tusarum baccarum selibra, diebus quadraginta insolari debet, & defaecatum in uasa transferri. Fit etiam uinum de baccis iuniperi, non aliter quam cedrites, & ad eadem ualens. Cedrites hoc modo fit. Cedriam dulci aqua lauant, & singulas amphoras singulis cyathis diluunt, & ita musto replent. Hoc genus uini excalfacit, extenuat, tussi antiquae utile sine febre. peccoris laterumque doloribus, torminibus, uentris & interaneorum ulceribus, purulentis excreationibus, mulieribus uuluae causarijs, hydropicisque, facit aduersus uentris tineas & horrores, contra uenenatos ictus auxiliatur, serpentes necat, aurium doloribus instillatum medetur.

Picatum.

Caput XXXIII.

Picatum ex liquida pice & musto temperatur. Picem autem primum marina aut maria tantisper eluere oportet, dum inaluerit, & syncera maris aqua defluat, mox aqua dulci proluenda. congios octo musti, uncia picis una aut altera adiungitur, ubi effertur & constiterit, in uasa diffunditur. Hoc genus uini excalfacit, conco-

Aquit, purgat, abstergit, utile doloribus pectoris, alui, iecinoris, lienis & uulua, si sine febre sint, ueteri rheumatismo, exulcerationibus in altum recedentibus, tussi, suspirijs, concoctionibus tardis, inflationibus, & luxatis, praesertim in succida lana impostum.

Abinthites. Caput XXXIII.

Abinthites faciendi ratio euariat. Aliqui enim duodequingenta sextarijs Italicarum amphorarum, admistam abinthij Pontici libram decoquunt ad tertias: & ubi infuderint sex aceti sextarios, & abinthij selibram, ac diligenter permiscuerint, diffundunt in uas: dumq; conqueuerit, defecant. Alij abinthij minam in amphoram demittunt, tufamq; & raro linteo deligatam, in cado musti macerant, binis mensibus. Alij abinthij quadrantem, alij trientem, & nardi Syriacae, cinnamomi, casiae, floris iunci odorati, calami, elatae, palmarum, singulos sextantes iniiciunt in metretam musti, & tundentes prius pila, obstructo uasis spiraculo, binis ternisue mensibus dimittunt: postea defecatum uinum transfundunt ad usus. Alij addunt in musti cadum, Celticae nardi drachmas quatuordecim, & abinthij drachmas quadraginta, linteo inuolutas, & post quadragesimum diem elutriant. Alij in senos sextarios musti, abinthij libram, & siccae pini resinae sextantem immittunt, & post decem dies excolant, & reconducunt. Vtile est stomacho, urinam cit, tardam concoctionem accelerat, hepaticis, regio morbo, & renum uitij auxiliatur, fastidia discutit. Ijs prodest quibus stomachus negocium exhibet, ualet contra longam praecordiorum distentionem, & inflationes, teretesq; uentris tineas, & remoratos menses, contra hausta ixiæ uenena quamplurimum potum, & uomitionibus redditum, auxiliatur.

Hyssopites. Caput XXXV.

Hyssopites est Cilicio hyssopo maxime laudatur, sitq; similiter, foliorum hyssopi ruforum libra in amphoram musti coniecta, linteolo raro, cum quibusdam lapillis, folia inuoluuntur, ut degrauius pondusculo fasciculus fidat. uinum post quadraginta dies defecatum elutriatur. Contra pectoris, laterum, & pulmonis uirtia, ueterem tussim, & suspiria prodest, urinam cit, torminibus & horribus febrium circuitu repetentibus auxiliatur, menses mouet.

Ex diuersis plantis facta. Caput XXXVI.

Simili modo chamaedrytes fieri solet. Excalfacit, discutit, conuulsis, regio morbo, uulua inflationibus, tarda concoctioni, incipienti aqua inter cutem, subuenit. Inueterascens melius redditur. Stechadites non secus temperatur. Congijs sex stechadis minam addere oportet. Crassitiem, inflationes, laterum, neruorumq; cruciatus, & perfriktiones discutit, comitialibus commodè datur, cum pyrethro & sagapeno. Fit ad eadem acetum est stechade herba, ut paulò antè diximus, aceto macerato, quod eisdem implet effectus. Fit uinum est betonica, quam cestron psychotrophon appellant, herbam semine maturo praegnantem, cum suis ramulis minae pondo, congijs duobus uini macerant, & post septimum mensem transfundunt, ad multa interaneorum uirtia, ut frutex ipse, pollet. Erut in uniuersum dicatur, fastitia uina sibi misturarum uires adsciscunt, quare non difficile fuerit, ijs qui illarum naturas norint, uinorum uires coniectura quadam cōsequi, ueruntamen uinorum usus febricantibus abdicandus. Fit etiamnum est betonica acetum ad eadem uirtia utile. Tragoriganites fit quaternis tragorigani drachmis linteolo colligatis, in quaternos musti sextarios coniectis, & post tertium mensem transfusis. Prodest torminibus, uulsis, ruptis, laterum doloribus, spirituum discursationi, & gris concoctionibus. Enapis fit uinum, nomine bunites, drachmis duabus tufi napi in sextarios duos musti additis, & cæteris eodem modo factis. Prodest stomachicis, & dimicatione, aut longo equitatu fatigatis. Digamni drachmas quatuor macerato quaternis musti sextarijs. Facit aduerius stomachi fastidia, menses, & purgamentum à partu subducit. Marrubij adulti folia tundito, & sextarios octo in musti metretam demittito, & reliqua consimiliter facito. Conuenit hoc uinum pectoris uitij, & omnibus quibus

quibus marrubium. Thymi tusi & cribrati uncias centum linteis colligatas, in amphoram musti adijcito. Valet contra ægras coctiones, fastidia, dysenteriam, nervorum & præcordiorum dolores, hybernos algores, & uenenata animalia, quorum morsus frigus insequitur, aut putrescit locus. Simili modo è iatureia uini fit, quod eadem quæ thymites præstat. Sic quoque organites ex heracleotico origano conficitur similiter cum supradicto. Facit eadem quæ thymites. E calamintha, pulegio, & abrotono uina sunt eodem quo thymites modo, profunt stomachicis, cibum fastidientibus, & regio morbo, quod urinam moueant. Fit item è conyza uinum, contra uenenata ante alia efficax.

Aromatites.

Caput XXXVII.

Aromatites ita fit: Palmæ, aspalathi, calami, nardi gallici, singulorum quatuor sextarios sumito, postquam contriueris, passo subigito: coactus ingentibus offis, & in sextarios duodecim austeri multi deiectis, operculato uase, quadraginta diebus quiescere finito: deinde ubi faece expurgatum fuerit, recondito. Alia eius ratio: Calami uncia, phu drachmæ septem, costi drachmæ duæ, nardi Syriaci drachmæ sex, casia uncia, croci drachmæ quatuor, amomi drachmæ quinq, asari drachmæ quatuor: omnia simul trita & linteis colligata in cadum musti demerguntur, & postquam uinum deferbuerit, transfunditur. Facit ad pectoris, & laterum, & pulmonis dolores, difficili urinæ, horroribus, retardatis mensibus, atque his qui per huiusmodi iter faciunt, potum conuenit, pituitæ crassitiem extenuat, colorem alit, somnū conciliat, dolorem finit, renum & uesicæ uitijs auxiliatur.

Ex diuersis odoramentis facta.

Caput XXXVIII.

Fit & uinum ad destillationes, cruditates, tussim, inflationes, & si humor in stomacho coe. myrrhæ duæ drachmæ, piperis candidi drachma una, iridis drachmæ sex, anisi drachmæ tres, omnia plenius tusa & linteolo inuoluta in sex uini sextarios conijciuntur: uinum post triduum colatur, & in lagena reconditur. Datur post deambulationem, mera culum, cyathi unius mensura. Fit quoque nectarites ex helenio herba, radice sicca pondo quinq, drachmarum linteolo colligata, & in congios sex musti addita, & post tres menses effusa, facit ad stomachi & pectoris uitia, urinam pellit. E Syriaca nardo, & Celtica, malabarbroque uinum facitatur, hac ratione: Singulorum selibram in binos musti congios mittito, post menses duos colato, datur cyathus unus cum tribus aquæ. Hoc uinum efficax est contra uitia renum, hepaticos, regium morbum, & urinæ difficultatem, prodest stomachicis, atque his quos pallor decolorat. Alij unciam aut sextantem acori, & Celticæ nardi quadriantem, in musti amphoram adijciunt. Asari quadrantem in senos musti sextarios itidem demittito: id uini genus urinam ciet, hydropicis, & regio morbo laborantibus, hepaticis, ischiadicisque conuenit. Radicis syluestris nardi recentis & trita cribrataque bessem in congiu musti conijcito, duos menses quiescere finito. Vtile est hepaticis, difficili urinæ, inflationibus, stomachicis.

Ex diuersis herbis facta.

Caput XXXIX.



Radicis dauci contusæ drachmas sex in musti amphoram imposito, & similiter transfundito. Facit ad dolores thoracis, præcordiorum, & uulvæ. menses pellit, ruptus ciet, & urinam. prodest tussi, ruptis, uulvisque. Salviæ unciam in musti amphoram, quod idem cum cerauius est, mittito. Valet contra renum, uesicæ, & laterum dolores, reiectiones sanguinis, tussim, rupta, uulsa, & suppressos menses. Panacis unciam in musti congiu mittito, & transfundito. Prodest ruptis, uulvis, contulis, orthopnceæ lienis crassitiem extenuat, contra tormina, coxendicum dolores, efficax est, tardas concoctiones accelerat, menses & partus extrahit, quæ inter cutem, & serpentium ictibus auxiliatur. Vina ex aceto

A & dulci radice consimili modo sunt. Oportet enim singulorum uncias octo in fœnos congios mittere, tribus mensibus macerare, mox in uas transferre. Faciunt ad pectus, & latera, & urinam mouent. Seminis apij recentis, maturi & cribrati uncia nouem in linteis colligata in musti amphoram demittantur. Appetitum excitat. sto machicis, & difficili urinae auxiliatur, faciles spiritus facit. Ex feniculo, anetho, & petroselino, uina eodem modo fiunt, & ad eadem efficacia. Fir & è flore salis uini, multo ad purgandum efficacius, quam uinum aqua marina temperatum. Fauces, uentricam, renes, & stomachum infestât: quare neq; in secunda, neq; aduersa ualitudine prodest. Fit etiam uinum quod phthorium uocant, quoniam partus necat. & abortus facit, ueratro aut scammonia, aut syluestri cucumere, iuxta radices uitium satos: siquidem uites sibi illorum uires adsciscunt. Id uinum partus enecat, datur ieiunis mulieribus, quæ antè uouuerunt, cyathorum octo mensura, dilutum. Ramorum thymelææ cum suis folijs & fructu triginta* drachmas mittito in congios tres musti, & leui igne coquito, donec congij duo supersint, defæcatumq; recondito. Aquosa purgat excrementa, & lienem abluunt.

*decem Hæmol.

Chamaedæa dum floret, cum folijs tusa & cribrata decem drachmarum pondere, in musti congiu additur. Post duos menses uinum in uas transfertur, aqua inter cutem, hepaticis, & lalsitudine contractis, efficax est. item mulieribus, quæ à partu ægre purgantur. Chamæpitynum simili modo fit, ad eadem conueniens. urinam quoq; ciet. Libram radicis mandragoræ concidito, segmenta lino trañcito, quod se libram æquat in musti cadum dimittito. ibiq; esse finito ad menses treis, deinde transfundito. Media potio, hemina dimidium bibitur, passo in duplum addito. Asunt heminam uini congio mistam, potu saporem adferre. cyathus unus cum sextario uini potus, enecat, mediocris usus eius, doloris sensum adfert. fluxiones in crassat, olfactu, potuq; & cum iaditur, idem præstat. In congiu musti aqua marina diluti, drachmas duodecim nigri ueratri triti in linteis mundo, mittito: dumq; effuerit, in marina aqua congios quatuordecim aut quindecim, ubi pleniuscule frigeris, inijcito, post aliquot dies colato, & utitor. Dato cyathum unum ex aqua balnei in potu, ad aluum soluendam, ijs qui euouuerunt à cæcra. Alia ratio: Veratri drachmas uiginti, iunci odorati uncias duodecim, spica Syriacæ uncias tredecim, cribratas & linteis colligatas in septem uini Coi sextarios diebus quadraginta macerandas indito, postmodum colato, dabis in potu sesquiheminam. Aliter: Decoctæ marinæ aquæ ex alto petita sextarios duodecim, ueratri candidi libras sex, in musti amphora quadragesimo die quàm madefeceris, colato, & utitor. Alia ratio: Veratri drachmas duodenas, & aphronitri quaternas, in senis musti sextarijs, diebus quinisdenis maceratis, mox colato: & semestri exaeto, utitor. Id uini genus abortus facit, & partus necat. Aut uuas in sole siccatas imposito in musto metretam (implet autem metreta congios duodecim) & gypsum in uinū mittito pondo drachmarum uiginti, & bi duo residere finito, conijcito ueratri nigri drachmas triginta, iunci odorati, calami, singulorum drachmas triginta, baccharum iuniperi sextarios duos & trientem, myrrhæ & croci singulorum drachmam, inuoluens linteolo diebus quadraginta appendito: postea colato, dabis heminas treis aut duas dilutas. Purgat à partu & abortu fœminas, fœtus extrahit, contra strangulatus uulua efficax. Scammonites sic fit: Radicis scammonia: per menses effusa, trita, & linteis colligata drachmas quinque in musti congiu mittito, ad dies triginta. Aluum purgat, bilem & pituitam extrahit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Actuario quoq; uinorum uarie conditura, ut abstinentes saluatum, & cæte. Sed hæc longius prosequi superfluum uidetur, cum partim hodie negligantur, & de his omnibus diligentissimè scripserit Arnoldus Nouicomensis, cuius libellus de uinis medicatis, propediem à nobis sub incudem reuocatus, ac nouis scholijs illustratus repurgatusq; in lucem prodibit.

Metallica omnia, & primum cadmia. Ca. XL.

EX cadmia generibus optima est Cypria, botryitis nominis, densa, modicè grauis, & in leuitatem magis declinans racemosa



racemosa facie, colore spodi, quæ fracta cinerulenta est, & æruginosa. Proximâ A
habetur foris cœrulea, intus candidior, internatis uenarum discursibus onychitæ
lapidi similis, cuiusmodi sunt quæ ueteribus metallis effodiuntur. Quædam etiam
pla codes, id est, crustosa, dicitur, segmentis quibuidam perinde quasi zonis cin-
cta, ob quod eam zonitin appellauere. Alia ostracitis nominatur, gracilis, & magnâ
ex parte nigra, sed quæ testaceam faciem habet, terram amplexa est. Improbatur cæ-
dida. Oculorum medicamentis botryitis nomine, & onychitis, utiles: reliquæ ad
emplastra, & farinas quæ cicatricibus inducendis inspurgantur, ad eadem Cypria
prodest. ex Macedonia uero, Thracia & Hispania delata, improbantur. Cædmiæ
effectus adstringere, caua explere, sordes expurgare, exiccare, corporis meatus in-
fercire, ex crescentia in carne coërcere, crustas creare, & ulcera quæ cacoethe uocan-
tur, ad cicatricem perducere. Gignitur cædmiæ ex ære in fornacibus candente, fuli-
gine egesta statu, & lateribus camerisq; fornacum inhærente. Prægrandes autem
ac ferreæ sunt rudes, ab officinis appellatæ acetides, per summa fatigia connexæ
& concameratæ, ut quæ ab ære iactantur sursum corpuscula coherant, & inibi de-
tineantur, quæ cum ipsius insident, in corpus concresecunt, & modo genus unum
eius, modo duo, modo omnia perficiunt. Extrahitur & cædmiæ in Cyprio monte
qui Solis incumbit, cremato lapide cui pyritæ cognomen est, in quo etiam marte
quædam quasi uenæ chalcidis, misyos, forcos, melanterias, cærules, chryso collas, a-
tramenti lutum, diaphrygisq; inueniuntur. Nec desunt qui cædmiam in lapidum io-
dinis inueniri tradant, falsi quadam lapidum cognatione qualis inuenitur & apud
Cumas la pis, nullam sui uim ostendens. li eo deprehenduntur, quod sunt cædmiæ le-
uiorres, nullumq; alienum mandentibus saporem exhibent. commaneducatus item
lapis, dentes ostendit cædmiæ, utpote cum cedat, esum non respuit. Alio autem die
seerni possunt argumento: Cædmiæ in farinam detrita, & aceto tubacta, atq; in so-
le siccata, coit: quod in lapide non accidit. Item tritus & igni appositus lapis, pro-
fusil, & fumum igni similem eiacular. cædmiæ uero quicquid manet, fuliginemq; lu-
teo colore aut æreo splendentem expuit, uario zonarum discursu. Insuper lapis i-
gnem expertus, atq; refrigeratus, colorem mutabit, ac leuior multo fiet, sed cædmiæ B
nihil euariat, nisi quis eam multis diebus cremauerit. Fit & in argenti fornacibus
candidior, ac minus ponderosa, sed uiribus nequaquam comparanda æraria. Vri-
tur cædmiæ superior carbonibus obruta, donec translucida spectetur, & ferri ster-
coris modo bullet, mox extinguitur uino Amniæo, quæ ad emplastra præparatur:
sed quæ ad psoriarum medicamenta præparatur, aceto. Alij hoc modo exustam con-
terunt in uino, rursumq; fistilicrudo torrent, donec pumicosa uideatur: iterumq;
tritam ex uino, tertio urunt, donec prorsus in cinerem redigatur, nihil scabritiæ re-
linens. hac spodi uice utuntur. Lauatur autem in mortario trita, effusa subinde a-
qua, dum sordidum nihil emergat, dein coacta in pastillos reponitur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Metallica (ut Iano Cornario medico doctissimo placet) appellantur medicis, quæ in metallis, aut sponte
natura, aut per fornacem gignuntur. Itemq; ea quæ ex his ipsis ab hominibus per quencunq; modum fiunt, ut
est cerusa, pforicon, sandix, fucus, autore Gale lib. 9. de simp. Videntur autem ipsa Metalla, ab inquirendo et
perscrutando, hoc est, ἐν τῷ μετὰ λαβῇ, appellata esse. Eorum enim gratia in uiscera terræ inus, & in
fede manuum opes querimus, ut Plinius ait: Quanquam idem Plinius, non inde appellata metalla Græcis pu-
tare uideatur, uerum quod non solitarie, sed simul, & cum alijs eorum uenæ reperiuntur, dictaq; ob id με-
τὰ λαβῇ, quod cum alijs, hoc est, μετὰ ἄλλοις, uel μετὰ τῷ ἄλλῳ, id est, post alia reperiatur. Plinij uerba lib.
33. cap. 6. hæc sunt. Et ubicunq; una inuenta uenæ est, non procul inueniuntur alia, hoc quidem in omni frere ma-
doceat, quod perscrutando & effodiendo in aliorum uicinitate maxime contingit. Habent autem Metallica
nim medicamentosa magna sui parte maximam, quædam etiam deleteriam, ut coniectura sit magna, ex his
uapores caloris interni uelatos plantarum uarietatem non parum iuuare. Ne putes massam tantam frustra
a Deo Maximo conditam, & ociosam, in quibus facultates naturales etiam omnes inesse soli christe testan-
tur, nec meo iudicio male sentiant, quod oculus in multis aperte uidet: licet plumbo metallorum soli incre-
mentum concedat Galenus.

Cædmiæ botryitis hodie dicitur, Tutia officinis. Germanis Grauer Augsteyn, quidā corruptè Cædmi-
am Climiam, & Catimiam uocant.

Naturalem

A Naturalem Cadmiam hodie uocant, Lapidem Calaminarem. Germani Galmei, quo æs tingunt, ex rubro in albidum (Zupffer in Messing) ex quo lebetes fiunt. In præsentî capite uidentur quædam deesse, quæ ex Serapione restitui possunt.

Pompholyx. Caput XLI.

Pompholyx specie sola, non genere, à spodio distat. Siquidem spodos nigricat, & plerumq; ponderosior est, palearum pilorumq; plena, quasi purgamentum quoddam, quod ab ærariarum officinarum pauimentis & fornacibus euerritur. pompholyx uerò pinguis est, & candida, usq; adeo leuis, ut in auras euolare possit. Cuius duo fluxerunt genera: unum ad æris colorem uergens, subpingue: alterum magnoperè candidum, summamq; leuitatem nactum. Candida sit pompholyx, quod candidissime. mulatius insparserint: namq; tenuissima * fauilla, quæ effertur, in pompholygem coit. Cæterum pompholyx non ex æris modo materia & fabrilî industria factitatur, sed est cadmia quoq; ad gignendam ipsam, eximie follibus proflata. Cuius faciundæ ratio hæc est: In domo gemina contignatione operata fornax extruitur, iuxta quam mediocris fenestra ad tabulatum à supernis partibus pateat. domicilij paries fornaci proximus, tenui foramine ad fornacem usq; perforetur, ad excipiendam foli cula altera huic coniuncta sit, in qua & folles & flator suo munere fungantur. deinde carbonibus in camino succensis, assidens artifex cadmiam particulatim fractam inspargit, à locis supra infurnibulum extructis. idem negocium obit infernè artificis minister, simulq; carbones adijcit, usq; dum indita cadmiæ copia prorsus absumatur, itaq; egesta sustitu tenuis pars & leuis materiæ in summam domum euolat, & parietibus, tectis, fornicib; adherescit: conflatum autem inde corpus, inter iniria erumpentibus aquarum bullis simile prodit, postea minus incrementum capessens, gloimusculis uellerum simile redditur ponderosius autem in ima loca se recipit. sed hoc B fornacibus offunditur, illud domus pauimento coheret: quod tenuiore deterius existimandum est, ideo quod multum terræ collegerit, & spurcicia in aceruatione reterciatur. Sunt qui hoc modo tantum fieri spodium arbitrantur, de qua antedictum est. Optima creditur Cypria, quæ accepto aceto halitum æris præstat, colore aliquantum piceo, sapore cæni horrido, & si fraudem non experta flagranti carbone inferuescit, ær eum colorem contrahit. Antedictis autem notis diligenter attendendum est. Siquidem à nonnullis adulteratur taurino glutine, ouillo pulmone, aut marino, aut crematis grossis, & quibusdam consimilibus. quod faciliè cognitu fuerit: quippe nihil in ijs probandis inuenietur eorum quæ antè dicta sunt. Pompholygem in commune ita lauari oportet: Ligatam linteo mundo modicèq; raro, aut siccam, aut aqua respersam, in labellum demittito, quod imbrem contineat, & huc atq; illuc fasciculū deferens, immergito: ita enim limosa pars rursus ac utilis effluet, & omne sedimentum in linteolo remanebit, postea residere sinens, aquam cum cinere colis incernito, & nouam infundens, agitato, & effundito: mutata tãtis per aqua, & colata, dum arenosi nihil fidat, demum aquam exprimito, & siccatum cinerem recondito. Alij, quantum maximè fieri potest, siccant, & manibus in aqua conterunt, dum mellis crassamentum imiretur. deinde linteo faucibus excepturi uasis obtentato, aut laxius illigato, colant, & quo facilius transeat, infusa per linteum largiore aqua, cinerem conturbant. mox spumofum, quod traiectum est, & supernat uas, concha excipiunt, & fictili nouo ad usus recondunt, quod uerò resedit, sensim criodosa fidere patiuntur, & in uas aliud excolant. hoc identidem faciunt, donec cinis merus & arenæ expers inueniatur. Alij paulatim integram in aqua respergunt, arbitrati arenas lapillosq; suo pondusculo degravatos, pessum ire, pilos autem & paleas leuitate sua in sublime attolli. cæterum cinerem medium separant, & in pilam coiectum, ut cadmiam, eluunt. Quinetiam lauatur uino Chio aqua marino diluto, modis quos suprà diximus. & ita redditur adstringentiôr, quàm aquis elota. Vis pompholygis astringere, refrigerare, explere, purgare, obstruere, & aliquantum exiccare.

ore (* inter medicamenta numeratur, quæ leniter crustas obducunt.) Quod si spodo- A
don torrene libet, diligenter tritam & irrigatam aqua, colliges in pastillos, fictiliq; * Quidam hæc
nouo, subiectis leuibus prunis, orbiculos continuo uersabis, dum assiccati fulue- non habent.
scant. Neq; ignorandum, ex auro, argento, plumboq; fieri spodium: uerum post Cy-
prium, plumbum maxime commendatur. Quoniam spodos sæpè numero desidera-
tur, necesse est ostendere, quæ simili uirtute pollcant, ut in spodij locum suffici pos-
sint, antispora uocant, quoq; modo sumi debeant. Folia itaq; myrti, cum floribus
& baccis immaturis, in fictile crudum coniecta, indito operculo continua forami-
na habente, uruntur fornacibus, donec figlinum percoquatur. iterum in fictile ali-
ud crudum transferuntur: quod ubi perassarum fuerit, exempla lauantur ad usus.
Idem quoq; fit è termitè syluestris oliuæ, si habeatur: sin secus, fatiuæ cum suis flo-
ribus, aut malis cotoneis dissectis, & detractis ossibus, aut gallis, aut laceratis lin-
tho, aut lentisco, cenanthe, aut mollibus rubi folijs, uel è buxi coma, uel pseudocype-
ro cum flore. Alij ficulneas frondes in sole antea ficcatas, eodem modo parant ali-
j taurinum gluten, ali- succidas lanas asperas, pice aut melle irrigatas, quæ omnia in
spodij uicem usurpantur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Quatenus Pompholyx à spodio seu spodo differat, hoc loco Dioscorides, Galenus & simp. phar. docent.
Vnus enim generis Dioscor. esse ait, specie tantum differre. Galenus autem neq; spodio neq; antispodio, quod
eandem uim habeat, se usum esse dicit, propterea quod semper pompholyge abundat. Ocularij medici hodie
uulgo Tutiam uocant, quamquam ali- Cadmiam hac appellatione accipiant, ut supr. à diximus. Sed in pharma-
copolijs nihil appellatur, unde etiam dictum uulgatum: Nihil oculis commodissimum esse, quo ambiguitas cõ
pompholyge modicis oculis non multis medicamentis contingendos inuauit. Esiq; nil alium ap-
pellatum, uera pompholyx. sicut gescum aut nigrum dictum. Verum spodium metallicum à Dioscoride &
Galeno descriptum. Nam quod alijs hodie spodium officinæ uocant, antispodium est, uulgoq; ebur usum esse
creditur. Aut cenna radicum canarum exustarum cinerem spodium esse dicit. hic animaduertendum Diosco-
B
spodium non fictitium, sed metallicum & fissile esse, nec intra corpus sumendum.

Aesustum.

Caput XLII.

A Esustum probatur rubrum, & quod contritu colore cinnabarim imitetur.
nigrum uerò plusquam deceat exustum est. Fit autem è clauis solutarum nau-
um, fictili crudo compositis: subperfo sulphure cum sale pari, omnibus uicissim in
spartis, fictile, circumlito figulari creta spiramento, fornacibus inditur, donec figli-
num percoquatur. Quidam pro sulphure & sale alumen inspargunt. Alij sine sul-
phure ac sale, fictili multos dies urunt. Alij sulphure solo utuntur, fuliginem tamen
excitant. Alij oblitos scissili alumine clauos, cum sulphure & aceto, fictili crudo
cremant, ali- in ænea olla aceto resperfos urunt, & iterum actertio idem efficiunt,
postea recondunt. Principem locum tenet, in Memphide combustum: proximum
in Cypro. Adstringit, exsiccat, reprimi, extenuat, attrahit, ulcera purgat, & ad cicat-
ricem perducit, uitia oculorum emendat. ex crescentia in carne consumit. nomas
cohibet, uomitus ciet, cum hydromelite potu, aut cum melle delinctum, illitumue.
Lauatur ut cadmia, mutata quater die aqua, donec nulla prorsus fordes emergat. * splendor em-
Aeris recementum, ster cusiue, quam scoriam uocant, eodem modo lauatur, & ean-
dem uim, sed imbecillior, habet.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Aesustum Ruspfersteyn / Gebraucht Artz / astringit, reprimi, acere est: ob id tenuat, ulcera purgat, sic-
eat, cicatricem inducit carni duræ, in molli lauandum &c.

Flos

Caput XLIII.

F Los æris, quem nonnulli clauorum ueteru psegma, quasi resegmentum aut segment-
tum, nominant, optimus est friabilis, in attritu fuluescens, milij effigie, & nu-
mero, breuis, ponderosus, modicè splendens, atq; constringens, qui delinctat æris
scobem non recipit, quæ sæpe adulteratur. Sed id facile deprehenditur, cum dentiu
alliss

A illifu dilatantur ramenta. Fit autem, cum æs fornacibus fufum, in receptacula dilabitur, per cola fistularum ad ea pertinentium. tum huic negotio additi ministri, fordes expurgantes, aquam clarissimam infundunt, refrigerandi proposito. itaq; repentino concretu, ac addensatione, uelut expuitur & erumpit antedictus flos. Adstringit, & excrementia coarctet, offusam oculis caliginem emendat, sed magnopere mordet. quaternum obolorum pondere datus, crassum humorem extrahit, carnosum narium & sedis uitia absumit, eruptiones papularum cum uino cohibet. Candidus contra diuturnas aurium grauitates tritus, in eas per fistulam statu impellitur uuam, to fillasq; reprimat, farina eius cum melle admota.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Turpi errore quidam hodie arbitrantur æris florem esse, nostrum æs uiride, non animaduertentes æris florem, ut hic Dioscorides scribit, cum æs in fornace fufum, in receptacula delabitur per canales, ministris aquam clarissimam, ut refrigeretur, affundentibus. subito exilire, nilij effigie breuis, grauis, splendescens, cum nostrum æs uiride potius æris rubigo sit, ut infrà audies. Galeno adulteratur æris squama, ut limatur.

Squamma æris. Caput XLIIII.

Squamma æris excussa ex Cypris Officinarum clauis, crassa quidem ipsa præstantior, quæ helitis, id est clauaris, nominatur. sed ex uili promiscuoq; ære, aut candido, uitiosa intelligitur: quam, ut potè tenuem & inuolidam, damnamus, maxime approbantes crassam, rufam, præsertim si aceti resperfu æruginem contrahat, Vim habet adstrictoriam, extenuantem, reprimentem, & erodentem. Nomas coarctet, ulcera ad cicatricem perducit, pota ex aqua mulsa, aquam trahit, aliqui farinam subactam, dant in catapotio, additur ad oculorum medicamenta, genarum scabritiam absumit, & fluxiones exiecat. Lauatur hoc modo: Sicca æris squamma expurgata selibra, cum nitida aqua in mortario manu diligenter conturbatur, quousque pressum ierit, abigitur quod subsidit*, & effusa aqua, hemina celestis imbris adiecitur, & distenta manu, squamma, quasi destrigenda sit, uehementer confricatur, dumq; lentorem emittere ceperit, aqua sensim ad sex heminas usq; superinfunditur, terendo ualide, squamma ad latus mortarij colligitur, ibiq; apprimitur, quo facto, expressus humor pyxide ex ære rubro facta, excipitur, hoc est enim uelut flos squammæ, ualens uiribus, & ad ocularia medicamenta cum primis efficax, ininde imbecillumq; quod superest, lauatur donec nullam prorsus lentitiam excernat, & linteo apertum biduo conquiescere finitur, effusaq; extante aqua, ubi siccatum erit, reconditur pyxidicula. Alij ut cadmiam lauant, & reponunt. Squammæ ex acie aut mucronibus decussa, quam uocant stomoma, eadem uis. Lauatur modo simili, & reconditur: sed ad moliendam alui deiectionem, inefficacior est.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Squamma æris, Germa. Zämerschlag/ & Kupferschlag appellatur, differt ab æris flore, quod hæc ui arte excutitur, alter sponte cadat affusa aqua, Probat crassa, ruffa, præsertim æruginosa.

Ærugo rasilis. Caput XLV.

Ærugo rasa fit ijs modis: In cadum, aut aliud consimile uas acetum quam acerrimum infunditur, superponitur inde inuersum æneum uas, præsertim concameratum: sin minus, planum, sitq; obstructum, nullumq; habeat spiramentum, exempto, quo doliolum obturaueris operculo. decimum post diem insidens ærugo deraditur. Aut æris lamina in cadis super acetum ita suspenditur, ne ipsum attringat, & totidem post dies raditur. Aut massula æris, aut lamina una pluresue, uinaceis non recentibus, sed iam acescentibus conduntur, & simili modo uersantur. Quin etiam ex delinata æris scobe æruginem facere licet, nec non è laminis, quibus bracteæ auri conclusæ malleo ducuntur, si quis eas aceto respargat, & ter aut quater uerset, donec æruginem contrahant. Tradunt æruginem in Cypris metallis gigni, lapidibus quibusdā nonnihil æris habentibus, quibus ærugo efflorescit: adduntq; per caniculæ æstus è quodam specu manare: sed illam paucam & optimā esse: hanc speluncis effluentem, copiosam quidem, & boni coloris, sed uitiosam, quod lapides multos

multos collegerit. Pluribus autem modis adulterant aliqui pumice admisto, alij **A** marmo: e, alij atramento futuro. Sed deprehendimus pumicem aut marmor, dum pollice sinistra manus madefacto, æruginis portiunculam altero atterimus: siquidem eam diffundi constat. marmoris autem pumicisq; partes coeunt non dissipantur, demumq; tractatione crebra & humoris complexu dealbescunt, quin & dentium appressu: siquidem sincera cedit, lævis, & sine asperitate. Atramentum uero futurum igne coarguitur, namq; si fictile, aut lamina adulterata æruginē illinatur, & feruenti cinere aut carbonibus incalascit alterutrum, murabitur, rubescetq; id quod atramentum futurum acceperit, quod id usum suapte natura talem sortitur colorem. Aeruginis quam uocant scolociam, duo sunt genera. quædam fossilis est, altera factitia ad hunc modum: In mortario Cypriæ æris dimidiam heminam aceti albi acrisq; pistillo cupreo conterito, donec strigenti crassitudinem imitetur: deinde aluminis rotundi dra chmam unam, cum salis fossitij, translucetis, aut marini quam albissimi, solidiq; aut certe cum nitri paripondere terito in sole, ætuosissimis diebus, sub sydus canicula, donec colorem æruginis contrahat, & concretu strigmentosum fiat ubi autem se in uermiculorum Rhodiæ similitudinem speciem coegit, recodito. Efficax & ualde boni coloris redditur, si duas partes urinæ ueteris cum una aceti adieceris, & alia quæ dicta sunt peregeris. Sunt qui æruginem rasilē, quæ in apparatu non respondit, gummi misto digerant in formas, & ita uendant, quod genus, ut uitiolum, improbat. Fit & quædam ærugo ab aurificibus, mortario & pistillo Cypriæ æris, cum urina pueri impubis, qua aurum ferruminant. Antedicta æruginum genera, uisæ æri omnino respondent, sed magis effectiuæ ualent. Sciendū fossilē scolociam præstantissimam esse: dera sam sequi, postremo loco factitiam, mordacissima tamen est hæc, & magis adstringens. aurificum autem ærugo rasilē respondet. Aerugines omnes adstringunt, extenuant, excalesciunt. oculorum cicatrices emendant. lachrymas cient nomas sistunt. uulnera ab inflammatione tuentur. ulcera ex oleo ceraq; ad cicatricem perducunt, callos & sordida ulcera purgant. cum melle coctæ, callum fistularum erodunt, cum ammoniaco, collyrij modo in eas adactæ, ad gingiuarum autem excrecentias, & extuberationem utiles. magnopere extenuant genarum crassitiem, cum melle illitæ, uerū post illitionem spongia ex aqua calida locus fouendus est. resina terebinthina exceptæ, cum cre & nitro lepras abigunt. Vritur ærugo, quacumq; uelis, minutissimè fracta comminutaq; in fictili patina, flagrantibus prunis superposita: uersaturq; donec se mutet, & colorem cinereum concipiat. postea refrigerata reponitur ad usum. Sunt qui cruda olla eam urant, uti dictum est: sed non prorsus eundem colorem cremata reddit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Aerugo est æris uelut rubigo in æreis uasis, laminis, squamis, scobibus, lapidibus concreta decem diebus aceti acerrimi uapore, aut crescentium uinaceorum contactu, post decussam uel dera sam. Est acris, mordet, detrahit, liquet carnem, etiam duram, digerit, nebonenter siccatur. Adulterandi & adulterata nascendi rationem sciens omitto, quod largæ eius sincera copia toti Gallie & Germanie à mulieribus Monspejulanis suppeditatur. Germani Spangrün. Galli uer degris appellant.

Aerugo uisæ & lota uerno uulnerato prodest, non uisæ autem iusto est mordacior. Ceterum ærugo uermiculata à similitudine ad uermiculorum speciem, dicta est, quomodo etiam Græci *οὐράνιος* *ἰόν* uocant, quem Plinius scolociam dixit. Estq; duplex: altera naturalis, & fossilis, altera artificialis, uelut hoc loco Dioscor. & Plinius lib. 3. 4. cap. 13. docent.

Rubigo ferri.

Caput XLVI.

Rubigo ferri restringit. sistit sceminarum profluuiam admodum: potuq; præstat ne concipiant illita ex aceto, ignibus sacris, & popularum eruptionibus medetur. perquam utilis ad scabritias genarum, reduuias, & pterygia. condylomatis prodest. gingiuas firmat. podagras illita lenit. alopecias replet. Vinum aquaue, in qua candens ferrum sit restinctum, potu coeliacis, dysentericis, lienosis, cholera laborantibus, & dissolutis stomacho auxiliatur. Stercus ferri, quam scoriam uocant, eadem potest quæ rubigo, sed inefficacius. aconito, ex aceto mulso potum, opitularur.

A

NOMINA ET EXPLICATIO.

Rubigo ferri, Eisen roß. Gallis ruilleure defer dicitur. Scoria est omnium metallorum spurcitia, recemenda, et uelut stercus, Germanis Schlacken dicitur: siccatur, sed omnium maxime scoria ferri, leuissime trita.

Plumbum elotum. Caput XLVII.

Lotura plumbi sic fit: In mortarium plumbeum aquam injiciens, pistillo plumbeo terito, donec nigrescat aqua, & limi modo crassescat, aut lutulenta reddatur. Linteolo deinde colato, aquam superinfundens, quo facilius quicquid est resolutum incerni possit. hoc iterum facito, usque dum satis tibi habuisse uideatur. ubi confederit, priore aqua effusa, nouam adiciens, ut cadmiam lauato, donec nulla extet nigritia. postea in pastillos cogens reponito. Quidam scobem mundi plumbi lima, quæ firam, mortario pistilloq; lapideis terunt, aut manibus cum aqua paulatim adiecta fricant, donec nigrescat. mox ubi id pessum ierit, effusa aqua, colligunt in pastillos. nam tritum uehementer, cerusæ simile redditur. Alij elimatæ scobi modicam plumbaginem adijciunt, a firmantes ita elotum plumbum præstantius esse. Potest refrigerare, adstringere, inducere, mollire, explere caua, sistere oculorum fluxiones, & ulcerum excrecentia. sanguinem supprimit. prodest contra sedis ulcera, condylomata, & hæmorrhoidas, ex rosaceo. item, ad ea quæ a græ cicatricem ducunt: & in totum spodij effectus præbet, nisi quod non obducit crustas. Synerum plumbum affricto, marini scorpionis draconisq; plagis auxiliatur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Germanis pley, Gallis plomb. Frigidum humidum, ob id liquor quiuis frigidus (ut oleum omphacinum, rosaceum, melinum, myrtinum, semperuui, cotyledonis, intybi, lactuce succus) in mortario plumbeo, pistillo plumbeo ductus dum crassescat, seipso frigidior euadit, optimunq; fit remedium phlegmonarum incipientium, & fluxionum aliarum, in inguina pedes, articulos alios, & ulcerum rebellium. & cancrorum. Laminæ plumbi lumbis instrata ueneris insomnia sedat, ganglia dissecat illigata. Plumbum usum & lotum ulcera rebellia, chironia, cancrora, carne implet, ac cicatrice tegit.

B

Plumbum ustum. Caput XLVIII.

* Alij, imponentes aceto, igne urunt.

Vritur plumbum sic: Super quam tenuissimas plumbi laminas, fictili nouo inditas, sulphur inspargito: additisq; alijs rursus laminis, interiecto semper sulphure, usque dum uas expleueris, succendito. flagrans autem plumbo, ferrea rude uersato, donec perfecte redigatur in cinerem, nihilq; è plumbo nonustum hæserit: tum demum, obstructis naribus, eximito: alioquin halitus plumbi noxius sentitur. Aut elimatam plumbi scobem in olla sulphure urito. Alij laminas in fictili crudo, ut dictum est, imponunt fornaci, aut foco, & circumlinentes operculum, dato exili spiramento, urunt. Alij pro sulphure cerusam aut hordeum inspargunt. Alij integras laminas imponentes, acri igne utuntur*, & rudicula ferrea continuè mouent, dum in cinerem soluantur. sed difficilis huiusmodi ustio, & si uehementius uratur, contrahit spumæ argenti colorem. magis tamen nobis placet prima urendi ratio. Plumbum ustum lauatur ut cadmia, & reconditur. Eisdem effectus habet, quos plumbum elotum, sed multo acriores. Recrementum plumbi, quod scoriam uocant, optimum est, densum, fractu contumax, cerusam planè representans, nihil plumbosi habens, quod ad luteum colorem accedit, & uitri splendorem imitatur. Eadem quæ plumbum exustum potest, sed magis adstringit. Lauatur in mortarijs infusa aqua, & refusa summa aquæ parte, quæ luteum colorem duxit: idq; sæpius, dum recrementum absumatur. dein ubi confederit crassamentum, aqua effusa, digeritur in pastillos. Molybdoites lapis à plumbi similitudine dictus, respondentè recremento uim habet, & eodem modo lauatur.

Stibium. Caput XLIX.

Stimmi optimum, quod splendidissimum est, modoq; nitedularum emicat, confRACTU crustosum, nihil terræ aut sordidi habens, friabile, quod stibi appellatur, alijs platyophthalmon. Vis eius adstringere, meatus obstruere, refrigerare, excrecentia in carne cohibere, ulcerum ad cicatricem perducere, sordes & ulcera oculorum expurgare.

expurgare. sistit & sanguinem è cerebri membrana profluentem. & ut in uniuersum A
dicatur, uis isto plumbò similis est. priuatim, ambusta igni, in pustulas erumpere nō
patitur, cum adipe recenti illitum, crustosas exulcerationes ad cicatricem perducit.
cum cera & exigua cerusa. Torretur pinrita farina circumlitum, & carbonibus ob-
rutum, donec carbunculetur crusta, exemptumq; restinguitur mulieris lacte, quæ ma-
rem peperit, aut uetere uino. Vritur etiam carbonibus succensis efflatum, quoad i-
gni deflagret. si enim paulò magis concremetur, plumbum fit. Lauatur, ut cadmia
& æs. Sunt qui ut plumbi recrementum eluant.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Stimmi, id est, Stibium, siccat, astringit, oculorum collyrijs liquidis & siccis miscetur, illotum ualenter as-
tringit, lotum soluitur, & naturam assurgit propter rosionis expertem, sossilium melius. Quod enim ostend-
dum, igni coctum est, idq; purius, uel sacculentius & scoriosum. Oleum ex stibio præciosissimum. Mulieres
oculis gratiam stibio conciliant, ipsum palpebris specillo inducentes quoti die, sic ne oculi membranam intus
contingat. Stibium Officinis Antimonium. Germanis Spießglas dicunt: naturale, Rohe spießglas, ar-
tificiale sine stictium, Gelsext spießglas uocant.

Molybdæna, seu Plumbago. Caput L.

Molybdæna optima est flaua, argenteæ spumæ æmula, modicè splendens: cum
teritur, rufa, cocta cum oleo iecinoris colorem trahit. Vitiosa est, quæ ærem
aut colorem plumbeum refert. Gignitur ex auro & argento. Est etiam quædam fos-
silis, ad Sebastianam & Coricum inuenta. Quo in genere probatur, quæ lapidosa non
sit, aut recrementosa, sed nitens & flaua. Vim habet spumæ argenti, aut recremento
plumbi similem, uritur lauaturq; eodem modo, miscetur convenientissimè medica-
mentis, quæ liparas uocant, atq; emplastris minimè mordentibus. carnem recreat,
& ulcera ad cicatricem perducit. glutinantibus tamen medicamentis, aut abster-
gentibus non conuenit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Molybdæna substantia est crassioris, & frigidioris, quàm Lithargyros, non terget tamen, cetera usum B
habet prope eundem in emplastris, licet uarium colorem afferat. Ambo liquantur tardius cum hydrelæo, ce-
larimè oxeleæ.

Molybdæna naturalis, German. Zwyttel dicitur: factura uerò Dedy.

Argenti recrementum. Caput LI.

Recrementum argenti, quod scoriam uocant, aut helcysma, aut encauma, mo-
lybdæna uim habet, quare emplastris quas phæas appellant, additur, ac me-
dicamentis quæ cicatricem obducunt, ut potè cum adstringat, extrahatq;.

Spuma argenti. Caput LII.

Spuma argenti quædam gignitur ex arena, quam molybdin uocant, in fornaci-
bus confusa, donec perfectè igni incandescat. altera ex argento, tertia ex plum-
bo. Probatissima est Attica, secunda Hispaniensis. has sequitur quæ fit Dicæar-
chiæ, id est Puteolis, Baijs, in Campania, & Sicilia: plurima enim hisce locis è flagra-
tibus laminis plumbeis gignitur. Quæ flauo colore splendet, chrysitris appellatur,
omnium optima: quæ in Sicilia, argyritis: quæ ex argento, calabritis. Vis autem
adstringere, mollire, explere caua, excrecentia in carne reprimere, ad cicatricem
ducere, refrigerare, & occludere. Vritur argenti spuma, confractis partibus ad ma-
gnitudinem iuglandium, prunæ superpositis: ita accensa foliis, ut conflagret, ab-
stergitur infidens spurcitia, & reconditur. Aliqui ter aceto aut uino restinguentes,
rursus urunt, & eadem prosequuti, reponunt. Lauatur ut cadmia. Vt argyritidi no-
minata, aut, si desideretur, alteri candor detur, ea in parteis magnitudine fabarum
confracta, chcenicis atticæ mensura, fictili nouo superfusa aqua, addito candidi tri-
tici pari pondere, priuatimq; pugillo hordei, linteolo puro, raro, anfulis uafis alli-
gato, coquitur, donec hordeum fractum disiliat: deinde omnia in nouum craterē
oris ampli transfunduntur, triticum abijcitur, spuma argenti uehementè manibus

Affricando infusa aqua lauatur, assiccataq; in Thebaico mortario teritur, affusa fetuente aqua, donec soluta fatiscat. excolata aqua, iterum tota die teritur, & uespere infusa calida aqua finitur. manè colis excernitur, alia infunditur, atq; ter die excolatur. id septē diebus fieri solet. postea additis ad singulas minas spumæ argenti, quinque salis fossilis drachmis, infusaq; calida aqua, ter die teritur, & addita aqua excolatur: cumq; inalbuerit, calida infusa, idem facito, dum nullam prorsus falsedinem resipiat. demum ardentissimo sole siccata, eiectio prius humore, reconditur. Sin minus, mina spumæ argyritidis diligenter teritur, addito sale fossili trito, triplicato pondere, in fictile nouum conijcitur, aqua infunditur, ita ut superemineat. mouetur quotidie manè & uespere, aquaq; superfunditur, priore nequaquam effusa. hoc fit triginta diebus: namq; nisi moueatur, crasse scit, ulq; in duritiem testæ. Post hæc effusa leniter muria, in Thebaico mortario spuma argenti teritur, coniectaq; in fictile aquam continens, manibus diligenter agitur, mutata subinde aqua, donec nullum falsuginis indicium præbeat. deinde quod ex argenti spuma candidum apparet, in uas aliud transfertur, & redactum in pastillos, plumbea pyxide conditur. Alij spumam argenti in fabarum magnitudines contractam, in uentre fuillo crudo ex aqua coquunt, dum uiscus eliquefcens contabescat. exemptamq; cum sale pari terunt, & ut supra dictum est, lauant. Sunt qui salis libram unam, & spumæ argenti tantundē, in sole terant, aqua continuè mutata, dum candor ei detur. Alia ratio: Sumito quantū uis argenti spumæ: ubi lana candida inuolueris, fictili nouo indita aqua cū pugillo fabarum recentium repurgatarumq; decoquito. Cumq; fabæ disruptæ dehiſcent, lanæq; non denigretur, exemptam argenti spumam, & altera lana inuolutam, iterum coquito, cyathum aquæ & parem fabarum modum adijciens. eadem tertio, quæ supra, facito, in summa, tantisper, dum lana iam non inficiatur. Insuper transfundens in mortarium, ad singulas salis fossilij libras, adijcto octogenas spumæ argenti drachmas Atticas, & terito: intermittensq; nitri quā albiſſimi cum aqua diluti drachmas quadraginta septem indito: iterum terito, donec satis candoris contraxisse uideatur. ita autem fundens eam ex alto in fictile oris ampli, adiecta largiore aqua, ubi confidere desierit, colato. tum nouam superadijciens aquam, manibus probè uersatam, finito ut confidat, ac rursus per colum adijcito. alternis eadē prosequere, dum purā aqua dulcisq; effluat, & nullam falsedinem præ se ferat. postremo in fictile nouum translatam, colato sensim omni humore, soli quadraginta diebus sub caniculæ sydus exponito, & siccata utitor. Elotam autem constat ad oculorum collyria prodesse, & ad cicatricum fœditates tollendas, ad rugosas facies, & cicatricosas, laceratasq; & macularum plenas.

Locus ex Plinio
restitutus.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Lithargyros est purgantis se igni materie nitium, siue fruescentis spuma, ut scoria iam purgata sex est, ex plumbo Molybditis seu molybdæna, ex argento ἀργυροῦς, ex auro χρυσοῦς omnium optima præcipue quæ foliata est. Lithargyros moderatij, omnium terreorum siccatur sine manifesto calore aut frigore, modicè adstringit & terget. Eius usus lausimè patet libris propè omnibus comp. phar. genere, maxime 2. & 3. Lithargyros manifestè nec calfacit, nec refrigerat, nec humectat, sed siccatur primo abscissu à temperatis: nullam enim qualitatem manifestam gustatu exhibet: nec emplastica est, nec emphractica, nec repellit quod influit, nec digerit quod parti inflammata est infixum, nec ulcera terget, nec expurgat euidenter, nec rodit, nec carne implet, nec eam supercrescentem absorbet, parum tamen à medijs ad partium crassitiem recessit (licet sit tenuioris essentie quàm molybdæna) quàm & coctione diuturna deponit fusa ut ignis, & alterata. Ex his enim est medicamentis, quæ tota liqueſcunt, ut resina, cera, sed non mox ubi ignem attigerit: quæ uerò multis imponit, etiam non sunt putantibus. Cum oxaleo autem cocta citius liqueſcit, & cum erugine quàm cum hydreleo uel cœleleo, & quò plus liquoris ad coquendum habuit, eò glutinantius fit medicamentum. Melius enim fit ex Lithargyro medicamentum, quo magis coctum erit, quòd ex liquidorum, quæ miscentur, copia coctingit. Expertus tamen pulchrarum harum uirium lithargyros, medicamentis miscetur, ut phoenicino, diachalciteos uiribus eius nec commodans, nec incommodans, sed materie ad emplastri phar. comp. compositionem idoneæ rationem obtinet. Cruda etiam per se femorum exitinere attritus iuuat parum fucando. Lithargyros absolue, interdum tamen ut in melis à colore cydonij emplastri Lithargyros χρυσόγυς dicitur li. 2. comp. phar. gene, Lithargyros Germanis Glect. Gallis Litharge dicitur.

Cerusa. Caput LIII.

Cerusa

Cerusa fit hoc modo: Infuso in urceum oris lati, aut fictile labellum quàm acer **A**
rimo aceto, laminam plumbeam supra fictilis spiraculum, subiecta prius arū
dinea tegere, firmato: superiectisq; uelaminibus, ne halitum expiret acetum, ubi re
soluta fuerit, defluensq; deciderit, humorem purum ad summa delatum colato,
crassamentumq; transfundito. debet quoq; sicari in sole, mox trusatili mola teri,
aut aliis tritum cribrari. postea quod superest duri, in tenues partes redigendum
cribrandumq; uicissim eadem tertio quartoq; facienda. Melior, quæ primò cribra
ta est, & medicamentis oculorum assumenda, secundum locum tenet sequens, & re
liquæ suo ordine, nec desunt qui ligneas rudes in medio uase appendant, & derafo
reū seu imposito, ita ut acetum non contingat, inditoq; operculo circumlinentes di
mittunt, post dies decem, laxato obturamento uisunt, cumq; resoluta materia fue
rit, reliquæ, ut suprà diximus, exequuntur. Si autem quis in pastillos uelit digerere, a
ceto acri subacta, diuiditur in pastillos, qui in sole siccantur. Aestate tamen supradi
ctum opus obeundum est, ita enim candida atq; efficax redditur. Quinetiam hye
me paratur, urceis supra furnos, balnea, aut fornaces impositis: ascendens enim ca
lor, idem quod sol præstat. Laudatissimam fieri putant Rhodi & Corinthi, aut La
cedæmonæ, proximam Puteolis. Torretur hoc modo: Flagrantibus igni carboni
bus, fictili nouo, maximè Attico tritam cerusam imposito, & assidue uersato, cūq;
cinereum colorem traxit, eximens refrigerato, & utitur. Est & aliud urendi genus:
Trita patinis nouis supra prunas imponitur, & ferulacea rude mouetur, donec co
lore similis sandarachæ fiat: extractaq; ad usus ministratur. quæ uerò ita parata est,
sandyx à quibusdam dicitur. Lauatur cerusa cadmiæ modo, uis ei refrigerare, oc
cludere, emollire, explorare, extenuareq; insuper ex crescentia leniter reprimere, &
ad cicatricem perducere, miscetur ceratis, & emplastris quæ liparæ uocantur, pastil
lisq; est autem letalis eius potus.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Cerusa aceti acris uel ex plumbo soluta refrigerat, siccatur, astringit, emplastica est, candeficit, hec lota **B**
plumbo ueloto uiribus proxima: uita transit in Sandycha, sitq; tenuior, nondum calfaciens. Phycos cerusa
se frigida te seruata tenuitatem assumpsit, quæ uis eius adueta in profundū corporis penetrat. Cerussa Rho
diaca, uel illi similis ex ciuitate Dicaearchia olim dicta, nunc Puteolis, præfertur, si emplastrum uis eximie can
didum fieri, quia albidior, leuior, tenuiorum partium his, quæ alibi nascuntur, sal ex cerussa ad multa offi
caciūsimus, & oleum ex Cerussa. Germæ dicitur Elcyweiss. Gallis Ceruse.

Chryfocolla. Caput LIIII.

Chryfocolla laudatissima Armeniaca, colorem porri quam simillimè reddēs.
secundum locum sibi uendicat Macedonica, & proximum Cypria, quo in ge
nere præfertur pura, damnatur, quæ terram aut calculos collegerit. Ratio lauandi
hæc est: Tusam infusa aqua, mortario expassa manu ad pilam uehementer fricato,
& statim quàm confederit, colato, alteram infundens aquam, rursum trito. hæc ui
cissim prosequere, donec pura syncerataq; spectetur. dein siccato in sole, & ad usus
recondito. Quod si utere uolueris, ex ea terens quod satis esse uidebitur, patinis su
pra carbonem adponito, & alia facito quæ suprà diximus. Dos chryfocollæ ad pur
gandas cicatrices, ex crescentem carnem coarctat, astringit, purgat, ex calfacit, & mo
dicè corpus mordendo exest, inter medicamenta intelligitur, quæ uomitiones con
citant, & necem in ferre possunt.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Chryfocolla tam metallica, quàm factitia ualenter digerit, & siccatur, carnem liquat sine ualenti morsu.
Chryfocolla, Spodium, Pompholyx, Pforicum, metallica sunt admodum tenuis essentia citra calorem. Na
turalis & fissilis, Germanicè Schiffergrün dicitur, factitia uerò, quæ auri ferrum fundendo celerita
tem addit, Wozzaff appellatur.

Lapis armenius. Caput LV.

Armenius lapis præfertur læuis, colore ceruleo, perquam æquabilis, calculo
carens, & friabilis. Eadem quæ chryfocolla præstat, sed inefficacius. Quin
etiam usum habet ad pilos in palpebris alendos.

A

NOMINA ET EXPLICATIO.

Armenius lapis illotus suprà & infrà atram bilem uacuat, datus à drachma una ad scrupulos quatuor: lotus etiam quinquages tuior est, ac tantum infrà uacuat, à scrupulis quinq; ad scrup. sex. Alexander Tralianus in melancholia, & post eum Mesues in simplicibus.

Cœruleus. Caput LVI.

Cœrulei origo ex ærarijs metallis in Cypro. copiosior ex arena littorali: secundum quosdam sub cauatos specus maris inuenitur, qui magis probatur. Eligi debet inebriatus. Vritur ut chalcitis. lauatur ut cadmia. Vim habet reprimentem, et modicè erodentem. crustas gignit, & exulcerat.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Cyanus siue Cœruleus, catharticus, id est, detrahens, digerit potentius quàm Cinnabaris, & subastri-
git. Vim purgantem melancholiam suprà & infrà, ac melancholicum succum ipsi illoto præbet Mesues com-
munem cum lapide Armeno, ob id ambos ualere censet aduersus omnes melancholicos affectus, maniam, me-
lancholiam, epilepsiam alteram, elephantiam, caneros, albos nigros, quartanas, hemorrhoidas. Sed & alia
ei uires miras tribuit, uocatq; lapidem Lazuli & stellatum, quod uelut stelle quedam aureæ in eius fractu-
ris cernantur. Is urendo cœruleus magis euadit, si uerus est, malus uerum nigricat ustione. Tam hic quàm
Armenus Medicis in usu hodie sunt rarissima. Germani Lasiussteyn appellant.

Indicum. Caput LVII.

Indici duo genera. unum sua sponte nascitur, tanquam spuma, germinatione In-
dicis arundinibus exiens. alterum insectoria dant Officinæ: & est spuma pur-
purea innatans cortinis, quam detractam artifices siccant. Optimum existimatur
quod cœrulei speciem præbet. succum suum sorbet, & leue. Inter medicamenta est
quæ leuiter adstringunt, & inflammationes, tumoresq; rumpunt. purgat & reprimi-
t ulcera.

B

NOMINA ET EXPLICATIO.

Indicum fossile aliquando & hodie in aurisdinis inuenitur, Germani & in Bergbloë appellant, facili-
tium uerò ex spuma. Istudis est, ut sup. suo loco diximus. Germani hoc Meysbloë, & Indigbloë. Galli de
& inde siue, ou grose appellant, hodie in medicina nullius usus.

Ochra. Caput LVIII.

Ochram leuissimam, & omnino luteam eligere oportet, saturatam, non lapi-
dosam, friabilem, natione Atticam. Vritur hæc, & lauatur cadmiæ modo. Vis
eius adstringere, erodere, collectiones & tubercula dissipare. ex crescentia in carne
reprimi: caua cum cerato explet, & articulorum tefos comminuit.

Germanicè Oger & Berg gel appellant.

Cinnabaris. Caput LIX.

Hallucinantur qui cinnabarin minio eandem esse existimant. Minium enim in
Hispanijs ex lapide quodam argenteæ arenæ permisto, temperari solet, alio-
qui non dignoscitur. fornacibus autem in florentissimum flagrantissimumq; colo-
rem permutatur. in metallis uerò strangulanti halitum eructat. itaq; facies inco-
læ uicinis obuelant, ut per illas spectent, nec respirando noxium aërem attrahant.
eo pictores ad sumptuosa parietum ornamenta utuntur. Cinnabaris uerò ex Aphri-
ca defertur, & magno constat. hætenus inuenitur, ut uix uersicoloribus pictorum li-
neis satisfaciatur. intento colore nec diluto præditum: quare quidam sanguinem es-
se draconis existimauerunt. Vim habet cinnabaris hæmatitæ lapillo eandem. con-
uenit ad oculorum medicamenta, uerum efficacius, magis enim adstringit, & sanguis-
nem cohibet, ambustis igni, & papularum eruptionibus cerato excepta, medetur.


NOMINA ET EXPLICATIO.

Sanguis draconis & Cinnabaris uera, hodie ignorantur, uerum si Iacob Syluio medico doctiss. credi-
mus, qui credit sanguinem draconis facilius esse, qui hodie ostenditur ex Bolo Armeno. sanguine hirci &
succa

sacco sistorum, uel alijs. Cum tamen ille sanguis draconis, quo uitrarij utantur atq; aurifabri, uiderint coloris gratia uel sit naturalis & fissilis quum igne liqueatur, omnino Dioscor. delineationi respondens: quare hanc ueram esse ueterum Cinnabarin crediderim. Ceterum loco huius ubi eius copia defuit, rectius uenitur scitio quam cinnabari neotericorum, ex sulphure uiuo, & argento uiuo simul uctis.

Argentum uiuum.

Caput LX.



Argentum uiuum fit ex minio, quod abusuè cinnabaris dicitur, patinis fictilibus, imposita ferrea concha cinnabarin continente, & calice cooperta, argilla superlita, carbonibus succedunt, siquidem deterfa fuligo, quæ calici insidet, refrigerata in argentum uiuum coit. Quinetiam inuenitur in argentifodinarum tectis, stillatim concretum. Alij per sese in metallis inueniri tradunt. Seruatur in uitreis, aut plumbeis, aut stagnis, aut argenteis uasis: siquidem aliam materiam omnem exedit, & defluere facit. Potum uim perniciousalem habet: suo enim pondere interna exest. Remedio est lac multum subinde potum, & uonitionibus reiectum, aut uinum cum absinthio, aut apij decoctum, aut semen ormini, aut origanum, uel hyssopum cum uino, auri limati scobs, id est, ramentum quàm tenuissimum: epotum mirabili est auxilio.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Argentum à colore, uiuum à motu Latini dicitur. Germanis *Quecksilber*, à consentia uerò Græcè *ὀψορρογος*, sed hanc arte factam Gale. lib. 9. simp. illud minerale uult Hermolaus: cùm eam factitiam ex mineris, quàm minerale, seu argentifodinarum tectis stillatim concretum, siue per seia metallis inuentum, Dioscorides hoc loco hydrargyron appellat. Cui congener ex aque fontibus uonica perpetua scaturit Plinio. Argentum uiuum est metallorum omnium cum sulphure materia à calore temperatissimo, sic per manus inuentum, ut sic cum humido, & humidum sicco equaliter in eo temperentur. Vnde opinor, chymistis calore & frigore temperatum quocq; dicitur, non quarto gradu cum quibusdam frigidum, cum alijs calidum. Neq; contra chymistarum placitum pugnarè uidetur quod scribit Dioscorides, potum uim habere perniciousalem, suorum pondere interna erodere addit, non qualitate aliqua caustica. Neq; uerba Galeni lib. 4. simp. cap. 8. quod scilicet calore nostro calidum actu redditum per erosionem interimit, & lib. 5. cap. 18. quod tota sua substantia nobis contrarium sit, & uenerum si sumatur: neuter enim id aut calore immodico aut frigore deleterium dicit: sed ille pondere, hic tota substantia, ut scilicet omnino nos ledat necessariò, quantumuis paucum sit sumptum: cùm deleteria calore aut frigore sint sola quantitate deleteria.

Geberus chymistis præclarus.

Ad hæc Galenus de sola hydrargyro factitia loquitur, cuius quod interimat sumpta uel admota, se periculum fecisse negat, lib. 9. simp. Hodie uerò uel pueris maxime perspicuum est, maximo mortalium incommodo, quas uires sumptum uel admotum, uel suffitum in scabie Hispana, siue Gallico morbo, (ut uocant) & eius symptomatis, & multorum artificum usu uario, habent argentum hoc semiuiuum, & crudum, quouis modo paratum & mistum. Quod uerò in metallis perfectius coctum est maxime, id longè omnium est efficacissimum, uti & preciosissimum, si quis secernere, & secreto nouerit uti illud essentie esset omnium tenuissima, indicant apertissime celerissima eius in uaporem prætenuem abito, & in corpus quoduis etiam densissimum penetratio, ut etiam calculum iustilem affricu non ita multò subeat, intusq; dealbet, & fragilem maxime redat. Ob id non probo ipsum enulato unguento, & alijs quibusdam misceri. Argentum uiuum sublimatum: ex calore ignis erodente iam præditum, sit eodem quocq; deleterium, ut calx & uini fæx uisita. Sublimandi autem (ut chymistæ loquuntur) modum docet Geberus, ex quo & alijs non contemnenda leges, quæ ad cognoscendam plenius argenti uiui naturam pertinet.

Rubrica Sinopica.

Caput LXI.

Rubrica Sinopis maxime probatur grauis, densa, ad iecinoris imaginem uergens, calculorum experta, concolor, cùm diluitur impendit fulilis. Effoditur in Cappadocia, speluncis quibusdam, expurgataq; defertur in Sinopem urbem, in qua uenditur: unde cognomenrum accepit. Vim habet exicatoriam, quasi inducendo obstruentem & adstrictoriam, quapropter uulnerarijs emplastris, & pastillis exsiccantibus, & adstrictorijs commisceri solet. aluum sistit, in ouo sumpta aut clystere infusa, datur iecinoris uitio laborantibus.

Rubrica fabrilis.

Caput LXII.

ARbrica fabrilis, ad omnia Sinopide inferior est. Optima Aegyptia & Carthagenensis, lapidum expers, friabilis. Gignitur etiā in Iberia, quæ ad occidentem spectat, ochra exusta, & degenerante in rubricam.
Hodie Germanis dicitur Röstelsteyn.

Lemniaterra.

Caput LXIII.

Lemniaterra, cuniculoso in specu nata, è Lemnio insula, palustri loco defertur, inibi delecta, & caprino sanguini permista: quam incolæ cogunt in pastillos, et imagine capræ signant: unde & sphragida ægos, hoc est, sigillum capræ, appellatur. Vim antidoti habet contra perniciosa uenena singularem, pota cum uino, & præsumpta, euomi uenena cogit, contra ictus morsusque animalium, quæ exitiale uirus ei aculantur, prodest antidotis familiaris. sunt qui hac ad sacrificia utantur, est & dyfenteriae utilis.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Sigillum Lemnium efficacius sanguinis ex quavis parte eruptiones cohibet, quam Samius Aster: hic contra tenax & viscosior, quam Lemniaterra: ambo moderate tergent. Lemnice etiam adstrictio quædam inest, *μελας* & *λεμνία* libro 9. comp. phar. part. in arteriace Andromachi 4. Ea hodie uera Constantinopoli affertur. Officinarum falsa est.

Atramentum sutorium.

Caput LXIII.

Atramentum sutorium genere quidem unum & idem est, molle & concretum: sed in specie differentias treis habet, unum namque humoribus stillatim in cuniculos quosdam colatis, concreuit: quare ab ijs qui Cypria metalla perficiunt, stillatitium appellatur. Petesius ipsum pinarion uocat, alij stala & icon, id est, stillatitium, alterum simplici ratione fit in speluncis: postea transfusum in excavatos seroebes, concretum capessit, quod pecton, id est, concretitium, propriè nominatur. **B** tertium dicitur coctile, & in Hispania fieri solet: sed inutile ac inualidissimum esse constat. Ratio parandi hæc est: Aqua madefactum decoquunt, mox in piscinas transfundunt, & residere patiuntur, hoc certis diebus coalescit, in compluribus formulas digestum, tesserarum specie reddentes, quæ racematim inter se coherescunt. Optimum esse creditur, ceruleum, graue, concretum, translucens: cuiusmodi stillatitium est, ab alijs lonchoton nominatum, proximum, concretitium, coctile uero ad infectus & denigrationes, aptius cæteris esse compertum est, sed ad medicum usum inualidius esse, experimenta docent. Valet adstringere, calfacere, & crustas inducere, latas uentris tineas necat, drachmæ pondere deuoratum, aut cum melle linctum, uomitus ciet, aduersus hausta fungorum uenena, ex aqua potum auxiliatur, purgat caput, aqua dilutum, & in uellere naribus instillatum. Vritur paulò post in mentione chalcitis ostendimus.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Chalcanthum Romani atramentum sutorium, Germani Victriol & Ruppferwasser. Galli coprose. Officinæ Vitriolum Romanum uocant, essentie est eiusdem & nature cum Chalciti: hæc autem natura est, & *Genckel gut* in argentifodinis appellatur, illud ex hac fistitium & in hanc tandem per se rediens: uehementissime adstringit, & calfacit non instrenuè, putridis ulceribus congruit, gargareonem etiam scirrhotentatum irritat. Adhæc quum medicamentum, id est uehementissimum, ualidis uirg; uiribus adstringendi & calfaciendi prædictum, uitanda eius per se uehementia, sed mitioribus mistis obtundenda. Vsum uero & locum multò moderatius redditur.

Chalcitis.

Caput LXV.

Chalcitis præfertur similis æri, friabilis, nec lapidosa, nec inueterata, intercurrentibus oblongis uenis, splendentibusque. Huic absterforia uis inest, ex calfaciens, & crustas ulceribus obducens, purgat quæ oculis & eorundem angulis hærent, in genere leuiter exedentium est, ad ignem sacrum, & ulcera quæ serpunt, efficax est, sanguinem è uulua & naribus erumpentem, cum succo porri sistit, gingiuarum uitia, depascentia ulcera, tonsillasque, eius farina compescit, usta, & cum melle trita, oculorum

oculorum medicamentis longè utilior redditur. callum genarum & scabritiam absumit, abstergetq; fistulas tollit, collyrij modo in eas adacta. Fir ex chalcite medicamentum, quod psoricon uocant, duabus eius partibus cum una cadmia additis, & ex aceto tritis, oportet autem in fictili obruere fino, diebus quadraginta, per cunicula ardores: sic enim fit acrius. Idem quod chalcitis potest. Alij pares utriusque portiones in uino terunt, & eadem prosequuntur. Vritur chalcitis fictili nouo, uis carbonibus superposito. modus autem uestionis in humidioribus est, dum ipsa chalcitis bullas excitare desierit, & perfectè inaruerit: in reliquis uero, dum murata in floridum colorem fuerit, & sanguineum aut miniatum colorem contraxerit, tum demum eximenda est: infidens autem spurcitiâ statim expellenda, mox reponeunda. Torretur etiamnum perlatis carbonibus usquedum luteo colore palleat: aut fictili subditis candentibus prunis, subinde uersata, donec igni cõflagret, & colorem mutet.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Sori, Chalcitis, Misy, acria, urendo escharas excitant, & nomib; adstringunt, essentia cõsistentia & fitu differunt. Nam sori in fodina infimum ac crassissimum: & quia lapidosius ac uehementius compactum, in humore non liquefit, friando nigrius cum melantheria apparet, ac scintillat ut Misy, in multa foramina delinquit, asiduè & gustatu uirus olet, suppingue est. Misy grumosum & frustulosum magis est durum, auro simile, quod friando auri colorem imitatur, & stelle modo splendet, summum & tenuissimum, & a colore nigro magis elaboratum, & siccius. Proinde & grius liquefit, & corporibus duris admodum ob tenuitatem minus ea mordet, quàm Chalcitis, tametsi aquè calidam. Eadem ratione Chalcitis usâ minus mordet, & minus adstringit, non minus tamen siccatur. Chalcitis fitu & essentia est mediâ, eri similis, friabilis, & non quidosa, promptissimè liquefit, ea usâ melior est quàm non usâ: quia tenuiore est substantia, ut alia omnia usâ, non tamen acrior, quod alijs multis utilis accidit. Vt autem omnia lauando miora & minus mordacia euadunt.

Soreos pars extima & summa in chalcitim, & chalciteos partes extimæ in Misy tandem transiunt: in retallica fodina, & quo loco seruantur, quomodo eri inuasatur erumpit. Hec Sori, Chalcitis, Misy uidentur tergere, Misy etiam modicè participes est facultatis exedentis. Chalcitis cruda mordax est, uim autem eius recedendo minuius, idonea est columelle inflatæ, quando uehementer inueterauit, & curatu contumax est. Chalcitis usâ est eligenda, quæ urendo cineritia euaserit, non æge & æd, & qualis uestione fit à multis. Chalcitis usâ non minus effiac, sed minus mordax.

Misy. Caput LXVI.

Misy assumendum natione Cyprium, auri simile, durum, quod friando auri colorem imitatur, & stellæ modo splendet. Vim habet & uestionem cum chalcitide eandem, præterquàm quod psoricum ex eo non conficitur, excessus defectusq; ratione tantum differens. Aegyptium autem cæteris præstat, ut potè quod efficacius habeatur, sed ad ocularia medicamenta multò supradictò inferius.

Melantheria. Caput LXVII.

Melantheria geminæ est originis. quædam in faucibus cuniculorum quibus Mæx eruitur, talis modo conrescit. alia uerò in summa facie supradictorum locorum coit, quæ terrena est. quineriam inuenitur in Cilicia & alijs quibuldam regionibus, fossilis quædam. Præstat, quæ sulphuris colorem trahit, leuis, pura, æquabilis, & quæ contactu aquæ confectum nigrescit. Vim causticam eam obtinet, quam & misy.

Melantheria Atramentum citrinum, Germanis Gelber bergschwefel dicitur.

Sory. Caput LXVIII.

Sory existimantur aliqui melantheriam esse, aberrantes. siquidem sui generis est Sory, ei non ab simile. uerùm sorèi uirus inest graue, & nauisam mouens. Inuenitur etiam in Aegypto, & alijs quibulda regionibus, ut in Libya, Hispania, & Cypro: Præfertur Aegyptium, quodq; frianti nigrius apparet, in multa foramina delinquit, suppingue, insuper adstringens, & olfactu deuorationeq; magnū uirus ois, ita ut stomachus in uomitiones effundatur, quod autem friatum scintillas misyos modo

A modo non emittit, & alterius generis esse, & inualidum censendum est. Vim & usum nem supradictis similem habet, dolori dentium, cauernis inditum medetur, eosq; labantes firmat, ischiadicis ex uino infusum auxiliatur, illitum cum aqua, uaros extinguit, medicamentis admiscetur, quæ capillos denigrant. Hæc autem ferè omnia & alia quæ usum experta non sunt, perustis ualidiora esse existimantur, præter sallem & uini fecem, nitrum, calcem, & consimilia, quæ cruda remissiora sunt*. combusta enim, uiribus efficaciora redduntur.

* Dissoluuntur.

Sory Officinæ Atramentum rufum, Germanis Roter bergschwefel appellatur.

Diphryges. Caput L XIX.

Diphrygis tria genera esse creduntur. Quoddam enim metallicum est, quod in Cypro sola gignitur. lutosum namq; extrahitur, ex luto cuiusdam inibi specus: extractum, sole liccatur, mox circumpositis sarmentis uritur. diphryges ideo uocatum est, quod & à sole & à sarmentis uratur, areseat, & ferè torreatur. Alterum perfecti æris, quasi subsidens fax est, siquidem post frigide aque offusionem, ut supra retulimus, cum de flore æris differeremus, sublato aere, fornacum ima parte coherens id genus inuenitur, & adstrictionem & gustum æris habens. Tertium sic fit: Lapidem pyritem, ut calcem multos dies cremant in camino: cumq; colorem rubicæ contraxerit, eximentes recondunt. Quidam tradunt hoc ex sola materia quæ lapidem æris gignit fieri: quando in dictis areis affata & in serobes translata peruritur: tunc enim ambientem serobis locum comprehendit, & exemptis lapidibus nihilominus inuenitur, præfertur quod saporem æris reddit, æruginisq; astringens, & uchementer exiccans linguam, quod sibi exusta ochra non uendicat, quæ cremata, diphrygis uice uenit. Vis eius adstringere, perpurigare, extergere, siccare excrecentia, consumere, ulcera serpentia, & quæ cacothe uocant, ad cicatricem perducere, suppurationes terebinthina aut cerato exceptum discunt.

NOMINA ET EXPLICATIO.

B Diphryges, quasi bistosum, est perfecti æris uelut fax subsidens & coherens imæ fornacum parti, tanquam ustorum in foco lignorum cinis, ablato aere uisitur. Duobus alijs modis fit hoc loco Dioscoridi & Plinio: medicè & astringit, & acre est, ut asustum, uchementer siccatur, ulcera rebellia sanat. ochra usta adulteratur. Germani uocant Berggrün/ unam diphrygis speciem.

Auripigmentum. Caput L XX.

Auripigmentum in eisdem metallis, quibus sandaracha, gignitur. Optimum existimatur crustosum, aureo colore micans, nulli materie permixtum, in squammas fissile: quale in Mysia Hellepontis nascitur. Huius duo genera fluxerunt, unum supradictum est: alterum (* glandis effigie pallidum) & colore sandaracham imitans, glebosum, ex Ponto & Cappadocia defertur: quod etiam secundum locum tenet. Torretur in testa noua uiuis carbonibus subiectis, absiduoq; uersatur, donec igne flagret, & mutet colorem: deinde refrigeratum, tritumq; reconditur. Vim habet adstrictoriam, & erodentem, crustas cum uchementi uredine, & uiolento morfu excitat, reprimat quæ excrecant, & capillos euellit.

* Quidam hæc non habent.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Arrhenicon à uetustis Grecis, ab huius ætatis hominibus Arsenicum, Latinis auripigmentum: in iisdem metallis, ut auro, argento, quibus sandaracha gignitur: ob id eadem gleba ambo sepe mixta uidimus: optimum existimatur crustosum, χρυσόλαιον (sic Galeno quoq; lib. 9. & 1. comp. phar. part.) id est, aureo colore micans, nulli materie commixtum, in squammas tanquam bracteolas fissile: alterum globosum, pallidum, & colore sandarachon imitans. Vendo multum sulphur exhalat, in argenti speciem fusum concreuit, sed intus rubet, causticum est nausæq; cum uchementi uredine & uiolento morfu excitat, hyperarscosin absumis, astringit & rodit, depilat tam non usum quam usum: quod tenuiorum est partium, miscetur digerentibus & tergentibus.

Sandaracha. Caput L XXI.

Sandaracha probatur rufa, & saturatior, & aliena materia uacans, friabilis, cinabaris colore, sulphuris uirus redolens. Dos eadem & usio, quæ auripigmentum.

to. explet alopecias, resina excepta. scabros ungues cum pice eximit. contra phthi-
riam ex oleo efficax est. Tubercula cum adipe discutit. prodest ad narium orisq; ul-
cera, & ceteras papularum eruptiones cum rosaceo: item condylomata. datur ex
mulso, purulenta extusisientibus. suffitur quoq; cum resina, aduersus veterē tussim,
raptō per fistulam nidore. uocem expedit, cum melle delincta, suspiriosis cum resi-
na in catapotio optime datur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Sandaracha Arsenico non solis natalibus, sed etiam tota natura affinis, ut coctione sola nature uideat-
ur hęc Arsenicum uincere: id enim uisione Sandaracha fit, ut Cerussa trita, mota, probē uista, in sandara-
cham pictoriam abit Vitruuius lib. 7. Ad hęc Sandaracha licet rubra sit, aqua tamen soluta luteum colorem
intensum facit: floridum autem colorem luteum reddit Arsenicum, Dioscoridi probatur rufa, saturatior, cin-
nabaris colore, sulphur uiuum redolens, friabilis, materia uiscans, auripigmentum rubrum dicitur Serapioni.
Eadem chymistis Arsenicum rubrum dicitur, ut Arsenicum croceum est auripigmentū. Arsenicum autem ab
soluē hīs est album naturale & scissum. Kifagalum siue Realgar (quod uocant) in genere est Arsenici in
iisdem fidius inuentum. Exedunt sandaracha, Petre Asiae flos, Arsenicum & sandaracha & chalcitis nō
emplastra reddunt flum. uel rufa. Sandarachę drachm. semissem, & alumen scissile & rotundum misceat An-
dromachus Isonachis lib. o. comp. phar. part. & mysos Ciprij drachm. s. apud quosdam legi scribit, ibidē,
Vide ne cum Arabibus Sandarachen uoces gummi imperi, neue uires illius huic attribuat.

Alumen. Caput LXXII.

OMne aluminis genus ferē in Aegypto, & in eisdem metallis inuenitur. etenim
scissile quoddam, quasi flos glebosi intelligitur. Gignitur & in alijs quibusdā
locis, in Melo, in Macedonia, in Liparis, Sardinia, Hierapoli Phrygię, Africa, Ar-
menia, & pleriq; alijs regionibus, sicut & rubrica. Plurimę eius species. uerū ad
medendi usum, scissile, rotundum, & liquidum expetuntur. Optimum est scissile,
praesertim recens, candidissimum, gustu perquam adstringens, graue olens, calculo-
rum expers, nec glebulosē aut assulosē compactum, sed sigillatum in capillamenta
quadam canescētia dehiscens, quale est quod trichites, quasi capillare nominatur, **B**
in Aegypto natum. Reperitur quoq; lapis huic alumini per similes, qui gustus iudi-
cē dignoscitur, quod non adstringat. Damnatur in rotundi genere, quod manu cō-
ficta est: sed ex figura deprehenditur. Assumendum autem inapte natura rotun-
dum, bullis turgens, albo propius, atq; ualidius adstringens, praeterea nonnihil pal-
loris cum quadam pinguitudine praeseferens, sine arenis, friabile, natione Aegy-
ptium, aut ex insula Melo. Liquidum probatio, ut sit lympidum, lacteum, aequale, &
semper succo madens, sine lapidibus, atq; quendam coloris igniculum expirans.
Vim habent excafaciendi, stringendi, & expurgandi, quę caliginem pupillis, oculo-
rum offundunt genarum carnem, ceterasq; excrecēcias extenuant. Scissile rotun-
dū efficacius intelligitur. Vri & torrerī chalcitidis modo debent. Putrescētia ulce-
ra compescunt, sanguinis fluxiones inhibent, gingiuas humore praegnantēs compri-
munt, motus dentium cum aceto & melle firmant, profunt cum melle ulceribus oris,
eruptionibus papularum, & fluxionibus aurium, cum sanguinalis herbę succo. le-
pris conueniunt cum brassicę folijs* aut melle cocta. item pruritus, & unguium
scabritijs, pterygijs, & permionibus, aspersa cum aqua, ualent cum aceti rēce, & gal-
la, pari pondere cremata, ad phagedaenas ulcerum, & cum salis duabus partibus, ad
uita quę pascunt. furfures cum eruo & pice illita abstergunt. ad lēdes, pediculos,
ambusta cum aqua illita auxilio sunt. contra tumores, & graue alarum inguinumq;
uirus, illinuntur. ex Melo autem aduectum, mulieribus praestat ne concipiant, ante
coitum ori uulua inditum, partus quoq; extrahit, gingiuas, si caro excreuit, uua ac-
tonillis accommodantur. ori, auribus & uerendis cum melle illinuntur.

* Succo


Alij, accommo-
datur, & illipi-
tur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Alumen ab astrictione uehementissima Graecis συνηγια dicitur. Germanis Alum, crassarum est parti-
um, maximē liquidum, & placites & pleurithes dictum, a cruste & lateris forma: minus strongylon & a
stragalotes, id est, rotundum in astragali modum: minimum scissum, id est, scissile non in fila, sed digitis fli-
bile. Omne alumen in aqua soluitur, & igni liquefit, tardius scissile, quod sine bullis tandem mollescit.
idem.

A idem aquæ innat. lingue & cuti integræ est mordacissimum, adulteratur segmentis lapidis amantii: sed hæc acrimonia caret, & ex pingui aliquo ardent rediit in corpore, aqua merguntur, & integra manent, in filisq; dissiliunt. Alumen scissile colore candidum & præstantissimum, idem tenuius & utilius, lib. 6. comp. phar. par. Et quia rarum inuentu, carius: liquidum contra, crassum, & utilissimi præci, quia in omnibus re- gombus inuentu est facillimum, lib. eodem sexto.

Sulphur. Caput LXXIII.



Sulphur optimum existimatur uiuum, quod apyron uocant, nitredulæ modo splendidum, perlucens, minimè lapidosum. Probatur in genere sulphuris ignem experti, quod uiret, ac præ pingue spectatur. Plurimum in Melo & Lipara gignitur. Supradictum sulphur calfacit, discutit, & celeriter concoquit, prodest tussibus, lussipiosis, purulentis extusis, in quo sumptum, aut suffitum, præterea partus, usti nidore extrahit lepras, lichenas, scabros ungues, cum resina terebinthina mistum, aufert. cum aceto aut emillitum, ad lepras efficax est. uutiligines tollit. scorpionis ictibus, addita resina, medetur. cum aceto uero, draconis marini scorpionisq; plagas sanat. pruritibus toto corpore erumpentes, cum nitro detersum, sedat. regium morbum emendat, inspersum fronti cochlearis mensura, aut in sorbili ouo sumptum, facit ad grauedinē, & destillationes. sudores quoq; conspersum inhibet. podagricis, cum aqua & nitro illitum, conducit. grauitatem auditus, suffiti nidore raptim per fistulam hausto, sanat. lethargicos suffitu excitat. erumpentem undecunq; sanguinem sistit. contusis auribus, cum uino aut melle illitum, medetur.

* Myrrha.

NOMINA ET EXPLICATIO.


Sulphur omne calidum, tenuis essentie, trahit, terget: salina uel lotio, uel oleo ueteri, uel melle, uel terebinthina exceptum, uenenatis ictibus impositum, sanat. Psoras, lepras, lichenas cum terebinthina tergendō & dissipando per sanat nobilissimum est. & uirgopid est uiuum & ignem nondū expertum, Germanis Lebendiger Schwefel, ignem expertum, quō uirentius, oleosius, pinguius, cō melius. Ex sulphure olium chymistis efficacissimum, trahitur. fumo eius ardentis in campanam uitream recepto, in oleum concreto, & catuū subiectum destillante: sed quia ex multo sulphure paucum ascendit, preciosum est. fit & aliter: Sulphur iisdē sublimando (ut illi appellant) purgatissimum & elementissimum efficiunt, etiam preciosum eadem de causa. Cuius usum non est quod uereare quorundam imperitorum exemplo: Cum Galenus uiuum sulphur impurissimum diamoro stomachico medicamento ad digerendum misceat bis lib. 6. comp. phar. par. Nocet sulphur achoribus: quia plus quā par est, eos calfacit atq; digerit.

Pumex. Caput LXXIII.

Pumicis probatio, ut magnoperè leuis, spongiosus, scissilis, nec arenosus, item teri facilis, & candidus. Crematur flagrantissimis carbonibus obrutus: & ubi canduerit, extractus, uino restinguitur odorato: iterumq; incensus extinguitur: & tertia uisione exemptus & per se refrigeratus, ad usum conditur. Vis eius adstringere, gingiuas abstergere, purgat cum calfactione, quæ caliginem pupillis offundunt, explet ulcera, & ad cicatricem perducit. excrecentia cohibet. fit ex farina eius denitrificium. corpori crustam obducit. auellendis capillis aptus. Theophrastus auctor est, si quisquā in bullientem urceum uini pumicem iniecerit, feruorem statim sedari.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Pumex Germanis pymsensteyn / sarcoticis miscetur, dentes polit, facultate deteriora, & asperitate ut smiris, testæ, cornua animalium uita: usus tenuiorum fit partium, & acrimoniam sumit, quam lotionē depone. Nunc scriptoribus propē so- lis ad papyrum expolendam cum gummi lumperi est usui.



Sal. Caput LXXV.

Sal fossilis efficacior est. cōmuniter, si est candidus, scalculis uacans, & perspicuus, densus, æquali compage. peculiariter Ammoniacus natione laudatur, si modò

modò findi facillè possit, & in recta segmenta diduci. In marino sale eligendus est **A**
 candidus, æqualis, densus. Probatissimus in Cypro fit, & Salamine Cypri, & Me-
 garis, in Sicilia & Aphrica. Sed inter dicta salis genera la custris præfertur: sed mul-
 to ualidissimus est Phrygius, nomine tapeus, aut tritæus, aut gantæus. Salis natura
 in commune perquam utilis est. adstringit, absterget, expurgat, dissipat, reprimat,
 extenuat, & crustas inducit, sed hoc inter est, quòd alius alio sit præstantior. quin &
 à putredine euindicat, admiscetur medicamentis pforas abstergentibus, excrescen-
 tia in oculis reprimat, & pterygia consumit, ceterasq; carnis extuberationes tollit,
 clysteribus infunditur, discutit lassitudines ex oleo illitus. contra hydropicorum
 tumores auxiliatur, dolores in facie fori mitigat, & pruritus sedat, ex oleo & ace-
 to infriktus ad ignem, donec sudent, item lichenas, lepras, pforasq; anginam ex mel-
 le, aceto, & oleo illitus leuat, tonsillis uuaq; cum melle tostus: ulceribus in ore ma-
 nantibus, gingiuis quas humor uexat, & phagadenis ulcerum, cum polenta cre-
 matus illinitur, aduersus scorpionum ictus, cum lini semine: contra serpentium mor-
 fus, cum origano, melle, hyssopo: aduersus cerasten, cum pice, aut cedria, aut melle
 auxiliatur: contra scolopendræ morsus, cum melle & aceto: aduersus uesparum i-
 ctus, & teredines* albidasq; capitis pustulas, thymos & tubercula, cum seuo uitu-
 lino: furunculos cum uua passa, aut suillo adipe, aut melle discutit, testium tumo-
 res cum origano & fermento maturius concoquit, crocodilorum morsibus auxilia-
 tur, tritus, in linteolo, & intinctus aceto, ita ut uinculis loca constringantur. Prodest
 ad bestiarum morsus, fugillationes in facie, ex melle. Cōtra haustum opium & fun-
 gos, cum aceto mulso bibitur, luxatis imponitur cum farina & melle, ambustis igni
 cum oleo impositus, pustulas erumpere non patitur, podagricis itidem imponitur,
 & aurium doloribus cum aceto, ignes sacros & ulcera quæ serpunt cum aceto aut
 hyssopo illitus sistit. Viriur fictili, diligenter opertus ne exiliat, conditusq; prunis,
 usquedum effruescat. Aliqui fossilem subacto polline obliniunt, & carbonibus sub-
 hiciunt, usquedum eius crusta exuratur. Solet & sal communis hoc modo uri: Aqua
 semel abluitur, & siccatus in ollam coopertam mittitur, subdito igne, moueturq;
 donec iam non exiliat.

Spuma salis, spumo si maris lanugo siue ramentum est, in exilibus petris inuentū, **B**
 cui uis eadem quæ salis.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Sal tam fossitius, iulgo sal gemme, quàm marinus, terget, adstringit modicè, ualidè siccatur, digerit, lib. 6. co-
 pbar. par. Per se cum galla leui attactu gargareonem inflammatum non durescentem in scirrhum: non au-
 tem initio, neq; dum augetur, aut cum multo calore uiget: quòd si corpus sit plethoricum, aut saltem caput
 plenum, si initio adhibetur inflammato gargareoni, extrema laboranti noxa inferitur. Sed adstringit quum cer-
 geat: siccatur autem non minus quàm nitrum, aut nitri spuma: sed hæc non adstringunt, ob id ceratis mixta ul-
 cerum sordes tergent. Sal ob adstrictionem id non præstat. Sal Armeniacus terget, subacris est, leuissimè adstringit,
 humores acres in supercilijs inpersus consumit, à quibus pili malè triti excidunt. Hammoniaco sali simi-
 lem forma schistum lapidem docet Dioscorides. Sal Hammoniæ ualenter digerit, lib. 6. comp. pharm. part.
 noster tamen nigricans, quem Officina corruptè Sal armoniacum. Germani Salmiac, tam nigricans, quàm
 albicans, siquid est.

Muria. Caput LXXVI.

Muria effectus salis præbet, abstergetiq; dysentericis infunditur, etiam si nome-
 intestina corripit, & ischia dicis ueteribus ad foras, aquæ marinæ usum præ-
 stat.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Muria, quam Greci ἡμελιν, Germani Salzbrunn uocant, est aqua salsa, quæ si recoquitur, iterum ad
 naturam suam consumpta liquore redit, & sal fit, uti ex Catone liquet libri sui de re Rust. cap. 88. ubi candi-
 dum saltem facere docet. Est autem nihil aliud muria quàm aqua salsa, uelut etiam ipsum mare salsum existit,
 sed hoc ex natura, illa arte paratur, prout usus exposulat plus aut minus salsum esse. Quare differt etiam à
 sal sugene uel sal silagine salinarum, quæ etiam ipsa natura salsa est, magis etiam quàm marina, & ad hoc etiā
 liquida, quum muria etiam durata fieri possit, certa quadam ratione prodita à Columella lib. 12. cap. 6. quano
 quàm non duram, sed maturam legendum esse credere malim, nisi sepe & Columella, & Cornelius Celsus, &
 Scribonius, & Diarcellus sic appellarent, ut uidelicet duram & maturam pro eadem acciperemus, cui cruda

Apponatur. Sic autem facere docet Columella: Quum salcm per aliquot dies nidebis in aqua tepescere, ex eo intelliges nondum esse muriam maturam. itaq; subinde alium salcm tandiu ingeres, donec in sporta permaneat integer, nec minuat: quod cum animaduueris, scias habere muriam maturitatem suam. Et paulo post: Est aliud murie mature experimentum. Nam ubi dulcem caseum dimiseris in eam, si pessum ibis, scies esse adhuc crudam: si innatabit, maturam.

Flos salis. Caput LXXVII.

Flos salis flumine Nilo defluit. lacubus tamen quibusdam innatat. Assumendus qui crocci coloris est, odore ingrato, ceu gari, interdum longè magis uirus olet, gustuq; mordacior, & pinguius lentus. Fucatus autem rubrica, aut scrupulosus, improbat. Præterea syncerus non nisi oleo resoluitur: adulteratus nonnulla ex parte, etiam aqua, diluente factitium colorem, ad ulcera quæ cacoethe uocantur, & phagedænas, genitalium nomas, & purulentas aureis, efficax est. oculorum hebetudines, cicatrices, albuginesq; tollit. emplastris unguentisq; coloris causa, ut rosaceo, miscetur. sudorem cit. aluum turbat, in uino aut aqua sumptus. stomachum malè habet. additur acopis & smegmatis, quæ albandi capilli gratia * componuntur. & in uersum acris est, & feruentis naturæ, ut sal.

* Alij, pilos ex palpebris efficer detrabit.

Nitrum. Caput LXXVIII.

Præfertur nitrum leue, roseo colore, aut candido, in foramina dehiscens, perinde quasi spongiosum quiddam, quale ex Bunis affertur. Humores euocat, qui in alto concreuerunt. Spuma nitri optima esse putatur leuissima, glebosa, friabilis, colore penè purpureo, aut spumosa, & mordens, qualis ex Philadelphia Lydia defertur: secunda est Aegyptia, quin & in Magnesia Cariæ gignitur. Vim & uisionem salis habet, tam nitrum quam spuma eius: præterea nitrum tormina sedat, si tritum cum cumino bibatur, in hydromelite, aut sapa, aut aliquibus quæ inflationes discutere possunt, uti ruta, uel anetho, febris circuitu redeuntibus illinitur, ante suspectam accessionem, miscetur emplastris, quæ extrahunt, & discutunt, extenuant, & lepras abstergunt. Cum aqua autem calida, aut uino infusum, inflationes, purulentas aureis, & ionitus earundem sanat, sordes expurgat, cum aceto instillatum, cantharidibus ex asinino adipe aut suillo medetur. resina terebinthina admixtum furunculos aperit, aquæ inter ceterum cum fico illinitur: oculis ad claritatem uisus cum melle succurrit: & uenenis fungorum, ex posca potum: aut si buprestis momorderit, ex aqua: his uerò qui taurinum sanguinem biberint, ex laserpitio: hisq; qui cibum non sentiunt, utiliter obducitur: opisthotonisq; iam remissioribus, & luxatis, cum cerato, in resolutione linguae, pani commodè permiscetur. Aliqui supradicta carbonibus urunt, subiecta prius testa noua, donec incandescant.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Nitrum, spuma nitri, aphronitrum, potenter tergenti cuti affricata: sin autem nitrum ex tenuibus partibus constans lapidosum est, urendum ac diligenter leuigandum. ἀφρονίτρον, seu ὄπρος, id est, spuma nitri ab Aphronitro differt, (sic χαλκός à χρῶσ & χαλκίδιον, & ἀνάνδυ δολύχ à δολυανάνδυν, & multa alia similiter) illi enim alba est farina triticea similis, eiusdem cum nitro facultatis & naturæ, sed essentie tenuioris: hoc autem in glebas coactum & congelatum, amarum, in balneis sordes terget, & ichoras priuatis excitantes digerit. Nitrum præsertim bernicum seu beronicum potius lib. 8. metho, siccatur, digerit: sumptum autem in corpus incidit, tenuat crassos & lentos humores multò potentius quam sal, amarum enim est, cap. 1. lib. 4. simpl. usum uerò tenuitatem substantiæ adeptum spuma nitri proximum est. Nitrum rubrum lib. 9. comp. phar. part. Aphronitrum magis quam hæc incidit, stomacho inimicum est, ob id nõ deoratur, nisi grauis urgeat necessitas. Nitrum uerò sumitur, & aluum subducit. Omnia hæc hodie desiderantur, quorum loca supponunt Officinae salcm petra (quam uulgo Salpeter & Salniter appellant) purgatum, in panes coactum. Id mentiri satius esset cineribus betæ, brassicæ, & aliorum nitroforum.

Fæx. Caput LXXIX.

Eligenda fæx maximè à uino uetere, Italico: sin minus, ab alio consimili. Fæx æceri uiribus longè acrior est. crematur ut alcyonium, antè diligenter siccata. Sunt qui noua testa igni largo urant, usquedum penitus incendantur. Alij uiuis carbonibus

bus facis glebam obruunt, & idem opus prosequuntur. Experimentum est legitima uestionis, ut aërio nitore inalbescat, linguamq; tactu urere uideatur. Eadem urenda facis aceti ratio. Vis ei supra modum urens, & abstergens, ulcera ad cicatricem perducit, adstringit, uehementer exest, siccaturq;. Sed recenti utendum est, quoniam celeriter exanimatur, proinde non nisi in reconditorio, & uase aliquo reponi debet. Lauatur, ut pompholyx. Quæ uestionem experta non est, tumores & per sese, & cum myrto cohibet, uentris stomachiq; fluxiones illita sistit, muliebri profluvium, imo uentri aut genitalibus imposita, mitigat, panos discutit nondum exulceratos, & tubercula, rigentes mammas, suiq; lactis impatientes, cum aceto peruncta extinguit. Cremata uerò, ungues scabros cum resina aufert, addito lentiscino oleo, illita non est tota, rufat capillum. Elota oculorum medicamentis, ut spodos, adijcitur, cicatrices eorum & caligines eadem abstergit.

Calx uiua. Caput LXXX.

CAlx uiua hoc modo fit: Marinorum buccinorum testas igni condito, aut feruenti clibano, nocte dimitto: postera die, si candidissimæ fuerint, extrahito: sin aliter, iterum urito, usque dum uehementer inalbuerint: dein ubi in aquam frigidam immersæ fuerint, in hñtile nouum conijcito, & exactè pannis operiens, noctem unam conquiescere finito, manè eam extrahens, ubi perfectò omni opere elaborata fuerit calx, recondito. Fit & littoralibus calculis igne crematis, nec non è uili & fusaneo marmore, quæ cæteris præfertur. Vis omni calci in commune ignea, mordens, adurens, & crustas inducens, quibusdam alijs immista, ut adipi, oleo, concoquendi uim assumit, molliat & dissipat, ulcera ad cicatricem perducit. Efficacior existimatur recens, nec aspersa aquis.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Calx uiua, Germanis Vngelschtyer Fels, uehementer urit, adeò ut crustas efficiat, & mox ubi est extincta, iam diu, non est caustica amplius, sed calida sicca: carnem tamè liquat: lota ter quater sine morfu strenuè siccatur.

Gypsum. Caput LXXXI.

Gypsum uim habet adstringendi, obstruendi. sanguinis eruptiones sudoresq; cohibet, sed potum, strangulationis modo iugulat.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Gypsum, Germanis Gyps, siccatur ut cætera terras, emplasticum est: cogitur enim, & lapides cit liquor aliquo, ut albumine maceratum, sanguinis eruptionem cohibet, cum tenui farina pilis leporum uel similiter mollioribus exceptum: usum minus est emplasticum, tenuium partium, siccus est, ex oxycrato repellit. Nostrum uerò Gypsum, uti calx, urendo emplasticum magis euadit.

Sarmentitius cinis. Caput LXXXII.

Sarmentorum cinis urendi uim habet, cum axungia autem uel oleo illitus, fractis neruis, articularum collisionibus, & neruorum nodis prodest, cum nitro & aceto, ex crescentias carnis in scroto reprimat. serpentium canumq; moribus illitus ex aceto medetur, crustas obducentibus medicamentis admiscetur, sit ex eo lixiuium contra præcipitationes, & fungorum uenenas, cum aceto, sale & melle.


NOMINA ET EXPLICATIO.

Latini cinerem, Græci τρεῖς γαρ. Germani Aschen. Galli cendre appellant, quicquid exustis corporibus relinquitur, siue hæc sint lapidum, siue arborum, siue animalium partes. Quare omne lixiuium eius cineris, cuius lotura est, naturam adipiscitur. Vnde sanè cum non unum temperamentum omnis cinis habeat, neq; etiam lixiuium habeat, ut merito à Galeno reprehensus Dioscor. uideatur, qui omni lixiuii adstringentem naturam tribuit, cum non omnis cinis hanc naturam habeat, ut Galen. lib. 8. simp. docet.

Alcyonium. Caput LXXXIII.

Alcyoni quinq; esse genera compertum est. unum enim spissum, acerbis saporis, spongiosa facie, item tetri odoris, ponderosum, & pilis olens, quod pluri-

A



num in littoribus inuenitur, alterum pinnula oculorum aut spongię simile, fistulosum, & leue, odorem algę referens. tertium uermiculi forma, & colore magis purpureum, quod Millethum quidam uocant. quartum luccidis uelleribus non dissimile, multis inanitatibus hians, leue, quintę figura fungi, sine odore, asperum, parte interna quodam modo pumicosum, foris læue, acie, quod plurimū in Pro-pontide iuxta insulam Besbicon appellatam gignitur, patrio nomine halos achnen uocant. Duo priora in fœminarum smegmata assumuntur. contra lentigines, lichenas, lepras, uirilignes, nigrítias, & maculas in facie reliquoq; corpore. Tertium hīs qui difficili urina uexantur, aut arenulas in uesica colligunt, idoneum est. item renibus affectis, aquę inter cutem, lieni, usum autem, & ex uino illitum alopecias replet. Postremum dealbandis dentibus aptum est. in alia smegmata, phlothrag; assumitur, cum sale mistum. Si quisquam alcyonium cremare uelit, cum sale in crudum fictile mittat, & oblinens uasis spiraculum luto, ita for-naci mandet, & cum figlinum percoctum fuerit, extrahens ad usus recondat. Lavatur ut cadmia.

Officina Spumam maris. Germani Meer Schwamm appellant.

Adarces.

Caput LXXXIII.

Galatia.

B



Est in Cappadocia* quod adarces appellatur. est autem tanquā concreta falsilago, humidis & palustribus locis siccitate emergens, & arundinibus ac herbis agglutinata, colore flori lapidis Asphimilis, & omni forma molli alcyonio, & aliquantū cano proxima, ut uideri possit lacustre alcyonium. Ad euellendas lepras, lentigines, lichenas, & uitia cutis in facie, & similia, accommodatur. & in summa, uis ei acris. humorem euocat qui in alto concreuit, & ischiadicis prodest.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Plinius adarce meminit lib. 16, cap. 27. inter harundines his uerbis Adarce numeras: Est & in Italia nascens adarce nomine, & palustris: lib. uerò 32, cap. 6. quasi antelatorum oblitus, inquit, inter aquatilia dici debet. Culameochus Latine adarcha appellata, nascitur circa arundines tenues spuma aque dulces, & marinae, ubi se miscent. His uerbis penitus Plinius adarches uidetur historiam confundere. Satisq; incuriose de hac differuisse, &c.

Spongię.

Caput LXXXV.

Espongijs alias mares appellauere, tenui fistula, spissas: quarum duriores tragos nominarunt. fœminas autem, quę contrarias dores habent. Vruntur ex ualcyonium. Recentes sine pinguitudine, uulnerarię sunt, & tumores reprimunt. recentia uulnera ex aqua poscæue conglutinant, ueteres sinus ex decocto melle iungunt. Vetusstę autem inutiles. Aridę ligatę lino, si penicilli modo adigantur, occlusa ulcera, callosq; laxant. siccę recentes & uacua senilia ulcera, quę fluxione laborant, aut cuniculatim excedunt, impositu siccant. sanguinis profuuium sistit. Crematarum cinis ex aceto, aridę lippitudini auxiliatur: & ubi quid abstergere, aut adstringere opus est. Vtilius, in oculorum medicamentis lavare cinerem. Omnium cinis cum pice crematarum, profluentem sanguinem sistit. Candidę curę fiunt, & mollissimis recentes, per æstus tinctę salis spuma, quę petris coheret: insolantur in uersę, hoc est, parte caua sursum spectante, & qua abscessa fuerunt, deorsum, si uerò æstiuā ferenitate ad lunam sternantur, per fusę salis spuma, aut maris aqua, maximum candorem referent.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Spongia Germanis Eus Bad Schwamm. Gallis une sponge appellatur. Lapilli in his reperi, triti, & uino pot.

poti lapides renum erumpunt, non autem uescit, quia tenuioris sunt essentie, sine insigni calore. Vesicae tamen calculos rumpere hoc loco scribit Dioscor. si ex uino bibantur.

Corallium. Caput LXXXVI.



Corallium, quod aliqui lithodendron appellant, marinum esse fruticem constat, qui alto extractus, duratur statim atque emergit, tanquam offuso aëre protinus concreseat. Plurimum inuenitur ad Syracusas, in promontorio cui Pachyno nomen est. Laudatissimum, rubens, colore antherici aut sandycis saturata, nec secus terenti facile cedens, æquabili usquequaque concremento, rursus algæ aut fuci marini odore, quam ramosissimæ forma fruticis, cinnamomi æmulum. Quod autem in lapidis duritiam coit, scrupulosum, inane, & lacunosum, uitiosum existimatur. Adstringit, & refrigerat mediocriter, excrecentia coëctet, oculorum cicatrices abitergit, ulcerum caua, & cicatrices explet, contra sanguinis reiectiones magnopere efficax est, urinæ difficultati auxiliatur, quin & potum ex aqua lienem abluunt. Quod antipates uocat, corallium esse arbitrantur, specie tantum distans, est autem colore nigro, arboris figura, ramosum magis. Vires supradicti habet.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Corallus lapis Aduario dicitur, ad δελφίνος aliqui uocant, fruticis forma, cinnamomi æmulus, crescit ad promontoria in mari, adstringit & refrigerat, contra sanguinis reiectiones magnopere efficax. Rubrum & nigrum tantum facit Dioscor. hoc loco, albi simus tamen hodie etiam uisitur naturalis, & citra uisionem.

Phrygius lapis. Caput LXXXVII.



Phrygius lapis, quo infectores in Phrygia utuntur, à qua nomen accepit, nascitur in Cappadocia. Optimus habetur pallidus, modice grauis, non solida corporis compage, intercedentibus albis segmentis, ut in cadmia. Vritur autem uino optimo perfusus, uinisque car bonibus obrutus: perstatursi diuè follibus, donec mutato colore rufescat, rursus extractus eodem uino restinguitur, hoc iterum & trinis uicibus faciendum, attendendum tamen, ne minutim confringatur, & in fuliginem euanescat. Vis crudo usque adstrictoria, expurgans, ulceribus crustas quadamtenus inlucit, ambustis cum cerato medetur. Lauatur ut cadmia.

EXPLICATIO.

Phrygius lapis gleba pumicosa est, in medicina, ut Plinius tradit, nullius usus.

Assius lapis. Caput LXXXVIII.

Assius lapis assumi debet pumicis colore, leuis, fungosus, item friabilis, scissiles uenas lutei coloris ad inum actas habens. Eius flos, salsugo subflaua est, summo lapide insidens, compage tenui, colore in aliquibus albo, in alijs pumici simili, ad luteum uergente, ad motus linguæ aliquantulum mordet. Vim habet uterque, adstrictoriam, & modice erodentem, admixtus liquidæ pici, aut terebinthinæ, tubercula discutit. Longè ualidior flos existimatur. De cætero siccatus flos, uetera ulcera & cicatrici repugnantia sanat. excrecentia cohibet, tetra ulcera & fungis similia, cum melle expurgat, ulcerum caua explet, & expurgat cum melle: depascentiaque cum cerato sistit, fit cataplasma ex eo podagris, misto fabæ lomento: & lienosis, ex aceto & uina calce, prodest flos ex melle phthificis linctus. Podagrici iuuantur, pedibus in folio ex eo lapide excavato inditis. Fiunt quoque pulueres, qui corpora erodunt, & luxuriantem carnem, & corporum crassitiem absumunt, cum uice nitri in balneo sparguntur. Si lauare liber, cadmiæ modo lauatur.

Ex hoc lapide olim fiebat sarcophagi.

Pyrites. Caput LXXXIX.

A



PYrites lapidis genus est, à quo æs conflatur. Eligi debet æris similitudine, facile scintillas ædens. Vritur sic: Melle irrigatus molli pruna continuò flatur follibus, donec rufescat. Alibi in multos carbonēs igni candelentes, lapidem copioso melle perfusum deiciunt, & ubi ad fuluum colorem uergere cœperit, extrahunt: efflatoq; cinere, rursus madefactum cremant, donec æquabiliter assiccatus friabilis reddatur. siquidē saepe facies summa solum uritur, ita crematus, siccatusq; reconditur. Si eloro opus sit, lauari debet ut cadmia. Tam crudi quàm usti uis est, excalfacere, abstergere, offusam oculis caliginem expurgare, duritias concoquere, & concoctas discutere. resina exceptus excrecentia in carne cohibet, sed calorem quendam & adstrictionem parit. Ita ustum nonnulli diphryges appellant.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Pyrites lapis, de quo æs perficitur, æris aspectu scintillas leui percussu edens: crudus & coctus calfacit, terget, digerit. Valida autem est facultatis, Galenus libro 9. simpl. Marcasita æris quibusdam dicta uidetur, & itz stoff.

Hæmatites.

Caput XC.



Hæmatites optimus habetur friabilis, saturato colore niger, durus & suapte ingenio æqualis, nulla sorde admixta, nulloq; zonarum discursu. Vim habet adstringentem, & excalfactoriā aliquantū, extenuantemq; oculorum cicatrices & scabritiam cum melle purgat. cum lacte autem muliebri, lippitudini, fractis, & oculis cruore suffusis conuenit. bibitur contra difficultatem urinæ, & fluxiones mulierum in uino, & ab iis qui sanguinem reiecerunt, cum succo punici mali, fiunt ex eo coticulæ & collyria, oculorum uitrijs apta. Vritur ut Phrygius, sine uino duntaxat, modus uestionis est, ut modicè leuis fiat, & bullis quibusdam intumescat. Sunt qui hæmatiten ita adulterant. Densam glebam rotundamq; schisti lapidis, cuiusmodi sunt quæ eius radices uocantur, in urceum figlini operis, qui feruentem cinerem contineat, condunt, paucaq; interiecta mora eximunt, experiunturq; si trita ad cotem hæmatitæ colore reddat, quod si ita res se habet, reponunt: sin minus, iterum obruunt, & subinde conspicientes, periculum faciunt, siquidem in cinere diu dimissus, colore murato diffunditur, coarguitur malè confectus, primum scissilibus uenis: quippe in rectos uenarum discursus refringitur, ad hæmatites longè secus se in colore habet: namq; hic floridum reddit, hæmatites uerò saturatiorem, atq; cinnabarin imitantem. Inuenitur in Sinopica rubrica. Fit & è magnetelapide, uehementer ambusto, in Aegyptō sponte natura cum metallis enascitur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Hæmatites à sanguinis colore, Germanis Blätsfeyn dictus: frigidus, adstringens, excrecentia reprimi, oculorum uulnera persanat, sanguinis expulsiōi ualet, siccat humores, sed minus quàm Cadmia. Nam ex huiusmodi substantia non terrestri constat, & super cotem medicam cum liquore tritus, in succum soluitur: per se uerò in corpus simile minuitur, ut schistus lapis, non in fragmenta terrestria, ut cadmia.

Schistus lapis.

Caput XCI.

Schistos lapis in Iberia Hispaniæ gignitur. Probatum maximè qui croci colore æmulatur, friabilis, suapte natura hisilis, concremento & alterno coherentium uenarum discursu, peccinum modo, ammoniaco salis similis. Vim exhibet hæmatitæ, sed ad omnia infirmior, quin & caua replet muliebri lacte perfusus, ad prociētia, rupta, item genarum crassitiem, & uuas oculorum, magnoperè efficax est.

Schistus lapis hæmatitæ uim habet persimilem, sed infirmior.

Gagates.

Caput XCII.

INgagatarum lapidum genere, præferendus qui celeriter accenditur, & odorem bituminis reddit, niger est plerumq; & squalidus, crustosus, perquàm leuis. Vis ei molliendi, & discutiendi, deprehendit fonticum morbum suffitus, recreatq; uul-

uz strangulationes. fugat serpentes nidore. podagricis medicaminibus, & a copis A additur. In Cilicia nasci solet, qua influens amnis in mare effunditur, proximè oppi dum quod Plagiopolis dicitur. uocatur autem & locus & amnis Gagas, in cuius fau cibus h lapides inueniuntur.

Gagates lapis colore atro, Germanis Schwarzer Augstein, uoce parum deprauata, dicitur, odore dū uritur bituminis siccit, glutinat, digerit admotus, in corollis precarijs & salinis frequens.

Alij plures lapides.

Caput XCIII.



Lapis thracicus dictus, nascitur in flumine quodam Scythiae, cui Ponto nomen est. Vis ei gagate. Traditur aqua accendi, & oleo re stingui: quod in bitumine accidit. Magnes lapis optimus est, qui ferrū facile trahit, colore ad cæruleū uer gente, densus, nec admodum gravis. Datur cum aqua multa, trium obolo rum pondere, ut crassos humores e liciat. Sunt qui magnetem crematū pro hamarite uendant. Arabicus la pis maculoso ebori similis. Is tritus illitu hæmorrhoidas exiccat. eius cin nis dentifricio optimus. Galacti tes appellatur, quod lacteum succum reludet. cinerei tamen est coloris, ac gustu dulcis. Ad oculorum fluxiones, ad ulcera conuenienter illinitur. Oportet autem in aqua tritum, pyxide plumbea recondere, propter uim glutini, quod ei obhæret. Melitites omnia galactita similis. hoc tan tū interest, quod dulciorem succum remittit. Eiusdem ut galactites effectus. Mo rochthus lapis, quem aliqui galaxiam, aut leucographida uocauerunt, in Aegypto nascitur: quo, ut potè molli, & facile liquefcente, linteones dealbandis uestibus u unt, cœliacis, & uesciæ doloribus, cum aqua potus. itidem fluxionibus uulua, & im positus uelleri. mollibus oculorum collyrijs miscetur. explet enim caua, atq; dela thrymationes sistit. idem cerato exceptus, ulcera quæ sunt in teneris partibus cor poris, ad cicatricem perducit. Alabastrites uocatus onyx, crematus, refina aut pi ce assumpta duritias discutit. stomachi dolores cum cerato leuat. gingiuas compri mit. Lapis nomine thyites, in Aethiopia gignitur, subuiridi colore iaspidem imi tatus. cum diuiditur tamen lacteum succum reddit. Vehementer mordet. tenebras, quæ pupillis obuersantur, expurgat. Iudaicus lapis in Iudæa nascitur, glandis effi gie, candidus, scita admodum configuratione, lincis æqualiter inter se distansibus quasi industria detornatis. solutus nullam qualitatem manifestam gustui represen tat. Potest ciceris magnitudine tritus ad cotem, ut collyrium, cum calidæ aquæ cya this tribus, potu difficultati urinæ auxiliari, & calculos in uescica comminuer. Ami antus lapis in Cypro nascitur, scisso alumini similis: quo, ut potè flexili, telas & uer la tantum spectaculi gratia * texunt, quæ ignibus iniecta ardent quidem, sed flammis * theophrastus Her mol. inuicta splendoriora exeunt. Sapphirus lapis, percussis à scorpione, potu prodes se existimatur. contra intestinas exulcerationes bibitur. ex crescētia in oculis, uuasq; & pustulas inhihet, & ruptas membranas cogit. Memphites in Aegypto iuxta Memphin inuenitur, calculorum magnitudine, pinguis, uersicolor. Tradit trito & illito, quæ urenda aut secanda sunt, sine periculo obstupescere, ita ut non sentiat cru ciatum. Selenites lapis, quem aliqui aphroselenon appellarunt, quoniā noctu in uenitur lunæ imaginem reddere, quæ cum ea quidem augetur & decrescit, nascitur tuta, in Arabia, candidus, translucens, leuis. Huius ramenta comitialibus in potu dari iu bent. eo ceu gestamine ad amuleta mulieres utitur. arbores a dalligato eodē frugife ræ redduntur. Iaspidium quædā sinaragdum imitatur, alia crystallū, colore simi lis pituitæ: alia nō dissimilis æri, ob id uocatur ærizusa: alia ueluti fumo infecta,

Ex Plinio resti-
tuta.

Aqua capnias ex argumento uocatur. quædam lineis albis & resplendentibus præcingitur. Assyrios appellata. alia terebinthinæ similis, quæ terebinthizusa dicitur. alia calore callida gemmam æmulatur. Omnes amuleta esse traduntur, & accelerare partum scemoribus appensæ. Aëtires lapis est ueluti prægnans, cum quatitur, alio in utero sonante: Grauidis continet partus, cum lubricæ sunt uulvæ & parum ténaces, sinistro brachio alligatus, sed parturientibus è brachio amoueatur, & feminibus alligetur, ut sine doloribus pariant, furem deprehendit, si quis in pane conditum offerat, fur enim mansum deuorare non poterit. quin etiam concoctus, furem coarguit: quippe decocta cum eo, deuorare non poterit. tritus, & ceratò exceptus, cyprino, aut gleucino, aut ex calfaciente, comitiales magnificè iuuat. Ophitæ genera multa. quidam ponderosus & niger, alter cinereo colore spectatur, punctis distinctus, tertius lineis quibusdam candidis interinctus est. Omnes alligati contra capitis dolores, & serpentium ictus profunt, feruntur qui lineas habent, lethargo, & capitis doloribus auxiliari. Lapidés in spongijs inueniuntur, qui uesicæ calculos rumunt, in uino poti. Litho colla glutinum, quo lapides coniunguntur, conficitur autè ex marmore, lapide Pario, & taurino glutine. Potest candente specillo ad motum, incommodos oculos pilos replicare. Ostracites testæ similitudinem habet, crustosus, & in laminas fissilis, quo mulieres ad detrahendos pilos, pro pumice utuntur. Menses drachmæ pondere potus ex uino, sistit. si quatuor diebus à purgatione bibitur sicilici pondere, sceminis præstant ne concipiant, cum melle autem impositus, mammarum inflammationes lenit, & nomas cohibet. Smyris lapis est, quo annularij scalpores lapides expurgant, ad erodendum & urendum utilis. gingiuis, quas humor uexat, prodest, dentifricio commendatur. Arenà è littoribus sole seruata, hydropicorum tumores exugit, si capite tenus in ea obruantur, torreretur solet ad aridos fatus, pro milio aut sale. E cote Naxia, quod ex acuendo ferro deteritur, illitum alopecias ad pilum reducit, uirginum mammas cohibet, nec incrementum patitur, potum ex aceto, lienem absumit, & comitialibus prodest. Geodes lapis adstringit, ficit, caligines oculorum discutit, illitus autem ex aqua, testium mammarumq; inflammationes sedat.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Magnes ficit hematite modo, & astringit, ad enterocolem utiliter sumitur, & ad mouetur. Magni est miraculi, in eo tanquam mundo aliquo colorum celi rationem inesse. Germanis Magniet & Segeisteyn appellatur. Plura de Lapidibus & Gemmis, uide in annotationibus nostris in Theophrasti lib. 1. de Gemmis siue Lapidibus.

Terra. Caput XCIII.

Omnis terra ad medendi usum recepta, summam & primam uim habet refrigendi, meatusq; obducendi, occludendiq; sed specie distat, cum alia adiunctis quibusdam ad alia sit utilis. Eretriares duæ sunt, una uehementer alba est, altera cineritia. Optima habetur ad cinereum colorem uergens, perquam mollis, quæ si per æramenta tractim ducatur, lineam uiolaceam refert. Lauatur ut cerusa, aut hunc modum: Teritur seorsum*, & cum aqua, & ubi pessum ierit, humor leuiter excolatur: ficcata solibus, iterum teritur interdiu, adiecta aqua, ut uespere cõsidat, antelucanis colo excernitur, & demum in sole trita, si fieri potest, digeritur in pastillos. Quod si tosta desideretur, pastilli magnitudine ciceris in fictile perforatum cõijciuntur, oreq; uasis diligenter obturato, supra carbones candentes cõtinentèr solibus persuantur, ubi uero cinis in fauillas se conuertit, aut æreum colorem contraxit, exempti reconduntur. Vim habet adstringentem, & refrigeratorem leuiter, mollientem, caua explet, & sanguinolenta conglutinat. Samia præfertur candida, leuis, tangenti linguæ glutinis modo adhærescens, mollis, succosa, friabilis, cuiusmodi est quam aliqui collyrion uocant. Duæ enim species eius, unam autè diximus, altera asper appellatur, crustacea, & cotis modo prædensa. Vritur ac lauatur ut eretria, uimq; consimilem habet. sanguinis reiectiones sistit, sceminis fluxionè uulvæ laborantibus, cum flore syluestris punicæ datur, testium & mammarum* inflammationes, illita ex rosaceo & aqua, refrigerat sudores arctet, contra serpentium morsum

* interdiu.

* oculorum.

morsus & uenena, pota ex aqua auxiliatur. Samius lapis, in Samia terra inuenitur. **A** quo aurifices utuntur poliendo auro, ut resplendeat. Probatur candore, & duritia. Vis ei adstrictoria, & refrigerans, prodest stomachicis potus, sensus hebetat, uerum ad fluxiones oculorum & ulcera, cum lacte efficax est, partus, ut tradunt, adligatus accelerat, & conceptus foeminarum custodit. Chia eligi debet candida, uergens ad cinereum, Samia similis est autem crustosa, albaq; sed fictitius formis diffrens. Vis eadem quæ & Samia, extendit faciem, & erugat, atq; splendidam reddit, colorem in facie & corpore toto commendat, in balneis pro nigro deterget. Eadem præstat Selinusia maximè laudatur, quæ uehementer resplendet, candida, friabilis, & humore dilui celerrima. Cimolia duo genera, candida, & ad purpureum inclinans. Optima existimatur quæ innatam habet pinguitudinē, tactuq; frigida sentitur. Vtraq; aceto diluta, parotidas, & alia tubercula discutit, ambuita igni, si statim cimolia oblinantur, pustulas non sentient, testium duritias, & totius corporis collectiones cohibet, igni sacro imponitur, in summa, utraq; multum in medicina commendatur, si incorruptæ originis, nec spuria assumatur. Quæ pinguis dicitur, colore ferè eretria similis est, grandioribus tantum glebis: manum si quis admoueat, refrigerabit, tactu linguæ uique adeo glutinosa, ut penilis hæreat, cui effectus idē qui cimolia paulò tamen infirmior. Hanc aliqui pro eretria de uendunt. Fornacea testæ uehementer tosta, crustas ulceribus obducunt: quare prurigini & papularū eruptionibus medentur, podagricis profunt, strumas discutunt, cerato exceptæ. Fornacum terra quæ retorrida fuluescit, eiusdem cum testa effectus. Melia colore cinereum eretria imitatur, aspera tactu, ea digitis friata, de rasi pumicis modo crepirat. Vim habet aluminosam, sed remissiusculam, id quod gustu deprehenditur, modicè linguam siccat, purum corpus reddit, & colorem commendat, pilos extenuat, uirilignes & lepras abstergit. pictoribus usum præbet, ut colores diutius perennent, emplastris uiridibus, quæ chloræ dicuntur, efficaciter inseritur. Ex omni Melia terra & omni alia in uniuersum, eligi debet recens, mollis, non lapidosa, friabilis, quæ cum humorem attigerit, facillè resoluatur. Ex ampelide terra, quæ pharmacitis nomine, in Seleucia Syria nascitur, laudatur in primis nigra, piceæ longos* carbonēs referens, modicè assulosa, equabili splendore, quæ detrita, accepto oleo, statim eliquefcit. Vitiosa censetur candida, & cinerea, quæ in liquorem non resoluitur. Vim dissipandi & refrigerandi habet, ad callibephara additur, tingendis capillis idonea, uel eius ad illinendas uites sub germinationis tempus, ut potè cum in nascentes uermiculos enecet.

Fuligo pictoria. Caput XCV.

Flugo qua pictores utuntur, ex uitrarijs officinis colligi solet: siquidem ei palmaribuitur. Vis ei ad adstringendum & erodendum efficax, fracta cum rosaceo cerato ad cicatricem perducit.

Atramentum librarium. Caput XCVI.

Atramentum quo scribimus, fuligine è redis coacta colligitur, in singulas libras gummis, ternæ fuliginis uncia adijciuntur. Fit etiam è refinare & pictoria fuligine, de qua paulò antè diximus. Assumitur autem fuliginis mina, gummis telquilibra, glutinis taurini, atramenti sutorij, singulorum sequi uncia. Additur conuenienter erodentibus medicamentis ambustis, ex aqua commodè crassius illinitur: sed non antè soluatur, quàm cicatricem induxerit, sanatis siquidē ulceribus, sua sponte decidit. Cæterum habes, amicissime Arec, serē qua tradenda duximus pro operis modo, quem destinauerimus, & materiæ auxiliorumq; medicinalium copia.

Finis Libri Quinti.

PEDANII

A^o PEDANII DIOSCORI DIS ANAZARBEI, DE VENENIS, QVO- QVE MODO ARCEANTVR, VITEN- turq; Liber sextus.



SUPERIORIBVS, amicissime Aree, libris, tradidimus de aromati-
bus, oleis, unguentis, arboribus, & earundem fructibus, lachrymisq;
item animalibus, melle, lacte, seuo, frumentis, oleribus, herbis, radici-
bus, liquamentis, uinis, metallisq;. In hoc uero totius operis ultimo, sa-
cultates medicamentorum recensuimus, quæ prodesse nobis, aut offi-
cere possunt. Vitata igitur orationis prolixitate, opus institutum prosequamur. Hu-
iusmodi autem tractatus, cum bifariam distributus sit, in partem uenena præcauen-
tem, ita ut ne fallant sumentes: aut si quando per imprudentiam dentur, ut tū quoq;
innoxia fiant, irritaq; & in rationem ijs succurrendi qui iam noxiam sentiunt: pri-
mū disseram de præcauendimodo, quem esse difficillimum pleriq; maiorum ar-
bitrantur, quod dantes clam uenena, ita insidias temperant, ut peritissimum quenq;
decipiant. Si quidem uenena sua amaritudine, permixtis dulcibus, poliant, & graue
odoris uirus mixtura odoramentorum eximunt. aut medicamenta immiscent, quæ
tuendæ sanitatis gratia dari putantur: & præsertim in ualitudine, ut absinthium,
tragoriganum, satureiam, aut hyssopum, quinetiam thymum, irim, organum, abro-
tonum, castorium, aut si quid medicamentis purgatoris cognatam habere qualita-
tem uideatur, aut potionibus inferunt: ut uinis asperis, iuribus, passo, mulsæ aquæ,
musto, succis, ut in cremore lentis, polentis. aut medicaminibus, aut alijs quæ assu-
muntur, edulsi speciem referentibus. Quare qui in ea suspicione sunt, cōditos cibos
uitare debent, omniq; intenso sapore, dulcium, aut falsorum, aut acidorum, abstinere
nec sitibundi affatim bibere, aut esurientes uoraciter comesse, semperq; ad sapo-
rem horum diligenter attendere, præsertimq; potu frigidam aquam præsumere.
Satiatio enim appetitu, qualitates agerrimè postea concoquantur. In agris quidem
facile cauemus portiones auxilij prætextu dari solitas, quas offerunt improbi uene-
ficorum artifices: itaq; ob id laborantes morbo non perinde audentium iniurijs pa-
tent. Et hæc quidem ne facile incauti seductiq; homines capiantur dolis ueneficorū,
ratio est & facultas. Sed alia superest expeditior, ut suspiciosi aliqua præsumat, quæ
uenenorum uires heberent, & inefficaces irritasq; reddant: cuiusmodi carica sunt
cum iuglandium nucibus manducata, & quæ cedromela uocant, id est, citria, femi-
nisq; napi drachma cum uino, item folia calaminthæ, aut creta, quæ Lemnia sphra-
gis appellatur, pondere pari cum uino, aut ruta folia & nucis iuglandis nucleum,
aut caricas duas, & salis callum ieiuni sumant, & nullo ueneni genere læduntur. An-
tidota ex uino sumpta eundem effectum præbent: inter quæ intelligitur magnū Mi-
thridatium, & quod scinco, & quod sanguine temperatur. Quin & sape uenenis
obstunt peculiares quidam corporum affectus, certo quodam modo constituto-
rum, cum quadam cibi potusq; qualitate, tum uini copia ita temperatorum, ut cum
uenenis dissentiant, si quidem ingesti ueneni uires frangunt, atq; iam priore alimen-
to factis præclusisq; meatibus, obstant ne membratim per digestionem insinuentur.
Verum enim uero, quoniam fortunæ necessitas interdum similia discrimina pere-
grè agentibus affert, absq; ullis insidijs hominum, nō nihil differendum mihi de hac
re necessarium duco. Iam primū igitur culinam apparare loco subdiali conuenit,
cibosq; & potus in huiusmodi loco struere, si id fieri commodè nequit, secunda
erit conditio hæc, apparandi apponendiq; sub tecto. Sed tum diligenter laquearia
animaduertenda, frequenter enim à superioribus contabulamentis animalia deci-
dunt, exigua quidem, sed quæ non modicam perniciem moliantur, ut phalangia,
stelliones, & alia quædam reptilia. Porro uinaria uasa diligenter intueri oportet:
namq; reptilia odore uini illiciuntur, quæ interdum sorbendo, noxium uirus eructa-
runt, interdum uero delapsa immerlaq; expirant, & exitij causas haurientibus
attulerunt. Sed hæc hæcenus dicta sint, ne cauti & prouidi insidijs pateant. Quod si
qui

qui sua sponte, aut ex quorundam insidijs sumpserunt, auxiliari primo quoque tem-
 pore oportebit. siquidem dum comites singulorum uenenorum nota expectatur, im-
 medicabile fit uenenum, & paulisper neglectum, medicamentis agere cedit. Qua-
 re si qui pro comperto se uirus sumpsisse intelligant, & fateantur, aut eorum qui ad-
 erant testimonio confitet, protinus ad idonea remedia transeunt, facile peculiari
 naturæque constitutioni restituemus. Neque enim his assentimur, qui protus auxilia
 in huiusmodi frustra adhiberi contendunt. Quo enim modo morbi, quorum cau-
 sæ cæcæ latentesque corporibus insident, medicinam admittunt, & quæ forinsecus in-
 currunt uenena, medendi rationem aspernantur? Acque uero omnes morbi pro cau-
 sarum ingruentium magnitudine, proque antecedentibus adfectionibus qualitati-
 busque, quibus sit opportunum corpus, uel medicabiles sunt, uel nullis cedunt medi-
 camentis. Quod si qui forsitan obtumescunt, aut temulentis, aut nolentes alioqui ue-
 nenum à se egeri, nullam nobis eius cognitionem præbeant, tum protinus acceden-
 dum ad ea quæ communiter epotis quibuscunque uenenis opitulari consueuerunt.
 Atqui nullum magis in omnia ualens auxilium dari potest, quam ut proximo loco
 uirus foras exhauriatur, priusquam inualescat. Quare sine mora, calidum oleum ex
 aqua, aut seorsum, ut uomitare cogantur, dari conuenit. Aut si oleum natura loci
 negat, butyrum cum aqua calida, aut malua, aut lini semine, aut trago, uel arica, seu no-
 graco, aut halicæ decocto, uicem eius exhibebit. Hæc enim non modo uomitioni-
 bus exigent uilla sua laxatrice, aut nauseam ciente, sed aluum quoque subducunt, &
 corporum inanitione ita aduersantur, ut acrimonas uenenorum hebetent. Id
 quod euidenter huiusmodi argumento deprehendere licet: Est ut quisquam ui-
 ua calce uel fæce, aut cantharidibus, aut alio quouis acri, corpus exulcerare statue-
 rit, is si ipsum oleo leniter illinat, exulcerationem non accipit. Atqui neque ueheme-
 ter adstringi corpus, neque refrigerari poterit, si antea perungatur. Quinetiam uomi-
 tus non ob id modo quod uacuet, & noxium humorem excernat, iuuamentum ad-
 fert, sed quod assumptum uirus nonnunquam odore, coagulatis grumis aut colore,
 prodat: quippe cum odore & amaritudine, meconii: colore, cerusam, gypsum ue-
 grum lac aut sanguinem animalis recens iugulati ostendat. Nam grauis odor re-
 gestorum, leporis marini, aut ruberæ ueneficia deprehendit, ita ut nonnulla ab his re-
 media peti possint, ad idonea singulorum auxilia transeuntibus. Oleo etiam maluæ
 decoctum admiscetur, aut glaucium, aut adeps anserinus, aut pinguium carniū ita-
 ra, lixiuium lignorum cinere factum. Vbi uero uomitus diligenter citatus fuerit, ne
 quid in uentre coierit, quæ hæserunt intestinis reliquæ, clystere acri deuocentur. Fa-
 cit & nitrum tritum, & cum hydromelite sumptum, uina uetera liberalius epota, gal-
 linacea iura, præpingues pisces, uetustæ carnes pinguesque, & quæ adipe aut recenti
 butyro parantur: aluum namque subducunt, uti diximus. & stomachum resoluunt,
 proniorem ipsam ad uomitionem reddunt, & uenenorum acrimonas hebetant: atque
 meatus obstruentia, celerem uirium penetrationem inibent. Quinetiam medicamen-
 ta dantur, quæ communi dote profunt: ut Lemnia terra, agaricum, abrotanum, irio,
 radix eryngij, semen pastinacæ, & calaminthæ, nardum gallicum, castorium, ferule
 uirentis medulla, flos rhododendri, succus marrubij, laser aut laserpitium, sagape-
 num, peucedani succus, aut panacis, & radix quam magadarim appellant, ariolo-
 chia longa, syluestris rutæ semen, & beronica, quam cestron nominant. folia singula
 et uino, drachmæ pondo sumi debent, effectum præbet polij decoctum, & fesei. & li-
 quida pix linctæ, magnificè ferunt opem antidota, quæ in calce scripta operis reliqui-
 mus. Communis ratio præstandi auxilij ita se habet. Ceterum ab his quæ contine-
 runt uenire, communia remedia sumptuari possunt. Ferè enim uires uenenorum quàm
 plurimorum, in affectus consimiles corpus tandem redigunt. Quam ob causam ple-
 risque communia conducunt auxilia. uaria etenim sunt uenenorum genera, communis
 tamen nec multi indem affectus oriuntur. Neque fieri potest, ut omnes concurrentesque
 casus quæ symptomata uocant, unum uenenum sequantur: alioquin superuacua
 fuisset uenenorum singulorum traditio cum suis remedijs ab autoribus descripta.
 Neque uero in uno eodemque promptum est inuenire, ut quis stomachi, alui, intestino-
 rum, iecoris, renum, & uellicæ dolore uehementer crucietur, ut singuliat, erodatur,
 contremiscat, refrigeretur, obmutescat, conuellatur, pulsus elanguescat, spiritus
 difficilis

A difficilis fiat, ueterno prematur, uertigo obuerfetur, caligent sensus, strangulerur, sitiatur, sanguis erumpat, febre conficitur, ægrè lotium reddat, torminibus uexetur, crebrò uomitet, nausea prematur, rubescat, liuore sugilletur, pallefcatur, deficiat, sterat, uiribus deficiat, & pleraq; alia faciat, patiarurq; singula enim in generales affectus deducta, pauca numero & communia ea demonftrant, quæ euenire confueuerunt. Quare in singulis quæ fuprà diximus, non facillè fuerit deuoratum uirus cognoscere. Nam oris & linguæ erosio, stomachi, uentris, uelicæ ac renum inflammatio, uehemens urinx difficultas, & interdum cruoris cum eo exitus lancinatio, & in plurimis partibus quidam adustionis sensus, non in cantharidibus modò potis reperiuntur, sed in erucis quoq; pinorum, & buprestis, & salamandra. Porro non modò eos qui meconium hauserunt, ueterno aut sopore premi, stertere, liuore sugillari, torpere, refrigerari, stupefcere, ueterno aut sopore premi, stertere, liuore sugillari, sed eos etiam qui mandragoram aut cicutam deuorauerunt. Delirium non hyoscyamus tantùm infert, uerum etiam quæ toxica appellantur. itidem aconitum, & mel quod in Heraclea Pontica gignitur. Strangulatio non minus in fungis, quàm in sanguine taurino, lacte, aconito, cerufa, gypfo conspicitur. In summa, difficile unũ uni ueneno proprium inuenire signum, quod haustum gustatumq; uirus prodere possit: maxime, quod hæc cæterorum etiam uitiorum, quæ in corpore exoriuntur, communia sequi solent. Cæterùm in his quæ celeriter enecant, noxam signis forsitan indicare possis, si ad ea respexeris quæ sumus dicturi. Sed in ijs qui ad longas ægritudines spectant, nihil ad medendi rationem difficile, dumtaxat quod pertineat ad indicia noxæ, ut potè cum uenena statim atq; præsentaneam uim illam perdidderunt, transmutata in longos adfectus, communia reliquorum uitiorum remedia, compositionesq; flagitent, cum uenefica proprietas non amplius inest. Si uerò longa sit affectio, in aliquod diuturnorum morborum genus recidet, à quibus facillè iuerit medendi rationem assumere. Sed de ijs quæ generaliter auxiliantur, hæcenus. Consequenter quæ priuatim singulis profunt, scriptis mandabimus, si prius sigillatim exposuerimus, quæ ex singulis ordinibus exitialem aut maleficam uim sortiuntur, ut medicinæ studiosi ea cautè obseruent, quæ ad rationem salutis scripta inueniuntur, quod nonnulla eorum quibus utuntur uenenis sint commissa. Incuria enim magnas adfert noxas, & sepe continuo usu eorum, homo in perniciem agit. Proinde animalia quæ exitiosam uim habent, hæc sunt: cantharides, buprestis, salamandra, pinorum eruce, lepus marinus, tubera, & rana palustris muta, deuorata hi rudines. Semina sunt: Hyoscyamus, coriandrum, cicuta, gith, psyllion. Liqueamenta: meconium, opocarpafon, thapsiæ succus, elaterium, mandagoras Radices, quas mittit chamæleo, aconitum, thapsia, ueratrum, ixia, agaricum nigrum, ephemerum, quod aliqui Colchicum uocant, quod in Colchide nascitur. Herba oleratq; similax, quam aliqui tithymalum appellant. Romani taxum: folanum manicum, quod & dorycnium dicitur: sardinia herba, quæ ranunculi genus est: corniculatum papauer, pharicum, toxicum, ruta syluestris, fungi, ab animalibus, taurinus sanguis recens, coagulatum lac, mel Heracleæ in Ponto genitum, metalla, gypsum, cerufa, calx, auripigmentum, duo sandarachæ genera, spuma argenti, adarce, plumbum, & quod argentum uiuum dicitur. E liquoribus domesticis: uinum abundè post balneas potum, aut passum, & frigida aqua similiter.

In hunc sextum & ultimum librum Dioscoridis nihil annotare librum, candidè Lector, cum ea omnia quæ hic liber comprehendit, fufius copiosiusq; testata sint à nobis in commentarijs nostris de ui & natura animalium, Latine & Germanicè conscriptis: de uenenis porrò atq; eorum Antidotis leges nostras annotationes in libello de uenenis Arnoldi Nonicomenfis & Petri Apponenfis, quos in hac re amplius consulere potes.

Cantharides.

Caput I.

Quibus datæ sunt cantharides, signa eueniunt grauissima. Ab ore enim ad uescam usq; cuncta erodi sentiuntur, picem aut simile quiddam cædrix respiciunt, dextra præcordia inflammantur, urinam ægrè reddunt, & subinde cum lotio sanguinem emittunt, strigmenta non secus atq; dysentericis, aluo deferuntur, fastidia urgent, animo linquantur, abortaq; uertigine concidunt, postremò mente abalienantur.

nantur. Ergo antea quam tale nonnihil accidat, dato oleo, aut supradictorum aliquo, uomere cogantur. mox ubi uomitione plurima reiecerunt, halicæ aut orizæ, A
 fragi aut ptisanæ cremor, ad decoctum maluæ, aut seminis lini, aut fœnigræci, aut radicem althææ, quam Latinus sermo ibiscum appellat, clystere infundatur. præterea nitrum eisdem dandum, ex hydromelite, ut quæ stomacho adhuc aut intestinis adherent, eluendo excernantur, ac descendant. Quæ nisi sic discutiantur, ingesta in aluum ex nitro aqua mulsa, uacuari debent. detur deinde uinum aut passum, in quo pineoli nuclei, aut cucumeris semina cōtrita sint, aut ex lacte, aut mulsa, aut anserinus adeps in passillo liquefactus. inflammata autem partes, hordei farina cum mulsa decocta perungantur. Ab initio admota cataplasmata nocent, quod citatus ab eis calor, illapsum uirus ita remoratur, ut in principes se parteis insinuet. ipsa tamen interiecto tempore, molestissimis inflammationibus opitulatur, ut potè quæ dolores & permulceant & leniant, tum ubi corpus calfaciente oleo inunctum fuerit, in soliū descendere oportet, ac lauare, ut per cutem summam quæ corpori noxia inhæserunt, etiam excernantur, & deiectiones multifariam moliri oportet, ne affectus infigatur, & stabilitatem capeflat. Gallinaceis carnibus & hœdinis, aut suillis catulis maximè pinguibus & tenerimis, ac cum lini semine coctis uesci debent: siquidem aluum ciant, atque uenorum acrimonias hebetant. Vinum dulce liberalius ebibatur. Prodest thuris cortex, & Samia terra, quæ aster appellatur, si quaternæ singulorum drachmæ cum passio^{* Passi dra-} sumantur. item pulegium ex aqua tritum, irinum aut rosaceum, cum ruta decocto: recentes uitis ramuli, cum passio detrīti. Longè omniū^{chma,} potentissimè antidota auxiliantur, cum aqua mulsa, drachmis quatuor pota.

Pinorum erucae. Caput II.

Is qui erucas pinorum hauserunt, illico dolor in ore & palato exoritur. uehementis A
 alui, linguæ ac stomachi inflammatio torquet, intestina dolor excruciat, ita ut pruriginem sentire uideantur. corpus totum exæstuat, fastidium urget. Quibus est succurrendum remedijs, quæ deuoratis cantharidibus dantur. Peculiariter tamen pro simplici oleo & irino, melinum, quod è cotoneis pomis & oleo temperatur, accipimus. B

Buprestis. Caput III.

Qui buprestin biberunt, non dissimile nitro uirus sapiūt. stomachi uentrisque uehemens dolor insequitur. tam uenter quam stomachus mirum in modū, ut in aqua inter cutem, diffusus inturgescit. Vniuersa corporis facies contenditur, urina supprimitur. Quibus eadem quæ potis cantharidibus auxiliantur. Priuatim post uomitus & uacuationes, quas clysteribus molimur, aridæ ficus profunt. item earum decoctum, ex uino. ubi uerò iam ferè pericula inclinantur, Thebaicarū palmarum cibo, aut earundem tritarum in mulso aut lactis potu, iuuantur. pyrorum etiamnum omne genus esse, & lac humanum bibere, conuenit.

Salamandra. Caput IIII.

Si Salamandram hauserunt, linguæ inflammatio consequitur. mens & sermo præspeditur. tremor cum torpore aut horrore quadam ac exolutione accedit. partes nonnullæ corporis liuoribus circumquaque sugillantur: sæpeque diutius immorante ueneno putrescentes defluunt. Quibus præstabis cuncta quæ potis cantharidibus. Peculiaria uerò remedia, resina pinus, aut galbanum ex melle linctum, & aiugæ decoctum, in quo nuclei pinei conterantur: urticæ quoque folia, cum lilij & oleo decocta. profunt etiam oua testudinis marinæ aut terrestres, cocta: item ranarum ius, cum quibus eryngij radix in cocta sit.

Ephemerum. Caput V.

Sympto ephemero, quod aliqui Colchicon, aut syluestrem bulbum appellāt, prurit in toto corpore excitatur, non secus atque ijs qui urtica aut scilla laceantur. interna rofionem sentiunt. stomachus cum ingenti grauitate exæstuat. cæterum inualefcēte morbo, cruor frgmentis admixtus, per aluum exigitur. Quibus, urijs

A qui salamandram hauserunt, uomitione aut clysteribus auxiliari conueniet. sed ante quam uenenum inualescat, dandum est decoctum frondium quercus, aut glandium, aut malicorij, lac bibere prodest, in quo serpyllum sit decoctum. item succum sanguinalis herbæ, aut ramorum uitis, aut rubi, aut medullæ recētis ferulæ, aut myrti cum uino: bacæ autem myrti tusa tritaq; & aqua macerata, ut liquor inde sumatur, opem ferunt. media castanearum tunica, similem effectum præbet, si cruda in aliquo supra dictorum succo sumptiueretur. organū quoq; cum lixiuio epotū. eximiè iuuantur asinini lactis aut bubuli calidi potu, etiam si in ore contineant: ita ut quibus copia lactis huius adsit, non aliud desideretur.

Dorycnium. Caput VI.

Dorycnion, quod aliqui manicon solanum appellant, epotum, lactis saporem in gustu refert. continentes singultus ciet, humor linguam uexat, sanguis confertim reijcitur. mucosa quædam perinde quasi dysentericis, aluo egeruntur. Itaq; antequam aliquid ex ijs eueniat, auxilio sunt antedicta, uomitus, clyster, & quæcumq; potum uenenum expellere possunt. Priuatim ijs opitulatur aqua mulsa, lac caprillum, aut asininum, dulce uinum, quod tepidum cum aniso bibatur, amygdalæ amaræ, gallinacæ pectora decocta. quinetiam conchyliæ omnia, tam cruda quam tosta esse salutare est. conueniunt & locusta marina, & gammari, & pota eorundem iuscula.

Aconitum. Caput VII.

Aconitum statim in lingua inter bibendum, cum astrictione quadam dulcescit: & subinde, potissimum cum exurgere conantur, uertigines offundit. lachrymas ciet, grauitatem pectori, & præcordijs adfert, simulq; crebri spiritus desistantur. Quare uenenum uomitione abigi aut clystere per aluum egeri opus est. urimur inter propinandum, origano, ruta, marrubio, uel absinthij decocto, cum uino absinthite, uel semper uiuo, uel abrotono, uel chamelæa, aut aiuga. prodest etiamnum opobalsami drachma, cum melle aut lacte, cum castorio, pipere, & ruta, æquis ponderibus ex uino. coagulum hædi, leporis, aut hinnuli, cum aceto. ferri quoq; stercus, item uinum in quo aurum, ferrum, argentumue candens restinguatur, potum. lixiuiq; cum gallina & uino decocta. aut carniū bubularum præ pinguium iura, cum uino sumpta, fertur & aiuga priuatim ipsis subuenire.

Mel Heraclia. Caput VIII.

Mel in Heraclia Ponti, ubi aconitum gigni solet, inuenitur, quod qui edunt bibuntue, non secus affligantur, quam qui aconitum ebiberunt. Iis eadem, quæ poto aconito conueniunt, adiuuantur inprimis continuo uini mulsi potu, cui rutæ folia sint adiecta.

Coriandrum. Caput IX.

Coriandrum ob odorem latere non potest. epotum autem uocem exasperat, insaniam adfert, a temulentij non abhorrentem. qui sumpserunt, pudenda dictu blaterant, toriusq; corporis odore, uenenum fatentur. Quibus post uomitionem irino oleo concitata, uti retulimus, merum & per sese, & ex absinthio potum, auxiliatur, item oleum. nec secus oua in eodem exinanita, si liquefacta * in muria forbeantur. & epota muria, & ius salsum ex gallina & anseris, passum quoq; cum lixiuia sumptum.

Psyllium. Caput X.

Psyllion epotum, corpori toti frigus & torporem cum exolutione & merore quodam affert, ita ut animum despondeant. Cui omnia quæ ex hausto coriano auxiliantur.

Cicuta. Caput XI.

Cicuta

Cicuta pota uertiginem excitat, oculisq; caliginem offundit, ita ut ne minimum A
cernatur. singultus ciet, mentem turbat. extremi artus gelantur, deniq; conuul-
si, suppresso arteriarum spiritu, strangulantur. Quare inter initia, uti in reliquis, cicu-
tam uomitu excutimus. postmodum deiectionem moliamur, ut quod ad intestina
prolapsum sit, excernamus. tum demum in meracam potionem, quæ maximo est au-
xilium, deuenimus repetendum per interualla, in quibus proderit lac asininum, aut
bubulum potui datum, aut absinthium cum pipere & uino, castorio, ruta, mentha
cum uino, aut amomi, cardamomi, aut styracis uncia, * aut piperis cum semine ur-
ticae & uino, aut lauri folia. item laser ex oleo & passo, & passum per sese largius
porum proficit.

Taxus. Caput XII.

Smilax, à quibusdam tithymalum, à Latinis taxus appellatur; frigus uniuer-
so corpori, strangulatus, & celerem interitum infert. Cui eadem quæ cicutæ
conueniunt.

Carpasi succus. Caput XIII.

Epotus carpasi succus soporem, citamq; strangulationem adducit. Aduuantur
autem qui hauserunt, epotæ cicutæ remedia.

Sardonía herba. Caput XIII.

Sardonía ranunculi herbæ generi assignatur, quæ uescentibus mentem adimit,
& quadam neruorum distentione labia in rictum contrahit, ut risus speciem
præbent, à qua quidem affectione, de Sardinio risu adagium in uulgus infausio o-
mine manauit. Post uomitum peculiariter conuenit aqua mulsa & lac, liberalius e-
pota, irrigatio, perunctioq; à pinguius medicamentis, totum corpus exalfacienti-
bus, in calidam aquam oleumq; descendant, sed tum multum perfricare & inungere
expedit. & in summa, curam omnem, quæ conuulsioni neruorum adhibetur, ex-
qui oportet.

Hyoscyamus. Caput XV.

Hyoscyamus potum aut comestum, similem ebrijs abalienationem mouet, sed
facile medicamentis cedit. Auxiliatur aqua mulsa copiose data, lacq; præser-
tim asininum, si id desideratur, caprillum, uel bubulum, uel aridarum ficuum deco-
rum, faciunt ad id etiam nuclei pinei, aut cucumis semen ex passo sumptum, & ui-
num salsum cum adipe suillo recenti, passoq; itidem urticae semen, aut nitrum ex a-
qua, & intubus erraticus, & sinapis, & nasturtium, radix, cepa, & allium. & hæc sin-
gula cum uino sumantur: * postea finendi quiescere, quemadmodum qui uinum bi-
berunt, ut excoquant.

* Alij, post quie-
scant, ut uinum
concoquantur.

Mandragora. Caput XVI.

Mandragora si bibatur, confestim sopor insequitur, exolutio, ac uehemens ue-
ternus, nihil temere distans à lethargo. Cui, antequam aliquid ex his accidat,
uomitum & aqua mulsa proderit, postea nitrum & absinthium, ex uino dulci aut
passo sumatur, caput rosaceo & aceto perfundatur, proficit excitatio, & motus cor-
poris, & olfactus eupatorii, & piperis, sinapis, castorii, & rutæ, tritorum in aceto: &
liquida picis, & odor è lucernarum exustione & extinctu, quod si ægrè in reuocetur,
sternutamenta mouere, alijsq; communibus auxilijs ut conueniat.

Meconium. Caput XVII.

Epotum papaueris succo, quem meconion uocant, consequitur ueternus cum per-
frictione & pruritu uehementi, ita ut sæpe inualecente ueneno, tanta erumpat
prurigo, ut hominem excitet, corpus id medicamentum olet. Post citatam oleo uo-
mitionem, acres clysteres auxiliantur, acetumq; mulsum cum sale potum, aut mel
cum rosaceo calido, merum cum absinthio aut cinthamomo copiosum, aut calidum
per sese acetum, nitrum ex aqua, & origanum cum lixivia aut passo, & rutæ syluestris

A semen cum pipere, uino, & panace: piperq; cum castorio & aceto mulso, uel cum satyreia aut origani decocto cum uino. hi olfactibus excitandi. ob enatam pruriginem in balneas descendant, & foueantur. post lauacrum prodest iurium pinguium usus, cum uino aut passo. medulla etiam ex oleo pota.

Corniculatum papauer. Caput XVIII.

Quod corniculatum papauer appellant, & potu & cibo eadem inferre consuevit, quæ papaueris succus: nec alijs expugnatur auxilijs.

Pharicum. Caput XIX.

Quod Pharicon uocant, sapore syluestre nardum imitatur. Resolutionem neruorum potum affert, cum conuulsione & delirio. Oportet autem post uacuationes uinum absinthien potui dare, cum cinnamomo, aut myrrha, aut nardo gallico, quod serinen aliqui uocauerunt: aut specie nardi duas drachmas, & myrrhæ totidem obolos, cum passo, aut irim cum croco ex uino, derafumq; caput illinire hordeacea farina cum aceto, & trita ruta.

Toxicum. Caput XX.

Toxicum ex eo nominari uidetur, quod barbarorum sagittæ eo illinebantur, qui biberint, labiorum & linguæ inflammatione torquentur. incoercitus furor uarias huiusmodi imagines obseruat: quare uix medicinæ locus est: raroq; qui hauserunt, euadent. Vinculis ergo cohibendi, ut uinum dulce cum rosaceo bibere, & reuomere cogantur. rapi semen bibendum cum uino. Priuatim huius conuenit, quinquefolij radix, & hircinus sanguis, aut caprillus, eodem modo sumptus. roboris, fagi, aut ilicis cortex cum lacte tritus. malaq; trita esse, aut cum pulegio & aqua bibere, conueniet. amomum & balsami semen ex uino. Sed qui periculis defuncti sunt, diu lectis decumbunt, & ubi surrexere, stupidi reliquum tempus degunt.

B

Ixia. Caput XXI.

Ixia, quæ ulophonon appellatur, inter potandum aliquid ocimo simile gustu & odore redolet. uehementem linguæ inflammationem excitat, mentem mouet, omnes excrementorum exitus suppressit strepitum cum animi deliquio ciens. huius intestina latrant, nec egeritur quicquam. Post uomitionem aluumq; resolutam, auxilium præstat aqua, in qua absinthium maduerit, ex uino largiore, aut aceto mulso pota. rutaq; syluestris semina, aut laferis radix. item tragorigani decoctum, cum aliqua supradictorum, aut lacte, aut resina terebinthina*, aut nardo, aut castorio, aut laferis pitio, quorum singuli oboli conueniunt. quin & nuces iuglandes ex uino, cum resina, castorio, & ruta trita, ita ut singula drachmæ pondus æquent. itidem chamelæ aut thapsiæ aut absinthij succi sicilicus cum aqua mulsa. & acetum calidum potum.

* Abicgna.

Cerusa. Caput XXII.

Cerusa suo colore proditur. sumpta enim, mox palatum, gingiue, lingua, & cæmissuræ dentium, candore quodam inficiuntur. singultus, tussim, ac linguæ ariditatem excitat. huius extrema frigescent, mens labat, membra torpescunt. Quibus dare conuenit aquam mulsam, aut ficuum, aut malum decoctum, aut lac calidum, aut sesamam ex uino tritam, uel lixiuiam ex sarmentis factam. amara cinum oleum aut irinum persicorum ossa cum hordei* decocto. columbina oua cum thure, aut hordei decocto, aut prunis, aut gummi quod ulmus plorauit, aut humor quem ulmea folia reddiderunt, cum tepida aqua. sed tum quoq; uomant. conuenit etiam thapsiæ succus, aut scammoniæ, cum aqua mulsa potus.

* Lilij.

Fungi. Caput XXIII.

Fungorum alij genere, alij copia lædunt. omnes tamen strangulatus suspensio similes concitant. Quibus confestim succurrendum, communiter ex oleo uomere

mere cogendi mirificè iuuat lixiuia ex farmentis aut pyraſtri ſurculis, epota cum A ſale, poſca & nitro. fructus, aut folia pyraſtri cum fungis decocta. ſtrangulantiem il lam uim auferunt, eſtataq; eiſdem auxiliantur. aduerſus fungos gallinacea oua cū poſca proficiunt, adiecta ariſtolochiæ drachma, item abſinthium cum uino melleq; ſumptum, & ex aqua potum. apiaſtrum ex nitro. panacis radix & ſemen in uino. ſex uini cremata cum aqua. atramentum ſutorium ex aceto. radix, uel ſinapis, aut naſtur tium eſu proſunt.

Gypſum. Caput XXIII.

L Apideſcens gypſum ſtrangulationem creat: quare eadē proferenda ſunt, quę manſis fungis, auxilia. ad hæc malux decoctum, quod etiam olei uicem penſat. utpotè cū pingue ſit, euomendoq; lubricas uias & faciles reddit, deradi corpora non ſinit. quod ubi duratur in lapidem, gypſum efficit. quin etiā prodeſt oleum ex aqua multa, aut ſiccorum decocta. lixiuia è ſiculneo cinere, aut farmentis facta, cum uino copioſiore pota. origanum aut thymum cum lixiuia, aut aceto, aut paſſo. hiq; decocto malux proluendi.

Sanguis taurinus. Caput XXV.

T Auri recens iugulati ſanguis, epotus, ſpirandi difficultatem ſtrangulatumq; concitat. faucium tonſillarumq; meatus cum neruorum diſtentione* præclu- dit. lingua rubefcit, dentes inficiuntur. quædam concreti ſanguinis ueſtigia, inter eorum commiſſuras reſtant. quare uomitum uitabimus. ſanguinis enim globi at- tractu illo in ſublime relati, magis gulæ inculcantur. Dari ergo opus eſt quæ con- cretum ſanguinem diſcutiunt, aluum ſubducunt. groſſi lacteo ſucco turgentes ex poſca, & nitrum per ſeſe, auxiliantur. nec ſecus coagulum omne cum aceto & laſer- pitij radice, aut laſere. itidem & braſſicæ ſemen, è cinere ſiculneo lixiuia. conyzæ fo lia* cum pipere, & rubi ſuccus ex aceto aluus reſoluenda. iſs qui ſeruantur, ſtercoro ſa & fluida per ſedem egeri conſueuerunt. ſtomachum aluumq; hordeacea farina B ex aqua multa perungere oportet.

Lac coagulatum. Caput XXVI.

E Os qui coagulum lac hauſerunt, frequens illico ſtrangulatio inuadit, quod in globulos quosdam lac coaleſcat. Quibus iuuandis pro antidoto, coagulum ex aceto damus, & bibere ſapius cogimus. damus & calaminthæ folia arida, item ſuccum, aut laſerpitij radicem, aut laſer cum poſca. thymumq; ex uino*, & cum lu- to ſuo lixiuiam. Sed nulla falſilago obijciatur, quoniam magis lac coiret, & in caſeu denſaretur. Neq; illos uomere conuenit: ſiquidem concretum lac ſeſe ingulæ angu ſtias inſinuans, ſtrangulat.

Argentis puma. Caput XXVII.

S Puma argenti pota, ſtomacho, uentri, & interaneis grauitatem cum magnis tor- minibus adfert, & nonnunquam pondere ſuo inteſtina uulnerat, urinam ſuppri- mit. corpus intrumet, plumbeamq; deformitatem concipit. Quibus ſubuenit ſecun- dum uomitionem. potum ſylueſtris hormini ſemen, myrrhæ drachmæ octo, abſin- thium, hyſſopum, apij ſemen, aut piper, aut liguſtri ſlos ex uino, aridum palumbis ſinum, cum nardo & uino.

Argentum uiuum. Caput XXVIII.

A Rgentum uiuum potum eadem quæ ſpuma argenti inferit, eiſdemq; utendum auxilijs. lac copioſe potum auxiliari coſtat. ſed poſtea euomant, qui hauſerūt.

Calx, Sandaracha, Auripigmentum. Caput XXIX.

C Alx, Sandaracha, & Auripigmentum, pota aluum & inteſtina cum uehementi eroſione excruciant. Præbenda cuncta quæ ſuo admixtu illorum acrimoniam

A heberant, ac soluunt, & facilem lubricamq; aluum reddunt, cuiusmodi ibisci & malua succus est. natura enim utriq; perlubrica. dandum decoctum seminis lini, uel semen tragi herbæ, uel orizæ, lacq; cum aqua mulsa copiosum, iura pinguis, & boni succi.

Lepus marinus. Caput XXX.

Qui leporem marinum biberunt, piscium uirus olent: procedente tempore, aluus dolore afficitur, urina sistitur. etsi quando eam reddere contingat, purpureum colorem referet. omne piscis genus aduersantur & odio habent. fetido ac graui sudore manant. biliosus uomitus, interdum sanguini promiscuus, subsequitur. His dandum lac asininum, uel passum continuè, aut radices malua foliorumq; decoctum, aut trita cyclamini radix cum uino, aut ueratri nigri, aut scammonij succi drachma, cum aqua mulsa, puniciq; mali acinis. cedria contrita cum uino efficax est. anserinus sanguis, ut tepebit, potus, sed cum pisces omnes respuant, aspernenturq; folijs fluuifilibus crancris uesci possunt, bibuntq; eos admisto uino, adiutiq; ab his percoquunt: cumq; appetere & comesse pisces ceperint, suæ salutis indicium habent.

Rubeta & palustris rana. Caput XXXI.

Rubeta aut rana palustris assumpta, tumores ciet. pallor corpus uehementet decolorat, ut planè buccum spectetur. spirandi difficultas torquet, & grauis halitus oris, singultusq; inuita interdum genituræ profusio consequitur. A diuatur secundum uomitionem multo meri potu, & arundinis radices binis drachmis aut cyperi totidem. breuiter, cogendi sunt ut uehementi ambulationi & cursui se credant, ob torporem quo corripuntur, quineriam quotidie lauandi sunt.

Hirudo. Caput XXXII.



De uorata cum aqua hirudines, si ori uentriculi adherent, tractione partium nonnullam suctionis imaginem præbent: eo enim argumento hausta hirudo deprehenditur. Has muria sorbitione excutit, & Cyrenaius succus, aut laserpiij folia, aut betæ, cum aceto, aut pota niuis glebula, cum posca nitrum ex aqua gargarizatur, aut atramentum sutorium aceto dilutum. Si faucibus hæreant, iniecta lupi * Alij, descende
dum est in solū
calfactum.
dendum etiam ijs, quæ etsi ferendi auxilij gratia tradantur, non minora tamen cæteris uenenis pericula sapius adferunt. Qualia sunt album ueratrum, thapsia, elaterium, agaricum nigrum: siquidem ea strangulatus concitant, aut immodicas deiectiones mouent. Quibus ea medentur quæ in fungorum mentione, & similibus retulimus. nimios autem deiectionum impetus, medicamentis quæ excrementa supprimunt, cohibebimus. Neq; negligenda quæ parum quidem nocere uidentur, interim tædè uitam in discrimina agunt. Quo in numero sunt syluestris ruta, (nouæ glacies), pappi recentes: flores autem sunt eius spinæ quæ cactos dicitur. Eos qui impetierint, sola uomitio recreat.

* Additiua
uerba.

Domestica nobis. Caput XXXIII.

Aqua frigida abundè pota, aut meracum uinum liberalius epotum, aut passum, præsertim à balneo, aut cursu, aut uehementi exercitatione, strangulatus & dolores infert. In quibus sanguinis missio protinus, & uacuatio, imminetia soluunt pericula. Sed de notis ueneficiorum, ac remedijs, & cauendi modo, hæcenus dicta sunt. Subiungeremus etiam antidota necessaria, quæ præclarè auxiliantur, quibus utimur, quale Mithridatium est præsertim, & quod sanguine, & quod

scinco

scinco temperatur: uerum quoniam alijs in locis diligentissimè scripta sunt, hic ab A
eorum descriptione super sedemus.

Venena.

Caput XXXIII.

DE bestijs quæ uirus eiulantur, & exitiis uenenis, ideo scribere aggredi
mur, ut tota curationis remediumque ratio ad umbilicum perducatur. In qua
dem pars hæc non minus quam cæteræ aliæ, necessaria est ijs qui artem medicam
exercent, ut potè cum adminiculo eorum quæ inibi traduntur, doloribus, periculis,
& cruciatibus, plurimisque alijs malis homines liberari conueniat. Hæc autem in sum
ma fastigia duo, sicuti ab initio relatum est, distribuitur. Nam qui de feris uirus in
spuentibus sermo disserit, theriacus dici solet: qui uerò de amolendis ueneficijs,
alexipharmacus: quo prius tradito, simul quæ sequi signa contineuerunt, præmou
strabimus: tum quæ non nihil auxilij ferunt. Omnia autem in promptu, & ad ma
num habere artificem oportet, propter urgentem & penuriam necessitatem. si qui
dem pauca è uenenis & uirulentis animantibus, tarda & grassantia seu, si pericula
cient, ita ut dilationem admittant: pleraque uerò præsentaneam perniciem afferunt.
Hominum autem partim malè alijs cogitantes, ingenta prauitate maleficium, ita ra
perant, ut spacium curanti liberum non relinquunt: partim sceleris admitti confici
entia, aut tristi aliquo euentu oppressi, hausto sponte ueneno mortem sibi conscisc
re conantur, qui postea deprehensi, aut resipientes, & uitæ cupidi, præsentaneam o
pem poscunt. Non desunt qui hostiles sagittas illinentes, aut fontes aquasque potea
nas hæc labe polluentes, ceram & inuitabilem aduersarijs perniciem moluntur:
in quibus ipsis etsi maleficium non subitò, sed aliquanto post grassari natura sua
comparatum est, tamen nisi primo quoque tempore coëscatur, & remedijs subinde
excipiatur, frustra tandem succurritur, occupatis iam corporibus exitiis ui uene
ni. Proinde non uulgari industria diligentiaque in ea re utendum est, ut quod in alijs
incommodis ars contineuit, in his quoque salutem mortalibus præbeat. Quin & apud
priscos genus hoc unum existimabatur esse eius partis, quæ medicamentis pugnati
sed recentiores ad ipsum dilcreuerunt, nominantes præcautionem, & modum præ
cauentem salubris sanantisque medium statuentes, parua & leui supra modum per
suasione decepti. Siquidem treis in humanis corporibus constitutiones esse contem
dunt, unam, qua sani degimus: alteram, qua sinistra ualitudine corpora laborant:
tertiam, quæ medium inter utraq; locum sibi uendicat, in qua positi, sanitatem spe
cie mentiuntur, facileque in morbos & pericula concidunt, ob uim corruptiorem,
quæ corporibus nostris incumbit. quemadmodum in ijs uidere licet, quos excan
descens rabie canis momorderit, necdum tamen aquam horrent: in ijs quoque qui
cantharidas hauserunt, sed nondum urinæ tormento cruciantur. Tripartito igitur
artem digerit, triplicique corporis constitutioni merito respondere tradunt. Sa
lubrem partem esse uolunt, quæ sanitatem ructur præcauentem, eandemque prohib
entem, quæ obstat quo minus in morbos incidunt: & sanantem, qua uirtus discuti
untur. Quibus ita responderi potest, quod primum ex ista rationatione non treis
corporis tantum, sed quatuor haberi constitutiones fatendum esset, quippe ut ali
qui sunt, qui necdum morbo laborant, morbo tamè maxime obimpendentem cau
sam sunt obnoxij: ita sunt, qui iam priore morbo defuncti, nondum tamen secunda
ualitudini restituti sunt: id quod in ijs qui à morbo proximè sese recolligunt, cerne
re licet, qui uitiam recreationem & robur desiderant. Sed quemadmodum curandi
ratio ad partem medicamentariam pertinet, ita præcautionem eidem subijci par est.
Ad arcendas enim ualitudines uehementibus utimur auxilijs, altiore sacrificatu, uti
onibus, amputatione, derodentibus epithematis, potionibus perniciem occurrenti
bus, & plerisque alijs. Verum enim uerò sunt usque eo rudes nonnulli, ut ne remedia qui
dè appellent, quæ morbos arceant. Cuius sententiæ inire rationem haud promptum
est: etenim cū uerbum ipsum, præcauere, tum agendi modus, omnino auxiliarem re
mediarique uim præ se ferunt. Mirum uerò nisi etiā sua illa distributione partem eos
cōplectuntur, qui in pestilentis coeli statu morbo nondum correpti sunt, pesti tamè
propter obuerlantis aeris occasionem, opportuni, & in morbum prout redduntur,

A Dicere forsitan quis posset, salubris institutionis præcepta non aliud esse, quam ar-
 cendorum morborum rationem: quippe cum firma reddere corpora, & minus ui-
 tijs obnoxia nitamur, ut inoffensa ualitudine degant, nec morbis conficiantur. Ne-
 que id silentio prætereundum, quod maxime præcipuum, & tanquam caput rei est,
 non oportere medicinæ partium distributionem, totidem corporis constitutioni-
 bus respondere, sed naturas singulorum suis notis seorsum scrutari ac explorare, ut
 suis locis ostendimus. Cum hîs igitur non pluribus agendum. Illud magis adnotare
 conuenit, affectus qui à uirulentis animalibus uenenisq; contrahuntur, uocari cæ-
 cos, id est, quorum ratio minime iniri potest. Quin & ea quæ eisdem auxiliantur, nul-
 li pariter sunt addicta causæ: quapropter quæstionibus obseruatoriæ artis, & eius
 quæ ratione fulciatur, annumerari solent. Neq; prorsus uerum deprehenditur, af-
 fectus huiusmodi cæcos esse. Nam quod semper se protrahit, & nullum in quibus-
 dam necessarijs usum exhibet, haud facili coniectura colligi potest: etsi naturæ pro-
 prietate prorsus cæcos eos affectus concedimus, qui ab exitiabilibus uenenis, & ani-
 mantibus quæ uirulento morfu sæuiunt, contrahuntur. Nam quod ad opus nō nul-
 lum usum præbet, datq; medendi occasionem, neq; imperceptibile, neq; cæcum, nul-
 lius causæ obnoxium reputatur: sed magis ab ipso quis impulsus, demonstratione
 se habere, & opinionem de abditorum cognitione confirmare poterit. Nam etsi sæ-
 pe minora sunt, quam ut sensibus percipiantur, euidenter tamen ex ipsis inter se col-
 latis deprehenduntur. Diocles autem in eo commentario, quem Plisarcho dicauit,
 satis modos perstrinxit, ad uerbum ita scribens: Nosse quis hoc potest cum in alijs
 non paucis, tum in uiperis & scorpionibus, & reliquis id genus, se cum animo repu-
 tans, ut quamuis exiguos sint corpore, uixq; conspectui subiiciantur, magnorum ta-
 men discriminum ac dolorum causas inferunt: quorum nihil præter quandam cor-
 poris exiguitatem, uimq; præ cæteris animantibus datam illis, facile fuerit inspicere.
 quanta enim ea moles corporis est, quæ à scorpionis ictu, & aliorum id genus ueneno-
 rum quæ nos morfu conficiunt, attingitur: quorum aliqua uehementes cruciatus ex-
 citant, alia erodunt, & putredines eient, nec desunt quæ præsentaneam perniciem
 moliantur, aut quantulum est quod à phalangij morfu ingeritur, & uniuersum cor-
 pus excruciat: neq; enim quis magnitudinem ipsorum deprehendere posset, cum
 prorsus exigua mole consent. Ergo quod hæc ad affectus referuntur, constitit inter
 omnes, uerum quod exacte deprehensum sit, uim quandam ipsis inesse mortiferam,
 quæ insinuata corporibus molestiarum quæ exoriuntur nobis causa sit, in confesso
 est, & omnium consensu persuasum. Nec quisquam inuenietur usque adeo contentio-
 nis studio flagrans, qui aliunde exoriri molestias asseueret, quam à materia morti-
 fera partem corporis attingere. Porro id erat quod inter utilia artis opera in omni
 opere dicere oportuit, quamnam res opus hoc efficiat, ut nihil prorsus nos lædat, in
 comprehensa communis causæ quæ proprijs inest ratio: quandoquidem tum eu-
 denter indicari possit, cum deprehensa est. Ideo Esistratus Empiricorum pertinaciā
 graui cauillatione incessens, cæcis affectibus causas assignauit, inficiatus his com-
 muniem & supremam morborum causam incomprehensibilem esse: & hanc in eo
 quem de causis scripsit commentario, aptissime prodidit, candido signatam lapillo.
 Nec ferendos eos esse censuit, qui se dicant in quibusdam, ut in uenenis, serpentium
 ictibus, & cæteris id genus tria medendi ratione contentos esse, neq; satis facturam
 sibi obseruationem eam, quæ à causarum comprehensione separata est. Primum e-
 nim genere comprehendi facile possunt. Quod autem sit letifera uis, corporaq; per-
 mutans, ita ut perimat, ex hîs quæ per genus, non per speciem uagantur, curationem
 indicat, quæ hæc hebetare, & prorsus expugnare liceat. Cum uero subiungit: Ad a-
 quam dulcem & potui idoneam uenit quis, & ante obseruationem ad uomitum, ad
 uulneris dilatationem, ad demorse partis suctum, cucurbitulas adfixit, partem inci-
 dit, uentia medicamenta, aut ea quæ uim eandem adipiscuntur admouit, postremo
 partem amputauit: secum reputauit medicamina, quæ per summam cutim ferre &
 applicari solita, immisæ ad intima perniciem repugnarent. Hæc itaq; quæ disseruit E-
 ristratius, ueritati consentanea sunt, nec arti refragantur. Sed methodicos demira-
 rilicet, qui mortiferam uim corporibus illapsam, negotiorum, quæ ipsa facessit, esse
 causam diffiteantur, uerum rudiusculè nomini attendunt. Nam apud ipsos palam
 immissa

inmissa uis φλογοποιός, id est, mortifera, nominatur: φλογοποιός autem nullius officij **A**
 alius esse potest, quam causæ. Aiunt hæc nomina, καροππός, & ἀναλυσίς, esse
 reliquis omnibus similia, in quibus partes quædam dictionum non pro uirtute, sed
 nuda enunciatione comprehenduntur. Enimuerò quemadmodum n his uocibus
 καροππός & ἀναλυσίς, partes neq; certos neq; principes reuinent significatus: sic
 in hoc uerbo φλογοποιός partes productionis gratia, non pro uirtute coalescunt.
 Hinc ad causarum differentias transeunt, affirmantq; causarum aliquas eddentes
 esse, quæ dum aduersam ualitudinem creant, separantur, cuiusmodi sunt frigus,
 labor, æstus, & similia: quasdam continentes, quæ permanent postquam morbum
 excitauerunt, hoc est, quibus præsentibus, & effectibus eorum adstant: incrementibus,
 affectus augentur: decrecentibus minuuntur: & cum desinunt, in eam finiuntur:
 quibus solis ac per se manentibus, effectus quoq; ipsi manent. Talia quidem recep-
 tissima sunt causarum discrimina, quorum nulli phthoropœon subijci potest. Eui-
 dens enim causa non est, quoniam morbus ipse permanet, nec ipsa a corpore sepa-
 rat. Nec continens causa dici potest, cum magna ex parte hic adsit, quemadmo-
 dum accidit ijs, qui à rabioso cane sunt demorli. Quod si neq; euidentis causa neq; o-
 rinens fuerit, neq; per se, neq; alterius consortio causaverit: quod si à nulla causâ
 differentia phthoropœon deducere possumus, consequitur, ut neq; causam esse fa-
 teamur. Quod autem asserunt, uocabula quædam in se non habere parres rerum si-
 gnificatiues, sed nuda & simplici pronuntiatione ficta esse, fatentur esse. Ve-
 rum non omnia, sed per pauca talem nascisci conditionem existimandum est. neq;
 enim πρῶτος in hoc nomine φλογοποιός perinde atq; assumptitia profertur, sed longè
 principem obtinet significationem. Quemadmodum enim φλογός, id est, corruptio-
 nis, nomen mutationem in peius significat, sic hoc uerbum πρῶτος sumi debet, ut tur-
 hil amplius ex eo quod hanc dictionem φλογός secum habeat declaret, neq; prorsus
 id significat, quod omnes palam audiunt, & huic simile redditur, πρῶτος ἐξ ὧν.
 Si dant à corruptione sanis, fieri morbum, concedunt utiq; uim in huiusmodi uer-
 bo πρῶτος subesse, siquidem aliquid est quod corruptionem efficiat. Omne autem **B**
 quod aliquid efficit, ostenditur per singulas causas quæ corporibus subiciuntur,
 idq; tam in letalibus uenenis, quam in ijs quæ corporibus ingeruntur. Verum non
 nihil subiacere causarum differentijs prodeunt. Quinetiam aberrauerunt, non ex actâ
 diuisionem assumentes. Qui uerò se dogmaticos præstiterunt, causam esse partim præ-
 parantem, partim continentem asserunt: ut inguinum ulcus, & inguinariâ febrem,
 & quæ effectui tum assiat, tum etiam separatur, ut à fractis præcipitatio. In sum-
 ma, quoties quippiam suapte natura causa fuerit, nec ulla diuisione comprehenditur,
 uitiosum est, neq; causæ adscribitur, eorum quæ idem genus sortiuntur. Sed
 quod phthoropœon, causa sit, nomen ipsum argumentum est, & in ijs quæ contin-
 gunt apertius ostenditur. Quid aliud causæ arbitrantur esse post impressum à ser-
 pentibus ictum, quam ex animante uim, & illapsam in corpora uirus? Neq; enim
 frigus, neq; æstus, neq; sectionem corporis, neq; cruditatem, neq; aliud quicquam
 simile causari possunt. Verum quoniam causarum differentijs gaudent, & aliquas
 continentes, alias euidentes appellant, ipsi dicendum, utroq; istorum modorum e-
 uidentem quidem causam esse, quod affectum præcedit, & quod corporis substanti-
 am præoccupat: continentem uerò, quod morbis præsentibus adest, quæ separata
 recedunt, quæ cum ipsa euenerant. Sed de ijs hæc enus. Statuendum itaq; mortife-
 ram uim inrinfecus manifestissimam esse causam, ipsamq; principem facere scô-
 pum oportet. Erantequàm ad ima decumbant morbi, uarijs modis est certandum,
 donèc uis tota corporibus excutiat. modò enim reuocari debet ea parte, quæ pe-
 ffrs intrauerit, modò aliqua alia, præsertim principatum non obtinente, ante coër-
 ceatur, quam altius irrepens uiscera tangat, aut eius pernicies eluatur, et uindicta;
 cum iam membratim peruagatura est. Itaq; uenena si hausta sunt, crebris uomi-
 tionibus: si morsu impressa, scarificatione, affixis cucurbitulis, exustu, carnis cir-
 cumscriptione, nonnunquam amputatione extremæ partis, euocantur. retinen-
 tur uerò infusione, & imposito medicamento acrum cohibentur. hæc simul
 utique arcere uirus & eluere possunt. Restinguuntur & euincuntur meraciorè po-
 tu, aut passo nulla aqua diluto, uel contrariorum esu, quæ acrimonia sint prædita.
 Postremo

A Postremo deiectione alui, euocatus sudor, & alia quædam in commune, quæ mem-
bratim demonstrabimus, auxiliantur. Verumenimvero non letiferam modò ma-
teriam, sed & magnitudinem, & tempus, pro scopo considerare oportet: etenim ab
his remedia quàm plurimum discrimen capessunt. A magnitudine quidem cum non-
nulla ex uenenis, & uirosis animalibus pericula minantur, alia putredines altas aut
exteriore excitant: alia uehementissimos dolores aut cæcos cient: alia uix medi-
camentis cedunt, & magis minù sue molestias excitant. Oportet autem ea quæ peri-
cula ferūt, per uicioribus auxilijs expugnari: & minus infesta, mitioribus. Quip-
pe absurdum fuerit in grauioribus, segnioribus medicamentis homines in discrimen adducere: in minoribus uerò, uehementium auxiliorum iniuria corpus lac-
sere. Finitio à temporibus in promptu est: hoc enim subito in pericula & præsentis
molestias adducit, illud uerò sensim & dilatas in diem longam aut breuiorem pro-
ducit. Itaque in acutis quidem confestim multa simul auxilio representari oportet:
reliquis, paulatim. Hæc quædam artis formula breuiter definita sint. Iam membra-
tum rem prosequamur.

Signa rabiosi canis, & demorforum ab eo.

Caput XXXV.

D E rabiosi canis morfu sermonem alijs præposuimus, quòd id animal dome-
sticum ac frequens esse cōsuevit, & in rabiem sæpius agitur, ac perit, ab eoq;
caueri difficile. inde periculum inuitabile hominem manet, nisi multis utatur auxi-
lijs. Canis plerumq; flagrantissimis æstibus in rabiem efferatur: interdum quoties
frigora inceserunt. Rabiosus autem potum & escam auersatur, largam spuman-
temq; pituitam naribus & ore proijcit. toruē & solito tristius intuetur. in omnes
passim sine latrata irruit, æquè feras hominesq; rā familiares quàm ignotos mor-
det. nec protinus infestum quiddam infligit, nisi, ut uulnus, dolorem. exinde mor-
bus ille, qui ab aquæ metu hydrophobicus gratia est uoce appellatus, contrahitur.
Euenit autem cum distentione neruorum, totiusq; corporis rubore, præsertim faci-
B ei, cum sudore & languore quodam aliqui auræ splendorem fugiunt, alij sine ulla
doloris intercapedine uexantur. Sunt etiam qui canum more latratus ædant, & ob
uiam factos morfu adoriuntur, ac mordendo simili uitio labefaciunt. Proinde ex
his qui hoc uitium senserint, neminem seruatum uidimus, nisi forsitan ex historia u-
num aut alterum euasisse audiamus. siquidem Eudemus superasse quædam affirmat.
Themisonem aliqui demorsum in hunc furorem incidisse & euasisse fatentur. Alij
ipsum cum amico aquam expauescenti morem gereret, & officium exhiberet, qua-
dam naturarum concordia similem contraxisse affectum: sed post multos tandem
cruciatu seruatum extitisse. Molestissimum itaq; genus morbi, à quo multos, ante-
quam ipsam experirentur, uindiciuimus, & complures ab alijs medicis seruatos no-
uimus.

Remedia demorforum à canerabioso.

Caput XXXVI.

R Atio medendi duplex. una communis, qua utendum in omnes morfus; quos
uirulentæ animantes impresserunt. alia peculiaris priuataq; eorum dunta-
taxat, quos rabiosi canes momorderint: quæ nonnullis quidem summam opem fer-
re consuevit, alijs uerò inutilis, maxime qui ex multo iam tempore ictum acceper-
unt. Quæ ad hanc pertinent, primum exponemus, deinde cursim perstringemus,
quæ ad communem medendi rationem pertinent. Cancros itaq; fluuiatiles in sar-
mentis albæ uitis cremare oportet, & cinerem eorum quàm minutissimè tritum ha-
bere reconditum. itidem gentianæ radicem tusam cribratamq; reponere. quoties au-
tem canis rabiosus morsum intulerit, in quaternos cyathos meraci uini, bina cice-
ris cancrorum cochlearia, unumq; gentianæ coniiciantur. hæc in polenta dilutioris
modum subacta, quatrinduo bibantur. Inter principia medicamentum hoc modo de-
tur. atqui si ab illato morfu bini terniue dies fluxerint, curationem auspicabimur à
triplicato pondere, supra id quod ab initio retulimus. Optimum hoc aduersus ra-
biosorum morfus auxilium, quod & plerisq; unum satis fecit, eoq; cum fiducia uti li-
cet.

cet. Sed ut alijs etiamnum auxilijs contra ineuitabile periculum muniamur, nihil ex A
teris uti prohibet. Satijs autem multo fuerit, etiam si in unum recidat, medicamen-
torum in humanos tolerare cruciatus, quam per inertiam ac desidiam in discrimē
adduci. Nec ita in demorsis à rabioso animali maiora uulnera uereri oportet, uti
minora, & ulcusculis cutis similia, quippe maiori uulnere confertim copiosus san-
guis emanans, potest nonnihil uirulenti liquoris exhaurire: quod in minoribus
non accidit: quin à minoribus abscedentes carnes hinc auferre, & labia acie scalpel-
li circumscribere, & prehensam hamulo aut uulsella carnem amputare oportet. In u-
trisq; circumstantia loca altioribus ulcusculis scarificanda, ut copiosior sangui-
nis uacuatio arceat, ne uenenum membratim insinuetur. Cucurbitulæ cum multa
flamma agglutinatz id iuuamenti præstant, ut ueneni uis extrahatur. Contra uiru-
lentos ictus, usio expeditissimum est auxilium, ut potè cum ignis cætera uiribus præ-
stet, simul quod uirus domet, & ferri penitus non patiat: simul quod pars igni
experta, postea non uulgare fundamentum curationi futuræ præbeat, manente diu-
tius exulceratione. Animaduertendum ex eo tempore cum crusta decident, ne ulce-
ris oræ coalescant, & cicatrice induantur, sed si fieri potest ad multum, idq; præsti-
tutum tempus, ulcerationes & fordidas adhuc & inflammationem minantes, pro-
rogari conuenit. Quod inditum ijs salsamentum optimè præstabit, & syluestre alli-
um detritum, item cæpe, succusq; præsertim Cyrenæicus, aut qui Medicus, aut Par-
thicus appellatur. tritici grana tam mansa quam non mansa imponantur. siquidem
sobacta pistatæ à persusione uulnera dilatant. Sunt qui à mandentum ieiunio, sibi
aliquid asciscere arbitrentur, quod suapte natura resistat. Verum id certum non
est: cæterum tempestius eorum usus minimè est contemnendus: Si uero, quod per
se pe accidit, ante dies præfinitos cicatrices coirent, committerenturq; manum po-
stulabunt: namq; eas diducere, carnemq; scalpello circinare, aut iterum inurere, ex-
pediet. Vbi uero propositum tempus præterijt, ulcus ad cicatricem ducendum, &
emplastro, quod è salibus conficitur, locus comprehendendus, nec multo post sine
pismo utendum.

Ratio uictus in morfu rabiosi canis.

Caput XXXVII.

QUæ ad partem istam pertinent præsidia, ita se habent. Cæterum uictus ra-
tionem ex ijs quæ ueneno aduersantur, coniectura quadam colligere oportet,
simul ut ueneni uires hebetet restinguatq; simul ut arceat, quo minus ad intima
perniciēs illabatur. Etenim assumpta perniciosarum uirium penetrationi resistunt.
Quorum utrumq; præstare potest uini meracioris, pasci, & lactis potus. quippe qui
hæc omnia capiunt ad curam, nonnihil ueneno obiciunt, quod omnem eius acri-
moniam obtundat. Simili modo aliorum, porrorum, cæparumq; cibis, quod ea
difficulter conficiantur, uixq; aboleantur. nam multos dies huius cibi qualitates
remanent, quo tempore nec euincuntur, nec permutantur à mortifera ui, sed contra
ijs illa uis expugnatur. Cui rei antidotorum usus accommodatur, & theriaces, Mi-
tridatis, & eius quod eupatorio temperatur, deniq; omnium quæ magnum aroma-
tum partem sibi uendicant. quippe aromata omnia uiribus & substantijs aggre per-
mutantur: quare in corporibus euincunt. Victus ratio hoc modo se habet: Nossè
conuenit, pauorem aque non statò definitoq; tempore exoriri, plurimum tamen ad
quadragesimum usq; diem neglectis differri consuevit. post semestrem etiam non-
nullos inuadit. quendam post annum aquam horruisse constat, quæ nobis uisù
comperta fuit. Narrant & aliquos post septennium aquæ metu fuisse tentatos.
Inter principia demorsorum à cane rabioso curandi ratio talis est. Verumenim-
uero si ea quæ retulimus auxilia, primis diebus prætermissa fuerint, nec scalp pro car-
nem circinare, nec usionem experiri operis præcium est. Non enim quod iam per-
transijt, satis euocare possent. Nulla utiq; istius rei occasio aut utilitas, sed incas-
sum corpora doloribus stermentur. Alter uero curationis modus accedat. deiectione
magnum præbet iuuamentum, ut potè cum mouendo, corporis habitum trāsmuter.
& quæ colocynthidem recipit hiera, item lac schistum, quod simul deiectionem mo-
ueat, & ueneni domare possit, cibi acres, & meraculi potus, quibus uis ueneni uehe-
menter

Amenter retunditur, quotidie sumi debent, ceterum sudores ante cibos, & post etiam ciendi. dropacismi sinapismi; alternatim per corpus totum adiciendi. Sed longè omnium efficacissimum auxilium helleborismus cognoscitur, quo cum fiducia non semel atq; iterum, sed frequentius ante quadagesimum diem, uel post hoc tempus uti licet. Tantam enim uehementiam hoc auxilium habere fertur, ut quidam qui iam aqua metum sentirent, sumpto helleboro simul ac primum morbi impetum experirentur, fuerint seruati. Nam & iam uitio tentatos nemo unquã seruare potest. Itaq; primum curam contra rabiosi canis morsus breui sermone exposuimus. iam ad alia, quæ uenenatis moribus sãuire consueuerunt, transeundũ. notas uno contextu, deinde communem medendi modum, qui omnibus conuenire possit, explicabimus. cursum deinceps subiungemus ea, quæ sua proprietate nonnullis auxilium prestare possunt. Postremo subnectentur etiam uenenata, quæ nullis cedunt remedijs.

Notæ eorum, qui à uenenatis demorsi sunt.

Caput XXXVIII.

* Rubescit.

Demorſus à phalangijs locus quidem ipſe, quaſi ab impacto a culeo rubet, non intumefcens, nec per ambitum calidus eſt, ſed mediocriter humeſcit*, ubi uero contrariorum occurſu refrixit, conſequitur corpore toto tremor, diſtentiones poplitum & inguinum, conuulſionibus non diſſimiles. in lumbis collectio exoritur. perpetua urina libido laceſcit, multa; reddendis excrementis colluctatio. uniuerſa cute frigidus ſudor emanat. colla chrymant oculi, offuſis; nebulis caligant. Si ſcolopendra aut dicta ophiocten e, morſum intulit, locus per ambitum liuore ſuggillatur, & putreſcit: interdumq; licet raro, faeculentus atq; ruber cernitur. à morſu ipſo exulcerari locus incipit. ulcus id negocium exhibet, ſerè remedijs inuictum, præterea toto corpore prurigo ſentitur. ſcorpionis morſu inflammari ſtatim incipit locus, & indureſcit, ac intentus rubet, uiciſſimq; dolore premitur. modo ſiquidem exaſtuat, modo frigore occupatur. labor repente fatigat. aliquando meliusculè habet, aliquando recrudescit. conſequitur ſudor, horroſis ſenſus & tremor. extremæ corporis partes refrigerſcunt. inguina extolluntur per ſedem ſtatus exeunt. capilli eriguntur. pallor membra decolorat. dolor, tanquam ex pungente aculeo, per uniuerſam cutem ſentitur. Si marina paſtinaca percuſſit, protinus accidunt moleſti doloſes, aſſidua conuulſiones, laſſitudo, & imbecillitas mens percuſſis labat. poſtea obtumeſcunt. oculi caligant. Percuſſus autem locus in ambitu cum uicinis partibus denigratur, & ita obſtupescit, ut tangentem non ſentiat. hunc ſi quis premat, atra ſanies, craſſa & male olens cernitur. Amure araneo percuſſis, circa morſum in orbem inflammatio exoritur, nigra; puſtula, diluta ſanie turgens, exurgit, proximæ partes liuent. rupta puſtula, depaſcens ulcus, non ei diſſimile quod ſerpit, occupat. inteſtinorum quoq; tormina, difficultas urinae, & frigida; aſperginis offuſio conſequuntur. Si uipera momordit, corpus intumet, uehementer areſcit. ſub albidumq; colorem cõcipit. ſanies à uulnere profunditur, primum ſubpinguis, mox cruenta. puſtula; aduſtis ſimiles erumpunt: & antea depaſcens ulcus, quod in proxima repens, non ſumma modo corporis, ſed intima quoq; corripit. gingiuarum cruore ſuffunduntur. inflammatio circa iecur erumpit. tormina & bilioſi uomitus ſequuntur. Sopor, tremor, & urinae difficultas accedit, & frigidus ſudor offunditur. Conſimilia eueniunt ijs qui à cæcilia nomine, aut amphibia demorſi ſunt. eademq; ſerè auxiliantur. quare hoc uenenum priuatam deſcriptionem ſortitũ non eſt, neq; uſum eſt dignum, quod alio genere comprehendatur. Adryno morſis puſtula moleſtiq; doloſes incidunt, præſertim quæ diluta ſanie emiſſarium ſubeſt. quinetiam eroſio, torminaq; conſequuntur. Ab hæmorrhoidis uehementes cruciatus accidunt, qui anguſta contractaq; corpora ex continuo dolore reddunt. ex plaga copioſus cruor eſſluit, & quacunq; parte corporis cicatrix ulla fuerit, ea ſanguine emanat. excrementa per aluum cruenta eſſciuntur, profluensq; ſanguis in globo coijt. à pulmone ſanguinem extuſiunt, & in uomitione eſſuſi ſine remedio commoriuntur. Quos diſſas percuſſit, ſolutus ac non conſtrictus tumor premit, ſitisq; uſq; eò pertinax, ut ſatiari non poſſint, ac ſine ulla intercapedine excruciet: & in potum

porum pleno ore affatim trahant, illico in eandem sitim relabuntur. proinde totum A
 habitum sunt ijs, qui antea potus nihil hauserint, quare propter cōtinuam
 sitim, & prester, & caufon, aut dipsas appellatur. Ab natrice demoris ulcus dilata-
 tur, & liuidum ac ingens euadit. sanies ex eo multa, & atra, & malè olens, non secus
 atque ijs quę serpunt ulceribus, exputitur. Cenchri morsum, qui uiperino ictui simi-
 lis est, putridum ulcus sequitur. carnes antea, ut in aqua inter cutem, præ tumide, de-
 fluunt. lethargo corripuntur, & ueterno pressi somnos caprant. Erasistratus eos ie-
 cinore, intestino, * colōque confictari autor est. Quippe dissectis ipsis, omnes ferè
 partes corruptę reperiuntur. A cerasse percussis locus attollitur, cum duritia pu-
 tulofus, è plaga sanies profluit, modò atra, modò pallidior, sed toto concretu uari-
 cosus intumescit, genitale intenditur, mens labat, oculorum caligo exoritur, deniq;
 rigore dissentit commoriuntur. Ab aspide ictis, uulnus exiguum prorsus, quasi ab
 adacta acu citra tumorem conspicitur. sanguis exiguus ille quidem, sed ater destil-
 lat. caligo uelox oculis obnubit, labor in totum corpus multiplex, omnino leuis et
 non sine uoluptate consequitur. ideo Nicæder per pulchrè cecinit: At uir perit abs-
 que labore uirens atq; discolor, medio cruris stomachi dolor afficit, frons perpetuò re-
 uellitur, genę contremiscunt, quasi sine sensu in somno uacillant: hos mors tollit,
 ad diei trientem non dilata. Erasistratus in libro, quem de medicaminibus & uene-
 nis condidit, de uocato basilisco scitè ita refert: Cum basiliscus momorderit, uul-
 nus ad auri colorem efflauescit. Itaque in plurimis, quę uirus ei aculantur, comites
 notę ita se habent. Transeunt utique ad medendi rationem, primùm, ut fieri po-
 terit, de communibus differemus.

* Vesica

Communis curatio in omnes ictus uirulentos.

Caput XXXIX.

A Duersus quidem omnem animalis ictum, quod uenenum uibrat, oris sectio B
 conuenit, lugentem uerò oportet ieiunium non esse, sed & cibum sumpsisse, & B
 uino os abluisse. postea exiguum olei in ore continens, plagam exugat: locus ipse
 sponsia fouendus, deinde scarificandus, sed ulcuscula altius imprimere expedit, quo
 uirosa materies profunda euocetur. Circinatio autem carnis, & sectio, scarificatio
 ne longè potentius opitulatur, nanque ab ijs duo peculiaria præsidia fiunt: unum,
 quod uirus è loco tollitur, alterum, quod eius ueneni pars, quę ad interiora grassa-
 tur, cum multo copiosior sanguine excernitur. Quod si locus sectionem nō admit-
 tat, cucurbitulę cum largiori flamma adfigendę sunt. Sed iam de uestione suprā in ra-
 bioforum morbu differimus. Si uerò icta pars, utpote extrema, eam sectionē com-
 modè non respuat, præsertim in omnibus serpentium ictibus, aut aspidis, cerasse,
 similibusq; proculdubio amputanda est. Conuenientiora supradictis auxilia sunt,
 quę epithemata uocant. Imponatur sarmentitius cinis, aut ficulnus, cum lixiuio
 stillatitio subactus, garo, & acri balsamento, porri, cepę, & alia modò minutissimè
 contrita ilinuntur, modò crementa uulneribus iniiciuntur, quinetiam dissecti galli-
 narum pulli, cum maximè tepent, percusso loco applicentur. Nec desunt qui hisce
 tanquam discordia quadam naturali pugnantibus utantur. uerùm huius rationem
 inire facillimum fuerit. Gallinæ enim calida natura præditę sunt, argumento, quod
 deuoratum insigne uirus conficiunt, & aridissima quęque semina consumant. I-
 tem nonnunquā arenas lapillosque ingluuie sua deuoratos, dissolunt. Itaque ani-
 mantis ad mori calore adiutus spiritus, ab icta parte imperum capessens, exiliensq;
 secum uenenum exigit. Nec me fugit quid in Aegypto fieri soleat. Cum spicas A-
 egypti metunt, ollam picis paratam habent, & appensam fasciam: tunc enim maxi-
 mè serpentium iniurias expauescunt, tum propter spicilegi tempus, tum quod o-
 pacis simul additę speluncis & cauernis, densoque aruorum cespite delitescunt.
 Molestissima enim animalia, & uirus eructantia, Aegyptus in campis ferre consue-
 uit ubi ergo aut in pedem, aut partem aliam, morsum intulerunt, quia ad sunt, fasci-
 am in ollam picis conijciunt, & semel aut iterum brachium aut crus paulum supra
 uulnus obligāt, & arctissimè duo è præsentibus distringunt, locumq; secantes qua-
 circumspectus est laqueus, picem instillant, cumque uulnus satis excepisse uidetur, la-

P

A queum resoluunt, & cepis alijsq; suprà memoratis illiniunt. Præterea pix liquida cum sale trito, et feruente illita, præsentaneo est auxilio, si uigiter innouetur. Conuenit & cedria, & simum caprarum ex uino decoctum, lo cum aceto calido, calamintha in lotio, maris aqua, aut acida muria decocta, foueri salutare est. Quinetiam non desunt emplastra uehementissima, & calidissima, quæ uenenum elicere, expugnare, & discutere possunt. Cuiusmodi sunt, quæ ex sale, aut nitro, sinapi, & cachrye componuntur. De quib. cõsequenter erit tractadũ. Erasistratus autem non iniuria reprehensioe eos incesit, qui incognitas adhuc usum facultates cõscripserunt, ut Elephatise, crocodiliue sanguinẽ ouaq; testudinis, & cõsimilia. Nã cũ iuuatia quẽdã literis tradidisse uidentur, planẽ in hæc sola incidẽtibus imposuerunt. Quare talia deuitanda sunt, cũ difficile, nisi regia facultate peruestigare possint: neq; quod nostra fides ijs obstrigatur, frequenti obseruatione, sufficiens experimentum præstiterint. Quæ autem ad cõmunem omnium usum pertinent, quæq; facillè suppeditari, & omnibus à serpente percussis auxiliũ ferre queunt, subiungenda uidentur. Intubus itaq; & erica, & astragalus, cũ acetopota, contra omnes serpentium morsus auxiliantur, item bitumẽ, et uiuentes platani pilule in uino diluto coctæ, & paliuri decoctum, radix aristolochiæ, & eryngij, decoctæ etiam lauri bacce, & deuorata, piperq; largius esitatum, ruta, anethum, & cyclaminus, coma porrorum priuatim ex pane, aut allium, aut cepe, fassamenta q; quam acerrima, origani decoctum cum uino potum, fœniculi, pullegiæ calaminthæ, porrorumq; succus, cum melle desorptus. hæc quidem à plantis conquiruntur. Ab animantibus uerò quẽdam utiliter peti solent. gallinaceorum cerebella in cibo, leporinum coagulum cum uino, itidem castorij sextans. testes marinæ testudinis sumpti multum prodesse traduntur. mustela sale inueterata inter auxiliaria in medicamenta est. Commendatur ioprimis exenterata, quæ sale siccescens inueteratur: ex qua binas drachmas cum uino bibisse satis est. Sed de simplicibus, quæ dari solent hæc tenus. Percussis à serpente prodest alui deiectio, diffuens sudor, urina copiosè reddita. Sunt & compositæ quẽdam potiones, quæ mira remedia polliceri traduntur, ut et opij & myrrhæ singuli oboli, piperis sicilicum, ea melle excipiuntur, & instar Aegyptiæ fabæ dantur cum uino. itidem syluestris rutæ seminis, gith, cum mini Aethiopici, aristolochiæ, galbani, singulorum pares portiones tritæ, & cum ericæ succo subactæ, digeruntur in pastillos, qui drachmæ pondus æquent. dantur ex ijs terni cyathi cum uino. Hæc habui de communibus auxilijs quæ dicerem. De peculiaribus remedijs contra bestias, quæ uenena uiibrant, consequenter est dicendum.

Peculiaria remedia uirulentorum ictuum,

Caput XL.

Inter ferientium uenenatorum notas nihil de uespis & apibus articulatum cõgessimus, quod conspicuè omnibus forent, & nihil excellens aut notatu dignum in his obseruaretur: inter remedia tamen, earum meminisse non fuit alienũ. Igitur aduersus utrarumq; ictus prodest illita malua, & hordeacea farina cum aceto, ficulneum lac in uulnus instillatum, à muria, aut maris aqua fotus: Phalangiorum ictibus ficulneum cinerem, adiecto sale trito & uino, imponere oportet, aut radicem syluestris punice quam tenuissimè tritã, aut aristolochiam, cum hordei farina & aceto subactam. ulcera aqua maris proluenda, aut apiastri decocto. folia eiusdem illinenda. lauacris perpetim utendum, & propinandum abrotoni semen, anisum, aristolochiam, cicer syluestre, cuminum Aethiopicum, cedrides tritas, platani corticem, & trifoliæ herbæ semen. priuatim autem, singulorum ex ijs binas drachmas dare cum uini hemina conuenit. item myricæ fructus, & chamæpityos, & uiridium cūpressi pillularum decoctum, admisto uino. Sunt qui fluuiarilis cæri expressi succi cū lacte, assumpto apij semine, confestim molestijs liberare prodant. Si scolopendra morsum infixit, sal quã leuissimè tritus ex aceto uulneri inspergendus, aut ruta syluestris superponenda. locus acida muria est fouendus. dàda in potu aristolochia cū uino, aut serpillũ, aut calamintha, aut ruta syluestris. Percussis à scorpione, presentia est auxilio ficulneum lac in uulnẽ instillatũ. scorpis ipse qui ictum uiibrat, tritus, et percusso loco impositus, suę plage remediũ est, ob cæcã quãdã naturarũ (ut cõstat) discor

* aqua, aut lacte.

discordiam, quæ antipathia appellatur. præterea tritus & impositus cum sale, lini A
 semine & althæa, scorpius conuenit. sulphur ignem non expertum, resina terebin-
 thina exceptum, & emplastrum modo adiectum auxiliatur, itidem galbanum ad sple-
 nis formam ductum, & calamintha quæ trita illinatur, & farina hordei in uino para-
 ta, in decocto rutæ. semen trifoliæ herbæ tritum, & uulneri iniectum opitulatur.
 Hæc ad affectum locum pertinent. Post hæc quàm efficacissimis portionibus uten-
 dum. cuiusmodi sunt aristolochiæ, præsertim corticis binæ drachmæ uino, tula gē-
 tiana, & pulegium decoctum, & bacce lauri pauco numero trite, & calamintha cū
 posca in qua magnopere discequi debet. cupressus* cū uino, et ruta, nec secus si cul-
 neum lac, laserpitium, si adsit: sin desideretur, peucedani succo utendum. efficax est
 potus trifolij, & ocini semen, horum autem omnium uicem pensat iugis lauacri-
 us, euocatus sudor, & diluta uini portiones. Eiqui marina pastinaca igitur, omnia,
 quæ de uiperarum morsu paulò post referemus, simili modo conueniunt. peculiari-
 ter autem (ictus à marino scorpione, & dracone inferuntur, qui molestos cruciatns
 cient: interdum autem, sed raro, nomas excitant. quibus) abinthij, saluie aut sul-
 phuris ex aceto triti portio subuenit. Pastinaca diuulsa & uulneri imposita, sui ictus
 medela est. Simus araneus momorderit, auxiliatur ex galbano splenium, per se uul-
 neri exterius impositum, ut medicamenti modo aceto tritum, & hordeacea farina
 cum aceto mulso illita. quinetiam mus ipse qui morsum intulit, si dissectus appo-
 natur, ictus sui ueneficia luit. resistunt quoq; acini dulcis punici decocti, & siliti, i-
 tem porri, & allia contrita, necnon aquæ calidæ fatus. sed hæc ad locum pertinent.
 Prodest potum abrotoni decoctum, maximè si in uino detur, præterea serpillum, et
 galbanum, & eruca uino madefacta, recentes cupressi pilulæ cum aceto, & cyclaminus
 ex aceto mulso, & pyrethrum cum uino & chamæleonis herbæ radix. Nec defunt
 qui literarum monumentis tradiderunt, tritum murem araneum cōtra suos ictus
 commodè bibi. Quam historiam apud alios inuentam, dignam duntaxat censui-
 mus quæ anno ratur. Alij asseuerant demorsum non aliàs exulcerari, nisi prægnās
 mus araneus fuerit, tum sanè auxiliari ferunt. Si uipera morsum impressit, simū ca-
 prinum cum uino, studiose impositum opitulatur. item laurus, & abrotonum, & gal-
 banum splenij loco superiectum, origanum uiride inditum. pulli gallinarum discer-
 pti, & confestim admoti. erui farina uino subacta. radices cortex uiq; eò tufus, ut in
 puluerem solutus abeat, & scilla tosta, detritum chamæmelum, hordeaceæ farinae ca-
 taplasma in aceto mulso præparatum: sed locus antè eo calido foueatur. hæc loco
 imponuntur. Contra uiperinos ictus rubus cum uino prodest. aliqui anchusam te-
 nuifolio constantem auxiliari produnt. leporini coaguli in uino terni oboli bibun-
 tur, & porracei succi hemina in mero, & foliorum apiastri succus, & syluestris rus-
 ta. hæc in uino potari debent. uinum frequenter bibendum, allia mandenda, & cæ-
 pæ, & porri recentes, salsamenta acerrima, & opipara simplicia hæc sunt. Percussis à
 uipera præclare auxiliatur medicamentum, quod myrrhæ, piperis, castorei, floris por-
 tulacæ seminisq; dimidio acetabulo constat. hæc omnia in Cretico passoteruntur,
 aut in alio probato. Erasistratus in eo libro qui *de uiperis* id est, de uiribus in-
 scribitur, pleraq; alia tradidit, quæ ictis à uipera auxiliua ferre possunt, * inter quæ
 talia maximè laudantur: gallinacea cerebella cum uino pota, semen fariæ brassi-
 cæ tritum, & acetabuli mensura cum uino potum. Quinetiam bonum est digitum in
 liquidam picem intingere, deinde uinum, quo digitus fuerit elutus, bibere. De am-
 phisbena mentionem hoc loco fecimus, quoniam ferè remedijs ad uiperas scriptis,
 percussis ab ea adiuuari soleant. A dryino ictis conuenit aristolochia cum uino po-
 ta, trifolij herba, radix hastulæ regiæ similiter assumpta, & fructus ex omni quer-
 cus genere. tuscæ ilicis radices, & illitæ parti ictæ auxiliantur. Hamorrhoidi dipsa-
 disq; morsus uelut immedicabiles à plerisq; maiorum deplorati relinquebantur.
 quare si peculiaribus contra dipсадem remedijs egeamus, communia experiri ope-
 re precium erit, protinus autem scarificatione uiti, uisionem facere, & si locus par-
 atur, extremorum amputatione opus erit: consequenter quàm acerrima cataplas-
 mata admouere, de quibus sæpenumero diximus. Nec me fugit, acres cibos, maximè
 à salsamentis, utiles esse. meracæ portiones & lauacra profunt, quæ subinde interie-
 cto breui spacio assumenda sunt, priusquàm morbi genus emerferit, quo semel ir-

* cyperis
 * parthien

* hæc quidam
 non habent.

* Omnia hæc
 quidam non
 habent.

A rumpente, opem ferre non potest ulla medici opera. In ictu hamorrhoi eadem pro
sunt, in super quæ in commune opitulantur, ut scarificationes, unctiones, acres cibi,
meraci potus, & quæ nunc in diptade definiuimus. quinetiam decocta uitis folia, &
cum melle trita. Si morsum natrix adegit, prodest origanum tritum, & aqua suba-
ctum, lixiuia cum oleo indita, aut aristolochiæ cortex, aut querna radix minutim
contrita & hordei farina cum aqua & melle colliquata, bibuntur etiam binæ aristo-
lochiæ drachmæ in potione poscæ cyathis duobus, deinceps marrubij succus, uel de
costum alterius cum uino, fauus recens datur in aceto, Morsus à cenchridio auxilia-
tur lactucæ fructus cum lini semine illitus, & satureia trita, & syluestris ruta, & ser-
^{centaurij.}pyllum cum duabus hastulæ regiæ* drachmis, & tribus uini cyathis, aut aristolo-
^{nasturtium.}chiæ radix, item cardamomum* & gentiana. Si ceras tes percusserit, cita partis
amputatio suffragatur, quare sine mora istam partem amputare, aut scal-
pro confestim circuncidere, et ijs similia cōsequi oportet, uren-
tia insuper reliquijs admouenda, siquidem uirus hoc
ueneno basilisci simile est. Iis qui ab aspide
feriuntur, quæ de ceras te scripta
sunt, auxilia dari debent:
nam uenenum hoc,
quemadmodū
basili-
sci, aut sanguis bubulus
celerrimè in arterijs sanguinē
cogit. Ad basilisci morsum, ut Erasistrā-
tus autor est, auxiliatur castorij
drachma in uino pota, item
papaueris succus.
Ictuum reme-
dia ita se ha-
bent.

FINIS.

IN

449

IN PEDACII DIOSCORIDIS ANAZARBAEI, PRIMVM DE MEDICA MATERIA LIBRVM,

Annotations
VALERII CORDI SIMESVSII.

IRIS. Caput I.



RIS, SIVE IREOS, siue Iridis, in genituo proferas, eadem est planta. Quapropter in eptè distinguunt quidam, quasi diuerse sine herbe, Iris & Ireos.

Est autem Iris ea radix, quæ à Germanis *Wolwurtz* uocatur: non quod uerè sit uiole radix, sed quod odore uioleas emuletur. Et hoc quidem nomen Iridi Illyricæ proprium & peculiare est, quæ omnium optima censetur. Nascentur etiam apud nos, & uulgo *Blaw schwerteln* seu *Blaw lilien* nominatur: Sed hæc suas habet, quibus ab Illyrica dignoscatur, notas. Est enim horribilior, odore iniucundior, & multò maiore acrimonia, gustanti molestior: fauces enim grani gaudijs modo exurit. Quapropter caliditate Illyricam plurimum superat. Sed quanto in hoc illa est superior, tanto etiam in aromatico odore & sapore inferior existit. Porro uehementius etiam aluum quam Illyrica, purgat.

ACORVS. Caput II.

Persusum est omnibus, Acorum eam esse herbam, quæ à nobis *Gelb schwerteln* appellatur. Quantum uerò hæc à ueritate distet opinio, facile intelligunt, qui rationem & communes sensus sequuntur. Acorus enim in tertio calefaciendi & sic candi ordine à Galeno ponitur, cum qua facilitate etiam iucundum & aromaticum odorem & saporem coniunctos habet. Qui uerò apud nos nascitur, falsò appellatus Acorus, nihil acrimoniae, nihil item quod aroma oleat aut sapiat, habet, sed austeri & acerbis saporis plurimum. Hinc sequitur necessariò, quòd contrarium Acoro temperamentum habeat. Porro nec hoc concesserim, eam hic in nostris terris degenerare. Nam quamuis hic ipse falsò uocatus Acorus etià in calidis regionibus nascatur, tamen eandem feruat austeritatem: & eotrà uerus Acorus, qui in Illyrico nascitur, eandem habet acrimoniam, quam in Syria multò calidiore terra nascens. Verus Acorus autem nihil aliud est, quam illa radix, quæ hodie in Pharmacopolijs *Calamus Aromaticus* appellatur: quod certissimis argumētis constat, quæ omnia adducere longum foret. Satis sit nobis doctissimi & diligentissimi in hoc studio Viri, Dominici Senni, fides &

autoritas, qui in Syria nostrum falsò uocatum *Calamum*, nasci uidit, ipsi dem omnibus notis insignem, quibus Acorus describitur. Porro quòd nos uero *Calamo aromatico* taceamus, suo loco demonstrabitur.

MEVM. Caput III.

MEVM, quod quidam etiam *Meum* appellant, solo nomine in usu est. Res uerò ipsa hodie incognita penitus est: quauis Pharmacopole radicularum quasdam acres hoc nomine ostendant, nò tamen omnes eandem habent. Quidam enim *Struthion*, quidam *Angelicam*, quidam *Tordeilon*, quidam etiam radiculam ab *Agyptis* *Osserick* uocatam habent: Tam incertus & inconstans est huius herbe usus. Verum autem *Meon* in ipsa Italia, medicamentorum fertilissima regione, non nascitur, nedum in Germania. Propterea quondam Itali medici hanc herbam serere cogebantur, ut testis est Plinius lib. 21. statim in principio cap. 23. ubi sic inquit: *Meum* in Italia non nisi à Medicis feritur, & ijs admodum paucis. Igitur licet nobis pro hac herba aliam æqualis temperamenti accipere. Eam uerò quam pro *Meo* accipimus, *Meon* uocare non perinde concessum est.

CYPERVS. Caput IIII.

Linus inter *Cypirum* & *Cyperum* differentiam cõstituit, cum tamen reuera nulla alia differentia inter eas sit, quam quæ inter duo eiusdem alitius oua. Quare siue *Cyperum*, siue *Cypirum*, pronuncies, eadem tamen res erit. Porro *Cyperus* est iuncus odoratus, angulosus, qui cum longas radices habet, *Cyperis* uocatur: Cum uerò oliuæ similes, & sibiipsis coherētes, *Cyperus*. Solæ radices in usu sunt Medicis, & priscum nomen retinent, nempe *Cyperus Romanus*, uel *longus*, qui *Cyperis* est: & *Cyperus rotundus*, qui *Cypirus* uocatur. Inueniuntur plerumque simul longæ & oliuæ modorotundæ radices sub eadē herba: propterea non erit operæ precium, magnam inter *Cyperum* & *Cyperidæ*, differentiam facere.

CARDAMOMVM. Cap. V.

Cardamomi appellatione habentur grana in Pharmacopolijs, ualde aromatica. Manardus uerò & Antonius Musa clamant, nos uero *Cardamomo* carere, quandoquidem ab autoribus descriptæ notæ, grani uocatis *Cardamomum*, nullo modo conuenire possint. Quod uerum esse concedo & ipse.

A Sed tamen non continuè sequitur, nos uero Cardamomo carere. Dioscorides enim & Serapio integros Cardamomi fructus granis confertos, ut olim afferbantur, describere. Hodie uero ipsi cortices, quoniam lignosi & nullius odoris ac saporis sunt, abijciuntur, & sola intus inclusa grana, propter saporis & odoris fragrantiam, ad usum reservantur. Cardamomi uero genera hodie duo afferuntur, maius & minus. Maius fructum habet lignosum, iuglandis ferè magnitudine, intus angulosus & aromaticis granis, mali pumici modo plenum & confertum, & fractu contumacem. Minus uero fructum fert Aucellana etiam multo minorem, triquetrum, & minoribus granis repletum, eiusdemque saporis & odoris, sed uehementius lingua penetrantibus. Maius parcius hodie affertur: propterea quidam in eius locum grana Paradisi substituerunt, & Cardamomum maius uocauerunt: improprie tamen & male. Nam sapore, quo piperi similia sunt, & odore plurimum à Cardamomo differunt. Fructus uero figura aliquam habet cognitionem, qui oui columbini magnitudine conspiciuntur, & Cardamomi modo granis angulosus repletus est. Grana ipsa etià Mellette uocantur, quod à regno Mellis aduehantur. Illi uero plurimum errant, qui Nigellæ citrinæ se-

* Alias, men Cardamomi appellatione dignantur.
donant.

NARDVM. Caput VI.

Cum simpliciter Nardum, scriptum legimus, semper Syriacum uel Indicum intelligere debemus. Sunt enim multe differentie, ut Indica & Syriaca, quæ nullam aut exiguam differentiam habent. Præter has est Celtica, quæ etiam Saliunca uocatur, Montana, rustica, sine Azaron, Cretica siue Phu, & Malobathrum: de quibus singulis dinceps agemus.

NARDVS SYRIACA.

SYRIACA siue Indica Nardus est ea, quæ adhuc in Pharmacopolijs Spica Nardi, uel simpliciter Spica appellatur. Adeo per omnia cõueniunt etià omnes notæ. Quapropter non raro mirari eos soleo, qui Nardo nos carere negant. Id tamen uerum est, afferri nardum ualde inueteratam, debili odore & languido sapore, ut satius sit & cõuenientius, Celticam pro Indica accipere.

NARDVS CELTICA. Ca. VII.

Celtica nardus absque ulla cõtrouersia est ea, quæ hodie à Pharmacopolijs Spica Romana dicitur: nulla enim est, quæ non conueniat, nota. Testatur Diosc. hanc nardum Saliuncam ab incolis appellari, quæ uocem Marcellus Vergilius in Gallicâ mutauit: sed male & ualde frigidis argumentis inductus. Nam Germani eandem herbam adhuc proprio uocabulo Seltungæ appellant. Celtica autem Nardus in Istria, Germaniæ uiciniore quàm Gallie regione, Pannonia et in Alpibus nascitur. Quare potius Germanica quàm Gallica appellari debet. Nusquam enim hæc Nardus in tota etià Gallia nascitur, sed adhuc ex Norico, Istria & Pannonia in maxima quantitate affertur. Quare ipse

Diosc. huic nardo Gallicæ nomen non tribuit, sed Celticæ & Saliuncæ. Nā Celtarum appellatione non tam Galli quàm Germani ab historicis quibusdam indicantur. Adde, quod Saliunca uocabulum Germanicum sapiat etymon. Hæc nardum alijs etiam uocabulis Germani nominant, ut Marten Magdalenen blâmè Spicæ nardes: sed omnium propriissima & uetustissima est appellatio Seltungæ: et si coniectari licet, uidetur mihi à conseruando iuuenili animo facta esse. Illi autem uehementer impingunt, qui Spicam siue Nardum Celticam eam esse putant, quæ ab alijs Lauendula maior, siue Massiliensis Lauendula appellatur, unde oleum Spicæ uulgo sic uocatum faciunt. Toto enim celo hæc due plantæ distant. Nardus Celtica brevis herbula describitur, quæ propter breuitatem suam in manuales fasciculos non minus hodie quàm olim ligatur. Lauendula uero longior & longius frutex potius quàm herba est, neque in fascies uel fasciculos ligatur. Nardi Celticæ folia subflana describuntur, Lauendula uero intensè uiridia cernuntur. Nardus Celtica luteo describitur flore, Lauendula purpureo ferè ostendit. In Celtica nardo solæ radices & caules Medicinam faciunt: folia enim & flores, quoniam neque saporem neque odorem habent, ex omni usu abdicata sunt. In Lauendula cõtrà soli flores & folia medica uel pollent: radices autem & caules potius quàm caules, quoniam lignosi & odoris & saporis expertes sunt, in nullum usum recipiuntur. Certum igitur est, Lauendulam istam maiorem non esse Nardum Celticam, sed utraq; diuersa est, & sui generis plantæ. Quid autem hæc Lauendula sit, in Stoechade indicabitur.

MONTANA NARDVS. Ca. VIII.

Montana nardus, quæ etià Niris, Thilacitis & Pyritis appellatur, olim ex Cilicia in coriandris sacculis (quos Græci θύλακες uocant) ad exterarum nationes ferebatur: partim ad Medicinæ usum, partim ut ignibus propter inuicibilem odorem iniiceretur: unde etiam illi nomen Pyritis factum est. Hanc intelligit in Fastis Ouid. cum ait:

Et sonet accensis spica Cylistis focis.

Nequaquàm enim Crocus eo loco intelligendus est, qui igni iniectus foetet. Nardus uero Montana in flammam iucundi odoris resoluatur. Copiosissime hæc in Cilicia prouenit. Quapropter potius Pauli Marci Piscinensis, quàm Antonij Phariensis Cõmentarium in hæc Ouidij locum probauerim. Nā ille Nardi Spicam, & bene: hic uero Crocum, sed male, per Cylistam Spicam intelligendū afferit. Hodie uero nullus illius usus est. Nā non amplius affertur, præterquam quod interdum casu cum alijs mercibus adueniat: sed id rarissimè accidit. Hi autem uehementer errant, qui Montanam nardum eam putant esse herbam, quæ à nobis Bagenleyterle appellatur, muscus potius, sionculi modo per terram serpens, quàm herba: qui etiam nullus neque sapor neque odore commendatur.

AZARVM. Caput IX.

Azarum

A Azarum quiduis odore Nardum imitetur, ut etiam propterea sylvestris nardus nominetur, nulla tamen formam cum nardo communem habet. Nō defuerūt, qui etiā hāc Baccharum appellarent, ppter odoris similitudinem. Ambe enim, scilicet Azaron et Baccharis, odorate herbe sūt, sed diuersae. Male igitur Baccharis caput in Azari caput, et eōtrā a repository est, quasi una eademq; esset herba. In correctiori bus uerō exemplaribus, eorū sim de utraq; agitur. Nā Azarum primo libro inter aromata recenset. Baccharē uerō in tertio inter odoratas et coronarias herbas describit. Azarum a nobis *Saschwurz* nominatur, quod plerūq; et firē semper, in Coryleis nascitur. Antonius Musa Italus, et Germanice linguae ignarus, a lepore factū illi nomen esse interpretatur, sed male. Nā si a lepore etymon deriuaretur, nō *Saschwurz*, sed *Sasewurz*, pronuntiandū esset.

PHV. Caput X.

Phu, sine Nardus Cretica, quā quidam agrestē nardū uocat, solo odore nardum imitatur. Per cetera enim omnino illi dissimilis existit. Ab omnibus esse creditur Valeriana. Quoniam autē praecipue note nō respōdent, falsum omnino est, quod quidā aīunt: Phu sine controuersia est Valeriana. Nullo modo tamen negandū est, Valerianam huius Phu speciem esse agrestem, et dissimili radicē, et quae a ueteribus nō descripta sit. Verum autē Phuea est herba, quae a nobis *Theracka* etiam / et *Garten selungk* / **B** quasi satius *Saliunca*, sine Nardus appellatur. Radices habet multas digiti crassitudine, quae transuersae in superficie terrae serpunt, odore nardi, sed grauiore. Valerianae uerō radices uirosiore odore sunt, nec in terrae superficie serpunt, sed graciles fibras deorsum agunt.

MALOBATHRVM. Ca. XI.

Malobathrum multi crediderūt Nardi folium esse. Diosc. uerō et ipsa experientia cōtrarium testantur. Hoc Malobathrum antiqui foliū etiā nominabant, quādoquidem nihil aliud est, quā foliū sine radice paludibus innatans. Hinc unguenta, quae Malobathro odorabantur, foliata dicta sunt: eratq; hoc foliū principale in unguentis, et non nardi foliū, ut Plinius existimat. Siquidem Nardus spica tantū est, praeter quam nulla folia habet. Quapropter superuacū est, quod Plinius dicit lib. 12. ca. 12. Gemina doctē Nardi spica et folia celebrant. Hodie autē hoc aroma amplius non affertur. In eius uerō locū Casia et Cinnamomi folia substituta sunt, quae pro Malobathro quidē in usum recipere cūlibet licet. Sed eadem Malobathrum, uel simpliciter folium appellare, non perinde fas est.

CASIA. Caput XII.

Casia multiplices habet differentiās. Est enim Casia aromatica Cinnamomo cognata arbuscula, cuius ramuli uel baculi, si cū ipso cortice ligno adhuc inherente uenduntur, *Xylocasia* appellantur.

Cum uerō extruso ligno ueneat, Casia *Syringites*, uel *Syrinx* uocatur, quod excavati cortices fistula similitudinem habeāt. Hae erat antiquis Casia fistula, uel fistularis. Arabes autē aliā Casiam fistulā in usum Medicinē introduxerunt, quae fructus procerae arboris in India, et nūc in Aegypto etiā nascentis existit, quem Aristobulus Barbarus *Fabam* Indicā uocat, diuersae penitus cum alijs facultatis. Porro ueterū Casia fistularis, uel lignea, multis seculis nō iusta est, sed eius loco cortex radicis cuiusdā, acerbi et nō aromatici saporis uenditur. Iam uerō quorundam diligentia factū est, ut una eius species rursum asportetur, sed raro ac minime copiosē. Habet autem Casia tantā cum Cinnamomo similitudinem, ut alterutra in aliam non raro degeneret.

CINNAMOMVM. Ca. XIII.

Cinnamomi non pauciores quā Casiae species sunt. Optimum est quod Gal. in lib. de Theriaca ad Pisonem et de Antidotiis, describit. Tali autē hodie omnino caremus, et habemus tantū ex omnibus uix unā speciem, eā scilicet, quae *Mesilica* Casiae similis est, quae item omnium max. arborescit. Propterea nō sine ratione quidā opinātur, nostrū Cinnamomum Casiae potius quā Cinnamomi speciem esse. Cum uerō Casia et Cinnamomum plures habeāt species, singq; inter se ualde cognatae arbusculae, temerarium esset pronunciare, nos Cinnamomo carere. Cinnamomum autem, ut hodie affertur, est cortex tantū suae arbusculae, quam quidam *Canellam* uocant, nos uerō *Simetinden*.

AMOMVM. Ca. XIII.

Amomum est paruius ille et in se ipsum cōuolutus frutex, quem monachi rosam sanctae Mariae, et rosam de Hiericho, uocat. Nihil enim in hac planta quod historiae repugnet, inuenitur: quāuis Antonius Musa id negat, eo argumento utens, quod rosa Hierichuntis folia Bryoniae nō habeat, quae tamen Amomū habere debet. Quod autem haec ipsa Hierichuntis rosa talia folia non habeat, nemo statuere potest, cum ipsa folia in tanto itinere, et tanto temporis intervallo antequam ad nos perferantur, dilabi possint. Quis enim non uidet, si apud nos ramus in syluis decerpatur, et per longinquū iter feratur, quod folia ipsa defluant? Quare frigidiusculum est hoc *Muse* argumentum. In Pharmacopolijs autem uerū Amomum nō habent, sed eius loco duplicis generis semina ostendūt, quorū unum est *Syzonis*, alterum uerō *Botryos*, hoc est, alterius *Ambrosiae* semen.

COSTVS Caput XV.

Costus, qui triplicem habet differentiā, hodie rarissimē affertur, sed eius loco quidam adhuc nō minus quā olim *Comagenae* Emule praeparatā radicem uendunt, quidam etiam alias diuersas: ita ut nullum ferē Pharmacopolium sit, quod nō propriū Costū habeat. Nomen eius adhuc in ore omnium fertur, res uerō ipsa ē manibus excidit.

A SCHOENVS, QVEM LATINI TERETEM seu rotundum odoratum iuncum appellant.

Caput XVI.

IUNCUS odoratus duplicem habet differentiam.

Vnus enim angulosum, alter teretem caulē fert. Ille alio etiam vocabulo Cyperus, de quo suprà dictū est, hic uerò Schoenos simpliciter appellatur. Et flores eius $\chi\omega\upsilon\nu\varsigma$ $\alpha\epsilon\upsilon\delta\theta$, et composita appellatione, $\chi\omega\iota\nu\epsilon\rho\delta\theta\varsigma$, quam uocem in squinantum Graecae linguae imperiti deflexerunt. Erantq; ex hac planta olim in maximo usu flores, nunc uerò stipites et folia tantum nobis Arabes mittunt: sibi flores, hoc est, praestantiorē partem referuantes. Nihilominus tamen haec partes stipites et folia, Schoenanthi appellatione uenunt. Porro hoc aroma Germani Kamelstro appellant.

CALAMVS AROMATICVS.

Caput XVII.

VERO aromatico Calamo omnino hodie caramus, cuius loco uenditur ueri Acori radix. In calamo autem ipsa arundo, et non radix, in usu est: propterea ipse calamus, siue arundo, à Dioscor. et non radix, describitur. Ex Acoro autē sola radix medicinam facit, quam nūc pro aromatico Calamo uendunt. Dominicus Senna cū Acoro Calamum aromaticum in Syria nasci uidit, et nihil differt à uulgari arundine, quod ad formam attinet, sed sola tantum uirium diuersitate, et aromatico odore et sapore ab illo distinguitur.

BALSAMVM. Cap. XVIII.

BALSAMUM non minus quā olim adhuc in Aegypto nascitur, sed ad nos liquor eius nō perfertur: et si adfertur, mille modis adulteratus est. Eius tamen fructus et lignum in omnibus Pharmacopolijs uenduntur, Carpobalsami et Xylobalsami nomine, sed adulterata et ipsa. Nam antequā ad nos ueniant, in humore aliquo emacerant incole, sibi dilutū ad medicinam et unguenta referuantes, nobis uerò sine uiribus lignosam substantiam mittentes.

ASPHALATVS. Cap. XIX.

ASPHALATOS, siue Asphalatos (nam utrunq; dicitur) multum ab Asphalto differt. Illa enim aromati odoris arbuscula est, haec uerò res pici similis in terra nascēs, quae aliā bitumen appellatur. Asphalati autem arbusculae non una tantum species existit, quae omnino hodie non cognoscitur. Nam neq; nomē amplius auditur. Ruellius lignum Rhodisium, quod Agallochi species est, Asphalatum esse constanter affirmat. Cum uerò in Rhodisio ligno ipsum lignum tantum medica ui et odore polleat, in Asphalato autem radicis tantum cortex, non uideo quomodo certū aliquis affirmare possit, lignum Rhodisium Asphalatum esse.

MVSCVS. Caput XX.

Differunt plurimum ueterum et recentiorum Muscus. Nam ueteres sic uocant uillosam illā caniciem arborum, quae propriē etiam in quacunque nascatur arbore, muscus appellatur. Medici autem hoc uocabulo non quemuis arborum muscū intelligebant, sed eum qui in Cedro, Populo alba, et Quercu nascetur. Verum neq; hanc indifferenter, sed eum tantum, qui aromatum modo odoratus esset. Quapropter à Diosco. in hoc primo Libro inter aromata recēsetur. Res uerò quae nunc muscus appellatur, improprie nomen hoc accepit. Non enim arborum illa canicies est, sed Indici cuiusdam animalis odoratū pus. Quapropter peritiores natura res diuersas distinguunt, illum Muscum, hunc uerò Moschum appellantes, ut apud Aëtium uidere est.

AGALLOCHVM. Cap. XXI.

AGallochum sine dubio illud est lignum, quod hodie ab omnibus Medicis et Pharmacopolijs Xyloaloes, id est, lignum aloes, et lignum Para distuocatur. Huius autem multae sunt differentiae, quas periti facile distinguere possunt. Omnium uilissima eius species est, quae lignum Rhodisium appellatur. Sed quāuis minori precio, quā ceterae species, ueneat, nequaquam tamen contemnendas in Medicina uires habet.

NASCAPHTHVM. Ca. XXII. D

NAscaphthon quid uerē sit, hodie omnino ignoratur, nisi quis Storam siccā, siue Corzum brum esse contendat.

CAUCHAMVM. Cap. XXIII.

CAUCHAMUM est gūmi illud, quod hodie omnes Pharmacopoli: Laccam uocant. Si uerò aliquis credere nolit, legat Diosco. de Cauchamo hoc Caput, et Serapionis de Laccā, qui hunc autorem super Laccā adducit, totūq; Cauchami caput de uerbis ad uerbum recēset.

CYPHI. Caput XXIII.

CYPHITHYMAMATIS compositio est, quae Aegyptij sacerdotes in sacrificijs utebantur: et atq; duplicis compositionis, Una Seleniacum, Altera Heliacum appellabatur: quod haec Soli, altera Lunae consecrata esset. Quomodo autem praeparetur, hic ipse autor, et Aëtius in Methridiaca compositione, et alij plures indicant.

CROCVM. Caput XXV.

CROCO olim Lycia, Cilicia, Sicilia et Italia celebrabantur tantum, nunc uerò copiosius etiā in Germania eius est praeruentus. Croci autem appellatione non solum tota cum radice herba intelligitur, uerum etiam ipsa tantum floris stamina, propter excellentiam, crocus simpliciter appellantur, quae nos cum Arabibus Saffran nominamus.

CROCO

CROCOMAGMA.

Crocomagma Crocini unguenti fex & sedimentum est, cuius compositio paulo post describetur.

DE INVLA. Caput XXVI.

Inula Helenium à Grecis appellatur, quod ex Helene lachrymis enatum sit: quam fabulā pulebrē describit Nicander in Theriacis suis. Est autem duplicis Inula differentie. Vna que copiose apud nos provenit, & quam Germanico vocabulo Alant vocamus. Altera, que in Aegypto nascitur serpillio similis, & coronaria herba est, sed hæc hodie omnino ignota est, præsertim apud nos.

OLEVM. Cap. XXVII.

Oleum, quando simpliciter scriptum invenitur, intelligendum id est, quod ex fatiis oliis exprimitur. Hoc Germanicè Baumöl vocatur, propter res: quod ex fructu arboribus nascite exprimitur. Omphacinum vero oleum est, quod ex immaturis oliis exprimitur: hoc viridiorum colorem habet.

OLEVM SYLVESTRIS OLIVÆ.

Caput XXVIII.

Hoc oleum ex sylvestris oleæ, quæ Oleaster appellatur, fructu exprimitur.

CANDIDVM OLEVM.

Candidum oleum duplex est. Quoddam enim nativum, quoddam factitium habebatur. Quod vero natura candidum est, adhuc ex Hispania Vlisbona in maritima Germaniæ oram affertur, & ab incolis Wittöl appellatur.

SICYONIUM OLEVM.

Caput XXIX.

Sicyonium ex candido oleo fit eo quo Diosc. docet modo. Nomen vero invenit, quod ad Sicyonem Peloponnesi ab eam copiose præparetur. Hodie autem fieri desit.

SORDES SIVE STRIGMENTA

Balneorum. Caput XXX.

Moris erat uteribus, corpora in balneis oleo ungere. Sudor vero qui huic oleo & corporum sordibus miscbatur, strigmenti nomen invenit.

PALÆSTRARVM ET GYMNASIORVM SORDES.

Similiter etiam nudi iuvenes in palæstris & gymnasijs se excreantes, oleo ungebantur. Sordes vero ex hoc oleo & pulvere, pavimenti, parietibus & columnis adherentes, ad suos in Medicina usus colligebantur.

OLEOMEL. Cap. XXXI.

Oleomel non amplius affertur. Huic tamen simile quiddam ex quercuum & betularum ne-

tis truncis fluit, sapore mellis, pinguedine oleore-spondens. Hoc similiter ut illud nausæan & uomium facit, aliumque soluit. Germani Stochonig, siue Speiseym, appellant.

RICININVM OLEVM.

Caput XXXII.

Ricininum oleum ex fructu ricini exprimitur. Quid autem ricinus sit, in Quarto describitur. Arabes hoc oleum de Kerna appellant.

AMYGDALARVM OLEVM.

Caput XXXIII.

Exprimitur adhuc ex dulcibus & amaris amygdalis non minus quam olim oleum, suorum habet in Medicina usus.

BALANINVM OLEVM.

Caput XXXIII.

Ex glande unguentaria hoc exprimitur. & Arabibus oleum de Ben nominatur. Quid autem sit hæc glans unguentaria, in Quarto declarabitur. Oleum hoc non amplius affertur, sed in Germaniam nunquam allatum est.

HYOSCYAMINVM OLEVM.

Caput XXXV.

Hioscyaminum oleum ex hyoscyami candidi aqua calida permacerato semine, ut alia multa olim exprimebatur. Nunc vero inuenta melioratione ex eodem trito & calefacto semine sine aqua ut excoquitur. Nos Bilsen öl appellamus. Huic similiter hodie præparatur Raphaninöl & Sinapinöl, quæ olim aqua macerabantur.

CNIDIVM OLEVM.

Ex grano cnidio oleum hoc exprimitur, rari hodie in medicina usus. Ceterum non est, ut Marcellus Vergilius in huius capitis Commentario ait, granum Cnidium Chameleæ semen, Dioscor. enim id negat. Quid vero sit, in Quarto audiemus.

CNICIVM OLEVM.

Cnicium ex Cnici, qui hodie Cartamus dicitur, semine exprimebatur, cuius hodie nullus est usus.

RAPHANINVM OLEVM.

Ex Raphani semine nunc quoque non minus quam olim hoc oleum exprimitur, sed alio, ut in Hyoscyamino præmonuimus, modo. Nos Retsig öl appellamus.

NIGELLINVM OLEVM.

Ex Nigelle, quæ melanthion Grecis vocatur, semine, hoc oleum exprimebatur. Nunc autem cessavit illius usus. Quid vero Nigella propriè sit, in Tertio audiemus.

SIN A.

A SINAPINVM OLEV. C

Sinapinum ex vulgaris sinapis semine exprimitur, alia quàm olim ratione, ut in Hyoscyamino prae monstrauimus.

MYRTEVM OLEV. C

Caput XXXVI.

Myrteum siue Myrtinum oleum, alia nunc ratione quàm olim preparatur, propterea eadem vires nemo illi tribuerit. De Myrto autem statim post hoc ipso libro sermo habebitur.

LAURINVM OLEV. C

Caput XXXVII.

Laurini varia est cōfectio: Hodie uerò illud tantum usui est, quod ex oliuae oleo, & laurifondibus oleo incoctis preparatur. Quidam, ut incundorem acquirat colorem, eruginem miscet, sed male. Corruptum enim, & turbatur erugine huius olei temperamentum. Verum si diligenter preparetur, satis hilarem acquirat colorem, ut non sit opus eruginem addere.

LENTISCINVM OLEV. C

Caput XXXVIII.

Lentiscinum oleum ex Lentisci maturo fructu oleo incocto fit, quod ad nos non affertur, neque a nobis preparari potest, cum ipsa arbore Lētisco ca-

B reamus.

MASTICHINVM OLEV. C

Caput XXXIX.

Hoc oleum fit ex Lentisci resina, quae mastiche uocatur. Eius magnus adhuc est in medicina usus. Hodie uerò alia quàm apud Dioscoridem ratione preparatur. Vulgo oleum masticeis uocatur.

ODORATA VNGVENTA. C

Caput XL.

ROSACEVM VNGVENTVM. C

Cap. XLI.

Rosaceum hodie oleum rosarum à Pharmacopolis uocatur. Verum secundum Dioscoridem & ueterum descriptionem non conficitur. Nam rosas tantum in oleum coniectas ad solem exponunt, & deinde à rosis excolatim exponunt, & usui referunt. Estque hoc simplex rosaceum, quo etiam ueteres interdum utebantur.

ELATINVM VNGVEN. C

Cap. XLIII.

Ex palme nondum florentis operimento, quod Elate uocatur, elatinum olim fiebat unguentum: hodie uerò fieri desijt. Quidam eius loco faciunt unguentum ex abiete, quod elatinum esse putant, creduntque in huius unguenti compositione abietem elate appellatione significari, sed falsò. Nam elate

tam palme operimentum, quàm abietem significat.

MELINVM VNGVEN. C

Caput XLIII.

Melinum ex malis cotoneis adhuc conficitur, non tamen aromatis odoratur, sed simpliciter fit ex maceratis & insolatis in oleo cotoneis malis, uocaturque oleum cytoniorum à Pharmacopolis.

OENANTHINVM VNGVEN. C

Caput XLV.

Oenanthinum ex labruscae, quae uitis agrestis est, floribus, oenāthe appellatis, conficiebatur. Nunc uerò eius nullus in hisce terris usus est.

FOENVGRAECINVM VNGVEN. C

Caput XLVI.

Hoc à quibusdam adhuc preparatur, sed simpliciter ex fenigræci seminibus oleo incoctis, uel ad solem maceratis. Qui preparant uocant oleum fenigræci.

SAMPVSCHINVM VNGVEN. C

Caput XLVII.

Sampsuchinum ex maiorana, quae Graecis sampschum appellatur, fiebat, admixtis alijs aromaticis. Nunc uerò non amplius preparatur. Nam omnia ferè unguenta, quae olim odoris gratia conficiebantur, hodie in Europa non preparantur.

OCIMINVM VNGVEN. D

Caput XLVIII.

Ex Ocimo hoc quondam conficiebatur. Quid autem ocimum sit, in secundo libro audiemus.

ABROTONINVM VNGVEN. D

Caput XLIX.

Ex Abrotono nigra seu mascula, hoc olim fiebat unguentum. Nunc quidam in sole cum abrotono maceratum oleum, abrotoni oleum uocant.

ANETHINVM VNGVEN. D

Caput L.

Hoc hodie simplici ratione ex anethi floribus in oleo ad solem maceratis conficitur. Quidam etiam Pharmacopole secundum aliam descriptionem faciunt. Vulgo in Pharmacopolijs oleum anethinum uocatur.

LILINVM VNGVENTVM. D

Caput LI.

Lilinum adhuc fit, sed tantum in oleo maceratis candidis lilij. Vulgo oleum liliorum nominatur.

NARCISSINVM VNGVEN. D

Caput LII.

Non amplius conficitur narcissinum, neque hodie preparari potest, cum uulgo narcissus non cognoscatur.

CRO

CROCINVM VNGVENTVM.

Caput LIII.

Crocinum nostris quoque temporibus fit, non tamen secundum hanc descriptionem. Pharmacopole hoc suo more præparatum oleum Croci appellane.

LIGVSTRINVM VNGVEN.

Caput LIIII.

Ex Ligustri floribus, quoniam odorati sunt, hoc olim conficiebatur unguentum. Nunc uero nusquam conficitur. Quid uero Ligustrum sit, in hoc libro non multò post demonstrabitur.

IRINVM VNGVENTVM.

Ca. LV.

Ex Illyrica Iris hoc præparabatur unguentum. Quid autem Iris sit, antea ostensum est.

GLEVCINVM VNGVEN.

Cap. LVI.

Simplex hec est Glevicini confectio, quæ à Dioscorido ponitur. A Galeno hec ipsa cum igitur styri septimo recetetur, et ad Dioscoridē refertur. Et præter hanc alie tres indicantur, quæ plura recipiunt aromata, sive ingredientia, ita uocantur. Nomen à musto, quod γλῶσσος à Græcè dicitur, accepit. Hodie non fit.

AMARACINVM VNGVEN.

Caput LVII.

Amaracini hoc est à Sampsuchino, quamvis utrumque Sampsuchum sive Amaracum capiatur. Alia uero aromata, quæ in ingrediuntur, differunt. Quæ uero distinguantur ab inueniunt, hoc Amaracinum, illud à sampsuchino appellatur. Nunc uero et hoc fieri desit.

MEGALINVM VNGVEN.

Caput LVIII.

Hoc hodie non conficitur. Nam Dioscoridis etiam etate non amplius conficiebatur.

HEDYCHROVM VNGVEN.

Caput LIX.

Hedyochroon ab hilaritate coloris nomen accepit, hodie uero non præparatur. Sunt et pastilli qui theriacam Andromachi ingrediuntur, similiter Hedyochroi appellati, qui plurimum ab hoc unguento differunt. Quapropter incipit apud Paulum Aegnetam li. 7. in Theriacæ compositione, uocabulo Hedyochroi adiecit unguinis appellationem interpres Albanus Torinus Vitodurensis.

METOPIVM VNGVEN.

Caput LX.

Metopium Galbanum recipit, propterea à Galbani planta ab Aegyptiis Metopion appellata nomen accepit. Non præparatur hodie.

MENDESIVM VNGVENTVM.

Caput LXI.

Neq. hoc amplius conficitur in Europa.

STACTE. Cap. LXII.

Dista est Stacte à stillando. Est autem recentis et expressæ myrrhe destillans pinguis flos. Antonius Musa styracem liquidam Stactē esse constanter affirmat, sed malo iudicio. Sunt enim natura penitus diuersæ Syracis et Myrrhe arbores, et huius lachryma in aqua resoluitur, illius uero in oleo, uel oleo simili humore tantum. Syrax præterea liquida calamitæ Syracis expressio est, cui antiquam exprimitur, liquida resina et oleum additur, ut liquidior facta magis redoleat, et uiltori precio ueneat. Nam Syrax calamitæ plurius constat. Si uero uera habetur et recens Myrrha, non magno labore ex hac Stacte exprimi potest. Hodie apud nos non exprimitur, ob recentis Myrrhe inopiam, sed in Arabia Mecha copiose adhuc conficitur.

CINNAMOMINVM VNGVEN.

Cap. LXIII.

Cinnamomum à Cinnamomo, quod basis huius unguenti est, nomen accepit. Hodie non præparatur.

NARDINVM VNGVEN.

Caput LXIII.

Nardum ex India Nardi spica, et alijs quæ à Dioscorido recensentur, fiebat. Nunc similiter præparatur quibusdam demptis, aliquibus etiam additis simplicibus. Sed nuncium illo ignotum est. Quisdam uerum Nardinum unguentum hoc esse credunt, quod ex spica Laenidula destillatur, sed longè falsum.

MALOBATHRINVM VNGVEN.

Caput LXV.

Malobathrinum unguentum præcipue Malobathro constabat. Hoc, ut Galenus in 12. lib. 3. inuuit, Romæ foliatum dicebatur. Nardinum uero spicatum.

IASMINVM VNGVENTVM.

Caput LXVI.

In Perside Iasmini nascuntur flores, Violis quodamtenus similes, qui ab Arabibus Iesmini et Zambach appellantur. Ex his unguentum illud conficiebatur, quod ab Arabibus etiam oleū de Zambach nominatum fuit. Unde imperiti putant hoc ex Samiæ floribus fieri, maximo, et qui etiam pedibus paluari possit, errore. Iasmini autem flores hodie à quibusdam in Italia feruntur, Iesmini appellatione. Sed I. primam consonantem quasi S. pronunciant. Unde quidam cognominis per uenerunt, ut Sesaminum semen, et Ieseminum appellatum italis florem, eandem rem esse credant, sed male.

MYRRHA.

A MYRRHA. Cap. LXVII.

Iamdudum de Myrrha incidit controuersia, negantibus etiam doctissimis uiris, nos Myrrham ueram habere. Qui uerò res ipsas diligenter inquisiuerit, non poterit non uidere, quòd non tantum medicis, uerum etiam optimis Myrrha afferatur: quòd hoc fiat rarius. Quòd autem non frequentius fiat, sola in causa est Aromatopolarum, quos hodie Materialis ut uocant, ignauis et inficitia. Hi enim cum partim etiam in Aegypti Alexandriam nauigent, facillè possunt optima quæ, eligere et asportare, nisi sumptibus parcere malleint, quàm humani corporis salubritati consulere. Verùm hoc nequaquàm illorum in fuitu est, sed longè alium finem, ipsas scilicet diuitias et priuatum commodum sequuntur. Myrrha autem adhuc nomen suum in Pharmacopolijs retinet.

BOEOTICA MYRRHA.

Bœoticam myrrham necesse est similiter Lachrymam esse. Quemadmodum enim propriè uocitata myrrha eiusdem nominis arboris Lachryma est, quæ in aqua dissoluitur (hoc addo, ut à resinosis Lachrymis, quæ in aqua nimumè resoluuntur, distingui possint.) Sic etiam par est, Bœoticam myrrham ex arboris aliqua parte manare. Non enim frustra, sed ob similitudinem substantiæ & qualitatis, quas cum myrrha paulò minus quàm easdem habet, myrrhæ uocabulo appellata fuit. In hoc uerò Diosco. exemplari, quod Marcel. Verg. interpretatus est, clare legitur, Bœoticam myrrham, nascentis cuiusdam in Bœotica arboris, incisam radicē esse, sed malè. Neg. hoc interpretis culpa, uerum exemplaribus Græci uitiō factum est, in quo scriptum reperitur: ἡ δὲ Βοιωτικὴ μύρρα ἐκ τῆς ἐν τῷ βῶτι τῆς ἀρκυρίας ῥιζῆς ἐκτείνεται. Correciiora exemplaria uerò sic habent: Bœotica uerò myrrhæ ex incisâ cuiusdam in Bœotia nascentis arboris radicē manat &c. Quam lectionem ueram esse, ipse etiam Scapio indicat, cum in myrrhæ cap. sic ait: Sed myrrhâ quæ est ex terra, quæ dicitur Laptoiens, id est, Bœotia, abscinditur ex radicē arboris, id est in terris illis. Sic ille Dioscor. caput hoc reddidit, nec dicit Bœoticam myrrham incisam esse radicem, sed ex radicē excindit, quemadmodum solent incisione elici reliquæ liquoris. Myrrhâ hæc hodie omnino non cognoscitur.

STYRAX. Cap. LXVIII.

Styracis & Myrrhe arbores natura penitus est
se diuersas, in Statte præmonui. Quod etiam ad
natales attinet, nihil penitus conueniunt. Hæc enim
in India & Arabia, illa uero in Asia minoris Persidia
& Cilicia prouenit, multum secundum latitudinem
distantibus regionibus. Si uero substantiam ipsam eas
rum, quæ ex his emanant, Iachrymarum considerabi
mus, omnino diuersam deprehendemus. Lachryma
enim, quæ ex Styrace manat, præter omnes alias no-

tas quas iam taceo, resinose est substantie, cuius proprium est, in sibi simili humore aliquo resolui, & minime in aqua, quippe que pinguedinis omnino nihil in se habeat. Que uero est myrrhe arbore destillauerit lachryma, facit etiam propter substantie similitudinem, in quouis aquoso humore dissoluitur. Nec latius ratio dico, ut sciamus liquidam Styracem nihil minus esse quam Stactem, quod pluribus etiam demonstrare argumentis possemus, si huius loci esset falsas doctorum opiniones & iudicia consultare. Styraeis autem triplex habetur hodie differentia. Est Styraex calamita, que in candicantes et ruffescentes grumos concreuit. Hec addita resina & oleo expressa, liquida uocatur Styraex. Estque altera species, quam substantia eadem, expressa huius sedimentum, quod pro bona Calamita Styraee hodie uendere ceperunt, idque ante paucos annos. Sed facit fraudem exercitatus deprehendere potest. Talis enim Styraex corticibus & scobe in magnos grumos conformati constat, qui minimum odoris, minus etiam pinguedinis habeant, & facile digitis in puluerem fricentur. Tertia Styraeis differentia, Styraex rubra est, a quibusdam etiam Thymium uocata, estque cortex in ruffo colore nigri canes, quem aiunt ex Styraicis arbore colligi. Hodie autem Pharmacoopole non amplius Styraex, sed Storaex, pronunciant.

BDELLIVM. Cap. LXIX.

Substantia & qualitate Bellium & Myrrha
magnam habent cognationem, suis tamen distin-
gui possunt notis, quas etiam ipsi uocant, Mate-
riaeque ignorant, quo factū ē, ut bacterius aliquod
seculis Myrrham pro Bellio attulerint & uendide-
runt. Nunc uerò genuinum Bellium rursus asser-
tursēd rarō, & in parua quantitate. Nomen suum in
Pharmacopolijs retinet.

THVS. Caput LXX.

Thus etiam optimum nos habere nemo dubita-
re debet. Neq; tamen inficias eo, interdum re-
fina & alijs quibusdam adulteratum offerri. Est au-
tem Thus in Arabia nascentis arboris resinose sub-
stantie lachryma candicans, pinguis, & interdum
duabus guttis testicularum modo conserescens, quod
optimum est, & masculum uocatur. Pharmacopola-
rum quidam Thus, quidam uero Olibanum Græci ap-
pellatione uocant. Germanis, quoniam in templis ad
sacros suffitus accenditur, Weihrauch, quasi conse-
cratorijs sumus, nominatur.

THVRIſ CORTEX.
Caput LXXI.

Thuris cortex una cum arefacta lachryma ex
arbore auellitur, & cum Thure affertur, ma
iore astringendi & siccandi ui, quam Thus ipsum,
præditus.

THYRIS

THYRIS MANNA.
Caput LXXII.

Frequenter huius Manne in libris Gal. *Kata* *Hy* inscriptis, mentio habetur, & apud multos alios ueteres scriptores: ubi Interpretes, quoties Manna thuris, scriptum inueniunt, ex una re diuersas faciunt. Si enim inueniunt orationem huius simile: Recipe Mastiches, Manna thuris, &c. Statim illi Mannam & Thure, diuersas res credentes, distinguunt uirgula, hoc modo, Manna, Thuris, &c. sed male. Est autem hæc Manna tenuis ex masculo thure puluis & pollen, qui in gruniorum attritu resoluitur. Huius frequens olim in emplastris fuit usus. Sed hodie hæc res in usu non habetur, sed eius loco trito utuntur Thure. Nomen uero ipsum ad æreum & roseidum mel, Manhu ab Israelitis olim appellatum, transtulerunt. De quo plura secundo Libro in Melis capite audiemus.

THYRIS FVLIGO.
Cap. LXXIII.

Fvligo etiam ex Thure, quemadmodum ex omnibus resinosis & oleosis rebus colligi potest, eo quo Dioscorides docet modo. Est autem Fvligo ex in censa quacumque pingui re resolutus tenuis fumus, qui Germanico uocabulo Rhym uocatur.

PINVS ET PICEA.
Caput LXXIIII.

Magnam inter autores Græcos controuersiam Interpretes mouerunt de uocabulis *πίτυς* & *πικύς*: non quod ipsi Græci tantum in horum significatione inconstantes sint, sed ipsi etiam Interpretes interdum *Pityn*, Pinum, & *πικύ* Piceam: & Ruellius interdum etiam *πικύ* Pinum, *πίτυς* uero Piceam, interpretati sunt: quæ inconstantia, magnam in demonstrandis & iudicandis rebus difficultatem affert. Theodorus Gaza in Theophrasto, præterquam quod *πικύ* Pinum, et *πίτυς* Piceam, etiam ipsam *πίτυς* Laricem interpretatus est: quæ secutus est Plinius, & Plinium Vergilius Marcellius, qui præterea *πικύ* thedam interpretatur, sed male. Non autem est quod hanc culpam aliquis ad interpretum ignorantiam rejiciat, cum ipse Verg. Marcell. in suo in hoc caput Commentario fateatur, & concedat, posse etiam aliter quam ipse interpretatus sit, horum uocabulorum significationem ex autoribus iudicari. Nec hodie tantum ista est in uocabulis controuersia. Nam olim quoque in ipsa Græcia & Macedonia sua nomina permutabant, *Pity* & *Peuce* arbores Laricem tamen *Pity*, & *Peuce* thedam interpretari, omnino absurdum est. Multum enim differunt *Pity* & *Larix*, *Peuce* & *Theda*. Ego autem potius Ruellium sequor, multis argumentis & rationibus adductus, & *πίτυς* Pinum, & *πικύ* Piceam, interpretandam esse censeo. Longum foret, & non

est huius instituti, omnia afferre argumenta & rationes. Meum tamen iudicium de huius generis arboribus hoc esto: *πίτυς* est Pinus, quæ cum sponte prouenit, *Pinasier* uocatur: nam aliàs etiam in hortis feritur. Hæc in Germania non nascitur.

πικύ sit Picea, quæ & ipsa habet duas differentias. Una est longæ setis comosior, deorsum etiam pendentibus ramis. Hæc fructus fert in longo cono Pineis nucibus similes, minores tantum. Conus à Pini cono differt, quod Piceæ conus longitudine ferè dodrantem æquat, crassitudine autem manum propemodum complet. Pini uero conus multò breuior latiorque existit, habetque pyramidalem figuram. Illius etiam squamæ tenues sunt, & ab inuicem resolutæ. Itaut fructus siue nukes sub squamis uideri queant. Huius uero crassiores lignosioresque sunt & compactæ, propterea non uideri possunt nukes. Si uero Pini conus in calido æstuario habeatur, uel ad firuentem solem ponatur, resolutis magno frigore squamis dissilit, nukesque spargi. Picea autem, quæ Pino similes nukes fert, à Germanis *Sirbel*, & nukes eius *Sirbelnuss* uocantur. Hanc arborem in Germania ad Alpes nasci scimus, & à quibusdam etiam Pini uocari, sed male. Picea uero syluestris, conum huius similem fert, in quo minutum & alatum fructum in minutè dura cortice continet. Hanc Germani ein *Sichten* vocant. Abies uero quæ Græcis *ἰλιάτρῃ* uocatur, ea est sine dubio arbor, quæ à nobis ein *Thanne* appellatur, similes Piceæ syluestri conos ferens. Huius similis est *Malax* arbor, siue *Taxus*. Sed hæc ex omnibus sola baccifera est, cum ceteræ omnes conosferant. *Taxus* Germanis ein *Libe* uocatur, fumi; ex ea hodie non minus quam olim, arcus & scorpiones. *Δάς* uero est propriè *Theda* arbor, quam nos ein *Kiefer*, *Bienbaum*, & *Seuren* uocamus, ex qua sumpta pinguisima materia, *Theda* Græcè, & *Bien* Germanicè, similiter ut arbor ipsa, nomenclatur. unde etiam facies *δάσος* à Græcis dicitur. Huius similis est *Larix* Latinis, ein *Lerche* Germanis appellata, Alpibus etiam iuxta Germaniam peculiaris: quam an Græci habuerint uel cognouerint, uehementer dubito. Non enim uocabulum, quo eam indicere, habent.

PITYIDES.

Pityides sunt fructus, Ponticis nucibus magnitudine & figura similes, oblongiores tantum enati, in Pini & Piceæ conis sub squamis inuenti. Qui autem ex Piceæ conis sumuntur, *Sirbelnuss* à Germanis uocantur. Horum rarus iam est usus. Piceæ uero nukes excorticate ad nos ex Italia afferuntur, suumque adhuc in Pharmacopolijs nomen retinent.

STROBILI.

Strobili priuati dicuntur in Pino cono inuentæ nukes, ut à Piceæ fructu distinguantur. To

A tus etiam Pini conus cum fructibus sue nucibus Strobilus uocatur. Quapropter bis hoc capite Strobili mentionem facit Dioscor. Primum enim exemptos ex cono et purgatos fructus intelligit: secundò totum cum nucibus conum.

LENTISCVS. Ca. LXXV.

Lentiscus $\Sigma\chi\iota\upsilon\varsigma$ à Græcis uocatur. $\Sigma\chi\iota\upsilon\varsigma$ uerò eidem genti teretem aromaticum iuncum significat: que uocabulorum similitudo quosdam in magnos errores coniecit. Ideo ne quis in similem errorem incidat, utriusque differetiam pono. Est autem Lentiscus procerus arbor ex resiniferarum genere, folia tamen dissimilia habens, que lentis folijs similia sunt. Nascitur præcipue in Chio, et alijs Græciæ locis, et in Aegypto etiam, in Italia autem ab admodum paucis in hortis plantatur. Germania uerò omnino hac arbore caret.

LENTISCINA RESINA.

Ex Lentisco resina in guttas concreta fluit, que privato nomine Mastiche appellatur à Græcis. Res ipsa adhuc in usu est. Nomen uerò, χ , Græcorum littera, in χ , Latinam mutato, corruptum est, et pro Mastiche, Mastix pronuntiatur.

TEREBINTHVS. Ca. LXXVI.

Terebinthus, quam Græci $\tau\epsilon\rho\beta\iota\nu\theta\omicron\varsigma$ uocant, etiam ex resinam ferentium arborum genere est. B folia eius eodem, quo in Lentisco ordine in pediculis disposita sunt, multo tamen maiora, et ad laurinum magnitudinem accedentia. Nascitur in Græcia, Cycladibus insulis, Petraea Arabia, Iudea, Syria, Cypro et Aphrica. Nobis omnino est incognita.

RESINAE. Cap. LXXVII.

Resine ex multis arboribus fluunt. Que autem ex Terebintho, Terebinthina Latinis uocatur, Arabibus gluten Albotum. Hæc rarissime affertur, eius tamen loco Picæ Resina, utimur, similiter Terebinthinā uocantes, sed malè. Que uerò ex Lentisco fluit, Lentiscina Latinis, Græcis Mastiche, Arabibus gluten Romanum appellatur. Pineæ ex Pino destillat, Abiegna ex abiete. Picæ quoque, ut diximus, resinam fundit. Strobilina resinam malè interpretatur Pineam Vergil. Marcel. Antea enim eius mentio facta est, sub $\pi\iota\upsilon\varsigma$ uocabulo, et à Pineæ resina differt Strobilina. Pityna siue Pineæ, est que ex arbore et rupto cortice manat. Strobilina uerò, in Strobilibus, hoc est, in Pini conis concreuit. Ex Colophone olim ante tempora Dioscor. liquida etiam resina afferebatur, quam uocabant Colophoniam. Ea hodie non est in usu. Ipsi enim liquidam resinam copiose habemus, ut etiam olim ex Germania in Græciam portaretur. Habent tamen adhuc Colophoniam nomine sicciſsimam resinam, quæ potius Pix Brutia est. quidam eam Picem Græcam uocant. Colophonia uerò

liquida fuit. Ex Gallia quoque in Græciam allatam esse Resinam liquida testatur Dioscor. deinde subiungit: Affertur Liquida et ex Galatia, que ad Alpes est (hoc est, ex Germania) quam gentis sue uocabulo Larignam regionis eius incolæ dicunt. Hæc adhuc à nobis Lerchenharz uocatur, ab Italis Largatū. Porro quod Larignam resinā ex Germania in Græciam dicit allatam esse, satis indicat in Græcia nullam Laricem, ex qua illuc colligi possit, nasci. Quare mea est opinio, Laricem innotatam arborem Græcis fuisse: nullum enim nomen, quo eam indicent, ostendi potest. Est et aliud resinæ genus, quod Galenus Pitynon phisema uocat, quasi Pineam abcessum. Sed non tantum in Pini hic abcessus generatur, ierumetiam in abiete, et alijs huius generis arboribus. Cum in abiete generatur, à Germanis Eim Thannenblater eadem significatione uocatur. Est autem extuberans abcessus resina, plenus in Resiniferis arboribus enatus. Ex Cupresso etiam Resina liquida fuit. Huius uerò nostra ætate nullus est in hisce regionibus usus. Coquebatur olim omnis Resina liquida, et cocta caliditatem, acrimoniam, odorem, et partium subtilitatem omnem deponit. Quare sic cocta utebantur ad suffusum, quale Cyphi est, ut sua pinguedine facile accensa alia etiam accenderet, nulloque interim suo odore reliquorum aromatum fragrantiam retunderet. Ob eandem causam preciosis unguentis substantiæ et crassitudinis causa addebatur.

PIX LIQVIDA.

Caput LXXVIII.

Liquida picis nullus hodie, uel rarus, in Medicinis usus existit.

OLEVM PICINVM.

Caput LXXIX.

Neq; hoc hodie preparatur. Si autem preparare quis uellet, poterit meliori modo per distillationem ex quacunque Pice et Resina colligere.

PICIS FVLIGO.

Cap. LXXX.

Quid Fuligo sit, et unde colligatur, antea ostensum est in Thuris capite. Quapropter non opus est, ea hic repetere.

SICCA, SIVE SPISSA PIX.

Cap. LXXXI.

Sicca Pix omnibus nota est. Germani Bech siue pech uocant. Quomodo autem fiat, Theophrastus docet, noueruntque omnes, qui Hercinie syluæ penetralia accolunt.

ZOPISSA. Cap. LXXXII.

Zopissa siue Pix naualis, quam Græci etiam Hypochima uocabant, alia est quam Pix naualis,

A nualis, quæ in Germania maritimis locis habetur. Greci enim naues suas resina et cera illinebant: nos uero in Germania ex liquido Bitumine picem naturalem coquimus, quemadmodum adhuc etiam in Epyro fieri constat, ubi pisasphaltum id est, picis bitumen copiose habetur.

BITUMEN. Cap. LXXXIII.

Bitumen Greci Asphaltum uocant, Germani Erdbech, quod substantia et uiribus picis respondeat, et in terra nascatur. Est autem pinguis etu terre adeps, qui picis colorem et substantiam habeat, unde facillime flagrat, et accenditur. Habet autem multas, ut subsequitur, differentias. Hec prima eius species Asphaltum, seu bitumen Iudaicum uocatur. Liquidum bitumen, quale in Sicilia reperitur, copiose etiam in Gothiaggitur, et in Saxonia iuxta Borchdorfum oppidum, quo ad axium unctiorem, iumentorum scabiem, et lucernarum lumina uiuntur. Hoc Germanice Theva, siue Sehe, uocatur. Ab aliquibus etiam a fectore Tenselsdrecht nominatur. Est et aliud liquidum picis genus, igne ex picis generis arboribus, carumque pinguisima substantia elicium, quo similiter curruum axes ungunt, quod nequaquam ad hoc liquidum Bitumen referendum est. Simile quiddam etiam ex Betula arbore igne elicium, quo coria Linoni et Rusi ungunt, hoc a Germanis Dagegen uocatur, à Plinio bitumen betule arboris, quam nos Lin Bircke uocamus.

PISASPHALTUM, Cap. LXXXIII.

Pisphaltum tale est, quale Dioscori describit: in Germania etiam quibusdam locis, ut in Trās Sylvania fluminis impetu et montibus defertur: quod incolæ colligentes et à sordibus purgantes, ad ceræ crassitudinem coquunt, et ad facies pro cera utuntur. Unde etiam à Germanis eius terræ incolis Erdwachs et Bergwachs, id est, in terra siue montibus genita cera uocatur. Arabes in sua Mumia Dioscori, cap. de Pisphaltum citant. Est igitur Pisphaltum nihil aliud, quam Mumia. In hoc tamē differunt, quod Grecorum Pisphaltum natium sit, Arabum uero Mumia, ut hodie affertur, sic fit: Accipiunt natium bitumen, et liquefactum in hominis cadauer insundunt, et omnes eius concavas partes replent, ceraneum scilicet, pectus, uentrem, et omnia peruia ossa: non enim tantum bitumine integra funera conduntur, sed arida ossa bitumine complentur, et in humanam formatur effigiem. Talis est Mumia quæ hodie affertur, et non habet aliquam myrrhæ, uel aloës, uel balsami admixtam portiunculam, quod colore, odore, et sapore manifestè deprehendi potest. Huiusmodi autem corpora quæ sic conduntur, diuturnum sunt, nec afferuntur. Sed ea tantum quæ Bitumine condita sunt, neque ea propriè, ut dixi, uerum aridis ossibus insusum Bitumen pro Mumia affertur. Si

uerò quis Mumia definitionem nouisse uelit, facillè eam apud Arabes inueniet, qui eam sic describunt: Mumia est, quæ ex humani cadaueris carne, aloës, Myrrha et Balsamo commixta, in sepulchris inuenitur sanies.

NAPHTA, Ca. LXXXV.

Naphta etiam Bituminis genus est, sed omnium liquissimum, calidissimum, tenuissimæ substantiæ. Quapropter cum præterea etiam oleosæ sit substantiæ, facillimè accenditur, et ignis rapacissimus merito existit.

Duplicem habet Naphta differentiam. Nigra enim quædam, et candida quædam, seu flaua reperitur, illa crassior, hæc uero aquæ modo liquida. Generatur autem ex Bitumine à se ipso in terra et montibus accenso, tenuissimis eius uaporibus sursum elatis, et ad frigidiora saxa in tenuem liquorem resolutis, qui deinde per suos meatus et montibus fontium modo seaturit. Porro multum differunt in terra contenta diuersis locis Bituminis genera, quo fit, ut ipsi etiam, unde Naphta generatur, uapores, magnam habeant differentiam. ex crasso enim et terrestri Bitumine, crassius: ex tenui et puro, pura etiam et tenuis generatur Naphta. Hodie in Pharmacopolis Oleum petre, siue Petroleum uocatur. Germanicum eius nomen est Steynöl.

Ad Bituminis autem genus etiam referri debent Lapides Gagates, Thracius, terra ampelitis, succinum tantum candidum, quam fuluam: quæ res forsitan omnibus Pharmacopoeis uidebitur. Verum nequaquam sine certis argumentis et rationibus id pono.

CYPRESSVS, Ca. LXXXVI.

Cypressus procera et semper uirens arbor est, conus ferens alui conis figura similes, magnitudine uero ad thedæ conos accedentes, in quibus rubentia et angulosa nascuntur semina, quæ ex arborum conorum resolutis squamis, cum matura facta fuerint, excidunt. Quidam hos integros cypressi fructus galbulos, pibilas et nuces uocant: posteriori uocabulo hodie Pharmacopoei utuntur. In Germania arbor hæc non sponte nascitur. In Gallia uero calidiori parte, et Italia copiose prouenit, unde ad nos eius coni feruntur, quos, ut diximus, Pharmacopoei nuces Cypressi uocant.

Est et herba Chamecyparissus à Plinio uocata. Hæc apud nos in hortis et fœtilibus seritur, coronarum gratia. Est enim odorata, et semper uiridem seruat comam. Hinc etiam hybernici coronis inseruntur. Germani Cypressen utrang, uocant.

IVNIPERVVS, Ca. LXXXVII.

Iuniperum arborem Greci ἰκκινδοῦ uocant: bacce eius ἰκκινδοίς appellantur. Duo sunt eius genera. Ad iuniperi arboris altitudinem ascen-

A dens altera, & minor altera. Hæc paruum fert fructum, illa uerò maiorem, Auellane nuci similem: Minor in Germania copiose nascitur, Wachholz deæ appellata, cuius fructu in Medicina utimur.

SABINA. Ca. LXXXVIII.

Sabina Græcis Βραδός uocatur, Arbustum est semper uirens, parua Ericæ & Tamarici similia habens folia, quæ in una eius specie aculeata sunt. Medici folijs utuntur. A Germanis Sauenbaum/ & Saterbaum appellatur.

CEDRVS. Cap. LXXXIX.

Cedrus ignota est arbor Germaniæ et Galliæ, multisq; alijs Europæ regionibus. Est autem grandis & procera arbor, uirapero folijs & fructu similis, qui Cedris appellatur. Colligitur etiam ex ea Cedrinus liquor, quem Cedriam Græci uocant, Arabes uerò Kytran. Hoc imbutæ charta à tineis non corroditur. Magnus quondam usus totius arboris fuit, materia sue ligni in preciosis structuris, Cedridum & Cedria in Medicina. Errant qui Laricem Cedrum esse opinantur. Arabes Cedrum Serbin, & liquorem Kytran, siue Alkytran uocant, ut diximus.

LAVRVS. Caput XC.

Laurus Græci Daphnen, fructus uerò eius Daphnoides uocant. Germani Loxen/ siue Lorbeerbaum arborem, & fructus Lorber nominant. Arbor non magna est. In calidioribus regionibus sponte, apud nos uerò uix sata proueniens, ob hyemis seuiam. Fructus & folia in promiscuo usu sunt.

PLATANVS. Ca. XCI.

Platanus peregrina quondam Italiæ arbor fuit. Ab Oriente autem prius in Italiam allata est, ubi in magno honore propter umbræ iucunditatem fuit. In Germania eam nasci nemo speret, cum in Italia etiam calida regione non sponte nascatur. Apud nos uerò arbor est procera & elegans, quam patrio uocabulo Alhorn nominamus: Hanc doctissimi etiâ uiri Platanum esse putant, quibus nequaquam assentior, Alhorn enim Acer est.

FRAXINVS. Caput XCII.

Fraxinus nota arbor est & celebris, quod hastis & frameis tot exercitus tot seculis armauerit. Duo eius genera Germani statuunt. Vnum Steinaschen/ quasi faxeam & duram Fraxinum dicat. Alterum Bichaschen appellantes, quod fagi similitudinem aliquam habeat. Fructum utraq; fert autem linguis similem, numerosum in uno pediculo, quem Arabes Lifnahazafir, id est, Linguam auis uocant. Hic solus hodie Medicis in usu est.

POPVLVS ALBA.

Caput XCIII.

Populus alba nigra populo per omnia similis est, folia tantum inferiore parte omnino candida habens. Germani hanc Weissen Alberbaum uocant, siue Weisse popelweiden. Quidam Albam populum eam arborem esse credunt, quæ à Germanis Asspen nominatur: sed male.

POPVLVS NIGRA.

Inter albam nigramq; populum tria interponuntur capita in uulgaribus Dioscor. exemplaribus. Cum uerò autor hic non solet cognatas species diuellere, post Albam populum nigram quoq; recensendam esse iure existimo. Non enim uerisimile apparet, Dioscoridem eam interiectis alijs & minime cognatis arboribus discreuisse. Est autem Nigra populus arbor, quam Germani poppel weiden uocant, ex cuius recenter erumpentibus oculis unguentum Acopon fit, quod Pharmacopole Populeum uocant. Porro Albam populum Græci Leuceon, nigram uerò Aegron nominant, & ueteres Latini utranq; sār sārūm. Non est, ut Poëtæ fabulantur, electrum huius arboris lachryma. Quid uerò sit electrum, lib. 2. cap. de Vrina animalium, ubi de Lyncurio agitur, uidebimus.

MACER. Caput XCIII.

Certum est Macer esse corticosum illud aroma, à Pharmacopolis Maces appellatum, quod ipsi Arabes etiam testantur, cum in descriptione sui Maxis Dioscor. caput de Macere allegant. Nema autem miretur, cur hic autor suum Macer arboribus immisceat, cum potius inter aromata de coagere debuerit. Venia dignus est in hac re Dioscorides. Erat enim eius ætate res noua, & adhuc incognita, quidnam esset, & unde colligeretur. Credebant tamen arboris corticem esse. Propterea hinc inter arbores eius caput legitur. Nostra uerò ætate, quid reuera sit, cognoscere incepimus. Nam Arabes clarè scribunt, quod sit cortex Nucis Moschate. Cum uerò Nux moschata multos habeat quibus munitur cortices, dubium est quotus sit in ordine cortex Maces. Propterea quidam dicunt: Maces est exterior cortex Nucis moschate: quod falsum esse ipsa experientia iam docuit. Possunt tamen & hi, qui hoc scribunt, isto modo tueri: Nuces moschate, ut hactenus allatæ ad nos sunt, duobus corticibus circumdantur. Illorum unus qui nucleum ipsum propius ambit, durus, lignosus, & insipidus existit. Qui uerò hunc circumdat, Maces est, & præter hos duos cortices nulli alij allati sunt. Ideoque non immerito crediderunt, Macem exteriorem corticem Nucis moschate esse. Ego uerò cum integros Nucleos moschate fructus uiderim & habeam, non possum non illorum formam indicare.

A Est ergo Nux Moschatu iuglandi, adhuc in arbo re cum omnibus corticibus herenti, magnitudine et forma omnino similis, corticem habens exteriorem carnosum, crassumque, quale est uiride illud et carnosum putamen in iuglande. Sub hoc Macer est, quod deinde lignosum corticem, nucleum ipsum, quem nucem Moschatam uocant, in se continentem, ambit. Indi totos hos fructus non aliter quam nos iuglandes, purissimo melle condunt. Tales fuerunt qui proximo anno à nato Christo 1538 Francofordiam ex India ab Hispano quodam ferebantur. Porro hi maxime errant, qui Cinnamomam credunt Cario-philos et Nuces moschatas ferre. Neutri enim fert, sed paruum fructum, glandibus in acetabulis siue caticulis adhuc herentibus similem, multo tamen minorcin.

VLMS. Cap. XCV.

Vlmus magna est arbor, Intosum amans so- lum. Folia habet Titie et Corylo non dissimi- lia. Eius duo sunt genera: Vnus Germani Nistern/ alterum Vlmum siue Vlmum appellant. Quid uero inter utrumque inter sit differentie, fabri lignarij no- uerunt.

CÀRIES LIGNORVM.
Caput XCVI.

Vetustos arborum truncos, et importuno te- pore casas, uel in ædibus nimia uetustate cor- rupta ligna uermes atterunt. Quæ autem farina mo- do è foraminibus excidit, Caries Latinis, Græcis κα- ριες, Germanis Wurmmehl uocatur. Differt hæc secundum lignorum diuersitatem.

PAPYRVS. Caput XCVIII.

Papyrus, grandis, triquetra et arborescens her- ba est in Aegypti palustribus locis, iuxta Nilum iunci modo nascent. Ex hac charta olim fiebant, ea quæ Plinius docet ratione. Hinc nostris etiam char- tis papyri nomen mansit.

TAMARIX. Caput XCIX.

Tamarix à Græcis Μυρτὴν appellatur, estque diuin generum. Satina et procera: altera in Aegypto nascent et humilis, altera quæ diminutius forma, Tamariscus dicitur: cuius filia et radices Pharmacopole ad medicinæ usus seruant. Fiumis eti- am hodie non minus quam olim, ex ligno eius circu- lus doctorum modo circumdata pocula. Germani pa- riter Græcis minorem Thamarisfen uocant. Ma- le bacterius apud Verg. interpretatum est, myricam esse cum fruticem, quæ à Germanis Heyden appella- tur, et cuius flore in Germania, presertim in Lune- burgensi solitudine, apes mel copiosum colligunt, sed minime generosum, ut Diosc. proximo cap. mani- feste testatur.

ERICA. Cap. C.

Erica sine dubio est arborescens thefrutex, quæ Germani Heyden appellant. In Luneburgensi solitudine ultra trium cubitorum altitudinem sur- gens: hunc myricam bacterius uocant, sed male, ut proximo cap. indicauimus.

ACACALIS. Ca. CI.

Non cognoscitur in his regionibus Acacalis frutex, cum in Aegypto nascatur, nec fructus eius amplius affertur, nisi aliquis ex Mirabolanis Em- blicum seu Bellericum hunc esse existimet.

RHAMNVS. Caput CII.

Rhamnus etiam Alba spina Latinis uocatur. Cautos tamen nos esse oportet, ne res diuer- sas hoc nomine confundamus. Nam præter Rham- num spinam arborescentem, duæ etiam Albae spinæ ex herbaceorum et carduorum genere ab hoc aucto- re lib. 3. describuntur. Apud Ouid. uero in 6. Fasto- rum per Spinam albam et uirgam Ianalem Rham- nus cuiusque uirga intelligenda est. Nec sine causa Oni- dius sic de Rhamno scribit:

Sic factus spinam, quæ tristes pellere posset

A foribus noxas, hæc erat alba, dedit.

Et paulo post:

Virgæ Ianalis de spina sumitur alba,

Quæ lucem thalamis parua fenestra dabit.

Cum ipse Diosc. eandem etiam Rhamno uires, quas Ouid. his uerbis tribuere uidetur. Fertur præterea Rhamnus, appositus pro foribus fenestrisue ramis e- ius, omnium ueneficiorum arcere maleficia. Ianalis autem uirga Rhamni uirga dicitur, quod Ianus eam, Crane nympha, quæ potius erat, contra strigum no- xas pro amuleto dederit. Sunt autem multe Rham- ni species, sed non omnes in Germania nascuntur, et quæ apud nos proueniunt, descriptæ à ueteribus non sunt. Ex hoc genere etiã est quæ nobis Stachdorn/ siue Arcusfel/ et fructus eius Arcusfelber/ Italis ue- rò Vna crispina uocatur. Copiose hæc in Germania nascitur in hortorum et uinearum scopulis. Veram Rhamnum secum afferebant ex Italia ij, qui religio- nis causa Romam proficiscebantur, quibus perua- debant sacrificuli, saluatorem nostrum illius spinis coronatum fuisse. Tertiæ Rhamni semen in quibus- dam Græcis Dioscor. exemplaribus Spondilio, in qui- busdam etiam Asphodelo comparatur, diuersis natu- ra plantis.

HALIMVS. Caput CIII.

Halimus frutex maritimis locis prouenit, quo- stu falsus, unde et nomen inuenit. Nobis pro- pterea incognitus est in mediterranea regione habi- tantibus. Considerunt aliqui hunc fruticem cum As- phodelo, qui etiam albus dicitur, hinc in hoc cap. quoque albus uocabulum legitur, uerum male. Non e- nim à Diosco. sed ab alio quodam imperito adiectum est. Videndum in hac planta erit, quomodo concilien-

Atur Diosc. & Serapio. ille enim ait: Rhamno simile esse halmum, sed spinas non habere. Hic autem plures illi quam Rhamno spinas tribuit. Vocatur autem ab Arabibus hæc planta molochia, & atriplex maritimum. Quare hoc nomine apud Serapionem querendum erit halmion. Plinius uterum an oritate plures eius species describit.

PALIVRVS. Caput CIII.

Inconstans & uaria est apud autores Paliuri historia siue descriptio. Sunt enim multe eius species, uerum in tanta historie diuersitate quequam certi sine certa ratione iudicare temerarium est.

OXIACANTHA. Cap. CV.

Oxiantha arborescens spina est, quæ Arabibus Berberis, Germanis Sauerdorn / Sau-rid; & Versig. uocatur. Ex fructu eius medicamentum fit, quod Pharmacopola Rob de ribes nomen.

CYNOSBATUS, SIVE CYNORHODUS. Caput CVI.

Cynobatum Cancrium Theod. Gaza apud Theophrastum interpretatus est. idem frutex alto nomine Cynorhodos, id est, Canina rosa, uocatur. Est autem nihil aliud quam syluestris & aculeata hamatis spinis arbuscula, quæ Rosas syluestres ubique in campis producit. Germani Feldtrosen uocant. Suntque tres eius differentie. Procerior una, & altera hirsutioribus folijs, cuius frutex totus inuasi-
B mum odorem spirat. Tertia omnium minima est, nec multum à terra attollitur. Quapropter à nobis Erdtrosen / quasi Chamberhodos appellatur. Plinius Cynobatum cum uulgaris Rubo confundit. Quidam etià hunc fruticem arbutum esse credunt, sed malè.

LIGVSTRVM. Caput CVII.

Ligustrum sine dubio eadem arbuscula est, quæ Græcie et Orienti Cypris appellatur. Propterea Plinium idem scripsisse nunquam poeniteat, Germanicè Munderweiden, siue Remweiden, appellatur, propterea quod salici similis sit, orisque ulceribus medeatur, & in Rheno ripa copiose nascatur. Malè hæcenus interpretatū est apud Vergil. Ligustra Conuoluuli flores esse, qui Germanis Saungloffen uocantur.

TILIA. Caput CVIII.

Que hoc capite à Diosc. describitur Tilia, omnino eadem est cū prædicto Ligustro: quod omnibus palam erit, si inuicem utriusque descriptionem conferant. Galeni & Aegnetæ ætate talis Tiliæ historia in Diosc. legebatur. Siue autem Tilia à Diosc. sic descripta sit, siue ab alio, falsa est eius hæc descriptio. Nā nullus neque ex præcis, neque recentioribus ea sic depinxit. Sed omnes certissimis notis indicant Tiliæ appellatione eam arborem, quæ Germanis

ob ligni lenitatem & mollicitē, Lila Linde uocatur. **C** Miror aut ualde nullū hæcenus hoc animaduertisse. Omnes enim qui post Diosc. scripserunt & interpretati sunt, usque ad hoc tēpus, eā controuersia de Tilia inter Diosc. & Theophr. præterierunt. Superuacua igitur est hæc Tiliæ historia, quæ in hoc autore legitur.

CISTVS. Caput CIX.

Amdudum ostēsum à Leoniceo est, cōfudisse Plinium naturā diuersas plantas, Ciston & Cisson: quātumuis frigidis argumentis eum defendent Colimutius. Cistus in hisce regionibus autem insignitus est, propterea ad eius succum transeamus.

HIPOCISTIS.

Sub prædicta Cisto succosa lachryma radicibus sadnascitur, quæ propterea Hipocistis uocatur. Hanc non habemus apud nos ueram, cum ipsa planta, sub qua nascitur, careamus. Habet tamē Pharmacopole ex altera planta coctura eliquatum & densatū succum, quæ corrupto uocabulo Hippocistidos nominant, sed ab Hipocistide penitus diuersum.

LADANVM. Caput CX.

Ladon Cisto similis frutex est, cui lenta & resinosa & odorata pinguedo adheret, quæ Ladanon dicitur. Hodie uerò in Pharmacopolijs Ladanum. Galenus Ladon nihil penitus à uulgaris Cisto differre ait, sed meliorem & calidiorem esse, cum in calidioribus regionibus nascatur. quod quā uerū sit, non uideo, cum ipse Diosc. Ladanum ex calidioribus locis, ut Arabia & Libya, damnet: Ex Cyprouerò frigidiore quā Arabia uel Libya regione probet. Ergo non caliditate regionum uulgaris Cistus diuersas uires nata est. Porro substantia utriusque succi multum differt. Hipocistis enim in aqua resoluitur, Ladanum in oleoso liquore. Illa etià in terra ad radices nascitur: hoc uerò ramulis & folijs adheret.

EBENVS. Caput CXI.

Ebenus nulla omnino hodie affertur. Quidam etiam Guaiacum lignum Ebenum esse affirmant, quod speciem quidem eius longinquam esse non nego, sed nullam qui à ueteribus descripta sit. Porro illi maxime errant, qui Ebenum putant eam esse arborem, quæ à Germanis ein Eibe uocatur: de qua in picea etiam dictum est. Ebenus enim calidissimis nascitur locis, qualis India est: Eibe uerò frigidissimis ferè regionibus, & earum etiam frigidis & gelidis montibus. Qualis autem arbor Eibe sit, in picea dictum est, & in lib. 4. in cap. de Taxo dicitur.

ROSAE. Caput CXII.

Rosæ multiplices habent differentias, quibus ab omnibus dignosci queunt. Rubentes uerò antequam penitus aperiantur, ad Medicinæ usum utiliores sunt.

ROSEI

ROSEI PASTILLI.

Caput CXIII.

Rhodides Pastilli rosei in Pharmacopolijs Trocisci de Rosis uocantur. Alia tamen est eorum hodie descriptio, et preparandi modus, quam à Dioscoride ponitur.

LYCIUM. Cap. CXIII.

Lycium ex Pyxantha arbuscula, eo quo Diosco. docet modo conficitur. Consecratur et ex Rhamno et ex alijs quibusdam similiter ut Pyxantha, astringentibus spinis. Copiosè quondam in Lycia fiebat. Quod uerò hodie in Pharmacopolijs habetur Lycium, neq; ex Pyxantha, neq; è Rhamno, neq; Oxiantha, nam ex hac quoq; non contemnendum confici potest) excoquitur, sed ex matrisylua, uocato frutice, qui sepes et arbuta uitis modo ascendit, et ex alijs quibusdam plantis, nihil aut admodum parum astringentibus.

ACACIA. Cap. CXV.

Omnibus hodie persusum est, Acaciam uerò Prunellorum agrestium esse succum, quæ Germanis Schlehens uocantur, uerum magno errore. Est enim Acacia, secundum omnes Græcos, Latinos et Arabes scriptores, in Aegypto spinosa nascent arbuscula, quam Theophrastus etiam simpliciter interdum Aegyptiam Acantham uocat. Fert hæc spina lupino similes siliquas, et semina, ex quibus nondum maturis succus, similiter ut planta Acacia appellatus, exprimitur. Vidi ego spinosos eius Oxianthe modo ramulos, lupino etiam similes siliquas, et semina in Gummi Arabico uocato, quod ex Acacia arbore manat, ut omnes Græci et Arabes testantur, inuenta. Quapropter non est dubium, quin Acacia careamus, et faciliè habere possemus, nisi deesset mercatorum diligentia. Si enim Acaciæ Gummi totæ naues onustæ ad nos peruenire queunt, cur non etiam succus ex feminibus expressus?

GUMMI.

Gummi appellatione intelliguntur omnes lachrymæ arborum, quæ tamen non resinosa constant substantiâ, quamuis interdum promiscuè hæc uocè ad omnium arborum et herbarum, tam resinosas quam aqueæ substantiæ, lachrymas referamus. Propriè tamen Gummi appellatur, quales ex Acacia, Ceraso, Pruno et Amygdalo lachrymæ fluunt. Ex quibus omnibus lachryma, quæ ex Acacia manat Gummi simpliciter, propter excellentiâ, uocatur. Arabes uerò Arabici appellationem adiecerunt, et ubiq; in Pharmacopolijs sub Arabici gummi nomine uenditur. Errane uerbenter, qui Arabicum Gummi Tragacanthæ lachrymam esse putant, uirium similitudine decepti. Est enim longè diuersa ab hac Tragacanthæ lachryma.

AMVRCA.

Amurca ex oleæ fructu expressi olei sex est, Cur

ius hodie in nostris Pharmacopolijs nullus est usus.

VITEX. Ca. CXVI.

Vitex Græcis Agnus à Castitate, quam facit, uocatur. In Germania non temerè nasci crediderim. Quatenus enim ego cæ peragravi, nullâ inuenire potui. In Italia copiosè nascitur: Fructus eius in Pharmacopolijs habetur, quem Agni Casti semen uocant. Differt Vitex multis notis à parua illa salice, quæ quidâ Viticè esse credunt. Theophrastus meminit alterius etiâ Agni, quæ Eleagnum uocant, quoddam mediâ inter Oleâ et Viticem figurâ et formam habet, atq; nasci circa Orchomenam lacum. Eadè arbuscula copiosè in Cauchorum paludibus inuenitur, estq; tota odorata, semen piperi longo non dissimile habens. Cauchi quoniâ lupulum non colunt, huius arbusculæ frondes et semina, suæ cereuijs pro lupulo incoquunt, ea somnum cõciliant. Et citò inebriat. Vocatur ab illis hæc arbuscula Meseim et Bozî.

SALIX. Ca. CXVII.

Notæ sunt, et ubiq; in aquis proveniunt Salicis species, quas Germani generali uocabulo Weiden nominant. Recentibus et adhuc uirentibus Salicis frondibus et floribus, Medici acuta febri laborantibus somnum conciliant.

AGRESTIS OLEA. Ca. CXVIII.

Olea arbor est, ex cuius fructu oleû, quod nunc uocant oliuorum, exprimitur. In Syria. Reperitur autem sylvestris etiâ olea in calidioribus locis, eam Romani agrestem oleam, et Oleastrum uocant. Satina uerò Olea copiosè in Italia et Hispania nascitur.

COLYMBIDES OLIVAE.

Nondum maturi oleæ fructus, cum adhuc flauent, marina aqua et thymo conduntur, quos ita murie innatantes Græci ὀλὺβιδες uocant. Afferuntur ex Hispania et Italia ad nos, uulgòq; Oliven appellantur, quæ grato sapore et salubri stomacho cibo cum asinis carnibus comeduntur.

OLEASTRI OLEVUM.

Exprimitur etiam ex Oleastri fructu oleû, quod ad nos non affertur.

AETHIOPICAE OLEAE LACHRYMA. Caput CXIX.

Nascitur et in Aethiopia Oleaster, calidioris temperamenti, unde hæc lachryma fluit, quæ hodie incognita est. Quidam tamen eam esse credunt Gummi Elemi: quod ut non nego, ita etiam non affirmo.

QVERCVS. Ca. CXXI.

Qvercus omnibus nota arbor est, nobis etiam Euche uocata, et glandes eius Eycheln. Sunt tamen multæ eius species, quas omnes suis nominibus indicare difficile est.

A FAGVS ET ILEX.

Fagum quoque Graeci ad Quercus genus referunt. Ea est sine dubio arbor, quae nobis *Ein Bische* nominatur. Ilex uero quercui magis similis quam Fagus est. Sed difficulter monstrari potest in tanta rerum uarietate.

CASTANEÆ. Caput CXXII.

Fago non dissimilis est frondibus et fructu arbor, quae Castaneas fert, uulgo *Bestenbaum* uocata, et nuces eius *Kastanen*, siue *Besten*.

GALLA. Caput CXXIII.

Multa fert Quercus et Ilex, inter ea etiam Gallas quae in pediculis ut glandes nascuntur. in folijs etiam pilulae Gallis similes inveniuntur, sed rarioris haec sunt substantiae, et aquosiores, quam Gallae, quae quamprimum deciderunt succescunt: decidunt autem cito, nec Gallae modo in parente sua in durantur. Gallae Germanis *Galläpfel* et *Eychäpfel* uocantur, sumi quoque optime Asiae, quas hodie Turcicas nominant.

RHV. Cap. CXXIII.

Rha planta est ferens latum ut lentes semen, idque copiosum in racemis, quod Arabico uocabulo hodie in Pharmacopolijs *Sumach* appellatur. Theodorus Gaza *Rhun* fluidam interpretatus est apud Theophrastum, nomen illi à *ῥῆος* factum esse *B* existimans.

PALMA. Caput CXXV.

Palma est arbor paruos fructus ferens, quae hodie *Caryote*, olim *Carotides* et *Dactyli* uocabantur, ex quibus fit purgans medicamentum, quod *Diaphoinicon* nominant, ab ingredientibus *Palmulis*. Sunt autem multa eius genera. Plinius quasdam *Palmulas* *Nicolaos* uocat, quarum quatuor cubiti longitudinem habent. Quae uerba *Hermolaus Barbarus* non intelligens in magnum errorem incidit, scribens: *Nicolaos Palmulas* quaternum cubitorum habere longitudinem. Auxit itaque *Barbarus* decies et sexies earum longitudinem. Locus est in Corollario huius cap. *Palmulas* autem Germani *Datteln* uocant.

PUNICA MALA. Ca. CXXVII.

Mala *Punica* hodie *granata* uocantur, à contentis in se acinis. Habent haec suas ex sapore differentias. Inuicuntur etiam, et arte sic nasci coguntur, quae nullum in acinis semen habent. Haec à Graecis propterea *Apirena* uocantur. *Granatäpfel* et *Marien Magdalenen äpfel*, *Punicum* malum nobis appellatur.

CYTINVS.

Cytinos *Punicae* flores ait esse *Diose*. et proxi-
mo cap. *Balaustia* quoque *Punicae* flores esse dicere, cum tamen plurimum differant *Cytini* et *Bala-*

stia. Eam uero in hoc autore ambiguitatem sic docti etiam utri diluunt, ut *Cytinus* sit satius *Punicae* flos, *Balaustium* uero *syluestris*. Sed cum utriusque *Punicae* flos eandem habeat formam, *Balaustium* uero et *Cytinus* diuersam formam, necesse est etiam subesse differentiam, quae talis est: *Cytini* sunt *Punicae* tenelii fructus, qui statim post flores decidunt, ut in omnibus malis. *Balaustium* uero est flos *syluestris* *Punicae*, qui decedit sponte, quoniam inter pediculum et floris folia non habet caput, ex quo fructus fit. Tales abortiui flores in multis arboribus et herbis uidentur, praesertim in *Cucurbitae* et *Cucumeris* omnibus generibus. Et haec est uera *Balaustij* et *Cytini* distinctio, quam nemo reprehendet, si ea quae de abortiuis floribus dixi, intellexerit, uiderit et animaduertit. Possunt autem tam in *syluestri*, quam *satia* *Punica* et *Cytini* et *Balaustia* generari. *Cytinos* hodie *Pharmacopola* *Balaustia* etiam uocant.

SIDIVM.

Sidion, uel in plurali *Sidia*, *Punici* mali cortices Graeci uocant, Latini *Malicorium*. Veteres etiam *Sidam* *Punicum* malum nominabant. Est et herba palustris fructum huic similem ferens, quae *Sida* si militer appellatur: Cuius etiam *Nicander* in *Theriacis* suis meminit. *Sidion* uero hodie corrupto nomine *Psidia* uocatur in *Pharmacopolijs*.

BALAVSTIVM.

Repetantur hoc loco, quae in *Cytini* cap. de *Balaustij* dicta sunt.

MYRTVS. Ca. CXXVIII.

Myrtus, siue *Mirtus*, non est paruos ille fructus, qui Germanis *Seidel* uocatur, neque *Myrtilli*, *Seidelber*. Vera autem *Myrtus* in Italia feritur, estque arborefcens frutex, folijs *Lentisco* uel *Buxo* similibus, acuminationibus tantum, gustu aliquid aromatis praeseferentibus et odoratis, quae hodie cum fructu ex Italia afferuntur, habentque ueri *Myrtilli* insignes differentias, quibus à nostris bacis, quas *Seidelber* uocamus, dignosci possunt.

MYRTHIDANVM.

Myrthidanum *Myrthi* aduatum siue accidet est. Non affertur amplius, propterea in nullo usu apud nos habetur.

CERASIA. Ca. CXXIX.

Cerasi arboris multae sunt forma et facultate distantes species. Quapropter earum etiam fructus diuersas in cibo et Medicina uires habent. *Austrera* et *matora*, quae non ita in magnis arboribus nascuntur, è *Ponto* primum in *Italiam* à *Laculo* allata sunt. Quae uero dulcia sunt, et in proceris arboribus nascuntur, sponte sua ubique in *Germania* proueniunt. Nos generali uocabulo omnia *Cerasia* *Risphen* nominamus.

SILI-

A SILIQ. VAR. Caput CXXX.

A Cornuum similitudine Græcis Kegeria hi fructus uocantur, Latinis uero Silique, quoniam leguminū Siliquis similes sunt. In Pharmacopolijs corrupto uocabulo Xilocataracta, pro Xilocarata uocatur. Germanis autē Johanebrot / quoniam credunt D. Iohannem Baptistā hoc fructu loco panis in solitudine se sustinuisse.

MALA. Cap. CXXXI.

Purimas habent Mala differentias, non tantum secundum diuersas regiones, uerum etiam in iisdem regionibus in singulis oppidis differunt. Quare magni esset laboris omnia suis appellare nominibus. Germani generaliter uocabulo Epffel nominant. Cythonia uero siue Colbomea, omnibus nota sunt, ex quibus in Pharmacopolijs multa ad Medicinam usum sunt, Quitten uel Butten.

MELIMELA.

Melimela siue Glycymela, à melle et dulcedine nomen habent. Si alia accederet descriptio, crederem ea esse que Germanis Honigöpfel et Augstöpffel uocantur.

EPIROTICA MALA.

Qualia Epirotica siue orbiculata Mala sunt, hoc die non faciliè alijs indicauerit.

AGRESTIA MALA.

Agrestia mala ubiq; nascuntur, habentq; multas etiam ut satia differentias. Facium ex his et Pyris agrestibus et syluestribus Prunis omnibus contusis, affusa aqua musto similem potum. Qui Hestiam incolunt rustici, uocant eum potum Apffel trand.

PERSICA MALA.

Persica mala, que Germanis pfirschen nominantur, omnibus cognita sunt. Differunt tamen à Persicis.

ARMENIACA MALA.

Ex Persicorum genere sunt Armeniaca, minoratamen et ori suauiora, colore sublaui et citò maturefcentia. Quapropter præcocia à Romanis uocantur, à Germanis uero Amarellen / Armenellen / Melletlin / Goldpfirschen. Arbor mediam inter Persicam et minorem Cerasum similitudinem habet.

MEDICVM MALVM.

Medicum malum, Assyrium etiam, Citreum, Cedromelum et Citrinum, siue Citrinatum uocatur. Grande est et oblongum ouata specie malum, lentà habens carnem, et in medio acetosum citrasemina succum, ex quo Strupum de acetositate Cetri facimus. Corticem habet Citrinum, unde et nomen inuenit. Porro hoc Malū in Cedro nō nascitur, propterea uidendū est, ne diuersæ arbores confundantur.

Sunt etiam huius generis Limones et poma Arā

gana, Germanicè pomerāngen uocata, que mihi etiam Aurea mala esse uidentur. De Medicis siue Citreis malis enigma factum est illud: Medica mala quidem nec Mala nec Medica: quod quibus qui prodiam callet, intelligit.

PYRA. Caput CXXXII.

Pyra non pauciores quàm mala differentias habent, quod ad formam attinet, facultate tamen omnia firè astringunt. Germanis Pyren uocantur.

MESPIVS. Ca. CXXXIII.

Mespilus arbor, eiusdem nominis parua mala producit. Sunt autem due eius species. Prima Tricoccus Græcis, et propriè Mespilus uocatur, Italici etiam cum Arabibus Alzarola, siue Azarola. In Germania hæc arbor cum fructu uocatur. Altera uero species Mespili Græcis Epimelis et Hamamelis uocatur, quòd à iuxta Malum soleat nasci. Hec copiosè in Germania satia et sponte prouenit. Cum uero sponte, semper acinam habet agrestè Malum, Unde et nomen à Græcis illi factum esse existimo. Huius fructum Itali etiam unedonem uocant, propterea quòd præter unum nemo comedere possit antequàm mollescat, adeò fauces astringit. Non melati, arbuti etiam fructum à quibusdam unedonem uocari, quòd tantum unus esitari debeat. Sed ipse Gal. Epimelida unedonem ab Italici rusticis appellari testatur, sed male illi arbuti uitia assignat, cuius fructus etiam à quibusdam unedon uocatur, stomacho noxius, et capitis dolores generans, quod male Epimelidi adscribit Gale. Cum constet experientia, Epimelida, que Mespilus etiam in Germania uocatur, stomacho non inimicam esse, nec capitis dolores generare. Porro que à Germanis Mespeln uocantur, Epimelidis fructus, id est, unedones sunt.

LOTVS ARBOR. Ca. CXXXIII.

Lotus uocabulum est multis plantis commune. Hoc uero loco de Loto arbore agitur, que Latinis Celtis appellatur, quibusdam etiam Faba Græca. Habet hæc Lotus aliquot differentias, quorum aliqua etiam in Germania nascitur, non ausim dicere, cum ex Aphrica in Italiam translata sit. Propterea non credo eam apud nos in frigidiore terra sponte prouenire, quamuis Melospilen quantitate, figura, colore, et saporis licunditate totam Loti historiam referant. Non desunt etiam qui Sandalum rubrum Lotum esse credant, et Presilium. Hi autem à ligni colore sua desumunt argumenta.

CORNVS. Cap. CXXXV.

Cornus nequaquā est, ut hactenus creditū fuit, arborescens illa spina, quam Itali spinum album uocant: quod quilibet sciet, qui Theophrasti et huius autoris uerba de Cornu cum Italorum spinum albo, et Germanorum Hagendorn cōferet. Vera autē Cornus duplex est: syluestris et satia. Verag

A in Germania nascitur, & à nobis Latino uocabalo Kornlebaum uocatur. Nam Corna, id est fructus eius Kornlen uocamus. Habemus & alia nomina præter Latinum, quibus ea indicamus, ut Dirlen/ Kornferschen/ & Berlizen. fructum fert oliuæ mediocris quantitate. Cibo & Medicinæ propter suam astringendi uim idoneum. Nascitur syluestris Cornus pinguibus montanis locis.

SORBA. Caput CXXXVI.

Sorba non sunt, ut quidam credunt, syluestria mala, quorum antea ab hoc autore mentio habita est. Suum enim proprium ab his genus habent. In Italia ferè omnibus cognita Sorbus arbor est, cuiusq; fructus, qui in una specie oratus, in altera rotundus est ceu globus. Germani parum deslexo uocabulo & transpositis literis, Spörspffel/ pro Sorbspffel uocant, & Eschspflen. In nostris Pharmacopolijs iam nullus illorum usus est.

PRUNVS. Caput CXXXVII.

Prunus arbor uaria habet genera, unde etiam fructus diuerso temperamento constare necesse est. sunt enim quædam alui sistentia Pruna, sunt & soluentia, quæ nis facillè ex gustu deprehendi potest. Quæcumq; enim dulcia sunt, alui solum. Quæ uerò acerbæ, acetosæ, siue austera, cohibent. Damascena etiam Pruna adhuc in Pharmacopolijs excicata habentur, quemadmodum etiam magna illa Hægarica, quæ Grosse zwecken à Germanis uocatur, & interdum his pro Damascenis quidam utuntur. Pruna autem nobis pſſimum nominantur, in Hæsia quoq; prammen, quæ uox à Prumino deducta uidetur. Nam sic Gale. syluestrem Coccineam, id est, syluestrem Prunum, in Asia uocari testatur. Exiccata etiam Pruna ad nos ex Hungaria, Bohemia, Austria & Morauia afferuntur, quæ omnia generali uocabulo Zwetschen nominamus. Sunt & cerea Pruna, quæ Spilling Germanis dicuntur.

ARBUTVS. Cap. CXXXVIII.

Comarion Græci Arbutum uocant. In Germania nondum nasci uidi. Non enim est syluestris Rose frutex, qui Cynobatos est, ut antea dictum fuit. Vera autem Arbutus in Italia nascitur, folium habet crassum, Laurini folij forma, crassius tamen, minus & secundum proportionem Latius. Fructum fert mediocris siue parui Pruni magnitudine, sed fragi figura & forma, intus similiter ut fraga, paleacea grana habentem, sed gustu* inuicunda. Respexit autem ad
* Alias arbuti et fragi similitudinem, quam inuicem habent, incūda. Quid, cum ait:

Arbutos foetus, montanāq; frāga legebant.

AMYGDALAE. Ca. CXXXIX.

Amygdala duplici est differtie. Fert enim quædam dulces, quædam amaras nuces. Ap

pellatur etiā nux Græca Amygdalus, cuiusq; fructus. **C** Germani Mandelbaum arborem utriusq; uocant, fructus uerò Mandeln. Notæ omnibus nuces eius sunt. Exprimuntur ex utriusq; nucibus oleum, quod in suos usus seruatur à Pharmacopolijs.

PISTACIA. Caput CXL.

Pistachia, uel Pistacia, uel Phistia, nuces sunt in Syria genitæ, lento putamine munite, quæ eodem nomine adhuc in Pharmacopolijs habentur.

IVGLANDES. Cap. CXLI.

Nux regia, siue Persica, uel simpliciter nux, nobis omnibus est fructus, in procera & ramosa arbore nascens, quæ lata & odorata habet folia. Germani simpliciter Nusse/ uel Welsch nuss/ uocant. Persica nux hæc uocatur, quoniam ex Persi de primis in alias translata est regiones.

PONTICA NVX. Ca. CXLII.

Leptocarya Græci, Latini Ponticas etiam cum Græcis, et Auellanas nuces uocant. Sunt uerò duplicis differtie. Quædam sponte ubiq; in Corylo uulgariter nascuntur, quæ à Germanis Haselnusse nominantur. Quædam uerò in hortis plantantur, arbore Corylo simili, sed fructu oblongiore, & toto ceu barbato putamine tectis & uestitis. Huius nucis rassa membrana cingitur. Hæ nuces propriè à Græcis & Latinis Pontica uocantur, à Germanis uerò Lampertische nuss. **D**

MORVS. Caput CXLIII.

Morus omnibus nota est arbor, quæ Germanis Maulbeerbaum nominatur, fructus uerò, id est Mora, Maulber. Quinctiam in rubo Mora nascuntur, his quæ in arbore nascuntur similia, sed minora. Rubus uerò frutex multum à Moro arbore differt. Conficitur ex utriusq; Mori succo Diamorū medicamentum.

SYCOMORVS. Cap. CXLIII.

Sycomorus uel Sycomorus, copiose in Aegypto nascitur, & alijs quibusdam locis: apud nos uerò incognita est arbor, quemadmodum etiam altera Sycomorus, quæ in Cypro gignitur.

FICVS. Caput CXLV.

Ficus uulgaris etiam est arbor, cuius fructus Ficus dicuntur Latinis, Græcis Fōnga, Germanis Feigen. Multæ ficuum apud ætæres sunt differtie. Hodie tantum tres in hisce regionibus nouitas. Afferuntur enim flauæ quædam in sparteis corbibus compactæ, quas Germani Korbfeigen nominant. Aliæ etiam in cistis, Laurinis folijs cōmixtæ ad nos ueniunt, quas à folijs Lawbfeigen nominamus. Tertium uerò genus ex Massiliensi provincia uenit, imbutis & turbinatis sparteis corbibus inclusum. Hæ sunt parue quidem Ficus, sed magnam dulcedinem

A nem habent, & Germani: Wärsilische Feigen dicuntur. Quidam etiam caricas siccitas Ficus nominant: quam uocem Verg. Marcell. male in Dioscoridis contextum posuit. Habent enim carica Ficus suum peculiare genus, ut Hermol. Barb. in Corollario huius cap. scribit. Ficus uero syluestris caprificus Latinis, & Graecis etiam ἐρεως uocatur. Germanice incognita est arbor.

PERSEA ARBOR.
Caput CXLVII.

Persca haec differt plurimum à Persca uulgaris arbore, quamuis utraq; ex Perside in alias regiones translata sit: tamen Persca in Septentrionalibus plagis citò & ante frigora maturat fructum:

Persca uero etiam in Rhodo calida regione uix ad C. florem peruenire potest. Qui uero plura de Persca legere student, Theophrastum consulant.

Epilogus.

Hic est finis Primi Libri, quamuis in quibusdam exemplaribus etiam aliquot herbae sequantur, ut Hiberis & Halicacabus, ab imperitioribus adiectae. Nam Hiberis idem est cum Lepidio, quod in secundo describitur. In cap. etiam Halicacabi, quod Hiberida sequitur, tres herbae confusae sunt, ut Halicacabus, Solanum somnificum, & Dorygnum. Propterea haec capita imposita sunt, & non genuina.

FINIS LIBRI I.

IN PRAEFATIVNCVLAM.
QVAM DIOSCORIDES SECVNDO
LIBRO PRAEPONIT, ANNOTATIVNCVLA.

PRAEPONIT Autor, quo ordine res in primo libro descripsit, & quo in hoc secundo libro uti uelit ordine. Facit autem nullam mentionem, quod herbacea quaedam, & acrimoniam habentia (prater aromata) in primo libro recensuerit. In secundo uero se de oleribus & acrimoniam habentibus herbis scripturum promittit. Cum ergo Hiberis oleracea sit & acrimoniam habens herba, ut in secundo libro describatur ne esse est. Nihil enim commune cum arboribus habet, quare inter has describi debeat. Sed ne quis à dictione, Acrimonia, ansam calumniandi arripiat, necesse est ut indicem, quam acrimoniam cum Diosc. hoc loco intelligam, ne mihi quis hac ratione persuadeat, bene describi in primo libro Hiberida, cum multa alia acrimoniam habentia in eodem recenscantur, ut Acorus, Meon, Cinnamomum, Costum, & alia quaedam manifestam habentia acrimoniam. Verum ad hanc objectionem respondemus, Dioscoridem de huiusmodi acrimonia, quam praedicta aromata habent, hoc loco non locutum esse. Non enim eadem omnibus plantis est acrimonia. Quaedam enim solum eam habent, adiuncta inter dum amaritudine, dulcedine, & quibusdam alijs saporum differentijs. Talia autem sunt: allium, caepe, sinapi, nasturtium, eruca, lepidium, siue Hiberis, & quaecumq; his similem praeseferunt saporis acrimoniam. Haec simpliciter acris dicuntur, siueq; omnia ista oleracea & culinariae herbae. De his autem in secundo se scripturum promittit. Longè autem aliam acrimoniam habent Acorus, Costus &c. quae in primo describuntur. non enim eam in terrestri habent corpore, ut exulcerare ualeant,

quemadmodum illa oleracea, sed omnia praeter lenem & gratam acrimoniam partium tenuitate constant, quae facile per corpus penetrare possunt. Non enim sui saporis & facultatis uim uniloco imprimunt, propterea exulcerare minime sunt apta. Partium etiam subtilitati gratum & iucundum odorem coniunctum habent, & quae talia sunt, aromata dicuntur. Differunt tamen haec ipsa secundum diuersorum elementorum non eandem mixturam. Quare facultatem etiam eorum diuersam esse necesse est. Hinc est quod Costus ferè solus ex aromatis ruborem cuti impositus excitet: quoniam suam acrimoniam magis in terrea substantia, quam cetera aromata, habet. Porro quamuis Piper & Zingiber etiam aromatis adscribantur, tamen cum horum maior in culina quam Medicina usus sit, maluit ea acrimoniam habentibus & olerum condimentis, quam aromatibus adscribere: & bene quidem, cum haec duo inter omnia aromata plurimum acrimoniae, & minimum aromaticitatis (ut ita loquar) habeant. Si quis igitur haec probè intellexerit, facile uideri poterit, Hiberida non primo, sed secundo libro describi debere. Simile etiam de Halicacabo intelligendum est, quae herba est, & ad deleteria refertur. Quare in primum librum non erat ponenda, sed in quartum, ubi ex professo de ea in deleterijs & frigidis simplicibus agit. Antea enim promissit, se forma & facultate cognata coniuncturum.

MARINVS ERINACEVS.

Caput I.

Exiv & βαλάνος, quem Latini Erinaceum marinum, Germani Ein Meer Tigel uocant, non erum.

A nouerunt qui in maritimis locis habitant. Terrestri similis est, rotundior, minor, & breuioribus aculeis circumuallatus.

TERRESTRIS ERINACEVS.

Ex terrestrium Erinaceorum genere etiam Histrix est, quod animal Aethiopia et India gignit, magnitudine senestris porci, pedibus forma urinis similibus, dentibus & labijs lepori, sed his crassioribus & pinguioribus, fuscis longis, & in ceruice erectis setis a collo usque ad scapulas uestitum. Cetera praeter uentrem pede longioribus candicantibus & nigro distinctis aculeis munitum, quos irritati contra aduersarium ualli modo praetendit, & nonnunquam ei aculeatur tanto impetu, ut sagittarum modo parietibus affigit. Talis est histricis forma & proprietates: nec ex aliorum relatione hoc posui, sed ipse animal hoc uidi. Habet etiam praeter eas quae enumeratae sunt, alias proprietates, quas breuitatis causa praeterco. Non enim huius instituti est, exactam omnium rerum historiam scribere. Histricem Hispani Porcapit, Germani Stachelschwanz uocant, quasi aculeatum porcum. De hoc Erinaceorum genere hoc capite non scribit Dioscorides, sed de minoribus qui in cliuorum caernis latitant. Horum autem Germani duplicem statuunt differentiam. Est enim quidam cui caninum sit caput, quidam etiam cui suillum. Hunc nos Schwein Jgel, illum uero Hundes Jgel/capitum similitudine, uocamus. Apud nos Erinaceorum nullus est neque in sumat, neque in Medicina usus.

HIPPOCAMPVS. Caput II.

Nomen hoc grandem Erucam insectum scilicet significat, cum tamen paruum sit animal. Quoniam uero uulgaribus Erucis grandius sit, nomen suum inuenit. Nobis in continenti habitantibus est incognitum: quare ij qui ad mare habitant, ut cognoscatur, laborent.

PURPURAE. Ca. III.

Purpureas quas Graeci Πορφυρα uocant, ex testaceorum sunt genere, quibus olim Purpura tingeatur. Multas haec differentias habent. Est enim quoddam earum genus, quod Germani Ostern/Graeca uoce appellant. Buccinorum etiam genus Purpuris non dissimile est, quod Pharmacopoea Matrem perlarum nominant, & quidam in genere Buccinorum uocabulo omnia Maris testacea animalia, quae nos Muscheln uocamus, intelligunt. Est nobis difficilimum quicquam certi in hisce rebus pronunciarere. Quapropter nemo expectet, quod omnes istas Conchas proprijs suis nominibus indicaturus sim. Exigite enim haec res, qui ad mare habitet, & sepe nauiget.

MITVL, TELLINAE, ET HIATVLI, Caput III. & V.

Murex, Τένιας & Χύμας, omnes Conchae rum species sunt, sed singulas suis nominibus non facile aliquis indicabit. Referuntur etiam ad Buccinorum & Hiaturorum genera, quae ex Hispania a S. Iacobo feruntur conchae. Item ille ex quibus in maritima Germania Calx uirith. Debebant sane naturae studiosi homines uita spacio alios luxui deditos excedere, quo melius admiranda diuinae providentiae sapientia ex uarijs suis operibus cognosceretur. Verum cum huic studio unius hominis aetas non sufficeret, fortuna potius quam uita breuitas incusanda uidetur, quae multos naturae studiosos homines, aut nullis aut admodum tenuibus facultatibus beati. Alios uero omnium rerum affluentia perfudit. Sed hi somnum, crapulam, & luxum potius sectari malunt, quam admiranda naturae opera inuestigare.

CONCHVLA INDICA.

Caput VII.

Indica Conchula oblonga unguis formam habet, quapropter a Graecis οὐγγε appellata est. Plures haec differentias habet, quarum utilissima hodie in Pharmacopolijs habetur, sub Blaccæ Bizantie nomine. Erat olim in Thibetianum consuetudinis huius Conchulae usus. Hinc est quod sacra litera etiam hanc in eundem usum receperint.

COCHLEAE TERRESTRES.

Caput VIII.

Cochleae quaedam terrestres, quaedam marinae, & quaedam fluuiatiles sunt. & Germanis Schneck en nominantur. Omnium autem generum multiplex differentia existit: Quare ex magnitudinis & formae diuersitate facile cognosci possunt. In quibusdam regionibus terrestres & marinae eduntur, quae uero ex terrestribus fruticibus adherent, priuatim fesceli a Graecis uocantur. Fluuiatiles uirus habent, quapropter a nullis eduntur. Quod si quis paruas fluuiatiles Conchas manu aliquandiu clausas teneat, uerementem urticae modo excitabit pruritum. Porro non ab re fuerit, Concharum, Cochlearum, & Limaciorum differentiam ostendere. Quidam enim hisce uocabulis promiscue utuntur.

Conchae igitur tam fluuiatiles quam marinae, duas habent leniter concavas crustas siue testas, quas aperire & claudere possunt. Inueniuntur etiam, sed paucae, quae unica & latiuscula concha tegantur. Has omnes Germani Muscheln uocant.

Cochleae uero omnes unicam & continuam habent, quae se abscondunt, testam, siue testudinem, quam cum prorupit in dorso secum ferunt. Estque haec testudo, siue maris domum appellare, omnibus spirae modo inuoluta, quibusdam tamen in planum, ut paruis fluuiatilibus Cochleis, quibusdam haec spirae conuexa est, aliquibus etiam turbinis modo in longitudinem & acumen desinens, quod tam marinis quam fluuiatilibus & terrestribus commune est.

huius

A Huiusmodi Cochleas Germani Schnecken uocant. Limaces uero maioribus Cochleis lentore humoris & forma omnino similes sunt, domibus tamen carēt. Et in quibusdam locis nigrū, in quibusdam ruffum colorem habent, uivuntque plerumque in hortis. Non tamen in arvis, sed gramine. Inueniuntur etiam in sylvis, aut ubicunque gramen provenit. Hoc genus Germani Schneegel nominant.

CANCRI FLUVIATILES.

Caput IX.

Cancris fluviales nulli non cogniti sunt, & a Germanis Breebs uocantur. Sunt & marini, sed fluvialibus multo maiores. Sunt etiam marini admodum exigui, qui Latini Squille, & nobis Arablen uocantur. Sunt & marini longesque cubitos inter dum, inueniuntur & rotundi, a Germanis dißi Wespinne.

SCORPIO TERRESTRIS.

Caput X.

Terrestres Scorpiones in Germania calidioribus locis gignuntur quidem, sed admodum pauci. In Italia uero & similibus regionibus magna illorum copia est. Macerat eos in oleo Pharmacopola, quod postea Oleum Scorpionum uocant.

MARINVS SCORPIO.

Caput XI.

In mari omnia nasci traduntur animalia, quae in terra. Quare non inepte Plinius ait, mare omnia genere quae cunctis in natura reperiuntur, & multa etiam quae nusquam in alijs elementis. Necessse igitur est, & experientia constat, marinos quoque Scorpiones inueniri, quorum hodie nullus est apud Germanos in Medicina usus.

DRACO MARINVS.

Cap. XII.

Quemadmodum in terra, sic etiam in mari Dracones inueniuntur, qui an hodie cognoscuntur, nescio.

SCOLOPENDRA MARINA.

Caput XIII.

Marina Scolopendra an hodie cognoscatur, similiter ignoro. Terrestris uero Scolopendra sine dubio est utringue (tremens modo) multis pedibus ingreditur insectum, colore sordidum, minimi digiti longitudine, quod noctu cum in humido pavimento repit, ut cicindula lucet: & si digitis attrectetur, prius ut marina Scolopendra excitat. Germani ein Oßel, siue ein Wosel, nominant. Inuenitur in humidis domorum parietibus, nonnunquam etiam hororum areis, & sic siccatis paludibus.

TORPEDO. Cap. XIII.

Narces Greci, & Latini Torpedine uocant: fecitque utraque gens illi a torpore nomen, quo

niam tantam in se stupefaciendi vim habet, ut etiam per hamum, setas, & uirgam, stuporem in piscatoris manum transmittat, qui deinde totum corpus occupat. Non autem magnus fertur esse piscis. Quondam eo Medici utebantur. Nunc uero, quod sciam, nullum in Medicina usum habet.

VIPERAE. Ca. XV.

Vipera qualis sit serpens, & quid differat a reliquis serpentium generibus, copiose Nicanor, Aristoteles, Galenus, Aëtius, & multi alij indicant. Nicolaus Leonicenus in libro, quem de Tyro seu Vipera conscripsit, constanter affirmat, in Italia copiose inueniri Viperas, & uulgo Marassos, siue scurtones appellari. Ego uero eas hactenus in Germania nunquam uidere potui. Carnes eius coctae in pastillos conformantur, qui in Andromachi Theriacam ingrediuntur.

SENECTA ANGVIVM.

Caput XVI.

Pvlchra est apud Sicandrum de anguina senecta fabula. Est autem Anguina senectus, siue, ut Plinius nominat, Vernatio, serpentium exterior si milis membranae cutis, quam primo uere inter duos lapides, uel alias huiusmodi res exiunt, Vulgo uocatur ein Schlangenhaut.

LEPVS. Caput XVII.

Duplex genus Leporum inuenitur. Vnu enim D terram & sylvas incolit. Alterum uero in mari uiuit: qui an cognitus sit ignoro. Terrestris autem omnibus est notissimus, cuius coagulum aduersus uenena Medicinam facit. Totus uero exustus Lepus calculos frangere creditur.

PASTINACA MARINA.

Caput XVIII.

Tρυγωνα Greci, Latini Pastinacam marinā uocant piscem, qui in nostro mari ein Roch appellatur. Quidam etiam Trigona turcorum mari num esse autumant, & nihil a Pastinaca marina differre.

SEPIA. Cap. XIX.

Sepia a putredine nomen habet. Est enim rotundus globi figura piscis, lentus in longitudinem circa caudam desinens, sanguine atro ceu putri tabo plenus, qui a quibusdam Sepia atramentaria dicitur. Germani Bläckisch/ quasi atramentarium piscem nominant. Habet Sepia in dorso spine loco longum, latum, & candidum os, quod facile in puluerem fitur, eo Aurifabri ad annulorum futurā, & Medici ad dentifricia utuntur. Hoc uulgo etiam Fischbeyn uocant.

MVLIVS PISCIS. Ca. XX.

Mullus a quibusdam ille piscis efficitur, quem Barbum uocamus, quoniam barbam

A habet, quæ Mullo tribuitur. Cum uerò Mulli in mari degant, nec in uinarijs piscinisq; crescant (ut Plinius ait) hoc ipsum non affirmo.

HIPPOTAMI TESTICVL.
Caput XXI.

Hippopotamus in magnis fluuijs & calidis regionibus uiuit, qualis in Aegypto Nilus est, hodie Caballus marinus, siue aquaticus uocatur. Est autem equo dorso, iuba, & hinnitu similis, unde & nomen inuenit. Eius testes, quemadmodum & fibri, contra uenena remediū sunt: apud nos uerò in Pharnacopolis non habentur.

FIBRORVM TESTICVL.
Cap. XXII.

Castor à Grecis, et Fiber à Latinis, animal id uocatur, quod Germani ein Biber nominant. Eius uerò testiculi Castoreum Grecis & Latinis, Germanis Bibergeyln dicuntur. Vbiq; cognitum animal est, eiusq; testiculi frequentem usum habent.

MVSTELA DOMESTICA.
Caput XXIII.

Talys Grecis, Mustela Latinis, & Misset Germanis, hoc animal uocatur. Harum duo genera quidam statuunt. Sunt enim syluestres quædam, & quædam in domibus nostris habitantes, gallinus infestæ. Grecis unum eius genus id est uocatur, quod proculdubio est id, quod in domibus oberrat & gallinas perimit, & à nobis ein Altis siue ein Ratz nominatur, non multum à Greco abludente uocabulo.

RANAE. Ca. XXIII.

Rana omnibus notissima sunt. Hoc autem loco de uiridibus & uocalibus sermo habetur, quæ etiam in fluuijs & stagnis uiuunt. Reliqua enim genera uirus habent. In fine uerò huius capitis alias uirides Ranas intelligit, quas Greci Bpē Gavses, & Germani Loubfresch uocant, ut ex Galeno iudicare possimus, qui de simplicium facultatibus lib. 10. ca. de sanguine harum ranarum, idem scribit quod Dioscor. Cum uerò aliquando harum sanguini adscriptas uires experiri uellet, inuenit falso tales uires illi adscriptas fuisse.

SILVRVS. Ca. XXV.

Qualis Silurus sit piscis, hodie non cuiusuis est indicare.

SMARIS, MAENA, ET GOBIVS.
Ca. XXVI. XXVII. XXVIII.

Quaes etiam Smaris, Maena, & Gobius pisciculis sunt, cum multis doctis me ignorare ingenuè fateor.

OMOTARICHVS: Ca. XXIX.

Omotarichus falsi Thiani caro est, Qualis autem sit

Thinnus piscis, illi scire deberent, qui ad mare habitant.

GARVM. Caput XXX.
Arum hoc loco non gelatum elixorum piscium ius significat, sed salforum omnium piscium & carnum muriam, Lactæ Germanis dicitur.

RECENTIVM PISCIVM IVS ES-
culentum. Caput XXXI.

Iusculum hoc, ut ipse Dioscor. hoc cap. ait, sit ex recentibus piscibus cum aqua, sale, oleo & anetho coctis.

CIMICES. Cap. XXXII.

Cimices Greci Kōges, Germani Wanzen siue Wandteuſs, id est, parietinos pediculos uocant. Notum omnibus factore suo animalculū est.

MVLTIPEDES. Ca. XXXIII.

Multipedes Greci xōbaed & ὄβας, et ὄβας, Germani Eselchen Itali nunc Porceliones uocant. Parua sunt animalcula, colore liuida, multisq; pedibus ingrediuntur. Inueniuntur in humidis muris sub lapidibus & aquarijs uasibus.

Scolopendra etiam Latinis Centipes & Multipes interdum uocatur. Videndum igitur, ne harum significatio confundatur.

BLATTAE. Ca. XXXIII.

Silphæ Grecis, & Latinis Blatta uocatur insectū, quod Germanis ein Heymchen siue Grille nominatur, circa furnos, fornaces & focos uiuens, idq; hyeme. Tum enim omnibus molestus est eius perpetuus in clamando tenor. Aestate etiam in campis audiuntur Blattæ.

MARINVS PVLMO.

Caput XXXV.

Marinus pulmo ex cori genere est, quæ Greci Qoq̄ uocant, nobis autem in continenti habitantibus ignotus.

ANIMALIVM ALI-
quot pulmones.

Animalia, quorum pulmonibus hoc cap. medicas uires tribuit Dioscorides, omnibus cognita sunt.

ANIMALIVM ALIQVOT
locinora.

Animalia hæc etiam nulli non cognita sunt.

MARIS CERVI GENITALE.

Caput XXXVI.

Marium ceruorum genitalia principem etiam hodie ad Medicinæ usum custodiunt.

ASINI CAPRARVMQVE
ungule. Ca. XXXVII.

Hæc animalia earumq; partes, de quibus hoc loco agitur, omnes nouerunt.

EQVORVM LICHENES.

Caput XXXVIII.

Lichen

Lichen sue impetigo, in superficie cutis serpens exulceratio est, quæ à Germanis Flechten vocatur. Simile quiddam his Lichenibus in equorum cruribus infra genua nascitur, quod calli speciem et duritiem habeat, et odore uirosi sentiat. Quidam equites den Kamp vocant. Hos itaq; Lichenes Dioscorides hoc cap. intelligit.

VETERVM CALCEAMENTORVM corium. Caput XL.

Calceamentorum vetus corium et solæ comburuntur in cinerem, quo ulcera exciuntur. GALLINACEI. Ca. XLII.

Noti omnibus Gallinacei sunt, quorum non uulgari in Medicina usus esse posset, si eis similiter ut olim uteremur.

OVVM. Caput XLII.

Ovorum diuersa genera, quemadmodum et alitum, inueniuntur. Hoc tamen loco gallinarum ova intelligenda sunt.

CICADAÆ. Ca. XLIII.

Cicadas in Germania, quatenus ego eam peragravi, nondum uidi. Nequaquam enim sunt in feno saltetia animalcula, quæ Germani Zewschre et en uocant. In Italia uero Cicadarum magna est frequentia.

LOCUSTAE. Cap. XLIII.

Boniam autem Cicadas admodum similes sunt Locustis, ideo has illis statim subiungit. Sunt autem Locustarum multa genera, inter quæ etiam, quæ edendo sunt, inueniuntur, quibus nos carimus. Germani in genere omnes Locustas Zewschre et en uocant.

OSSIFRAGVS AVIS. Caput XLV.

Ovis Romanis Ossifragus uocatur, et si quis auis ex aquilarum genere. Quo autem nomine Germanis appellatur, et an in Germania reperiatur, cum multis ignoro.

GALERITA AVICULA. Caput XLVI.

Coridalum Græci, Latini Galerita, et Galli co uocabulo etiam Alaudam hanc auem nominant, Germani ein Lerche. Nulli non cognita est.

HIRVND. Ca. XLVII.

Hirundinum species omnibus cognita sunt, Germani Schwalben uocant.

EBUR. Cap. XLVIII.

Soli Elephantorum dentes Ebur sunt: suntq; hoc haftenus preciosissimum. Quapropter nemo speret uulgo in Pharmacopolijs uerum Ebur haberi. Hodie enim marinarum belluarum dentes pro Ebo re ostenduntur, è quibus pectines fiunt, qui ubiq; pro eburneis ueniuntur. Veruntamen Ebur Germani

Zelssfenbeyn, siue Zelssfenzahn, uocant.

SVIS TALVS. Ca. XLIX.

Talus os est in iuncturis pedum, quod Germani ein Kiste uocant: non tamen quoduis animal talos habet.

CERVI CORNV. Ca. L.

Ceruorum cornua omnibus nota sunt. Plurimum tamen refert, quo tempore ceruis decident, si ijs in Medicina uti uoluerimus.

ERVCAE. Cap. LI.

Eruca nomen insecto et olæ commune est. Hoc aut loco de herbis erodentibus Erucis sermo habetur, quæ Germanis Raupen uocantur.

CANTHARIDES, BUPRESTES, ET Pineruca. Ca. LII. LIII.

Cantharos scarabeum significat, unde diminutiuæ forma Cantharides dicuntur: parui, aurei coloris et oblongi scarabei, qui Germanis Gold Feser, siue Goldwurmchen, appellantur, quorum adhuc est in Medicina usus. Pineruca uero quæ Græcis πινυρκα uocantur, eruca sunt in Pino genitæ, quarum hodie nullus est usus.

Buprestis uero sine dubio ille est scarabeolus, qui Germanis ein Qualster uocatur, quo deuorato boves rumpuntur, unde et nomen illi à Græcis factum est. Formam hoc animal scarabeis similem habet, atque ingrediens pedibus, et fectore ipsos cinices superat, quo etiam frondes et fructus inficit, si quando per eos repat.

SALAMANDRA. Ca. LIII.

Salamandra sine dubio est pigrum illud lacertarum genus, quod Germani ein Molch, siue Vlm, uocant. Multis hoc probare possem argumentis, nisi breues annotationes, et non integram rerum historiam scriberem.

ARANEVS. Cap. LV.

Aranearum multa sunt genera. Eum uero qui retia ad capiendas muscas pretendit, et pro siliis, id est, uenatorem Græci uocant. Aliud genus sunt qui non ita artificio labore, rudes telas in domibus texunt. Germani omnes Araneos generali uocabulo Spinnen nominant. Græci etiam Phalangas, interdum Araneos uocant: quamuis præter Araneos etiam diuersum Phalangorum genus reperiatur. La certis paruis potius quam Araneis simile, quod Tarantula ab Italis uocatur.

LACERTA. Ca. LVI.

Lacertæ Romani Lacertum et Lacertam, Germani Zeydren uocant. Notum omnibus repens in terra quadrupes animal est, colore ut plurimum uiridi.

CALCIDICA LACERTA. Cap. LVII.

Alcideam Lacertam Nicander & Dioscorides Lacertis similem esse dicunt, eamq; Septem ad putrefaciendo uocant. Putrescit enim sanicm; olidam emittit ab illius morfu factum uulnus. Nomen autem inuenit, quod non uiridis sit, ut cetera Lacerta, sed aeri coloris. Est etiam aliud serpentium genus, quod similiter seps uocatur, sine pedibus, uiperæ simile, cuius Aëtius meminit: sed diuersum penitus est à Calcidicalacerta.

SCINCVS. Cap. LVIII.

Scincus terrestris Crocodili genus est, magnitudine Lacertæ, quo multis annis caruimus, sed iam quorundam diligentia factum est, ut rursus ex Aegypto ad nos perferatur. Materi diste, ut uocât, paruas quasdam aquaticas lacertas Pharmacopolis pro Scinco uendunt, quas Scincos marinos uocant: quibus non temerè uteretur, quoniam uirus habent. Quilibet ergo uideat, ne eas alicui intra corpus sumendas offerat.

VERMES TERRÆ.

Caput LIX.

Terre uermes Græci terre intestina, Germani Erdwürm / siue Regenwürm uocant.

MVS ARANEVS.

Caput LX.

Murem araneum Græci Μυγάλλω uocant, quod medium inter Mustelam & Murcem magnitudinem & formam habeat, non quod ex Mustela & Mure nascatur, quoniam naturalem inimicitiam hæc duo animalia habent. Quo autem nomine Germanis appelletur, non certò affirmare ausim: quamuis suspicer magnos illos Mures, quos Ratten / siue Rattenmæus Germani uocant, Μυγάλλας esse. Sunt enim uenenati, quapropter à felibus non nisi maxima fame comeduntur.

MVRES. Ca. LXI.

Preter Araneos mures sunt etiam marini, aquatici, & in agris nati Mures. Hoc uerò capite de urbanis siue domesticis muribus sermo habetur.

LAC. Cap. LXII.

Notum est omnibus Lac, non idem tamen habet omnium animalium Lac temperamentū.

CASEVS. Ca. LXIII.

Multa sunt Casei, secundum lactis qualitatem, differentiam & facultates.

BUTYRVM, EIVSQVE FV-
llo. Ca. LXIII.

Notum omnibus Butyrum est, quod quamuis à bobus nomen habeat, quoniam præcipue ex bubulo lacte conficitur, tamen non minus etiam ex ouillo & caprino lacte, eo quo rustici nouerunt mo-

do, conficitur. Quapropter non est quoddam Gale. Dioscoridem miretur, ex ouillo lacte Butyrum fieri, dicentem: Fuligo etiam ex accenso Butyro colligitur, oculorum Medicina utilis.

LANAE ET OESYPVM.

Cap. LXV. LXVI.

Lane succide neq; crude neq; uide in nostris Pharmacopolis usum habent. Earum tamen fordidam pinguedo adhuc præparatur, quam ueteres Oesypum uocabant. Hodie uerò corrupto uocabulo Yssopus humidus appellatur, ut ab Ysopo distinguant. Hisopum enim herbam hodie Ysopum uocant: de quo ridiculum carmen in ore omnium Pharmacopolarum habetur, hoc scilicet: Ysopus est herba, sed Esopus dat bona uerba.

COAGVLVM ANIMALIVM

aliquot. Ca. LXVII.

Coagulum Græci Πύλω, Germani Labuocant. Est autem Coagulum in huiusmodi siue pullorum animalium uentriculis in caseum densatum lac. Animalia quorum coagula hoc capite enumerat, partim nota sunt, partim ignota, his præsertim regionibus.

ADEPS. Ca. LXVIII.

Notus est ferè omnium animalium Adeps, quorum hoc capite mentio fit.

MEDVLLA ANIMALIVM.

Cap. LXIX.

Habent Græci duo uocabula, quibus Medulla significat, nempe σπινθηρ, & μυελός, sed diuersam habent significationem. Illo enim arborum Medulla, & facta in fructibus quibusdam semina indicantur. Hoc uerò, quæ in spina & ossibus animalium continetur Medulla, quam Germani Mark appellat.

FEL. Ca. LXX.

Quid fel sit, cuius notum est. Hodie autem rarò ad Medicinam utimur.

SANGVIS ANIMALIVM.

Caput LXXI.

Preter hircinum sanguinem nullus in Pharmacopolis ad Medicinam usum, hoc tempore hisce regionibus seruatur.

FIMVM ANIMALIVM.

Cap. LXXII.

Non opus est animalium Fimum in Pharmacopolis seruari, cum semper & ubiq; cuiuscumq; animantis (si necessitas requirat) finum habere possimus.

VRINA. Ca. LXXIII.

Note uulgo omnibus urinae sunt, de quibus hoc capite scribit Dioscorides. Lyncis uerò urina quid sit, & an sit in rerum natura, multis secus

A seculis dubitatum est. Scribunt enim Lynceum proieci-
tam urinam terra obtegere, quae deinde in lapide,
Lyncurium dictum, indurescat. Sed fabula tantum
est. Quapropter bene Dioscorides quoque illam dam-
nat, & recte inquit, idem esse Lyncurium cum ele-
ctro, id est, succino: quod nisi longum foret, innume-
ris argumentis & rationibus probare possemus.

Quid uero re uera succinum sit, haecenus proculdu-
bio uulgo ignoratur. Et si quid dixerim, omnibus non
eadem o'poy dicere uidebor. Nullius enim est resina ar-
boris succinum, quod tamen doctissimi quique haec-
enus crediderunt. Eo autem solo argumento ostende-
re id conantur, quod culices, formicas, & alia huius-
cemodi animalcula complectatur, unde ratio cinan-
tur, liquidam antea fuisse resinam. Ego quidem succi-
num rem liquidam fuisse probe scio, propterea hoc
libenter concedo, resinam uero fuisse minime assen-
tior. Si enim succini materia, qualitas, uirium facul-
tas, odor, & alia eius accidentia considerentur, lon-
gissime a quacunque resina aberit. Paucis igitur uer-
bis quid sit expediendum. Nam si omnia argumenta af-
ferre studeam, quibus succinum non esse resinam pro-
bare possem, aliquot paginas implere necesse esset.
Et si citam omnes rationes adducere, quibus quid
sit re uera ostendere facile quocumque in iustum librum
excreset oratio. Quare necum de succino iudici-
um (quod etiam Georg Agricola, harum rerum di-
ligentissimus scrutator & scrutator, adeo non impro-
bat, ut etiam probet & mecum sentiat) proinam.

Antequam autem id faciam, paucas illis quaestiones pro-
ponam, qui succinum resinam esse contendunt, quas
si mihi soluerint, cum illis libenter sentiam.

I. Cur succinum in locis generatur, ubi densum
sine liquidum bitumen inuenitur? II. Cur succi-
num etiam nigrum inuenitur, cum nulla eo colore
unquam uisa sit resina? III. Cur nigrum suc-
cinum suas uenas in montibus seu bituminosi isti car-
bones habet? IIII. Cur succinum tot habet colo-
re differentias, quot Bitumen & Naphta?

V. Cur succinum odorem bituminosum carbo-
nibus impositum reddit? VI. Cur succinum bi-
tumen eadem uires habet, imò etiam efficaciores?

VII. Cur succinum quoddam reperitur, quod
Naphta modo flammam attrahit? VIII. Cur
succinum, si resina est, non in guttas singulas, seu plu-
res coniunctas, ut aliae resinae, concreuit?

IX. Cur succinum in paruas & magnas po-
tius glebas quam in guttas concreuit? X. Cur
succinum, si resina est, Piccae uel huius generis folia
non complectitur, cum aliae quae sponte destillant re-
sinae, ea sibi commixta habent? Sed non opus est plu-
res afferre quaestiones. Ad rem redeamus. Est au-
tem re uera & sine dubio succinum ex montibus in
mare defluens Naphta, quae marina aqua in solidum
corpus densatur. Graecis electrum uocatur, Germa-
nis Bismstein & Agsteinstein. Est & electrum

metallum, quod ex auro argenteoque constat: cuius Ho-
merus etiam meminit, cum ait Menelai regiam au-
ro & argento, electro & ebore fuisse.

MEL. Caput LXXIIII.

Omnibus notum est mel. Sardinium uero mel
ex absinthio & ranunculi quadam specie col-
ligunt apes. Quapropter intra corpus non sine no-
cumento sumitur. Quod autem in Ponto uenenatum
sit, hoc apes ex aconiti, absinthij & nerij floribus col-
ligunt. Est & aliud mellis genus, quod Sacharon an-
tiqui, recentiores uero Zuccarum uocant. Sponte
hoc in arundinibus generatur, Indiciis & Fortunatis
Insulis, quas hodie caput S. Thomae, Canarias, &
Maderam uocant. Porro sunt etiam docti uiri, qui
nos antiquorum Sacharon habere negant. Eos autem
rem diligentius considerasse uelim. Nam nihil differt
nostrum Zuccarum ab antiquorum Sacharon. Ho-
die enim totas illas sacchariferas arundines tundunt,
& ex his Zuccarum uulgo notum excoquunt. Olim
uero nondum cognito eo excoquendi modo, illud tan-
tum colligebant, quod lachrymarum modo ex harum
arundinum illarum oculis & germinibus erumperet.

CERA. Caput LXXV.

Ceram Germani Wachu uocant. Sequitur haec
mellis qualitas. Quapropter Pontica &
Sardinia aliud habet, quam uulgaris cera, tempera-
mentum & facultatem.

PROPOLIS. Ca. LXXVI:

Fuit olim magnus Propoleos in Medicina usus,
nunc uero ex omni usu abdicata est. Arabes au-
tem hanc Mum uocant, sed male eorum interpretes
Mum sordes alucarum esse dicunt: multum enim ab
his differt. Sordes enim in fundo reperiuntur, suntque
derasa apum pedibus à fauis ramenta. Propolim ue-
ro ex betulae foliorum pinguedine & populi lachry-
ma apes colligunt, quae alucarum caeteras partes
exequant, & foramina contra frigus obturant. Ger-
mani Bet et Stopffwach uocat. Efficacior uero
Cretica & Pisdica propolis est, cuius maiorem par-
tem apes ex Styraeis lachryma, & Ladani pingue-
dine colligunt.

TRITICVM. Ca. LXXVII.

Notum est omnibus Triticum. Porro sunt qua-
dam qui Triticum generale omnium frumen-
torum nomen esse autumant: reuera tamen iuxta o-
mnium satis certam opinionem Triticum illud est
frumentum, quod Germani Weizen uocant. Habet
tamen hoc ipsum suas species & differentias.

HORDEVM. Cap. LXXVIII.

Hordeum notum omnibus frumentum est, ex quo
Hordeacea prisana conficitur, Germani Ger-
sten Hordeum uocant.

A ZYTHVM ET CVRMI.

Cap. LXXIX. LXXX.

Zythum & Curmi ueteres appellabant ex frugibus facta pocula, qualia illa multa sunt ceruissie genera in Germania.

ZEA. Caput LXXXI.

Zea Latinis Zea, Germanis Dündel uocatur.

CRIMNVS. Cap. LXXXII.

Crimnus crassior farina Trutici & Zea est, quamuis etiam ex alijs frumentaceis fiat. Unde puls postea conficitur. Germani Griesß uocant.

OLYRA. Ca. LXXXIII.

Olyra, ni fallor, uulgare illud est frumentum, quod Germani Rocten/ siue Roggen/ uocant. Hoc si non fuerit apud ueteres, Olyram non habemus, & quid Rocten sit, ignoramus.

ATHARA. Ca. LXXXIII.

Athara est tenuissima farina liquidior facta pulicula, quam Germani ein Sauffen uocant.

TRAGVS. Ca. LXXXV.

Tragus quale sit frumentum, & quo nomine appellatur, non cuius cognitum esse puto.

HAVENA. Ca. LXXXVI.

Hauena duas habet differentias. Vna enim frumentum est, quod Habbern Germanis dicitur. Altera ab hoc ipso autore in quarto lib. Græcè *ἑρμύς* appellatur, quæ à fruge differt, & à Vergeti. Sterilis auena uocatur.

ORYZA. Ca. LXXXVII.

Oryza frumenti genus est, quod à recentioribus Rizum, & Germanis Reiß uocatur: in palustribus & uliginosis locis nasci *ἑρμύς* Dioscor. ait. Nostra uero Oryza ex India in alias terras translata est, & in multis locis Europa feritur. Quare necesse est aliam quoque Oryzæ speciem inueniri, quæ etiam in Europa sponte nascatur. Nam Dioscorides simpliciter palustribus locis eam nasci ait, nec adiecit peregrinæ alicuius regionis nomen. Porro inuenitur apud nos in palustribus & uliginosis locis frumentum, quod Schwaden uocamus. Hoc proculdubio illius species est. Habet enim folia, culmos, spicam, & semen omnino maiori Oryzæ similia. Semen tamen quamuis eandem proportionem, saporem & usum habeat, minus est. Sed hoc nihil impedit, quo minus Oryzæ sit species. Hi autem uelociter errant, qui Schwaden Sefamum esse putant. Quid autem Sefamum sit, statim sequetur.

ALICA. Caput LXXXVIII.

Condrum Græci Latinorum Alicam uocant. Veteres duas res hoc uocabulo intelligunt,

nempe ex Zea, quæ Diazeas uocatur, certo modo factam farinam, & peculiare frumenti genus, quod Latini Far siue Adoreum uocant. Sed quæ hoc sit, nondum planè compertum habemus.

MILIVM. Ca. LXXXIX.

Conchroon Latini Milium, Germani Hirsen uocant, notum est frumenti genus, harundinis folijs, & in harundinea iuba semen ferens.

PANICVM. Caput XC.

Eλμός Græcis, Latinis Panicum uocatur. Panicum ab omnibus autoribus Milio simile esse dicitur. Quare in maximo errore uersantur hi, qui Panicum illud frumenti genus esse putant, quod Germani Seydenfohn appellant. Verum cum Seydenfohn hederacea folia, & minime harundineum caulem habeat, Panicum uero harundineum culmo & folio constare describitur, Panicum nequaquam Seydenfohn esse poterit. Sed non opus est multis argumentis. Propterea quid reuera Panicum sit, indicabo. Verum itaq; Panicum nullo simile est frumentum, quod Itali adhuc Panigo, & Germani Suchschanz uocant.

SESAMVM. Caput XCI.

Sesamum à multis esse Schwaden creditur, quod in Oryza negauimus: & hoc loco multis certissimis argumentis id ipsum demonstrari posset, nisi breuitati consuleremus: propterea unum tantum afferam. Scribunt auctores Sefamum semen suum in uisculis papaueris modo continere, Schwaden uero in spica siue iuba Millacea suum semen fert. Ego Schwaden nequaquam Sefamum esse potest. Miror autem uehementer, quo argumento moti sint, ut illi opinioni tam firmiter adhererent, cum adhuc uerum Sefamum ex Aegypto ad nos copiose afferatur, una cum oleo ex semine expresso. Nam peregrinum nobis Sefamum est. Schwaden uero sponte apud nos prouenit. Porro sumus qui tesminos flores, quos Itali Sefminos pronuntiant, à Sefamino semine non distinguere ualeant, ob eam causam quam in lasinio unguento indicauimus.

LOLIVM. Caput XCII.

Lίαν Græci, Latini Lolium unumquodque de generans frumentum appellat: quod cum in Hordeo nascitur, & walch à nobis, propter infamiam quam facit, dicitur. In Olyra uero Trespe. Est & alia herba parua & quinquefolia rose similem habens florem, eumque rubentem, & nigrum in uasculo semen, quod nos Raden uocamus. Hoc etiam à quibusdam Lolium esse creditur. Cum uero auctores Lolio spicam tribuant, Raden uero uasculum habeat, nihil affirmo. Hi autem magnopere errant, qui Raden Nigellam esse crediderunt.

AMYLVN. Caput XCIII.

Nota

A Nota omnibus res est Amyla, sic dicta, quod sine mola conficiatur. In Pharmacopolis, uero mutata litera, Amidum uocatur. In Germania uero Sterck & Knaßmehl.

FOENUGRAECVM.
Caput XCIII.

Foenugraecum leguminis genus est, quod Graeci Τύρις, Germani Zigenhorn & Sibens gesente uocant. Sunt tamen qui posterius hoc uocabulum ad lotum satiuam etiam referant. Zigenhorn uero genuinum Foenugraeci nomen est. Nam sic Germani Graecorum Aegoceron interpretantur. Semen autem Foenugraeci eodem nomine in Pharmacopolis habetur.

LINUM. Cap. XCV.

Vesciebantur ueteres Lini etiam ut Foenugraeci semine. Propterea leguminibus coniunguntur. Est autem Linum omnibus nota herba, quam Germani Flachs uocant. Semen uero solum Lini.

CICER. Cap. XCVI.

Epichoridion hoc legumen uocatur. Colore habet triplicem differentiam. Est enim quoddam genus rufum habens semen, & quoddam candidum, quod columbinum dicitur. Et tertium genus nigrum semen habet, quod priuatim arictinum nominatur, quoniam arictino capite semen eius simile sit.

FABA, LEGUMEN.
Caput XCVII.

Cyamum Graeci, Latini Fabam uocant, Germani Bonen, de quo non opus est dubitare, cum omnes ab autoribus Fabe adscriptae notae huic legumini conueniant, quod nos Bonen uocamus. Differunt Fabe secundum colorem & magnitudinem.

FABA AEGYPTIA.
Cap. XCVIII.

Aegyptia Faba in inundatis Nilo campis nascitur, cuius radicem Aegyptij Colocastiam uocant, solo semine haec nostrati Fabe similis est. Quod enim ad ceteras eius partes attinet, omnino dissimilis esse cernitur. Nobis autem haec est incognita.

LENS. Caput XCIX.

Lentis Latini Lens, Germani Linsen appellatur. Est autem Lens duplici differentie. Quedam enim legumen est, de qua hoc loco agitur. Altera stagnantibus undis innat, de qua infra sermonem habebimus.

PHASELVS. Cap. C.

Distinxerunt Phaselum a Phasiolo, qui post Dioscoridem scripserunt, ita ut Phaselus sit legumen simpliciter nunc uocatum ab Italis Phasiolus, Phasiolus uero idem cum Dolicho, sed istam dif-

ferentiam nullus autor adhuc, neque ipse Dioscorides obseruauit. Nam hic Phaselolum uocat id legumen, quod adhuc Itali Phasiolum uocant. Quapropter cum uideam a multis diuersas has herbas confundi, distinguam eas, & notas quibus ab inuicem dignosci possint, ostendam. Sunt enim ambe legumina, magna in folijs, floribus, siliquis & seminibus affinitatem habentia. Hic Phaselus igitur quem Dioscor. hoc loco recenset, & ab aliquibus etiam distinctionis gratia Phaselus, seu ut Itali dicunt, Phasiolus uocatur, legumen est, absque adminiculo seu pedamento per se subsistens, folia habet in uno pediculo tria, bederacea, mollia, quarum spina ex interiore parte candicat. Flores proferit candidos, & post hos in siliquis terebibus candida & oblonga semina, media inter fabas uulgares & pisas forma & magnitudine, quibus nigrum quiddam eo loco, quo siliquis ameduntur, innest. Hic est Phaselus siue Phaselus, in quidam dicunt, de quo hoc loco scribit Dioscorides.

Alter uero eius species est huic forma foliorum similis. Circunvoluitur haec arbutis & hactenus, siueque ex ea corne estate, longiores haec quam praedictus Phasiolus siliquas fert. Propterea ab aliquibus Dolichus appellatur, & fructus eius Loli, quoniam insignes sunt siliquae in quibus figura Phaselii semina nascuntur, non tantum candido colore. Nam inueniuntur nigro, croceo, rufoque colore, & mixtus etiam pluribus coloribus simul. Hic Phaselus Smilacis & satiuae etiam appellatur. Quorum uero haec duae Phaseolorum species inuicem similes sunt, nomen etiam commune habent. Cum uero proprie loqui uolumus, legumen illud prius descriptum, Phaselus siue Phasiolus uocamus: postremo uero descriptum Dolichum, Smilacem locum siue satiuam, & Siliquas eius Lobas. Porro utrumque Germaniae peregrinum fuit legumen, & Phaselus, siue Phaselus, siue Phasiolus, qui absque adminiculo erigitur, a paucis in Germania Pharmacopolis & Herbarum studiosis fertur. Dolichus uero a plurimis non tantum ciuibus, uerum etiam rusticis umbræ & ostentationis causa. De Dolicho autem statim post sequetur proprium caput.

OROBVS SEVERVM.

Caput CI.

Orobolus Graeci, Romani Erui appellant. Peregrinum hoc Germania hactenus legumen fuit, quamuis omnes Orobum uocent eam leguminis speciem, quae Germanis Wicken appellatur, sed errore seducti. Nam Wicken est Latinorum Vicia, et Graecorum Aphace, seu Buxia, in de Germanica uox deducta est. Verum tamen Eruium nunc a quibusdam in Germania fertur.

LUPINVS. Cap. CII.

Lupinus Graeci Lupinum, Germani Setzbohne uocant. Notus omnibus Pharmacopolis eodem nomine Lupinus est.

A SATIVA RAPA. Ca. CIII.

Rαυλῶν, siue ραυλίδας, Latini Rapum, Germani Rāben/ appellant. Notae omnibus cum herba radices eius sunt, quibus uescimur. Duplicem habet Rapum differentiam. Sunt enim sativae quaedam, de quibus hoc capite scribitur, et sponte in arvis prouentientia quaedam. Videndum tamen est, ne Raphanum agrestem, cum sylvestri Rapo confundamus. Sunt enim ualde similes inuicem herbae, sed Rapum fruticosus est, et multas alas ramulosque ad latera spargit, in quibus sunt lutei flores: nascitur pinguis aruis. Raphanus uero sylvestris pallidiores habet flores, et paruas radices, Rapum uero pollicem crassas.

NAPVS. Caput CIIII.

Napirapis congeneres sunt, densiores tamen, acriores, et minores. Inueniuntur etiam luteo et croceo colore Napi in Bordueliano Brunsvicensis ducatus agro, quibus praecipua laus et autoritas attribuitur. Graeci hunc Napum Βουνίδα uocant, Itali Nauoni, Germani Nāpen et Sackel rāben/ Saxones uero Brunsvicenses suos Nāpos Bordiseldische Rāben appellant, ab oppidulo Bordiselt, ubi nascuntur.

RAPHANVS. Ca. CV.

Raphanum Latini radicem, aliqui etiam radiculam, Germani Rettiſch uocant, siue Rube Rettiſch. Est et alia herba, quae a Latinis Lanaria radícula, siue simpliciter etiam radícula dicitur, a Graecis Struthion, sed diuersa a Raphano. Quare uidendum est, ne alteram pro altera accipiamus. Raphani autem duae sunt species. Una scribitur, et in Turingia cubitali longitudine et crassitudine, quae utraq; manu amplecti nequeat, prouenit. Quare non inepte Plinius scriptum reliquit, Raphanum in Germania infantium magnitudine nasci. Altera uero sponte in aruis prouenit, quam Germani Heyde rettiſch/ id est, sylvestrem Raphanum uocant, Latini Armaraciam. Recentiores Raphano etiam adscripserunt acrem istam radicem, quam nos Merrettiſch appellamus, et ea utuntur, ubi praedicto Raphano ui debent: sed male. Non enim habent aliquem ex ueteribus autorem, qui Merrettiſch/ Raphani speciem esse innuat. Quid tamen Merrettiſch sit, paulo post audiemus.

SISER. Caput CVI.

Sισέριον Latini Siser uocant. Serebatur haec herba olim in Germania cibi causa, et optime in hac frigida regione proueniebat, qua causa ea quotannis a Germanis flagitauit Tiberius Caesar, ut inquit Plinius. Hodie uero quid sit Siser, ignoratur. Brunfelsius tamen in tertio Herbarij sui Tomo scribit, quod Siser sit illud olus, quod Germani Geirlen uocant, cui omnino subscribo. Hesi uocant Blino

gelmdzen/ alij Geirldzen. Estque omnium radicem, quae uescendo sunt saluberrima Siseris radix.

RVMEX, SEV LAPATHVM. Caput CVII.

Rῥυμήξ, Latini Rumex, Germanis Ampfſer dicitur. Herba est quinq; sub se habens species. quapropter praedicta trium gentium uocabula in genere omnibus speciebus communia sunt. Quidam Rumex satiuus est, hunc nos Gartenampfſer uocamus. Agrestis etiam quidam est, qui a Pharmacopolis Lapathum nunc dicitur, a Germanis Hasenampfſer/ Cassenwurz/ Butterampfſer, quoniam rustici butyrum eius folijs inuolutum in urbes ueniale ferant. Non desunt etiam qui Buglossum eam uocent, Myssenorum et Vitebergensium Saxonum Germanico uocabulo decepti. Tertia species ῥυλῆξ, ῥυλῶξ, Graecis, Latini Rumex acutus, uel, ut nunc, Lapathum acutum, Germanis Spitzampfſer dicitur. Nascitur humentibus, sylvestri similis, nisi angustiora et acutiora folia haberet. Quarta ῥυλῆξ, Graecis, Latini Acetosa, Germanis Sauerkampfſer uocatur. Quinta omnium maxima est. Nascitur aquosis et palustribus locis, unde a Graecis ῥυπῶλας, siue ῥυπῶλας, siue ῥυπῶλας, et a Germanis eadem significatione Rossampfſer et Wasserampfſer nominatur. Haec sunt Lapathi genera ab antiquis descripta. Est et sextum, acetosae forma et sapore simile, multo tamen minus, in agris nascens.

LAPSANA. Caput CVIII.

Lapsana agreste olus est ex brassicae genere, Germanis Reintöl appellatum. Hoc seapud Dyrrbachium uicissim milites Caesari in triumpho exprobrauerunt, ut apud Plinium et Suetonium est uidere.

BLITVM. Caput CX.

Bliton inter et insipidum olus est. Quo autem nomine iam appelletur, superuacuum est inquirere, cum nullas habeat medicas uires.

MALVA. Caput CXI.

Mαλὰχ, Latini Malua, et papeln Germanis appellatur. Una eius species in hortis scribitur, quae a nobis Römische Pappeln uocatur, sinuosa crispidine per ambitum foliorum insignis. De hac et sylvestri uulgari hoc cap. agitur. Sunt enim et aliae sylvestres Maluae, seu Althea et Alcea, de quibus infra sermo erit.

ATRIPLEX. Ca. CXII.

Aτρίπλεξ, Graecis, Atriplex Latini, Melde Germanis hoc olus uocatur. Duplicem habet differentiam. Est enim sylvestris et satius. Satius rursus duplex, est enim uiridi et rufis folio. Sylvestris plures habet discrimina metas. Haec quod in stercorearijs nascatur, Mistmelde appellatur.

BRAS-

A BRASSICA. Cap. CXIII.
CXIII. CXV.

K *Brassica* Latinis *Brassica* olim dicebatur, nunc uero *Caulis*, unde Germani suum *Brassica* desum pferunt. Multae sunt *Brassicae* species: Est enim uulgaris quaedam, quae simpliciter *caulis*, et Germanis *Wila* est nominatur. Est et crispa quaedam, omnibus etiam nota: utriusque folia ad purpureum colore inclinant. Est etiam alba *Brassica*, quae in capita conerescit, unde capitata et *sestilis* uocatur, a Germanis uero *Cappestrant*, quod nomen ab Italico ad nos uenit. Illi enim capitum sestilem hanc herbam nominant. Habent huius capita in quibusdam regionibus, ut Boemia, rufum colorem. Est et marina *Brassica*, quae hodie *Soldanella* in Pharmacopolijs appellatur. Porro *Syluestris brassica* plures sunt differentie.

BETA. Caput CXVI.

T *Beta* apud Graecos, Betam Romanis, *Beys* est, *Römis* est, *Rounga* est, et *Mangolt* Germani hoc olus nominant. Duplicem habet colore differentiam. Est enim nigricantibus in purpurea folijs quaedam et rufa radice. Haec nigra Latinis dicitur. Germanis *Rot mangolt*, siue *Rote Rüben*. Radices enim rapis magnitudine et forma similes sunt. Candida huic omnino similis est, sed colore differt, quem folia eius in candido uiridem habent.

B Nigra beta radices arte incrementum sumere coguntur, quae conduntur et assatis carnibus apponuntur. Candida uero *Beta* radices minime curantur.

PORTULACA. Ca. CXVII.

A *Portulaca* apud Graecos *Portulaca* uocatur, Germanis *Portel*. Notum est acetarium hoc olus, est et *Syluestris Portulaca*, in asperis litoribus nascentis: de qua alibi agemus.

ASPARAGVS. Cap. CXVIII.

A *Sparagus* Pharmacopolijs *Sparagus*, Germanis *Spargen* appellatur. Foeniculo folijs simile olus est, cuius radices et semina in Pharmacopolijs seruantur. Dicuntur etiam *Asparagi* omnium olerum, tam *Syluestrium* quam *saturum*, primo ueretenelli et recentes caules, quales in *Rapo* et *Bryonia* uidentur.

PLANTAGO. Ca. CXIX.

A *Plantago* apud Latini *Plantaginem*, Germanis *Wegwey* uocant. Tres habet haec herba differentias. Est enim latifolia quaedam, et angustis oblongisque folijs quaedam, tertia latifolia similia habet folia, multo tamen minora, et leniter hirsuta.

SIVM. Caput CXX.

S *Sium* ex *Api* genere olus est, quod Germani *Klein Wasserment* uocant, quoniam *Paludapio* si-

mile sit, sed minus. Nascentur glaciis et perennibus riuis, ut *Plinius* etiam obseruauit.

SISYMBRIVM. Ca. CXXI.

P *Simum* *Sisymbrium* menta species est, quam Germani *Sichymus* uocant. Estque haec duplicis differentie. Una enim nigricantem habet caulem, et ubique in aquis nascitur, *Sichymus* Germanis appellata. Altera hirsutioribus est folijs, nec tantum iuxta riuos, uerum etiam in siccis prouenit. Haec *Balsamita* a Pharmacopolijs nominatur. Confunduntur tamen ab imperitis haec duo *Sisymbrij* species.

Alterum uero *Sisymbrium* solum nomine priori simile. Nam *Nasturtij* potius quam illius species est. Quia propter etiam a Graecis *Kage* aqua, quod si nascitur, et a Germanis *Wasserkraut* uocatur. Notum est et *Julibre* olus, quod *Nasturtij* frequenter nascitur. Recentiores hoc aquaticum *Nasturtium*, maximo errore *Sonectone* uocant, ut in *Sonectonis* cap. audienus.

Batis. Cap. CXXII.

K *Batis* apud Latini *Batin* dicitur. Marinum est olus, quod etiam in hortis serchatur. Nomen tantum in Pharmacopolijs nostris habetur. Res enim quae hodie sic apud nos uocatur a Pharmacopolijs, diuersa penitus a *Bati* est.

CORONOPVS. Ca. CXXIII.

P *Coronopode* male haecenus *raniculi* quaedam specie uisus sumus. Nunc autem uera *Coronopus* a quibusdam seritur. Est enim acetarium olus, folia habens pedibus et unguibus coracis similia. Et hodie ad Italiam herba *Strella* uocatur. Quidam etiam *Cornu ceruinum* appellant, a sistorum figura.

SONCHVS. Ca. CXXIII.

S *Onchum* Latini *Cicerbitam* et *Lactucellam*, Germani *Gewemelke* et *Kaputöl* appellant. Ex interbi genere haec herba est.

INTYBVS. Ca. CXXV.

S *Erin* Latini *Intybum* uocant. Multiplex *Intybi* genus est, hoc tamen cap. duo, satium et unum *Syluestre* describit. *Satium* *Intybum* ab Italico adhuc *Endiua* satium appellatur, estque per omnia *Syluestri* simile, tenerius tamen et latioribus folijs *Syluestre*, quod *Cichorium* et *Pieris* ob amaritudinem uocatur, et *Amarago* a *Gaza* in Theophrasto interpretatur, in Pharmacopolijs *Cichorea*, et a nobis *Sindtleuff*, *Wegwart* et *Sonnenwibel* nominatur. Flores habet coruleos, qui ferè semper sollem uersus inclinantur, unde etiam a quibusdam *Solsequium*, siue *Heliotropium* appellatur, quamuis *Heliotropium* diuersa sit ab *Intybo* siue *Cichorio*, et sui generis herba.

CONDRILLA. Ca. CXXVI.

Kondrilla

AKov *ῥοῖα* quog; intybacea est herba, habetq; duas species: quarum prima Cichorio est similis, multo tamen tenerior & minor, florem interdum coruleum, interdum etiam candidum ferens. Germani Klein Sonnenwibel uocant: nascitur in uineis, quae solidum & gypsosum habent solū, quales sunt in tenensibus collibus. Altera Condrilla in pinguib; & lutosi agris, praesertim in hordeacea segete nascitur. Luteum habet florem, & à Germanis Sewdistel uocatur: quod nomen ferè omnibus etiam intybi speciebus commune est.

CVCVRBITA. Ca. CXXVII.

CVcurbita, *Κολοκύνθη* Græcis, Germanis Kürbis appellatur, cuius duæ sunt potiores differentie. Vna longos fert fructus, altera latos & sesiles: semine eius Medici utuntur.

CVCVMER SATIIVS.

Caput CXXVIII.

Sinuos, siue Cucumis satiuus, à Germa. Gurken & en appellatur: quod nomen ab anguria deductum est. Sic enim itali quandam Cucumeris speciem uocant, & omnia eius in Pharmacopolijs eodem nomine habentur.

LACTUCA. Cap. CXXIX.

C XXX.

Lactuca, quæ Græcis *Ολδα* appellatur, duplicem habet differentiam. Est enim satiuæ altera, & agrestis altera. Satiuæ à Germa. Lattich / Melchering / & Schmalzkrout appellatur, praesertim in Hesiâ, ubi illa in acetarijs cum eliquato butyro, quod pro oleo affundunt, uescuntur homines. Unde & Schmalzkrout dicta est.

Agrestis uerò Lactuca ea est, quam Itali Scariolam, aut (ut quidam diuini pronunciant) Scariolam, quoniam dorsum folij serræ modo asperum sit, uocant. Quidam etiam hanc ipsam Endiuia appellant: nam in hisce regionibus hæc herba pro intybo utuntur Medici & Pharmacopole. Germani hanc ipsam Gensdistel / siue Gensizan / appellant, quod spinosum folij dorsum asserim; dentibus simile sit. Porro nemo offendatur, quod hæc Endiuia Lactucam agrestem appellem. Nam omnes intybi species ad Lactuca genus referri debent.

GINGIDIVM. Ca. CXXXI.

Gingidion Syriacum est olus. Nuper etiam ad nos ex Syria allatum, per omnia descriptio-
ni respondens. Quidam Carui de Syria uocant. Porro eo ignorantia quidam perueniunt, ut Senecionem, qui nobis Creuskrout appellatur, Cerefolium etiam nominem.

SCANDIX. Ca. CXXXII.

Scandix etiam agrestis Pastinacæ simile olus est, sponte in pinguib; aruis proueniens. Candidos

& paruos in exiguis umbellis flosculos habet, ex quibus singuli, & ceu acus longi apices sursum enascuntur. Quapropter à Latinis etiam acicula, & à Germanis Tadel mosen uocatur.

CAVCALIS. Ca. CXXXIII.

Caucalis Dauco similis herba est, non tamen cuius dauco (sum enim plures eius species) sed illi tantum, qui in Germania Pimpinella uocatur. Hirsutioribus tamen cõstat caule & folijs, Germani Rauch Bibenellen uocant.

ERVCA. Ca. CXXXIII.

Eruca, Latini Erucam, Germani Weissen Senff uocant, quoniam simile per omnia sinapi sit, præterquam semine, quod sinapi nigricans est, Eruca uerò candidans.

OZIMVM. Ca. CXXXV.

Ozimum, Latini Orimum, recentiores Basilicon uocant, Germani postea nomen cum Latino commune habent. Est autem Orimum duplicis differentie. Quoddam enim altius adolefcit, & maioribus nigrioribusq; consistit folijs. Quoddam etiam prædicto minus, ramosius, & minoribus folijs inuenitur, & Chariophillos odore innotatur, unde Orimum Chariophillatum hoc appellare consueverunt Latini & Pharmacopole. Germani uerò Krauß Basilicon.

OROBANCHE. Ca. CXXXVI.

Orobanchen Theodorus Gaza apud Theophrast. Eruangam interpretatus est. Nomen inuenit ex eo, quod eruum strangulet: pinguis est & sine folijs herba, Germanis Sommerwurz appellata.

HIRCI BARBA.

Caput CXXXVII.

Tπειρανόριον Latini Hirci barbam, Germani Hocksbart appellant. Nascitur campestribus locis, nunquam etiam pratis & aggeribus, pingui solo congestis.

ORNITHOGALVM.

Caput CXXXVIII.

Ornithogalum Germani Klein Erdnuß appellant. Porro duæ sunt in agris nascentes herbae, quas Germani hoc nomine indicant. Vna candidum habet, aut luteum, qualem hoc cap. Dioscorides describit, florem. Altera purpureum, quæ ab hoc autore descripta sit, ignoro.

TVBERA. CXXXIX.

Tubera radices rotundæ sine germine sunt, quæ fungis similiter in terra nascuntur. Græci *ὄζυα* uocant. An etiam in Germania proueniunt, nondum comperi. In Italia copiosè proueniunt, ubi etiam Tartosle uocatur. Sunt & tubera quæ *ἀγρόζυα*, ab

A ab arato legumine dicuntur: de quibus huius instituti non est dicere.

HORTENSIS SMILAX.

Caput CXL.

Smilax hortensis siue lenis, quem Dolichum etiam Graeci appellant, nonnulli etiam Phasiolam, Germani Winder bonen/Welsche bonen/ & Spindel bonen uocant. De hoc legumine in Phasoli capite etiam differuimus.

MEDICA. Cap. CXLI.

Medica à Media nomen habet. Nam ex ea regione per bella Persarum in Graeciam allata est, unde postea in Italiam translata, ad iumentorum pabulum sercitur. Propterea nemo speret eam sponte in Germania provenire, ut ij faciūt, qui se omnes plantas, quas Dioscorides describit, nouisse & indicare posse, uana quadam iactantia & persuasione gloriantur. In Italia autem adhuc à quibusdam seritur. Vidige herbam hanc à Georgio Agricola ex Italia allatam.

APHACE. Caput CXLI.

Aphace uitia est, quae sponte in aruis nascitur, quam Germani Feldtwietze appellant. Theophrastus in iudaei generis herbā Aphacen nominat, quae diuersa est ab hac nostra Aphace.

PORRUM. Ca. CXLI.

Non omnibus Porru est, quod Graeci ῥέγγας, Germani Lauch uocant. Porro sub eodem genere haec omnia continentur: Allium, Vpiciū, Scorodoprasum, Ampeloprasum, Porrum, Ophioscorodon, Cepa, Gethyum, & similia.

AMPELOPRASUM.

Nascitur sponte etiam in aruis & uineis, teretibus folijs Porrum, quod Graeci Ampeloprasum, Germani Wilden lauch appellant.

CEPA. Caput CXLI.

Kεράσιον Latini Cepa, Germani Zwiebeln & Zippeln nominant. Notae omnibus cum germine suo radices sunt.

ALLIUM. Caput CXLV.

Sκόρδον Latini Allium, Germani Knoblauch appellant. Est etiam sylvestre Allium Ophioscorodon appellatum, lata habens folia, ut Liliū conuallium. Hoc Germani Rampen/sive Rempsen/ & Ramseren nominant. Estq; inuisum pastoribus, quoniam lac alij odorem acquirit, si couefcantur iumenta.

SCORODOPRASUM.

Sκόρδον ῥέγγας sylvestri alij genus est, mediamq; inter Allium & Latifolium porrum si gram & temperamentum habet. Vnde ab utroq; nomē inuenit, Germani Seldt Knoblauch/sive Wild

den Knoblauch/ appellant. Haftenus hac herba eiusq; semine pro scordio usi sunt Pharmacopole, & adhuc magno errore utuntur. Non enim est sylvestre siue agreste allium scordium, sed proprii generis herba, ut suo loco indicabimus.

SINAPI HORTENSE.

Caput CXLVI.

Sινάπι Latini Sinapi, Germani Senff appellant. Nota omnibus cum semine suo herba est.

NASTURTIVM. Ca. CXLVII.

Kαρόπυ Latini Nasturtium, Germani Bressen/ & Gartenkressen uocant. Hoc capite de satino Nasturtio agitur.

THLASPI. Cap. CXLVIII.

Tηλασπίνος Germani Daischeltressen uocant. Differt tamen à Bursa pastoris, quae Elym Daischeltressen nominatur. Maius uerò Thlaspi sine dubio caest herba, quam nos Moxetrich appellant, & Arabes Nasturtium album, à candore radicis. Grandibus hoc radicibus & magnifolium describitur. Verg autem Marcellus in hoc cap. non bene in comparatio gradu interpretatus est maiore radice, & latioribus folijs Ita enim intelligitur maius Thlaspi minori secundum proportionem maius esse, sed Dioscorides hoc non uult, neq; uerba eius hoc indicant. Nam in Graeco nulla comparatio legitur, sed simpliciter θηλασπίνος, καρυάδω-εξ.

ARABA. Caput CXLIX.

Quedam exemplaria Arabam, quaedam etiam Arabida appellant. Est autem Nasturtij genus, quod Arabes orientales uocant, hodie ignotum: quauis Ruellius id cognouisse uideatur. Verum non temerè Ruellio crediderim, cum plantas ad historias uitorquere soleat. Ceterum non male ait Verg. Marcellus, nullam esse apud alios autores herbā hoc nomine. Plinius tamen eius mentionem facit sub nomine Driophoni.

IRIO. Caput CL.

Εἰριον Latini Iriom, Germani Schindelsenf appellat. Theophrastus alterius Erysimi genus inter frumentacea recenset, quod diuersum est ab hoc. Imperiti Iriomem, qui à Dioscoride hoc loco describitur, sceminam Verbenam etiam uocant, uerum magno errore. Nam Irio sinapi cognata herba est, propterea hic inter acrimoniam habentia describitur. Verbenaca autem nihil cum sinapi neque Iriom commune habet.

PIPER. Caput CLI.

Piper nouerūt omnes. Habet aut triplicē differentia. Est enim longum, rotundū seu rugum, & album. Longum nigro & candido omnino distimile existit, cum haec duo parua & rotunda sine grana, illud uerò oblongum & betularum grossulis simile.

A simile. An uerò ueteros rectè de eius planta, & quo modo nascatur, scripserint, non est huius loci discutere.

ZINGIBER. Ca. CLII.

Zingiber, quod hodie Zinziber nominant Latini, Germani Ingber. Diuersæ à pipere plantæ radix est. Cur autem non potius in censu aromaticum descriptum sit Piper & Zingiber, in præfatione huius libri indicauimus.

HYDROPIPER. Ca. CLIII.

Hydopiper parens meus in suo Botanologico ait esse mordacem Persicariam, quæ à Germanis Wasserpfeffer & Schmerzen appellatur, cui sententiæ Musa non aduersatur. Ruellius uerò eam negat esse ueram, quoniam nigram maculam Persicariæ in folijs habeat, qualem autores Hydopiperis folijs inesse non dicant. Ait etiam Persicariam exiccatis paludibus emergere, Hydopiper uerò in lacustrium marginibus adolescere. Addit præterea, Hydopiper mentæ folijs describi, sed Persicariam Persici folia habere. Antequam tamen Persicariam Hydopiper esse neget, indicat Hydopiper eam esse herbam, quæ Eupatorium appellata est hætenus falsò. Cum igitur antea admanuerim, cautos esse Ruellianos lectores oportere, propterea quod non raro inuitas plantas ad historias & descriptiones detorqueere soleat, suadeo etiam hoc loco, ne illi continuo fides habeatur, uero aliàs insigniter docto, & qui non ex industria malè iudicat, sed qui, cum homo sit, præter opinionem in errores aliquando præcipitetur. Necesse est igitur aut parentem meum, aut Ruellium perperam iudicasse. Quapropter utriusque iudicium discutendum, & cum Hydopiperis historia conferendum erit.

Principiò igitur Ruellius negat Persicariam Hydopiper esse, quoniam Persicaria purpurei coloris maculam in folijs habeat, quam si Hydopiper haberet, in descriptione auctores non omisissent. Ad hoc argumentum breuiter respondeo: Duplex genus esse Persicariæ. Vna quæ maiora nigrioraq; habet folia, purpureis maculis distincta, quæ nullam omnino acrimoniam in gustu habet. Altera uerò huic similis, candidioribus & minoribus tantum folijs, quibus nullæ insunt purpurei coloris macule: hanc dixit parens meus Hydopiper esse, non illam. Quare nullum hoc argumentum habet. Diluendum igitur nunc erit illud, quo infert dissimiles etiam habere natales Hydopiper & Persicariam, quoniam hæc exiccatis paludibus, quod Hydopiper non faciat, emergat. Illud uerò in lacustrium marginibus adolescat, ut historia & descriptio clarè ostendit. Ego uerò Persicariam non tantum in exiccatis paludibus nasci uidi, uerum etiam iuxta leniter fluentes aquas, idq; sepius: nec ego tantum, uiderunt etiam plures alij quibus monstrabam, ne fortasse commentum me dice

re quidam existiment. Et contrà, illam herbam quam Ruell. Hydopiper esse existimat, in palustribus exiccatis non semel nasci uidi. Et quamuis Persicaria exiccatis tantum paludibus nasceretur, minime tamen hoc solo argumento negare aliquis posset, eam Hydopiper esse, cum non omnino sicca nascatur, sed semper subsit aqua. Nec Dioscorides illi tribuit, quod tantum circa leniter fluentes uidas proveniat, & non in alijs aquosis. Propterea enim à Græcis Hydopiper appellatur, quod aquosis locis emergat, siue sint palustres, siue leniter fluentibus undis uicini. Præcipuè tamen & plerumq; huiusmodi natalibus, quales Dioscorides recenset, Hydopiper nasci scribitur: quam notam in mordaci quoq; Persicaria non solus neq; semel obseruui. Quapropter neq; hoc argumentum negare potest Ruellius, quod Persicaria mordax Hydopiper sit. Propteremus igitur ad illud quo ait, Hydopiper mentæ folijs ab autoribus describi, Persicariam uerò Persici folijs consistere. Ad hoc respondemus, nullam similitudinem tam perfectam esse, quæ non habeat aliquam dissimilitudinem. Igitur quamuis Persicariæ folia longiora sint, quam mentæ, non tamen continuo sequitur, eam Hydopiper non esse. Nam non ratio magnitudinis pro longitudine tantum, & contrà accipitur. Si igitur tam strictè hanc notam Ruellius intelligit, illius falsò uocatum Eupatorium multo minus habet folia, Mentæ similia: nam & ipsa etiam non proportionaliter maiora sunt, quam mentæ folia, sed similiter ut Persicaria longiora & nigriora quam mentæ folia, cum Hydopiperi candidiora quam mentæ adscribatur. Igitur neq; hoc argumentum parentis mei sententiæ conseruiabit. Cum uerò adhuc consistet, Hydopiper Persicariam mordacem esse, necessariò sequitur, Ruellium à ueritate aberrare, quod falsò uocatum Eupatorium Hydopiper esse iudicauerit. Hoc itaq; probare nunc incipiemus. Principiò igitur uidendum est, quale nã falsò uocatum Eupatorium intelligat. Tres enim sunt plantæ, quibus falsò id nomen inditum est. Vna scilicet quam Mæsus describit, altera quæ dodrantali altitudine inter arbuscula nascitur, mentæ folijs, & lupuli odore. Harum nullam intelligere Ruellium certum est, quoniam utraq; sicca nascitur locis, quam uerò ille Eupatorii nomine indicat, circa aquas nascitur, estq; omnino ea, quam nostrates etiam Pharmacopoleæ Eupatorium uocant, Germani Wassertothen. Hoc an Hydopiper sit, iam uidendum erit. De Hydopipere itaq; sic Dioscorides scribit: Nascitur plerumq; circa stantes aquas, & leniter fluentes: quæ nota pulcherrimè conuenit. Nolo enim respondentes notas omittere, ut Ruellius in Persicaria fecit, cuius Piperi similem acrimoniam præterijt. Quamuis igitur hæc unica nota per omnia conueniat, non tamen sequitur, quod hæc herba Hydopiper sit. Plures enim plantæ in eodem naturali proce

sspondent.

Apponatur. Cum igitur sola haec nota conveniat historiae, fallere potest. Si vero quae nunc sequuntur, similiter conueniant, ipse non inuitis pedibus in Ruellii sententiam currerem. Sequitur itaque in Dioscoride: Caulis ex se mitis geniculatum solidum. Quis notat Ruellius male falsò uocato Eupatorio tribuit. Non enim geniculatum habet caulem, Persicaria uero mordax euidenter tumentibus geniculis intercepta est. Solidum etiam caulem eadem Persicaria qualitate habet. Eupatorii uero falsò sic appellati caulis non tam qualitate quam quantitate solidus. Procerus enim est, et magnam foliorum florumque onus sustinet. Quapropter necesse est cum robur contra uentorum impetum habere. Persicariae autem caulibus quamuis paruis sit, non tamen paruum soliditatem adeptus est, atque id qualitate, non quantitate seu magnitudine. Nam omnia quae proceris constant caulis, robusta etiam à diuina providentia facta sunt. Quae nunc de foliorum forma et colore dicenda essent, paulò ante relata sunt. Quare ad saporum eorum conuertamus orationem, de quo sic Dioscorides scribit: *ἀκρις ὡς τὸ γόβρα καὶ τὸ πῖπερ*. quod est: sapore acris, ut Piper. Eupatorium autem acrimoniam nullam habet alios saporis excellentem, sed tantum amaritudinem magnam. Propterea Ruellius etiam huius Eupatorii folia meram Piperis amaritudinem respicere scribit. Differunt autem plurimum amarus et acris sapor, et Piper tantum acris, et minime amarum est. Eupatorium uero falsum sic uocatum, solam amaritudinem respicit. Ergo quilibet etiam manibus palpare potest, hoc loco Ruellium scribere, quod in rerum natura non inueniatur. Si igitur sapor non conuenit, à quo Hydropiper appellata est haec herba, iam plane iudicandum erit, Eupatorium, de quo hic agimus, Hydropiper minime esse. Netamen alias notas refutgere uideamus, pergam eas omnes membratim historiae conferre. Sequitur autem in textu: *Κάτω οὖν ἐκ τῆς ἐπὶ κλωναρίου μεκρῶν ἐκφυέμενον πᾶσι τὰ φύλλα συνεχῆ καὶ ὀρθόσωμα ὁμοῦ ἀγὰ ἐν τῷ*: quod est, si de uerbo ad uerbum uertas: Semen uero habet in ramulis paruis enascens iuxta folia, continuum et racemosum, acris et ipsum. Ex quibus notis ne una quidem falsò uocato Eupatorio conuenit. Nam hoc in summo tantum caulis uertice, non in ramulis iuxta folia latos potius corymbos, et umbellis similes, quam racemos fert. Hydropiperis uero caulis circa se alarum cauitates, et paruos ramulos habere debet, et non in summitate tantum, quod optimè mordaci Persicariae conuenit. Eupatorii etiam semen sensu deprehendi non potest, neque aliquam saporis acrimoniam habet, et demum in pappos resolutum auolat, propterea difficiliter colligi potest. Hydropiperis uero semen non minus quam folia in gustu acrimoniam respicit. Propterea cum illis ad Medicinæ usum olim colligebatur,

quae omnia in Persicaria acris euidenter appa-
rent. Constat igitur falsò uocatum Eupatorium Hydropiperis historiae minime conuenire, Persicariam uero, quae maculis purpureis caret, per omnia respondere: quamuis sola foliorum similitudo à longinquo petatur. Sed sine dubio ipse Dioscorides hanc foliorum comparationem largo modo intelligi uoluit. Non tantum in hac una herba immoratus fuissim, si Ruellius suum de Hydropipere iudicium tantoperè non probauisset, et alios, qui hoc uerum esse inficiarentur, ueritatis caecos non appellasset. Porro in Piperitide et Siliquastro iudicando, similiter errat Ruellius. Non enim est herba siue Mentha diuè Mariae. Verum hunc errorem huius loci non est consuetudine, quoniam in Dioscoridis libros annotationes, et non in Ruellii errores reprehensiones scribimus. Plinius de Hydropipere nihil scripsit, de Piperitide aut siue Siliquastro, non pauca. Differt enim plurimum à Piperitide Hydropiper. Quapropter utrang, plantam (ne ab aliquo confundi possint) suo nomine indicabo.

Hydropiper est, de qua iam disputauimus, Persicaria, cuius folia et racemosum semen acrem Piperis saporem habent. Piperitis uero sine dubio ea est herba, quae in Italia et Germania petulibus uasculis fertur, caule circa alas rubro, folijs laurinis, flore candido, et post hunc semine in oblongos uasculis ceis siliquis (unde Siliquastrum etiam appellatum est) albo et tenui. Itali eam Piper Hispanum uocant, Germani Schotenpfeffer, id est, Siliquaceum Piper, ut sic interpretetur.

PTARMICA. Ca. CLIII.

Ptermice à sternutamentis, quae ossifraga priuatur, appellata est. Ruellius eam paruum illud ac syluestre Pyrethrum esse affirmat, quam herbam probe cognitam habeo. Cum uero non una tantum sit quae reclamatione nota, nolo quicquam in hac re affirmare.

RADICVLA, SIVE LANARIA HERBA. Caput CLV.

Hanc herbam Graeci Struthion, Germani Meysterwurts, et Distrens, Pharmacopole uero corrupto nomine Obsitutum appellant. Quidam etiam Magstrantiam, à Germanis translata appellatione, Ferulacea et umbellifera est herba: et quamuis etiam radícula à Latinis nominetur, longe tamen diuersa est à Raphano, qui similiter Radícula uocatur, ut antea etiam, cum de Raphano aggeremus, indicauimus.

CYCLAMINVS. Cap. CLVI.

Cyclaminus rotundam habet radicem, et ple-

Arum, latiusculam, quam Pharmacopole eodem adhuc nomine appellant: quamvis etiā ab aliquibus Panis porcinus nominetur, & à Germanis Erdscheiben.

ALTERA CYCLAMINVS.

Caput CLVII.

Altera Cyclaminus in Pharmacopolijs non habetur. Qualis autem sit herba, & quo nomine iam appelletur, ignorare me fateor. Ruellius eam cognovisse videtur. Verum illius decreta cum iudicio legenda esse, supra monui.

DRACUNCVLVS MAIOR.

Cap. CLVIII.

Δρακοντία, siue δρακον, Latinis Dracunculus et Serpentaria vocatur. Hanc magno errore Bistortam esse hactenus credidit tota fere Medicorum & Pharmacopolarum multitudo. Cum vero Bistorta, quam nos Latereburus appellamus, frigidum omnino habeat temperamentum, Dracunculus autem calidum vehementer, nullo modo Bistorta Dracunculus esse potest. Verum tamen Dracontia in Italia, Gallia, & Germaniæ locis quibusdam habetur Ari similitudine, cuius etiam species est, ut veteres omnes tradiderunt.

DRACUNCVLVS MINOR.

BMinor Dracunculus, qualem hic Dioscorides describit, nescio an cognoscatur. Mihi enim hactenus eum videre non licuit.

ARVM. Cap. CLIX.

Apy Latini Arum, in secunda declinatione vocant. Hodie usus invaluit, ut in tertia Aren Aronis, fluctamus. Est autem herba ubiq; pingui solo in umbrosis & antiquis sylvis nascent, quam Germani pariter Græcis, Aron / pfaffenbündel / & Teutschen Ingwer vocant. Vulgares etiam Herbarij pedem Vituli, propter foliorum similitudinem, dicunt.

ARISARVM. Ca. CLX.

Arisaron ab Aro & Isaro, id est, Dracunculo nomen inuenit. Figura enim Aro, & temperamento Dracunculo simile describitur. Hodie incognita est herba. Dicitur etiam Aris, diminutius forma, quoniam Aromunor sit.

ASPHODELVS. Ca. CLXI.

Magnus in Asphodelo error commissus est hactenus. Vbiq; enim pro eo sylvestre Liliun, quod Hemerocallus Græci, & Germani Goldwurz appellant, accipiunt Pharmacopole. Verus tamen asphodelus in quibusdam Italiae locis habetur. Suntq; radices eius Peonie radicibus similes, ut

Autores scribunt, & nos etiam vidimus. Hemerocallis vero radix, quæ iam pro Asphodelo in usu est, Lilij radicis, & minime Peonie similitudinem habet.

BVLBVS VOMITORIVS.

Cap. CLXII.

Qualis herba vomitorius sit Bulbus, hodie non quis dixerit. In quarto libro Narsis sus etiam hoc nomine appellatur.

BVLBVS QVI EDENDO EST.

Caput CLXIII.

Βόλβος est βόλβος, quemadmodum olim omnibus cognitus fuit, ita hodie omnibus incognitus est.

SCILLA. Cap. CLXIII.

Σκίλλα Latinis Scilla, Pharmacopolis Squilla vocatur. Cæpe cognata est planta, cuius radices in frequenti sunt usu medicis.

PANCRA TIVM.

Cap. CLXV.

Paneration minor Scilla est, quæ hodie raro ad Medicinæ usum affertur.

CAPPARIS. Ca. CLXVI.

Capparis spinosus frutex est, cuius salit flores & fructus, eodem nomine appellantur, & cū assatis carnibus mensa apponuntur, Germani Rappern vocant.

LEPIDIVM. Ca. CLXVII.

Lepidium Hiberis etiam vocatur, & falsò à quibusdam diuersæ herbe creduntur. Quapropter male in fine primi libri caput de Hiberide legitur. Est enim una eademq; herba, quæ tamen diuersas species habet. Maius Lepidium Luirino, sed maiore constat folio, gustu acri. Hoc Arabibus sitarag, & Germanis Ingwerskraut vocatur. Minus vero Lepidium Gauchsblum.

BATRACHIVM. Ca. CLXVIII.

Batrachium Latini Ranunculum, Germani Erdschpfeffer / Ranenfuss, & Spiegelblume men vocant. Plures eius sunt quam Dioscorides descripsit species. Omnes tamen flammulae appellatione hodie veniunt, ob igneam in gustu acrimoniam sic dictæ. Est etiam frutex quidam, qui similiter à quibusdam flammula appellatur, qui ab his diuersus est.

ANEMONE. Cap. CLXIX.

Anemone agrestis Papaveri non dissimile est, hodie autem in nullo usu habetur.

ARGEMONE. Cap. CLXX.

Duplex

ADplex est Argemone, sed utraq; etiam Papa ueri agrestis siue Rhoeadi similis est. Neutra hodie cognoscitur, quamuis Iena copiosissime proueniat, ea qua à Dioscoride describitur figura. Nomen eius in Agrimoniam detortum est, qua appellatione uerum Eupatorium hodie indicatur: de quo errore in Eupatorio sermonem faciemus.

ANAGALLIS. Ca. CLXXI.

Latini pariter Græcis Anagallidem uocant. Pharmacopolarum quidam Anagallum, Germani uerò Gruntheyl & Jodyheyl. Malè quidam hanc & Auriculam muris confundunt, naturæ diuersas herbas.

HEDERA. Ca. CLXXII.

Hedera sine dubio est, muros, turres, & arborescens frutex seu arbor, quæ à Germanis Ephew uocatur. Quare sine rationibus & argumentis quidam nos Hederam neq; nouisse, neq; habere contendunt.

CHELIDONIUM MAIUS.
Caput CLXXIII.

Chelidonium, non Celidonium, pronuncian- dum & scribendum est. Nomen inuenit quoddam circa hircundinum aduentum erumpas. Germanicè Schellkraut uocatur.

CHELIDONIUM MINUS.
Caput CLXXIII.

Minus Chelidonium eandem etiam ob causam nomen accepit, forma uerò priori dissimile est. Habet aurei splendoris flores, & in folijs purpureas maculas, quas Dioscorides non descripsit. Vergilius uerò diligenter in quarto Georg. depinxit, cum Amellum florem his carminibus indicat. (Est enim sine dubio eadem herba Chelidonium minus & Amellus.)

Est etiam flos in pratis, cui nomen Amello. Ecce Agricole, facilis querentibus herba. Nang, uno ingentem tollit de cespite sylvam Aureus ipse, sed in folijs, quæ plurima circum Eunduntur, uiolæ subluet purpura nigra. Sepe Deum nexis ornate torquibus are, Asper in ore sapor, tonsis in uallibus illum Pastores, & curua legunt prope flumina Melle.

OTHONNA. Ca. CLXXV.

Othonna quid fuerit, neq; ueteribus constitit, ne-

que nobis. Hodie nomen cum re amissum est.

MURIS AVRICULA.
Cap. CLXXVI.

Quædam exemplaria duo capita de Muris auricula habent, quædam etiam unum tantum, nempe posterius, quo propriè uocata Muris auricula describitur: de hac etiam hoc loco agimus. Nam quæ priori capite describitur, Alfine est, & in quarto statim Helxinem, in quibusdam exemplaribus hoc loco unum tantum de Muris auricula caput habentibus, sequitur. Vera itaq; Muris auricula Scopolendrio siue Polypodio similia habet folia, minora tamen, quæ singula murium auribus similia sunt, Germani quoq; Weußbhylen uocant. Est & alia quæ similiter ab omnibus Auricula muris uocatur, etiam Germanis quibusdam & Italis Pilosella, nostrisq; equitibus Tagelkraut, sed hæc minima quædam in tybi species est, quod ex floris forma, colore & lacteo foliorum liquore faciliè colligimus.

ISATIS SATIVA.
Caput CLXXVII.

Isatis satina copiosè in Thuringia ad tingendas luctes seritur. Germani Weyde uocat, Latini Lu- team & Glasium. In huius herbe caulis longitudine uariant exemplaria: quædam enim cubito cum altiore, quædam uerò duobus proceriorem esse indi- cant. Prior tamen lectio mihi magis placet. Ea enim altitudine in pingui etiam solo Isatis nasci uidi.

ISATIS AGRESTIS.

Agrestis Isatis eandem cum satina formam ha- bet, & ab illa nihil differt, præterquam quod non seratur. Germani eam Wilden weyde uocant. Nascitur in spisso & gypso solo.

TELEPHIUM. Ca. CLXXVIII.

Videtur corruptum esse hoc caput, & dubitatur an hoc loco legi debeat. Nam in quarto eandem herbam aliter describit, in capite Aizoi minoris, quod Telephium diuersum ab hoc esse, secundum hanc descriptionem, necesse est. Ego nullam hæcenus herbam uidere potui, quæ huic historie conueniret. Quapropter in minoris Aizoi annotationum sermone de Telephio rejici- mus.

LIBER TERTIVS

AGARICVM.

Caput I.



AGARICVS fungi genus est, arboribus adnascens: nomen suum in Pharmacopolijs adhuc retinet, & à Germanis, quoniam plerumque in Abiete nascitur, *Dammenschwamm* uocatur.

RHA PONTICVM.

Caput II.

Habentur in Pharmacopolijs due radices, quarum unam Rha barbarum, altera Rha Ponticum uocant. Verum neutra est ea, quae hic à Dioscoride describitur. Nam Rha ponticum, quod hodie sic uocant, huic historiae minime conuenire potest. Est enim ponderosa & succosa, nec aliquè croci ex se colorem remittit. Rha ponticum uerò, quod Dioscorides describit, fungosum & leue est, & croci colorem manducatum remittit. Ergo quilibet uidere potest, nequaquam uerum esse Rha ponticum, quod hodie eo nomine uenditur. Neque enim in Ponto hoc nascitur, sed in Italia, unde ad nos adfertur. Quid autem sit ea radix, quae hodie pro Rha pontico in usu est, statim post audiemus. Nunc uerò quid Rha ponticum reuera sit, indicandum puto. Omnes Arabes cum de suo Rha barbaro seu Rauedsemi scribunt, Dioscoridis caput de Rha pontico citant. Unde necessario sequitur, Dioscoridis Rha ponticum, quod in Ponto nascitur, idem esse cum Rauedsemi Arabum. Cum uerò Rauedsemi ualde odoratum esse ipsi sensus testetur, & Rha ponticum sine odore, (hoc enim Graecis ἀοσμήν significat) à Dioscoride describitur, necesse est diuersas radices esse, nostrum seu Arabum Rha barbarum, & Graecorum Rha ponticum. Propterea antea à me dictum est, neutram radicem Dioscoridis esse Rha ponticum, quod non simpliciter à quoquā intelligi debet. Nam Rha ponticum, quod in Ponto nascitur, inodorum est: quod uerò in India prouenit, odoratum propter celi & regionis calorem gignitur. Nam idem genus habent, & eandem formam, Rauedsemi & Rha ponticum Graecorum, odore tamen & uirium praestantia Indicum praecellit. Certum igitur est, nostrum Rha barbarum cum Dioscoridis Rha pontico idem esse genere, & tantum differre natalis loci diuersitate. Propterea minime errant Arabes, quod Dioscoridis caput de Rha pontico in recensendo suo Rauedsemi adducant. Subscribo itaque hoc meo de Rha barbaro iudicio Manhardo, qui in Epistolarum lib. 6. Epistola 5. ad Leoncentium scripta, idem quod ego de Rha barbaro iudicat.

Scribitur hodie in plurimis Germanis locis herba

quaedam, quam uerum Rha barbarum esse credunt, quoniam luteum colorem radicis eius habet: sed magno errore. Est enim nihil aliud, quam Lapathi uel Rumicis species, quod quilibet ex radicis, caulibus, foliorum, florum & seminum figura & uiribus iudicare potest. Nequaquam enim continuò Rha barbarum erit, si luteum colorem radicis habeat. Nam uulgis quoque Rumex similem colorem in radice ostendit. Propterea superuacuum est, quod tanta cura ea herbam excolant.

GENTIANA. Caput III.

Γεντιανή à Germanis Ditterwurz & *Geni* an appellatur. Nota hoc nomine omnibus Pharmacopolijs & Medicis radix est. Nascitur copiosissime in Suevia & Brisgiae montibus.

ARISTOLOCHIA. Cap. IIII.

Tria sunt Aristolochiae genera. Longa, rotunda, & altera longa, quae Aristolochia clematidis uocatur. Hanc hodie simpliciter longam uocamus, cum tamen prior illa sic appellanda erat, quae incognita nobis hactenus fuit. Iam uerò ex Italia ad nos rursus affertur. Radicem habet dodrantem non multò longiorem, ut etiam historia indicat. Quae uerò hodie longa à nobis appellatur, & ueteribus Aristolochia Clematidis, ab hac diuersa penitus est. Longissimam enim & uitis sarmento similem radicem habet, unde apud Graecos nomen inuenit. Germani eam *Osterlucci* uocant.

Rotunda Aristolochia radicem rotundam, instar globi, habet: nonnunquam etiam tuberibus inaequalibus. Hac etiam caruimus hactenus, & male eius locousumus ea radice, quam Germani *Solwurz* appellant, quae nihil habet praeter radicis rotunditatem, cur Aristolochia dici possit. Omnes enim Aristolochiae hederaceo constant folio. *Solwurz* uerò Rute & Fumo terrae filia similia habet. Omnes etiam Aristolochiae eundem saporem & odorem habent. *Solwurz* autem ab Aristolochia utriusque diuersum. Porro malè in omnibus Dioscoride exemplaribus Clematidis Aristolochiae folia, minoris Sedi, id est, uermicularis folijs cōparantur. Etenim cum longa & rotunda Aristolochia, hederaceis constet folijs, par est etiam tertiam eius speciem eiusdem formae folia habere, qualia etiam in ea nasci cernimus. Propterea corruptus est hic locus apud Dioscoridem, cum ait: *φύλλα ὡς πορφυρέαις ἀεὶ ῥωμάνοις ἐοικότες* & pro ἀεὶ ῥωμάνοις legendum est ἀεὶ ῥωμ. Sic proculdubio etiam Dioscorides scripsit, & ipsa rei natura indicat. Mixta uerò expungendum est. Ipsius uerborum contextus uidetur à Dioscoridis stylo & loquendi forma in comparationibus plantarum abhorre-
re.

Tactum

A Factum itaq; est quorūdam diligentia, ut omnes tres uere Aristolochie differentias habere possimus. Quid autem sit Solwurz / quam malē rotundam Aristolochiam uocamus, in Fumi terre capite indicamus, ne quicquam relinquare uideamur.

DVLGIS RADIX. Ca. V.

Glycyrrhizam Germani Süßholz et Süßwurz appellant. Eadem est cum Scythica, qua comesta aliquot diebus sitim finemq; tolerare Scythas posse, autores tradunt. Platur hæc in Germania etiam ad amoniam & uestigal. Plinius errauit, quod dicit sine dubio inter aculeas esse Glycyrrhizam, folijsq; eam echinatis describat, id est, aculeatis. Decepit Plinium duorum istorum uocabulorū similitudo, *γύζω* & *ἐχίνω*. Nam facilis est ex uno in alterutrum lapsus. Dioscorides folia Glycyrrhizæ *γύζω*, id est, Lentisco comparauit. Vidi autem ego Lentisci & Glycyrrhizæ folia: estq; his mira in figura, positu & ordine similitudo. Quapropter monendi sunt Pliniani Lectores, ne hoc loco Plinij potius auctoritatem, quam naturæ ueritatem, & oculatam fidem sequantur.

CENTAVRIVM MAIUS.

Caput VI.

Inuenit olim utrumq; Centaurium, & à se appellauit, Chiron Centaurus. Hodie uerò quale sit hoc maius Centaurium, omnino incognitum fuit, & adhuc paucissimis, quid reuera sit, notum est. Porro si huius historie quis conseruat radicem istam grandē, quam hæcenus improprie Rhaponticum uocant Pharmacopole, haudquaquam ire inficias potest, idem esse eam cum maiore Centaurio. Neq; uerò radicem tantum descriptioni conuenit, conueniunt etiam caulis, folia, flores & semina. Quapropter nō opus fuisset Antonium Musam hoc negare.

CENTAVRIVM MINVS.

Cap. VII.

Minus Centaurium ob amaritudinem Fel terreat etiam à Latinis appellatur: quam appellationem malē ad maius Centaurium transtulit apud Theophrastum Gaza. Non enim amarum gustu percipiunt, ut minus. Est autem minus Centaurium ea herba, quam Germani Taufent gulden, & Auzin uocant. Quidam etiam Siberiaut. In Pharmacopolijs Centaurea appellatur.

CHAMAELEON ALBVS.

Cap. VIII.

Chamaeleonem quidam cum Carduum esse dicunt, qui à nobis Vihdistel appellatur. Alij etiam Marianum carduum ueluti lacteis maculis in folijs conspersum Chamaeleonem uocant. Sed neutra pars probabile quiddam offerit. Nam Chamaeleon duplicem habet differentiam. Est enim candidus & niger, ille nullum omnino caulem habet: hic uerò tan-

tum dodrantali longitudine. Sed Vihdistel & Marianum distel proceros habet caules, qui interdum supra hominis proceritatem excresecunt. Neq; hæc tantum nota hi Cardui à Chamaeleonibus differunt. Carent etiam odoris grauitate, propter quā niger Chamaeleon Oximoides & Cinozolen uocatur. An autem apud nos etiam nascatur albus Chamaeleon, non facile quini dixit, in Italia uerò prouenit, unde alatas radices uidi. Ixia uenenum huius radicibus interdum & in quibusdam locis adnascitur, usque quo aues capiuntur simile, unde & apud Græcos nomen inuenit. Appellatur etiam ipsa herba Ixine ab hoc usque, ut apud Theophrastum & Plinium uidere est. Apud Plinium tamen lib. 21. cap. 16. malē Helxine pro Ixine scriptum inuenitur.

CHAMAELEON NIGER.

Caput IX.

Chamaeleonem nigrum uulgo ignoramus. Mihi tamen ea cardui species uidetur esse, quæ à Germanis Eberwurz appellatur: historie etiam omnes notæ conueniunt, & eisdem habet in curandis malignis ulceribus usus. Sed obijceret quibiam, Nigri Chamaeleonis radicem uenenatam esse intra corpus sumptam, ut Galenus ait: radicem uerò, quā nos Eberwurz nominamus, egeriam uim contra pestem & omnia uenena habere. Nos autem respondemus: Non semper huius Chamaeleonis radicem uenenatam esse, neq; in omnibus locis, sed ipsi tantum, quibus usque simile quiddam, quod Ixiā uocant, in radice producit, quod si non habeat, non est uenenata. Nam albi etiam Chamaeleonis radix si sine Ixia sit, intra corpus contra uarios morbos similiter. Cum uerò adnata Ixia habuerit, uenenata redditur. Scitendum est illud etiam, in nigro Chamaeleone Ixiā interdum inueniri, ut Plinius lib. 22. cap. 18. circa finē ait, additq; omnium generum Chamaeleonis radices scorpionibus aduersari. Quare non sine ratione nos quoq; nigri Chamaeleonis radice, quā Eberwurz uocamus, contra pestem & uenena utimur. Porro accusare aliquis Plinium posset, quod nigri etiam Chamaeleonis genera usque ferre dixerit. Verum cum uiderim in ea radice, quam Eberwurz uocamus, Ixiā nasci, Plinium uera dixisse, & Eberwurz nigrum Chamaeleonem esse, probare possum, Itali nigrum hunc Chamaeleonem Carlinam uocant.

CROCODILIVM. Cap. X.

Crocodillon nigro Chamaeleoni similis est, & sepe legentes fallit. Germani uero Eberwurz uocant. In Pharmacopolijs hodie nō habetur.

LABRVM VENERIS.

Caput XI.

Labrum Veneris Græci Dipsacon, Pharmacopole Carduum fullonum, Germani Wollfstrahl / Weberdistel / & Webergarten appellant. Notus est omnibus Carduus, cuius echinatis ca-

Apitibus fallones pannum uellicant & exasperant. Duplicitas autem est differentie. Quædam enim sponte ubiq; prouenit, quædam etiam in agris feritur, quæ fallones utuntur. Non desunt qui hanc cardui speciem Virgam pastoris uocent.

SPINA ALBA. - Ca. XII.

Spina alba, de qua hic agitur, ex Carduorum censu est, & ab Arabibus Bedegbar appellatur. Nondum tamen inter doctos cõuenit, quo nomine à nobis appelletur. Quamuis Fuchsius Marianum cardium, cuius folia lacteis maculis distincta sunt, spinam albam esse certò affirmat. Cum uerò ueteres hanc albam spinam simpliciter albo colore descriperint, & non candidis maculis conspersam, quales in Mariano carduo uidemus, nihil affirmo.

ARABICA SPINA.

Caput XIII.

DE Arabica Spina, quam Arabes Succhaba uocant, non parua etiã inter doctos & Pharmacopolas contentio habetur, quam componere non est nostrum.

SCOLYMVS. Ca. XIII.

Scolymus non est uulgaris ille & incultus Carduus, purpureum habens florem, sed satius ille, quem ueteres Rustici scriptores simpliciter Cardium uocant, Itali hodie & Galli Artocochum. Pulcher est cardius, cuius fructu siue capite in cibis uescentur. In Germania nuper etiam scri coepit, non tamen ad libidinis luxum, ut in Italia & Gallia.

POTERIVM. Ca. XV.

Poterion Cardui species est, quæ hodie non cognoscitur: non, ut quidam putant, arbuscula illa, quæ Germanis Schlehendorn appellatur. Dioscorides Poterion grandem esse fruticem scribit. Schlehendorn uerò frutex non est, quoniam in iustam arboris magnitudinem adolescit, si non præcidatur. Poterion longos, molles, uiliu modo lentos, graciles & hircinæ spinæ similes ramulos producit. Schlehendorn uerò non ramulos à terra mittit, sed crassum, durum, inflexilem, et si flectatur continuo fragilem caudicem erigit. Vidi ego Hircinæ spinæ ramulos, qui graciles mollesq; sunt, ut carduorum & aliorum herbarum ramuli. Sed nihil omnino commune cum hac arbore habebant. Poterion totum multa, tenui, lanosq; lanugine uestitur. Schlehendorn uerò nulla lanugine uestigia habet, nisi forte aliquis in uetustis illius caudicibus muscum & uillosam canicem lanuginem appellare uelit. Sic autem nequaquam intelligit Dioscorides. Multum enim differunt Muscus & Lanugo. Muscus etiam in crassius tantum arborum partibus inuenitur. Poterion uerò totum tam ramulis minimis, quam maximis lanuginem ostendit. Poterio semen siue fructus

odoratus, sed Medicinæ inutilis est. Schlehendorn uerò inodorum & Medicinæ ualde utilem habet. Postremò Poterio sunt radices nervosæ, quæ in terra sectæ gummi lachrymantur. Schlehendorn uerò ligneas habet radices, quæ in terra sectæ nullum gummi emittunt. Certum igitur est, arborem quam nos Schlehendorn appellamus, Poterion non esse, neq; à Dioscoride describi. At si eam descripsisset, in primo libro, ubi Prunum & alias arbores recenset, querenda esset, ac minime inter Carduos in hoc tertio, in quo de radicibus, herbis & seminibus scripturum in præfatione huius libri pollicitus est.

ACANTHIVM. Ca. XVI.

Acanthion diminutiuum est ab Acantho nomen. Est autem sine dubio Carduus, quem Benedictum uocant, Pharmacopole Itali Cardumelum diminuto à Carduo nomine, & Germani pariter Latini Cardobenedicten, & proprio uocabulo Eptimendistel, quasi araneæ cardium, propterea quòd aranearum telis capita ipsius simili septa sunt lanugine.

ACANTHVS. Ca. XVII.

Ex Carduorum etiam genere Acanthus est. Itali cum Brancam urfinam Romanam uocant. In Germania à quibusdam spectaculi causa in hortis colitur. Differt à uulgo hic uocata Branca urfina umbellifera herba plurimum, quæ à Nicandro & Plinio Bupleuron, & à ueteribus Græcis etiam Buprestis appellatur. Est & Buprestis ex Cantharidum genere, de qua in Secundo dictum est.

SYLVESTRIS ACANTHVS.

Qualis sit sylvestris Acanthus, nondum comperi.

ONONIS. Cap. XVIII.

Ononis ab Italis Remora aratri, Resta bouis, & Acutella, à Germanis uerò Sawhechel & Stallkraut appellatur. Longissimas habet radices, quæ boues & aratra in arando remorantur, unde etiam ab Italis nomen inuenit.

LEVACANTHA. Ca. XIX.

Anthea habuimus Cardium, qui duobus distinctis nominibus *ἀνθεα* & *ἀνθὺ* appellabatur. Hic uerò compositus ex duobus uocabulis nomine, *ἀνθὺ* & *ἀνθεα* uocatur. Qualis autem Cardium sit, hodie ignoratur.

TRAGACANTHA. Cap. XX.

Tragacantham Latini Hirci spinam uocant, cuius lachryma quæ ex secta manat radice, adhuc in Pharmacopolijs Tragacanthum appellatur. Falluntur aliquot recentiores, qui gummi Arabicum Tragacanthæ lachrymam esse putant.

BRIN.

ERYNGIVM. Cap. XXI.

Eryngon, quod hodie quidam Centum capit, & Germani Wallendistel uocant, omnium Carduorum pulcherrimum est, propter foliorum speciem stabilem formam, & capitulorum posituram, quae alibi candida, alibi pallida, & in quibusdam locis coerulea spectantur. Radices eius in Pharmacopolijs siccatæ & saccharo condite seruantur.

ALOE. Caput XXII.

Aloe omnibus Pharmacopolijs notus est succus, cuius frequentissimus est in Medicina usus. Affertur autem ex India. Herba ipsa etiam apud nos studiose in hortis colitur, ea qua à Dioscoride describitur figura. Quidam Sempervivum indicæ appellant.

ABSINTHIUM. Ca. XXIII.

Absinthium Germani Wermut & Elscum uocant. Multas habet quae statim insequuntur differentias. Hoc loco tamen de ulgari & ubique nascenti agitur. Errant qui album Abrotonum Ponticum à absinthio esse dicunt. Errant etiam qui Cupressum herbam (quam nos Cypressen, Graeci Chamaecyparissum nominant) Absinthium, id est, maritimum Absinthium esse contendunt.

MARINUM ABSINTHIUM.

Caput XXIII.

Marinum Absinthium à Seripho insula etiam Seriphium dicitur. Nascentur maritimis locis, unde nomen inuenit. Pharmacopola eius semen habent, quod Alexandrinum semen uocant, quidam etiam Sanctum semen, quod nomen à Santonico deducunt. Nam hoc marino Absinthio simile est semine tantum exiliore. Nascentur hoc in Gallia & Germania quibusdam locis, & semen eius ab Italis Santonico, à Pharmacopolijs Zina semen, uel semen Santonici appellatur. Germani utrumque Wurmianum & Wurmianum uocant.

ABROTONVM. Ca. XXV.

Abrotonum duplex est, scilicet nigrum & candidum. Illud mas, hoc uero foemina intelligitur. Mas apud nos in hortis plantatur, & Germanis Stabwurt, Garthrein, & Breys; candidum similiter in hortis seritur, sed interim multis in locis sponte gignitur, propterea à nobis Wilde Stabwurt, & Weiss Stabwurt appellatur. Mas apud nos raro floret, ob nostri coeli frigidiorem.

HYSSOPVS. Ca. XXVI.

Hyssopus sine dubio est ea planta, quae adhuc ab omnibus hoc nomine dicitur: quamuis multis argumentis contendere aliquis posset, nos Hyssopo carere. Sed ea argumenta facile dilui queunt. Germani Hyssop uocant.

STICHAS. Ca. XXVII.

Stichas in Stichadibus insulis è regione Massilie olim serebatur, unde & nomen inuenit. Huius loco hodie Arabica Stichade utuntur Pharmacopola, quae omnino eadem est, sed densiorem spicam habet. Porro omnibus hodie ignotum est, quidnam sit ueteribus illa herba, quam nos Lauendulam maiorem siue Spicam, appellamus. Quidam tamen Nardum Celticam esse affirmant: quorum opinionem in Celtica Nardo confirmari. Alij Rosmarini genus quoddam existimant, inter quos Leoniceus, Manbarus & Prens meus fuerunt. Verum neque horum opinioni assentiri possum, Salua tamen semper doctissimorum uirorum autoritate, & chari parentis reuerentia. Cum uero ab illorum sententijs omnino recesserim, meam opinionem de Lauendula ista, seu Spica, ut praefari necesse est, ne uidear temere & absque ratione à doctissimorum uirorum iudicio recessisse. Mibi autem omnino persuasi, spicam istam Stichados speciem esse. Nam nascitur & plantatur iisdem locis, quibus Dioscorides Stichada nasci ait. Sed leue est hoc argumentum. Consultamus ergo omnes alios sensus, qui si integri nobis fuerint, nunquam in iudicandis plantis errare & falli possumus. Iamdudum itaque in ea opinione hesitauit, quod crediderem spicam istam Stichadis speciem esse. Noli tamen quicquam certi pronuntiare, antequam utraque plantam uiuam uidissem. Curauit igitur Arabicum Stichada, nostro orbi peregrinam plantam, mihi offerri, allatumque ex Narbonensi Gallia semen terre mandauit, aliquoties & è semine prodijt plantarumque folijs, odore, sapore, & ramulorum foliorumque positi spica Lauendulae per omnia similis. Fragrantior tamen est Arabica Stichas, quam Spica. Neque tamen his notis contentus fui. Animaduerti etiam flores & semina in utraque similia esse, quae utraque in oblongis spicis gerit. Arabica tamen Stichadis spica breuior est & densior, quam Lauendula siue spica.

Huius etiam generis est ulgaris ista Lauendula, quae ex maiore illam eam quam uidemus degenerauit. Porro Mesue uolenter errat, quod scribit Arabicam Stichada semen non habere, cum illi satis manifestum & perspicuum sit.

ORIGANVM OMNE.

Cap. XXVIII.

Origani multae sunt species, ut Heracloticum, Onitis, Origanum syluestre, & Hircinum origanum. Heraclotica uero plures adhuc differentias habet, inueniunturque una eius species, quae forma foliorum & capitulorum Maioranam imitatur. Haec iam ex Creta à quibusdam allata est, odore iucundissimo. Omnibus illis speciebus nos in nostro orbe caremus, sola syluestri Origano excepta, quae copiose in nostris montibus gignitur, & à nobis

A Tosten & Wolgemat appellatur. Hec iam in Pharmacopolijs habetur.

PVLEGIUM. Cap. XXX.

Nouerunt omnes Pulgum, quod humentibus locis sponte gignitur, & à quibusdam in hortis & perforatis fictilibus plantatur, propter miram germinandi facilitatem. Nam etiam minutim incisum satumq; prouenit & germinat. Germani poley uocant.

DICTAMNUM. Ca. XXXI.

Iamdudum à doctis deprehensum est, nos uera Dictamno carere, & diuersissimam ab ea radicem in eius locum recepisse, quam magno errore Dictamnum nominamus. Constat uera Dictamni Pulgij folijs, nostra uero, qua pro Dictamno utimur, Fraxinifolia habet, quae longè à pulgij foliorum similitudine recedunt. Vera Dictamni etiam folijs Medicinā facit tantum, Radices enim lignosae sunt, propterea rarus illarum usus fuit. In nostra uero sole radices medicaminum habent. Dictamni praeterea folia densa lanugine utrinque uestita sunt. Nostra autem folia omnino glabra conueniunt. Quapropter in Dictamno hac ualde erramus. Ne autem calumnias & conuicia audire cogar, quod à communi persuasione recedam, indicabo ubinam uera sit Dictamni: Georgius Agricola primus in Germaniam Dictamni ueram attulit, cum ex Italia rediret. Vidit hic ueram Dictamnum cum Scordio in fictilibus uasculis Venetias ex Creta allatam. Post hunc magnam illius copiam Olingerus Norimbergam à Venetijs aduexit, à quo peritiores etiam Pharmacopole emunt. Nunc autem quotannis magnae eius sarcinae ex Creta Venetias, à Venetijs Francofordiam afferuntur. Et tam graphice ab omnibus descriptam historiā exprimit, ut non possit melius. Verum minime caule caret, ut Theophrastus scribit. Minime etiam flore, ut Dioscorides putat. Habet enim purpureum florem. Quapropter hac in parte potius Vergilio, quam Theophrasto & Dioscoridi crediderim, qui caulem et flores purpureos Dictamno tribuit. Sed uenia dignos illos pronuncio, cum multae herbae quibusdam temporibus & locis neque caulem neque flores habeant. Non tamen id à proprietate illis inest. Simile in Cynoglossa Dioscorides commisit, quae quibusdam locis & temporibus caulem & flores minime producit, cum tamen alibi utrinque producat. Plures sunt herbae, quibus neque caulem, neque flores, neque semina Dioscorides esse dicit. Ego tamen multis nunc annis hoc obseruare uolens, tale nihil inueni, sed deprehendi eas herbas, quibus ille caules omnino negat, interdum, ut antea dixi, sic nasci. Illud tamen animaduerti, uerum esse, nullam Filicem Filiciq; cognatam herbā, caules, flores & semina ferre. Telipteris autem quamuis caulem ferat, flores tamen & semina minime gignit.

PSEVDODICTAMNVS.

Pseudodictamnus antedicta similis describitur, sed humidioribus locis gignitur. Necessè igitur est, maiorem priore fieri, quod ad folia & caules attinet. Viribus uero multò inferior existit. Non affertur haec. Satius enim est nobis priore uti, quae uiribus hanc superat.

CRETENSIS DICTAMNVS.

Non apportatur ad nos hoc Dictamni genus. Quidam credunt nostram Dictamnū illud esse. Sed haec ubiq; nascitur, propterea non opus fuisset, ex Creta eam in Græciam afferri.

SALVIA. Cap. XXXII.

Elephbacum Latini Saluiam uocant, Germani Salbey. Optima est quae minora habet folia. Vchementiorem enim saporem remittit. Nota omnibus Salvia est.

MENTHA SATIVA.

Caput XXXIII.

HΔόσμογος siue Μινθώ, Germani Krauseminz appellant, Saxones uero Krauseminthen, Pharmacopole Mentha crispam. Satiua haec Mentha est, & nusi saepe trāsferatur, si ymbria simili est.

MENTASTRVM.

Mentastrum agrestis Mentha est, Germanice Pfefferdammz appellatur. Serpit per terrā hirsutioribus & grauius olentibus folijs, quam satia Mentha. Sed nemo aquaticam Mentham intelligere hoc loco credit.

NEPETA. Ca. XXXIII.

Nepeta tres habet species. Est enim montana, agrestis, & fruticosa. Montanam nondum uidi. Agrestis priuatim à Latinis Nepeta uocatur: quod nomen malè nunc tertiae speciei, quae omnium ignauissima est, tribuitur. Habet uera Nepeta Pulgij similitudinem aliquam, & nobis Rozemintz uocatur. Tertia species fruticosa & procera est, Germanice Katzenmintz uocatur, quoniam fies ea delectantur. Ob eandem causam ab italis Mentha catartaria dicitur. Graeci omnes has species Calaminthas uocant. Recentiores Pharmacopole ueram Nepetam Calamentum & Mentham non odoriferam dicunt, ut distinguatur à satia & odorata Mentha. Verum inepta est haec distinctio, cum Calamentum etiam ualde odoratum sit.

THYMVM. Ca. XXXV.

Thymus in multis Germaniae locis in hortis plantatur, & à nobis Tymen uocatur. In calidioribus regionibus sponte gignitur. Is uero qui in Creta nascitur, spicata habet capitula, & fragrantissimum spirat odorem. Nonnunquam etiam ad nos affertur.

Afferitur, & à Pharmacopolis Thymus aromaticus appellatur.

THYMBRA. Ca. XXXVI.

Thymbra sylvestris, & sativa est, utraq; Cuius la à Latinis dicitur. Sativa uerò Satureia tantum. Hec à nobis Saturey et Gartenfunel dicitur. Nemo credat, Columellam Thymbram à Satureia diuersam facere herbam, cum ait: Et Satureia Thymi referens Thymbramq; saporem. Satureia enim uocabulo satiuam Cuiusdam intelligit, Thymbræ uerò sylvestrem. Quasi dicat: Satureia que Thymbra sativa est, medium habet inter Thymum & sylvestrem Thymbram saporem. Sylvestris autem Satureia, que propriè Thymbra uocatur, & ipsa àfferitur ex Creta pro Polo, sed falso, habetq; circa se cuscutam Epithymi modo, quam Pāulus Aegnetā, Epithymum uocat.

SERPILLVM. Ca. XXXVII.

Serpillum quoddam satiuum, quoddam etiam sylvestre est. Satiuum hodie non temerè cognoscitur. Errant itaq; qui nostrum Pulegium illud esse credunt, Sylvestre uerò ubiq; in asperis nascitur, & à nobis Quendel funel, & Seldetfunel uocatur. Quidā ad id inerte sunt, ut Seldetfunel & Seldetfimmel eandem rem esse credant: cum hoc uocabulo Caron agreste, illo uerò Serpillum sylvestre Germani intelligant. Porro magnam similitudinem Cuiusdam cum Serpillo habet. Propterea hoc illius etiam nomen sibi apud Germanos adoptauit.

SAMP SYCHVM.

Cap. XXXVIII.

Sampsuchus siue Amaracus, Latinis Maiorana, Germanis Mayeran uocatur. Omnibus nota est herba. Illud tamen reticere nolo, Amaraci nomine etiam aliam herbam Galeno, Dioscoridi, & alijs Grecis significari. Nam Galenus libro tertio *de medicamentis simplicibus* Amaracum non boni odoris esse indicat, propterea eam delicati cuiusdam emplastro miscere noluit. Quid uerò sit Amaracus, quam eo loco intelligit, postea eodem hoc libro in Parthenio indicabimus.

MELILOTVS. Ca. XXXIX.

Melilotum Latini Serotulam Campanam uocant. Non idem Melilotum omnes Pharmacopole habent. Quidam enim humistratam trifolij speciem, que luteos habet flores, pro Meliloto accipiunt, sed malè. Neq; recens enim, neq; sicca aliquam odoris bonitatem habet, Melilotum uerò fragrantissimum habere debet, præsertim siccum. Propterea hoc Dioscorides cum Sampsucho inter alias odoratas herbas deferat, si tamen melius faciunt, qui Stroyntlee appellatam Loti siue Trifolij speciem, pro Meliloto accipiunt. Odorata enim est ualde, præsertim que luteos habet flores, si siccat melius etiam ualent.

MARVM. Caput XL.

Maron olim omnibus nota fuit herba, propterea (ut in re nota sit) forma eius descripta non fuit. Hinc factū est, ut hodie omnino ignoretur.

ACINOS. Caput XLI.

Acinus nisi Ocimum Cariophyllatum fuerit, quod Germani Arcus basilien uocant, omnino incognita est hoc tempore.

BACCHARIS. Ca. XLII.

Bacchar siue Baccharis, coronaria est herba. Cuius caput in quibusdam exemplaribus malè Azari capiti commixtum est, & ab imperitis additum, ut supra, cum de Azaro ageremus, dictū est. Bacchar uerò quo nomine iam appelletur, ignoratur. Ruellius eam nouisse se putat. Ego uerò qualem ille herbam intelligat, non scio.

RVTA. Caput XLIII.

Rutam Germani Rauten / siue Weinsantzen appellant. Omnibus nota est herba. Habet autem suas differentias. Una enim sativa est, de qua nunc agitur. Altera sylvestris, odoris & saporis acrimonia satiuam superans. Hanc Arabes Harmel siue Arnel uocant: pro cuius semine Cicutæ semen magno periculo hactenus in usu fuit, quem errorem alij ante nos animaduertunt.

RVTA SYLVESTRIS.

Caput XLIII.

Parens meus in suo Botanologico ait, nostrum uulgare Hypericum siue Perforatam, Ascyron, id est, alteram Hyperici speciem esse. Antonius Musa uerò negat, & scribit nostram Perforatam omnino eam esse, que hoc loco à Dioscoride Ruta sylvestris uocatur. Miror autem quomodo in tam peruersum iudicium incidere potuerit, ut ille alias acerrimus simplicium censor. Quod autem hac in re falsum iudicium tulerit, nunc conabimur ostendere, à temperamento Ruta sumpto initio. Certum est secundum Galeni, et omnium Medicorum sententiam, atq; ipsa experientia comprobata, satiuam Rutam in tertio iam completo exaltationum ordine siue gradu esse, unde etiam tantam exiccandi uim acquisiuit, ut ipsum genitale semen exiecit. Sylvestris uerò Ruta integro gradu in caliditate & siccitate satiuam excellit: quo fit, ut non sine nouimento intra corpus sumatur. Qui igitur hæc probe considerauerit, nullo modo iudicabit Perforatam sylvestrem esse Rutam: quippe cum Perforata in secundo tantum caliditatis & siccitatis gradu sit. Unde perspicuum est, eam non dum satiuæ Ruta, nedum sylvestris temperamentum habere. Qui hoc credere noluerit, ipsum Galeni & certissima iudicia, que à gustu & experientia sumuntur, temerè reprehendit. Sed dicent aduersarij,

A Errorum eorum affectores (ut sunt ad calumni-
as prompti) cœli temperamentum in causa esse, ut
Perforata apud nos in calore deficiat. Eos suo gla-
dio iugulabo. Nōne idem cœli temperamentum etiā
ipsam Rutā in calore deficere cogere deberet? Nōne
Ruta prāter quā quod satius est, ex alio etiam
orbe ad nos allata fuit, unde necessariō sequeretur
eam frigidiorē multo fieri (si cœli ratio tantum in
mutandis herbarum viribus ualeret) & tamen ad-
huc apud nos calida in tertio gradu existit. Cum ue-
rō Perforata hic minimē feratur, sed spōte ubiq; pro-
ueniat, & omnia sponte genita satius acriora sine,
etiam in eadē specie, & tamen in calore integri
gradus interuallo satiuam rutam non assequatur, mi-
nimē uerum esse potest, quod Musa ait Perforatam
rutam syluestrem esse. Cuperem igitur Musam non
temerē parentis mei de Perforata iudicium reprehen-
disse, quamuis eum non nominet, sed tantum eos re-
prehendat, qui Perforatā Ascyron esse credant. Cum
uerō hoc ipsum nemo prāter patrem meum credide-
rit, uel scriptis prodiderit unquam, faciliē intelligi
potest, eum patrem meum reprehendere. Sed immeri-
tō, cum huius scriptis & inuentis, quibus ille malē uti-
tur, non parum in suo examine adutus sit. Videamus
igitur quid Musæ imposuerit, ut tam ineptam
sententiam tulerit. Principiō igitur patri meo inuen-
tum suum inuidit, (sunt enim plerumq; huiusmodi
uirtute prædita Italorum ingenia) quod cum irritū
facere conaretur, in foedum errorem lapsus est ip-
se, minimē consultata patris mei sententia. Hæc in-
uidia illius oculis calignem circumfudit, ne uideret
Rutæ syluestris caput deprauatissimum esse in Dio-
scoride, de quo nunc uerba faciemus. Duplex & di-
uersa syluestris Rutæ historia hoc capite in quibus-
dam exemplaribus legitur, ac malē sibi ipsi totum ca-
put coheret. Necessē igitur est unam ex illis notam
& adiecitam esse. Quæ autem illa sit, ipsa ratio et
meliorum codicum fides docere potest. Siquidem in
principio huius capitis tota Hyperici historia legi-
tur, quæ malē ab imperito quodam huius capiti præ-
posita est. Quilibet enim hoc, qui legere tantum
Græcas literas potest, iudicabit. Nam de uerbo ad
uerbum totum Hyperici caput huic loco accreuit.
Hæc itaq; est notha & adulterina historia Rutæ
syluestris, cui Musa suam Perforatam contulit, non
animaduertens Hyperici descriptionem esse, neque
hoc loco in probatis & sinceris codicibus legi. Ab-
iecta igitur adulterina hac historia, uera & genuina
sequetur, quam ille neglexit. Eam autem Rutæ speci-
em a quibusdam in Italia feri uidit harum rerum dili-
gentissimus obseruator Georg. Agricola, Medicinæ
Doctor, qui aliquot cum folijs, floribus & seminibus
ramulos secum ex Italia attulit, eos ego diligenter in-
spexi, & historia contuli. Cui postquam per omnia
respondere sum uisi, ipsa me rei ueritas pronuntiare
cogit, ipsos de Ruta syluestri decerptos fuisse. Hæc

uerō Ruta omnibus ignota est Pharmacopolis. Por-
rō amicis hæc scripsimus. Nam si cum Musa con-
gredi necefforet, ualidiora adhuc allaturi essemus
argumenta. Hæc igitur candidis ingenijs sufficiant.

PANACES HERCVLEVUM.

Cap. XLVI.

Panaces Herculeum malē apud Theophrastum
Ligusticū interpretatus est Theodorus Gaza.
Sunt enim natura diuerse, non tamen penitus dissi-
miles ferulaceæ plantæ, quod ad radicem, caulem &
semina attinet folia uerō plurimum discrepant. Ipsa
herba apud nos non nascitur sponte, in Italia uerō a
quibusdam ostentationis gratia eā seri audio. Ex radi-
ce incisa liquor manat, qui opoponax & opopona-
cum uocatur, cuius adhuc est frequens in medicinā
usus. Atqui non queo satis admirari præcoces eos et
temerarios in demonstrandis plantis iudices, qui quā-
primū unica tantum nota & similitudo historie si-
ue descriptioni conuenierit, tam faciliē plantam ali-
quam hoc uel illud esse pronuntiant, reclamantibus
interim plurimis descriptioni notis. In eorum etiam
numero Itali quidam sunt, qui nostrā uulgarem Bran-
eam uersinam Panaces Herculeū esse putant, nobisq;
Germanis semen eius ceurei exotice mittunt, cum ta-
men apud nos nihil illa uulgarius ex ferulaceis herbis
inueniatur.

PANACES ASCLEPIVM.

Caput XLVII.

Panacis hoc genus ab inuentore suo nomen inue-
nit. Hodie uerō non cognoscitur.

PANACES CHIRONIVM.

Cap. XLVIII.

Inuenit olim Chiron Centaurus, & a se nomi-
nit hoc quod nunc ab omnibus ignoratur Panaces.

LIGUSTICVM. Ca. XLIX.

Ligusticum a Liguria, ubi copiosè nascitur, ap-
pellatum est. Galenus Libisticum uocat, & hæc
macopolæ Leuiticum, Germani Lebstöckel.

PASTINACA ERRATICA.

Caput L.

Erratica Pastinaca a Germanis Wilde imdē/
& Vogelsnest / propter umbellæ figuram,
appellatur. Græci *ἄραυδις* & *ἄραυ*, Phar-
macopolis uerō Daucum. Sed omnes auctores Daucū
diuersam herbam ab hac syluestri Pastinaca faciūt.
Propterea hic scriptor Daucum seorsim etiam de-
scripsit, cuius caput statim sequetur. Sunt igitur di-
uerse herbæ, syluestris Pastinaca & Daucus.

SESELI. Caput LI.

Seselsos multæ sunt species, ut Masiliense, Ae-
thiopicum & Peloponnesiacum. Est etiam Cre-
ticum, quod proximè sequitur. Aethiopicum autem

A Peloponnesiacum, hodie à nobis non cognoscitur. Solius Massiliensis semen Pharmacopole habet, Sileris montani appellatione, quod nomen à Sile duxerunt. Nam Sefeli ueteres etiam Sili & Seli uocabant. Siler uero pumile salicis genus quoddam est, in aquis proueniens.

TORDYLUM, ID EST, CRETICUM Sefeli. Caput LII.

Tordylum sunt qui Topd'vlay uocant. Nicander Tordylon, Aegnetia Togyvlay, nisi uitium in exemplaribus sit. Herba haec qualis ueteribus fuerit, nulli haecenus cognitum est ex recentioribus, qui de simplicibus scripserunt. Ego tamen affirmare ausim, eam esse quae à Germanis Berwurtz appellatur, à quibusdam etiam Mœu, sed falsò. Patrens noster in Botanologico suo herbam, quam Berwurtz uocamus, Daicum Creticum esse putauit. Semen uero manifestè historiæ reclamationat, quod ille non dum uiderat. Quapropter ab illius sententiâ libenter recedo, ne chari aliqui patren pluris quam ipsam rei ueritatem estimare uidear. Non enim is sum, qui suos suiq; parentis errores defendat. Eo uero si inuistè ab aduersarijs reprehendatur, me illum defendere uis naturæ iubet.

SISON. Caput LIII.

Sison siue Sison, exiguum semen est. Hoc tamen nomine à Pharmacopolis non cognoscitur, qui duo semina Anomi appellatione ostendit. Vnum rotundum & Papauer minus, neq; acre, neq; odoratum, quod Botrys semen est. Alterum uero Apisifine Petroselinum semen figura & quantitate emulatur, colore nigrum, cum tunditur odoratum, & in gustu aromatica acrimonia lingua pungens (ut ferè omnia in umbellis genita semina). Posterus hoc sine dubio est illud semen, quod Dioscorides aliq; ueteres Sison siue Sisona appellant. Recentiores Medici, qui barbaro illo seculo uixerunt, & Pharmacorum compositiones in luminaribus suis, ut uocant, conscripserunt, malè Petroselinum Olusatrum (quod illi corruptè Olixatrum uocant) & Sison (quod Sisonum appellant) idem esse putant.

ANISVM. Ca. LIIII.

Anisum omnibus notum est semen, quod in Pharmacopolis nomen suum retinet. Quidam etiam Foeniculum Romanum illud appellant, cum tamen Romæ idem habeant Foeniculum, quod nos. Semine uero nostro dissimile Foeniculo est. Scribitur in Germania multis locis ad uelligal, & à nobis Anis uel Anis appellatur.

CARVM. Ca. LV.

Karum siue Caron, Latini Carum uel Careon, Pharmacopole Carui, Germani Wisenfiumel siue Seldtämnel uocant. Nasctur in pratis & campestribus pinguibus (non tamen uliginosis,)

locis. Semine eius quotidie in cibis utimur.

ANETHVM. Ca. LVI.

Anethum umbelliferum olus est, Foeniculo simile, latiore tantum semine. Pharmacopole herba eodem nomine appellant, Germani uero Till.

CYMINVM SATIVM.

Cap. LVII.

Cyminum sunt qui Cuminum appellant, Pharmacopole Cyminum, siue Cyminum Romanum, Germani Bantämnel.

CYMINVM SYLVESTRE.

Caput LVIII.

Dplex syluestris Cymini genus hoc capite describitur. Vnum satiuo simile semen, sed glutinosum ferens, quod Haberämnel à Germanis uocatur, quoniam auene modo glutinosum sit. Apportatur hoc aliunde cum satiuo in Germaniam. Alterum Nigelle potius quam Cymino simile est. Cum uero Nigella quoq; à quibusdam Cyminum nigrum uocetur, potuit etiam ad hanc herbam Cymini appellatio trāsferri. Vidimus eam sepe in agris, & hic quoq; in Viitebergensi agro Medicis studiosis ossi idimus. Est autem uera Nigelle omnino similis foliorum incisuris, florum figura & colore, seminum colore & odore: fructuosior tantum, & semen non uisculo continuo ut Nigella, sed in corniculis pluribus ex uno principio sine flore sursum crescentibus. Hoc Germani Bantämnel, id est, cornutum Cyminum uocant. Ruellius libro 3. cap. 44. ait, ad alterius syluestris Cymini descriptionem satis accedere uideri herbam, quam sua rura Cornutam (à Corniculis) uocant. Qua in re bene iudicat Ruellius, propterea nequeo non illius iudicium probare, Atq; utinam aliq; similiter indicaret.

AMMI. Ca. LIX.

Ammi Latini Ammulum, Pharmacopole Amos nominant. Peregrinum nobis semen est, et interdum eius loco Petroselini semen Materialis Pharmacopolis uendunt. Scui aliquoties mihi missum recens Amos semen, & nostrum coelum minime respuit, habetq; mediam inter Apium & satiuum Petroselinum figuram.

CORIANDRV. Ca. LX.

Korandrum à Κορανδρ, Latini Coriandrum, Germani Wandsekenell & Coriander uocant. Nomen inuenit à fædo odore, quod cum uiride adhuc est, Cimices imitatur. Antio. Musa Brasanolus in suo examine scribit in hanc modum: Germani Latini nomen imitantur, Coriander proferentes, nā apud ipsos non extat. Putans nos non habere proprium nomen, quo Coriandrum appelleremus, cum tamen Germani nomen illi indiderunt, quo indicant Anetho cognatum, et Cimicum odore Coriandrum esse.

Dicit

A Dicit etiam apud nos non extare, manifesto errore, (ne dicam mendacio) Nam pluribus Germaniæ locis ad uel ligal ab holitoribus feritur.

HIERACIVM MAIVS.

Cap. LXI.

Non reor Dioscoridem hoc loco inter umbelliferas plantas Hieracium descripsisse. Cum enim sine Intybacca & oleraceæ herbæ eas in secundo lib. ubi de Lactuca & Intybo agitur, describi oportuit. Est autem Hieracium maius Intybi agrestis species, quæ à Germanis Wilde Sewdistel uocatur.

HIERACEA PARVA.

Hieracea parua à Germanis pippaw/ pfaß fenblaten / & Sommerdohz uocatur. Coliculus breuiter, tenerum, concavum, & glabrum sine ramulis & folijs à terra ex circumstratis folijs erigit, in summo luteum orbiculatum & latum florem sustinet, qui postquam in pappos resolutus fuerit, ut stigma relinquit sacrificalorum rasuris simile. Porro utrumque Hieracium nomen ab accipitribus accepit, qui eius lacteo liquore oculorum suorum aciem acuere existimantur. Idem etiam de Aquila quidam tradunt. Pharmacopole rarò has herbas colligunt.

APIVM SATIVVM.

Caput LXII.

Omibus cognitum est sativum Apium, quod Germanis Epper/ deducto ab Apio nomine, & Merck/ uocatur. Apium etiam sponte in nigro & pingui solo circa pagorum fossas ac riuulos nascitur, satiuo per omnia simile, & idem, præterquam quod non colatur. Copiose autem hoc inter Lysiam & Merseburgum urbes circa pagos crescit.

PALVSTRE APIVM.

Eλεοδένειον apud Theophrastum Paludapium non indocte uertit Theodorus Gaza. Qui quæuis Græcus natione esset, primus tamen fuit, qui in Latina lingua Græcarum dictionum compositiones imitari auderet, nec infelicitè Latinam linguam in rerum appellationibus auxisse uidetur. Est autem palustre, siue rusticum Apium, grandis herba, Apio satiuo similis, in palustribus proveniens, quæ à Germanis Wassermerck appellatur. Nullus eius apud nos est in Medicina usus. Cum tamen eadem omnia quæ satiuum possit.

MONTANVM APIVM.

Montanum Apium quid sit, hodie omnino ignoratur. Nolo tamen præterire, uehementer errasse interpretem Virg. Marc. quod capitula huius Apij Papaueris capitibus comparauerit. Ruellius autem Cicute capitibus illa similia uertit, & hoc quidem optime, ut nunc ostendemus. Magna enim est ineptia, umbellifera plantæ capitula, id est,

ipsas umbellas papauerinis capitibus comparare, cum nulla sit inter utraque illas partes proportio uel similitudo. Græci tamen exemplaris culpa est, quod Verg. Marcell. in uertenda hac nota peccauerit. Nā in illo legitur: Κεφαλαία μινωίων παρρημωδών, ubi ille μινωίων Papauer uertit, cum tamen μινωδον Papauer, μινωίων uero ex Papauere expressum succum significet. Quis igitur herbarum partes succo alicui conferret? Verum abundat in ea dictione μινωίων, & simpliciter μινωίων legendum, quod est Cicute. Et sic etiā uertit Barbarus. Omnes enim Apij species in umbellis flores & semina ferunt, & minime in papauerinis uasculis. Propterea sine dubio ipse Dioscorides huius montani Apij capitula siue umbellas Cicute capitulis comparauit, quæ etiam umbellas & minime papauerina uascula ferunt. Vena dignum Marcellum pronuntiarem, si non ipse etiam omnia argumenta, quæ pro nobis sunt, probè sciuisset, & pro sua uersione contra Barbarum Apologiam scripsisset, in huius capituli Commentario.

PETROSELINVM.

Quamuis Petroselinon quoque similiter in montibus ut Oroselinum nascatur, tamen diuersæ sunt herbe. Petroselinum enim non tantum in montibus gignitur, sed præruptis illorum petris, unde nomen inuenit. In Macedonia optimum nascitur, unde Macedonicum etiam appellatur. Ostendunt eodem nomine grande & nigrum quoddam semen Pharmacopole, quod Ruellius etiā uerum Macedonicum Petroselinum esse credit lib. 3. cap. 47. Cum uero Petroselini semen Ammulo candido & minime semini comparatur, nequaquam uulgo uocati Petroselini Macedonici semen, uerum Petroselinum esse potest. Hoc enim nigrum & grande est. Quod autem hoc semen Petroselinum Macedonicum non rectè uocetur, eorum culpa est, qui in suis luminaribus docent, Petroselinum Macedonicum & Olistratum, siue Olixatrum, (ut illi pronuntiant) idem esse: sed magno errore. Habet enim Olistratum proprium & à Petroselino diuersum genus, cuiusq; semen est, quod falsò Macedonicum uocatur Petroselinum, ut sequenti cap. indicabimus. Porro uero Macedonicum caremus. Quod uero eodem nomine apud nos in hortis feritur, illius speciem cultura manifestam esse minime inficias eo. Hoc à nobis Petroselinum appellatur.

OLVSATRVM.

Hipposelinum Theodorus Gaza apud Theophrastum Equapium uertit, propter magnitudinem sic à Græcis uocatum. Est autem Olistratum sine dubio ea Apij species, cuius semen hodie in Pharmacopolijs Petroselinum Macedonicum appellant. Omnes enim notæ descriptioni conueniunt. Idem etiam Musasentit, nec refert, an ille à seipso hoc nomen uerit, uel ab alio didicerit, magis rem ipsam cognoscimus.

A *Scamne*. Ruellius *Olasstrum* non cognouit, cum huius semen ante *Petroselinum* esse dixerit.

SMYRNIVM. Cap. LXIII.

Smyrion à Myrrha nomen habet, quoniam radicis lachryma & semen Myrrhae aliquem odorem & saporem habeant. Hanc herbam pater Angelicam esse dixit, non uulgarem tamen, sed que in *Pomerania* & *Brisgoia* nascitur, nigra foris radice: & hac in re dubium non est. Ruellius non sciuit, *Smyrion* hodie Anglicam uocari, aliqui non affirmaret, Anglicam *Laserpitium* Gallicum esse. Inuenit enim in quibusdam artis ueterinarie compositionibus *Laserpitium* Gallicum requiri. Postquam igitur satium Anglicam in Gallia uidisset, statim, (sed temere) iudicauit, eam *Laserpitium* Gallicum esse. Cum uero à nullo unquam probato auctore aliqua *Laserpitij* species in Gallia nasci scribatur, nec eius historia à quoquam ponatur, uana hæc est coniectura, qua patris suam celebrare conatur, ut simili *Laserpitij* & appellantur Gallie, quemadmodum *Cyrenis*, quas *Catullus* *Laserpitij* & carminæ suo appellat. sed esto (quod non est) Angelica *Laserpitium* Gallicum uocetur, tamen etiam *Smyrion* esse potest. Quapropter ipse Ruellius *Smyrion* quoque non cognouit, quamuis herbam uiderit: ille *Smyrion* eam esse herbam dicit, que Gallis *Leuechia*, siue *Leueche*, siue *Leuesche*, ut in Indice legitur, appellatur. Cum uero ego compertum habeam, **B** *Leuesche* à *Leuistico* deductum & corruptum uocabulum esse, & sic *Gallos* satium *Ligusticum* appellare, minime uerū est quod scribit, *Leuesche* *Smyrion* Gallis uocari. Porro uerum *Smyrion*, id est, Angelica, à Germanis *Seitig geist wurz*, *Brust wurz*, & Anglicè uocatur: quibus nominibus ea est intelligenda, que ex *Pomerania* & *Brisgoia* affertur radice nigra. Nam aliud etiam genus ubique in uliginosis circa paludes & profluentes, & in humidis petris prouenit, quod multis notis à priore distinctum potest.

ELAPHOBOSCVM. Ca. LXIII.

Ad *Elaphobosci* descriptionem satis accedere uidetur herba, que Germanis *Gurste* appellatur.

FOENICVLVM. Cap. LXV.

Marathrum Germani *Fenchel* appellant. Notū omnibus est, ferulaceam & umbelliferam herbam esse *Feniculum*.

HIPPOMARATHRVN.

Cap. LXVI.

Hippomarathrum grande & sylvestre est *Feniculum*. Describitur & alia sylvestris *Foeniculi* species, sed utraq; hodie ignoratur, quamuis Ruellius sibi *Hippomarathrum* cognitū esse uideatur.

DAVCVM. Ca. LXVII.

Hic *Daucus* à sylvestri *Pastinaca* plurimum dif-

ferit, habetq; multas species. Omnium uero maxima *Pastinaca* Gallica à Plinio uocatur, cui alia similes sunt, sed multo minores. Omnes hæc in Germania *Pimpinella* uocatur, iudeo *Stibenelle*, quarum radices & semina ualde acrem habent saporem. Itali, inter quos etiam *Musa* est, aliam herbam *Pimpinellam* uocant, eam scilicet quam nos *Blattspiss* & *Spiss* appellamus: cuius due sunt species. Una purpureo, alia pallido, cum flore, capitulo. Hæc in æditis et asperis nascitur, illa in pinguibus & lutosiis pratis: utraq; Italici ad cibos expetitur, habetq; *Dauco*, id est, *Pimpinelle* nostre similia folia, minime tamen umbellæ. Temperamento uero contrario constat, uulnera capitis mira efficacia sanat, quas uires uulgares *Herbarij* magno errore nostre *Pimpinelle* tribuunt. Porro minime est negandum, quod etiam *Pastinaca* sylvestris à ueteribus, & ab hoc ipso auctore interdum *Daucus* uocetur. Propterea non merito aliquis *Pharmacopolas* reprehendat, quod *Pastinacam* sylvestrem *Daucum* nominent.

DELPHINIVM. Ca. LXVIII.

Sylvestris *Dioscoridem* nullum *Delphinium*, præsertim hoc loco, descripsisse. Neque enim *Calenus*, neque *Aegnatius* uel mentionem in simplicium censu faciunt, cum tamen alijs de omnibus que in *Dioscorido* describuntur simplicibus ipsi quoque agunt. Neque hoc caput in antiquis codicibus legitur, neque hoc loco inter umbelliferas herbas siliquas ferens describi debuit. Est enim hoc contra auctoris huius institutum & ordinem. Non tamen nego fuisse *Delphinij* appellationem ueteribus herba, sed à *Dioscorido* non depictam.

PYRETHRVM. Ca. LXIX.

Pyrethrum Latine etiam *Saluareum* appellatur. Radices eius in *Pharmacopolijs* habentur eodē nomine. Scribitur in Germanie multis locis ad uetigal, & à nobis Greco uocabulo corrupto *Perthia* proprijs uero nominibus *Seineurwurz* siue *Geferwurz* id est, gustu feruida, & *Saluareum* uocatur. Ruellius male folia eius Gallica *Pastinaca* comparauit, cum tamen *Dioscorides* simpliciter ea sylvestri *Dauco* comparauerit. Hoc autem loco per sylvestrem *Daucum* *Pastinacam* sylvestrem intelligi. Nam huic similia folia *Pyrethrum* habere ipse inspicit. Gallica uero *Pastinaca* ualde lata habet, & *Pyrethro* dissimilia folia. Atqui Ruellius male Gallicam *Pastinacam* idem cum sylvestri *Pastinaca*, siue *Carota* esse putat. Quamuis autem *Gallos* fuerit Ruellius, minime tamē Gallicam *Pastinacam* cognouit, neque ipsum *Pyrethrum* nasci uidit: quod ex Plinio & alijs uerbis facile demonstrare possem.

LIBANOTIS. Cap. LXX.

Libanotis species, que hoc loco describitur, nobis hodie omnino incognita sunt, & plurimum differunt à nostro uulgari *Rosmarino*. Quidam tamen putant nostratē *Rosmarinum* hanc uocari

A Libanotida esse, sed apud nos degenerare. Verum hi toto coelo aberrant. Sunt enim diversissime plantae. Ille enim, de quibus hic agitur, umbellifera & Foeniculo similes sunt: quae similitudo nullam habet cum nostrate Rosmarina proportionem. Nam quoties degenerant plantae, minores aut maiores, aut debiliores evadunt, servata semper eadem proportionem. Hanc autem Libanotida in Theriacis suis intelligit Nicander, & minime nostratam, quae proprium ab illo genus habet, ut proximo Capite sequetur.

LIBANOTIS CORONARIA.

Caput LXXI.

Quae hoc loco describitur coronaria Libanotis, à Romanis & Germanis Rosmarinus vocatur: & haec est quae ubique ad coronas plantatur, habetque diversum genus à priore. In Italia & quibusdam Galliae tractibus copiose nascitur sponte, apud nos vero sativa est tantum.

SPONDYLIVM. Cap. LXXII.

Spondylium Latini Verticillare vocat. Hodie nobis incognita est planta. Ruellius eam cognovisse videtur, ait enim à Gallis Panacium Sylvestrem vocari. Videndum igitur est, quānam ille herbam intelligat.

FERULA. Ca. LXXIII.

Nasus Latinis Ferula appellatur. Grandis haec est & Foeniculo similis planta. Pharmacopolis hodie incognita. In Italia sponte quibusdam locis provenit. In Germania vero à paucissimis fertur ostentationis gratia. Omnes umbelliferae plantae ab hac ferulaceae dicuntur, cum Foeniculum, Peucedanum, Anethum, &c.

PEUCEDANVM. Ca. LXXIII.

Peucaedon Latinis Peucedanum, Germanis Saxirangt vocatur. Notum est Medicis & Pharmacopolis Peucedanum.

NIGELLA. Ca. LXXV.

Melancholici Latini Nigellam, Germani Schwarzen Rammel appellant. Errant vehementer, qui in segetibus longis hirsutisq; folijs, & rubente flore nascentem herbam Nigellam vocant, quae à nobis Raden appellatur.

LASERPITIVM. Ca. LXXVI.

Silphium Latini Laserpitium, Pharmacopolis Asam foetidum, Arabes Anjuden, Germani Tauselsore appellant. Multi opinantur (inter quos etiam pater meus fuit) Asam foetidam minime esse silphij liquorem, solo odore rem aestimantes. Verum ij falluntur. Differt enim secundum regionis diversitatem Silphium. Optimum est Cyrenaicum, quo hodie caremus. Quod vero nos habemus, ex Media & Syria affertur, cui Dioscorides viri osum odorem tribuit, quem in Asa foetida aperte sentimus. Certum igitur est, nos cam saltem Silphij speciem habere. Illi autem vehementer errant, qui Asam dulcem sine Ben

zei, verum Laserpitium esse putant, in quo auctoritas etiam est Ruellius, qui Benulium pro Benzoinum scripsit, & interpretatur prole Iudae parentis, cum tamen Benzoi non in Iudaea nascatur, sed ex India affertur. Porro non erit inutile, differentiam ostendere inter Laserpitium & Benzoi, ne aliquis ad falsam illorum opinionem inclinet. Certum est Silphij liquorem ex ferulaceae & Apio simili planta manare. Quia vero Benzoi ex India afferunt, idisse se dicunt proceram arborem, ex qua resina modo destillet, quod incole Benzoi nominant, ex hoc pinguisimum florem exprimi, quem sibi reservant, ac potentissimis regibus pro magno dono mittunt, oleum Benzoinum vocantes, & quo Dys suis supplicent. Sedimentum vero quod superfuerit, sicca resina simile ad avaris mercatoribus vendi, et demum ad nos etiam afferri. Lignum etiam huius arboris in sacrificijs iucundissimo odore accendi, habetque in maximo precio & honore.

SAGAPENV. Ca. LXXVII.

Sagapenvoy Pharmacopole corrupto vocabulo Serapinum dicunt. Aerba ferulaceae Media nascentis liquor est.

EUPHORBIVM. Ca. LXXVIII.

Euphorbium acerrimus est liquor, qui eodem nomine in Pharmacopolijs vocatur. Nomen vero ab Euphorbia, Iuba regis Lybiae Medico, & fratre Muse, Augusti Caesaris Medici, invenit.

GALBANVM. Ca. LXXIX.

Galbani verum eodem nomine à Pharmacopolis cognoscitur. Et hoc ferulaceae plantae, Metopium appellatae, liquor est.

GVTTA AMMONIACA.

Cap. LXXX.

In Lybia circa Hammonis Iouis delubrum, ex ferulacea planta colligitur Hammoniacus liquor, qui & Hammoniacum Thymiana à Grecis Medicis appellatur. Quidam autem interpretes cum apud Galenum legunt: *Ammoniacus buxus*, duas dictiones urgula distinguunt, duas res intelligentes, sed falso.

SARCOCOLLA. Ca. LXXXI.

Sarcocolla notum est in Pharmacopolijs gumma, quod in Perside ex arbore quadam destillat, & in minutis grumulos concrevit.

GLVTINVM. Ca. LXXXII.

Glutini siue Gluten, *Kōmā* à Grecis, Germanis *Leim* vocatur. Ligna eo conglutinantur, propterea etiam à Grecis *Evλόνδα*: & quod ex taurino corio excoquitur, *Tauρόνδα*, vocatur.

GLAUCIVM. Cap. LXXXII.

Male quidam credunt, Glaucium (Arabes *Mais* vocant) formam Paganis suorum esse.

Affe. Nam ex sui generis herba colligitur. Hodie uero ad nos non amplius affertur.

ICHTHYOCOLLA. Ca. LXXXIII.

Ichthyocolla à Pharmacopolis colla, siue gluten piscium, à Germanis Hausenblasen uocatur, quod scilicet pisces illius ex alio sumpta membrana sit. Vtuntur ea in gelandis croceis piscium iusculis. Excoquitur etiam ex membranis illis, quemadmodum ex boum corijs pulchrum, lauum et translucidum gluten, Germanis Mundeleim uocatum, quod eius ma defactis in ore frustis charte glutinari soleant.

VISCUM. Caput LXXXV.

Ios Germanis Vogelheim appellatur. Ex multis arboribus Viscum fit, quales sunt Mixe fructus, Aquifolia, et ea quæ nos Wadich appellamus. Hoc uero loco Dioscorides Viscum intelligit, quod ex frutice illo fit, qui à Germanis Mistel appellatur, nunquam per se è terra crescente, sed alijs arboribus seu accedens adnascente. Inueniuntur hic fructus in quercu, syluestri malo et pyro, salice, betula, corulo, abiete, et nonnunquam etiam in uite.

APARINE. Cap. LXXXVI.

Aparine à quibusdam Lappa etiam uocatur, quod tota herba cum semine propter asperitatem suam prætereuntium uestibus adhaereat, Germani eam Klebefraut nominant.

ALYSSUM. Ca. LXXXVII.

Alyssum hic autor, et alij, rotundis folijs descriptum, Plinius uero Rubie similibus, sed male. Qualis uero sit hodie, ignoratur.

ASCLEPIAS. Ca. LXXXVIII.

Asclepias ea est herba, quæ à quibusdam Vincetoxicum, à Germanis Schwalbenwurz uocatur, quoniam cum maturum semen in Siliquis, si liquæ ipsæ dehiscunt, et hirundinibus uolantibus similes sunt. Eandem ob causam ab aliquibus recentioribus Hirundinaria dicitur. Sed alia est Hirundinaria, quæ à libro Chelidonium uocatur.

COLVS RVSTICA.

Cap. LXXXIX.

Appocynus, Cnici, quem hodie Cartium uocant, agrestior quædam species est, quæ hodie non demerè à quouis cognoscitur.

POLYCNEMVM. Caput XC.

Polycnemum qualis sit, hodie omnino ignoratur. Nomen à multis suris siue internodijs inuenit.

CLINOPODIVM. Caput XCI.

Clinopodium Germanis Werdeldost appellatur, multos habet, ut Marrubium, circa caules uerticillos, lectorum rotundis pedibus similes, à quibus Greci et Germani nomen illi indidit.

LEONTOPODIUM. Ca. XCI. C

Leontopodium omnino est incognita hoc tempore replant.

TEUCRION. Caput XCIII.

Teucrium à Germanis Kummertrost uocatur. Huius etiam species est, quæ hodie dicitur et nobis pro Chamedry in usu Germaniæ Pharmacopolis habetur.

TRIXAGO. Ca. XCIII.

Xapad, seu Germanicè Erdenche uocatur. Non cognoscitur hæc à Germaniæ Pharmacopolis. Eius tamen loco Teucrij speciem habent, quam omnes etiam uulgares Herbarij Chamedryos appellatione indicant. Differunt autem plurimum inter se. Hæc enim ubiq; in campestribus nascitur, coeruleo flore, et minimo semine in compressis pericarpis clauso. Sed uera Chamedrys asperis et caluis exit montibus, flore purpureo, et semine nigro et rotundo in denticulatis caliculis, Hyoscyami nasculis similibus, multo tamen minoribus. Affertur iam ex Italia et Creta ad nos. Ego autem maximam eius copiam in Germania ibena ueni. Brunfelsius eam in tertio Tomo sub Chamepyteos nomine depinxit.

LEUCAS. Cap. XCV.

Leucadis Nicander etiam meminit. Quo uero nomine nunc appellatur, nulli cognitum est.

LYCHNIS CORONARIA ET AGRESTIS. Ca. XCVI. D

Vtraq; Lychnis hodie incognita est. Ruellius tamen eam cognouisse uidetur.

LILIUM. Cap. XCVII.

Multe sunt Liliorum differentie. Hoc tamen loco candida Lilia intelligenda sunt, quæ nobis Liliens uocantur.

BALLOTE. Ca. XCVIII.

Ballote Latine nigrum, siue cantherinum Marrubium, et Vlceraia, Germanis Schwaetzer Anthon uocatur.

APIASTRUM. Ca. XCIX.

Dvplex est Apiastrum. Vnum sic appellatur, quod Apio simile sit. Hoc alio nomine Rantulus uocatur, et in Sardiniâ uenenatum est. Alter uero ab Apibus Apiastrum uocatur, quæ hæc herba delectantur. Melissophyllon hoc à Grecis uocatur. Plinius hanc distinctionem non cognouit, ut lib. 20. cap. 11. uidere est. Vbi dicit: Apiastrum Hignus quidam Melissophyllon appellat, sed in confessa damnatione est uenenatum in Sardiniâ. Apiastrum uero id est, Melissophyllon, quod Hignus intelligit, nequaquam est uenenatum. Pharmacopole hæc herbam Melissam, Germani Dinenwort dicunt.

MARRYBIVM. Cap. C.

f. 2

A Prasion Latini Marrubium, Germani Andorn
 & Gots vergiß uocant. Nota est omnibus herba.

STACHYS. Cap. CI.

Stachys spicata herba est, & Marrubio similis,
 candidior tamen, & ob eam causam Germanis
 Weisser Andorn, & Stein Andorn uocatur.

PHYLLITIS. Ca. CII.

Omibus persuasum, & Pharmacopolarum
 animis altius infixum est, Scolopendri-
 onef-
 se Linguam ceruinam, quæ Germanis Zieschzung
 uocatur. Cum uero Scolopendrium Polipodij modo
 incisjs folijs describatur ab omnibus, Lingua cerui-
 na uero nullas omnino incisuras habeat, necesse est
 differre plurimum Scolopendrium & Linguam cer-
 uinam. Quid autem reuera Lingua ceruina sit, hoc
 loco indicabimus. Posthac etiam quid uerum Scolo-
 pendrium sit, indicaturi. Lingua ceruina: igitur sine
 dubio est, quæ hic describitur. Phyllitis, tam graphi-
 cæ omnes notæ descriptioni conueniunt.

PHALANGIVM. Cap. CIII.

Phalangium hoc nomine omnino hodie ignora-
 tur.

TRIFOLIUM. Ca. CIIII.

Multa sunt Trifolij species in campis & prae-
 tis nascentes. Hoc autem loco diuersum ab
 illis Trifolij genus intelligit Dioscorides, quod prius
 Tim Oxitriphyllon & Asphaltion ab odore uocatur.
 Quale autem Trifolium hoc sit, nondum compertum
 est.

POLIUM. Caput CV.

Duplex est montani Polij genus, sed neutrum
 Pharmacopolis in Germania cognitum. Quod
 enim hi Polium uocant, asperis locis exit, Serpyllo
 syluestri simile, æneceps per ramulos nascente semi-
 ne, non iniucundè uiride hoc olet: siccatum uero nul-
 lum habet odorem, hyeme etiam perit. Sed uerum Po-
 lium altis & caluis exit montibus, in summis ramulis
 corymbi figura capitula, & in his semina ferens.
 Viride & siccum suauiter olet, & hyeme tota uiret.
 Sic describitur Polium à ueteribus. Huius minor spe-
 cies ex Creta, Lugduno, & Masilia, Gallie urbibus
 ad paucos nostrates Pharmacopolas affertur. Ma-
 ius uero in Germania copiose nascitur, præsertim
 Ithene, & ab incolis Wilder Rosmarin uocatur,
 improprie tamen.

SCORDIUM. Ca. CVI.

Scordium hæc herba appellatur, quod odore tano-
 rum Allium imitetur. Forma enim omnino Allij
 dissimilis est. Pharmacopole magno errore syluc-
 stre Allium Scordium appellant. Veruntamen Scor-
 dium in Germania multis locis nascitur, ut Runden-
 berg, Peyna in Brunsuicensi Saxonia, ut in Cheru-
 scorum agris, necnon Vuitenberg. Herba est Cha-

medry similis, odore Allij, nascitur palustribus locis
 eis, unde etiam Romanis palustris Trixago appella-
 ta est. Germanicum nomen nondum audire licuit.
 Scordium quod in Creta, Italia & Gallia nascitur,
 eandem habet cum nostrate figuram.

TVSSILAGO. Cap. CVII.

Bhyssopus hunc & μυσσαλον, sine μυσσαλον
 pos, Latinis Tusilago, Farfarella, Farfara-
 go, & Vngula caballina, Germanis Büßlattiich et
 Brandelattiich appellatur.

ARTEMISIA. Cap. CVIII.

Artemisie duo cognouimus genera, Alterum
 rubente, & alterum candicante caule. Phar-
 macopole eodem utriusque adhuc nomine appellant.
 Germani Muggart & Weißß.

TENVIFOLIA ARTEMISIA.

Huius Artemisie caput genuinum non uidetur, quo-
 niã antea etiã tenuioris Artemisie mentionem fecit.
 Præterea in antiquis exemplaribus nusquam legitur.

AMBROSIA. Ca. CIX.

Ambrosiam recentiores Tanacetum, id est,
 Reinsar esse putant, quidam etiã Ziesch-
 wurtz: Sed utriusque falsum est. Nam Ambrosia Ar-
 temisie speciebus annumeratur. Hodie uero non co-
 gnoscitur.

BOTRYS, HERBA. Ca. CX.

Et hæc Botrys altera Ambrosie species est, cui
 D
 ius semen ab aliquibus Pharmacopolis Amos-
 mum uocatur. Seritur à paucis in Germania. Herba
 est admodum odorata, & ab holitoribus, qui eam se-
 runt, Tütschlicher Weißß uocatur. Nomen à copia
 so semine illi Græci indiderunt, quod in racemulis
 paruis circa totos ramulos nascitur.

GERANIVM. Ca. CXI.

Geranium siue Gruiua, Germanicè Reinsch-
 schnabel & Stordenschnabel uocatur,
 quoniam semina gruinis rostris similia ferat. Habet
 hæc herba aliquot differentias, quæ à foliorum & flo-
 rum diuersitate cognoscuntur.

TOMENTVM, SIVE CENTVNCULVS. Caput CXII.

Τρυφάλας Latini Centunculum & Albinum,
 Germani Rharfraut appellant, mollis est & lanu-
 gnosa herba, quæ pauperes olim culcitras farciebāt,
 Vnde à Græcis & Latinis nomen inueniunt.

TYPHA. Caput CXIII.

Typha palustris siue lacustris est planta, quæ
 à Germanis Bolben, siue Tarenfolben
 uocatur, florem in summo densum, copiosum & cla-
 ue similem habens.

CIRCAEA. Ca. CXIIII.

Circaea quo nomine iam appellatur, omnino inco-
 gnita est.

CENAN-

A OENANTHE. Ca. CXV.

Oenanthem Theodorus Gaza uitis florem apud Theophrastum interpretatus est. Satis huic descriptioni respondet herba, que Filipendula iam uocatur, quod glandibus similes radices à longis & tenuibus fibris seu filis pendeant. Germani propria uocabulo *Erdweyche* / quasi terrestrem glandem, à radicum similitudine, appellant. Videndum tamen est, ne cum hac *Chamaedryn* confundamus, que nobis *Erdweyche*, id est, terrestris *Quercus* uocatur.

CONYZA. Caput CXVI.

Confundit Plinius cum *Origano* & *Cunila Conyzam*, diuersas naturae plantas, quas hic Dioscorides & alij ueteres scorsim diuersis etiam capitibus descriperunt. Nihil enim commune inter se habent. Sunt autem plures *Conyzae* species, que magnitudine, natali solo, & odoris grauitate dignosci possunt. Germani generali uocabulo omnes eius species *Sundsaugen* uocant.

HEMEROCALLIS. Ca. CXVII.

Hemerocallis syluestre Lilium est, quod Germani *Goldtopoln* / siue *Goldwurz* appellant. Pharmacopole uero à *Aphodolum*, sed falso, ut antea dictum est, cum de *Aphodolo* sermonem haberemus.

VIOLAE. Cap. CXVIII.

Albi & Romani *Violam albam*, Arabes *Cheiri*, Germani *Gelbe violen* uocant. Inueniuntur albo, luteo, caeruleo & purpureo colore. Ad Medicinam tamen utilissima sunt luteae.

CRATAEOGONVM. Ca. CXIX.

Non cognoscitur hoc nomen aliqua herba. Est etiam arbor apud ueteres eiusdem nominis. Porro si quis ea probe intellexerit, quae proximo capite de *Phyllo* dicturus sum, manifestum erit Ruelium errare, quod *Theligonon* & *Arrenogonon* *Persicariae* species esse scribit.

PHYLLVM, HERBA.

Caput CXX.

Phyllon superuacuum habet in hoc autore historiam. Nulla enim per se est herba, quae propriè *Phyllon* appellatur. Neque Dioscorides eius historiam quasi suam posuit, sed ex *Cratæa* Herbario, ut ipse fatetur, descripsit. Non tamen inutile futurum existimo, si quid sit *Phyllon* indicauero. Theophrastus lib. 9. cap. 19. de historia plantarum, herbam ponit, quae duas habet species. Vnam appellat *Arrenogonon*, quod masculinum sexum concipi faciat: alteram *Theligonon*, quod femininus sexus ea pota concipiat. Ex quibus constat, hanc Theophrasti herbam cum Dioscoridis *Arrenogono* & *Theligono*, (quas etiam *Phyllon* uocat) eandem esse. Descriptio enim, nomen, et attributa uires conueniunt. Quomodo

uero ante dixi, *Phyllon* non habere proprium genus, & tamen est herba, quae *Arrenogonon* uocetur, necesse est eam sub alio nomine latere: quod manifestum fiet, si quis *Mercurialis* historiam & uires ab hoc autore descriptas, cum Theophrasti *Arrenogono* & *Theligono* conferat. Sunt enim sine dubio *Arrenogonon* & *Theligonon*, *Phyllon* et *Mercurialis*, una eademque herba, quae duas habet species, ut suo loco indicabimus. Propterea nemo existimet, Foliū, herbā, hoc loco descriptum, diuersum à *Mercuriali* esse. Deprehensum à nullo hactenus est hoc in Dioscoride uerbum. Nemo tamen hanc ob causam minus fidei Dioscoridi habere debet. Non enim ipse proprium *Phyllo* genus à *Mercuriali* diuersum constituit, sed haec ex Herbario *Cratæa* descripsit, ad quem etiam ea referre ijet.

TESTICVLVS. Ca. CXXI.

Opxis Latinis *Testiculus*, siue *Canis testiculus*, Germanis *Kagwurz* / *Standhart* / *Stendelwurz* / *Geylwurz* / & *Edgeyn* uocatur. Pharmacopole omnes eius species *Satyriones* nominant, cum tamen *Satyrion* diuersum ab *Orchi* genus habeat.

ALTER TESTICVLVS.

Orchis *Scrapias* priori similis est, maiora tamen folia, & minores testiculos habet. Germani ipsam hanc quibus illam nominibus appellant. Porro plures hodie *Testiculorum* species, quam à ueteribus descriptae sunt, cognoscimus.

SATYRIVM, HERBA.

Cap. CXXII.

Qualis haec prima *Satyrj* species sit, non facile quis dixerit.

ALTERVM SATYRIVM.

Alterum siue *Erythron Satyrion*, Germani *Rot Enabenkraut* uocant. Hodie non in secunda *Satyrj* declinatione, sed *Satyrion*, in tertia declinant.

ORMINIVM SATIVM.

Caput CXXIII.

Orminij duo sunt genera. *Sativum* unum & syluestre unum. Vtrunq; hodie *Centrū galii*, & male etiam *Gallitricum* uocant. Quidam etiam *Scarlean*, unde Germanicum nomen *Scarley* deducunt.

HEDYSARVM. Cap. CXXIII.

Hedysaron siue *Pelecinus*, quem Latinus *Securidacum* uocat, in nullo usu est, quoniam non cognoscitur.

ONOSMA. Ca. CXXV.

Onosma ex *Anchusarum* genere est. Hodie uero quo nomine appellatur, non constat.

NYMPHAEA. Ca. CXXVI.

Nymphæa est herba, quam Arabes Nenuphar, Germani Seefenneten / Seebliomen / & Beulenwurz uocant. Prior hæc species grandem & candidum florem habet, multis oblongis folijs constantem.

ALTERA NYMPHAEA.

Alteræ Nymphææ priori omnino folijs & fructu similis est. Flore differt, quem luteum & Rose similem habet.

ANDROSACES. Ca. CXXVII.

Androsacen parens meus suspicabatur Cuscutam esse, nihil tamen certi pronunciauit, quoniam descriptioni Androsaces non per omnia responderet Cuscuta.

ASPLENVM. Cap. CXXVIII.

Asplenon, siue Asplenon, eadem est cum Scolopendrio. Scolopendrium uero, ut in Phyllitide dictum fuit, non est Lingua ceruina. Propterea errant omnes, qui adhuc Linguam ceruinam Scolopendrium uocant. Verum autem Scolopendrium Arabes, & quidam Pharmacopolæ Ceterach uocant, Germani Tüßelfahyn / id est, Scolopendria simile Filicem. Est enim Scolopendrium siue Asplenum, herba ex Filicis genere, Polipodij, et Scolopendriae uermis modoutrinq; incisa, habens folia ex una parte glabra & uiridia, ex altera flua & aspera. Quidam Germani Scolopendrium etiam Flein Spicant uocant. Dictum itaq; iam est quid sit uerum Scolopendrium, siue Asplenum, & quid etiam sit Lingua ceruina, quæ hæctenus falso Scolopendrium est nominata. Sufficere igitur hæc puto ijs, qui præteriti et barbari seculi erroribus adhaerunt.

HEMIONITIS. Ca. CXXIX.

Hemionitida Theodorus Inula in Theophrasto uertit, propterea quod in Theophrasto non Hemionitis, sed *ἡμίων* legitur. Quo autem nomine iam appelletur, nondum constat. Ruellius tamen putat Linguam ceruinam, quæ hodie falso Scolopendria uocatur, Hemionitida esse, sed antea ostensum à patre meo & me fuit, Ceruinam linguam sine dubio esse Phyllitida, quæ seorsim ab Hemionitide describitur. Illud tamen fateor, me sæpe suspicatum esse, & adhuc suspicari, quod Hemionitis & Phyllitidis una eademq; sit herba. Descriptio enim & uires conueniunt. Quod si fuerit, nemo Ruellium accusare poterit, quod Hemionitida Linguam ceruinam esse dixcrit. Porro Verg. Marc. maxime errat, quod Asplenon & Hemionitida eandem esse herbam suspicatur: in quam suspensionem ideo incidit, quod Asplenon etiam secundum uulgatum errorem Ceruinam linguam esse crediderit. Plinium Teucrium & Hemionion, diuersas naturæ plantas, confundere, sciante Pliniani lectores.

ANTHYLLIS. Ca. CXXX.

Duæ sunt Anthyllidis species. Una scilicet, altera Chamæpity similis: utraq; falso est gustu. Propterea ab Italis Salsola appellantur, & stercus passerum. Priorem nondum uidi. Altera uero quæ Chamæpity similis est (licet malè in quibusdam Dioscoridis exemplaribus Chama dry, scriptum reperitur) in apricis Herciniæ syluæ locis nascitur, & à Germanis Salztraut appellatur, tam manifestolis sapore, ut etiam ex utraq; uita & non uita sal excoqui possit, quem salem Alkali uocant Arabes. Propterea neq; Aristotelem, neq; Plinium rectè sensisse constat, quod scribant omnes sapores præter salum plantis inesse. Nec enim sola Anthyllis excipitur, cum aliis etiam plures huiusmodi inueniantur.

ANTHEMIS. Ca. CXXXI.

Anthemis, siue *ἄνθεμις*, corrupto nomine Pharmacopolis Camomilla uocatur. Germanice Camillen / Birmelen / & Weydbliem. Prior species, quæ foris candidum, intus luteum habet flore, hodie in omnibus Pharmacopolijs ad usum Medicinæ seruatur.

PARTHENIUM. Ca. CXXXII.

Parthenium hoc à Pharmacopolis Matricaria uocatur, quod Arabum quoq; Interpretes minime latuit. Galenus hanc herbam Amaracum uocat, ut in Sampso dictum est. Propterea magno errore in 6. libro Gal. de simplicib. Amaracum Maiorana uertit Theodoricus Gerbardus Gandanus. Nam Maiorana Galenus postea in 8. meminit, sub nomine Sampsychi, & diuersum ei ab Amaraco temperamentum tribuit. Quinetiam ab hoc autore Parthenium Amaracus dicitur.

BUPHTHALMVM.

Caput CXXXIII.

Sunt aliqui qui Buphtalmum & Chrysanthemon eandem herbam esse credant, quibus non uolenter repugnabo. Illud tamen nouisse oportet, plures esse Buphtalmi species; Sunt enim quibusdā candidi simulq; lutei flores, quarum maiorem nos Büttele / minor em uero Bوندستille / & Bوندسblämen appellamus, Pharmacopolæ Cotulam sectidam. Quædam etiā species omnino luteos flores habet, & his Chrysanthemi nomen Græci indiderunt, Germani uero, idem significante uocabulo, Goldblämen.

PÆONIA, SIVE GLYCY.

sive. Caput CXXXIII.

Insignis est herba Pæonia, & omnibus cognita: habet tamen duas species sexu distinctas. Feminam nos habemus, cui radices numeroe ceu gracilibus isthmis coherent. Masculam uero in Germania haberi nondum comperi, cuius semen aliunde mihi missum terræ mandauis, sed nulla cura mulcetri po-

Auit ut exiret. Quamvis enim auctores scribant ex omnibus seminibus nasci plantas, & Paeonia utraq; in signe semen habeat, nullum tamen audiui, qui ex facto semine germen nasci uidisset, tametsi plures periculum fecerint, atq; ipse etiam sepius. Oportere igitur adesse certum serendi tempus & modum, quidā uolunt, & illud etiam curari, ne unquā semina, cum ē corniculis eximuntur, digitis attrahantur. Quibus an assentiri debeam, nescio. Quoniam etsi quottannis semen sponte ē corniculis in terram excidat, & seipsum serat (ubi magnam Paeoniae copiam hortiores habent) minime tamen enascitur: quod diligenter ipse animaduerti, & hortulanus huius rei causa interrogatus, qui simile se deprehendisse responderunt. Paeonia itaq; Germani Peonien & Freysam rosen uocant. Pharmacopole Latino siue Greco nomine utuntur.

LITHOSPERMUM.

Cap. CXXXV.

Lithospermon Germani Steinfamen & Mierhiesen, Pharmacopole Milium solis uocant. Nullam herbam usq; ad id admiratus est Plinius, atq; hanc.

PHALARIS. Ca. CXXXVI.

Phalaris Pharmacopolis incognita est herba, nec cuiquam adhuc cōstat, quo nomine iam appelletur. Mihi uero ante paucos annos semen ē Norimbergae missum est. à Gallis Milium sylvestre uocatum: quod cum scissem, Phalaris ipsa, quam Dioscorides hoc loco describit, erupit, optime descriptioni respondere note omnes. Germanicum eius nomen i-garo, quoniam apud uos adhuc neq; satiatam, neq; sponte nascentem uidi.

RUBIA. Caput CXXXVII.

Rubia quādam Theophrastus Εγευδὲ δ' ἄρα οὐ appellat, qui eam longē aliter quā hic autor describit: quā bene autem, non uideo. Siquidem nos cum omnibus antiquis & recentioribus Medicis optime Rubiam cognoscimus, ea qua Dioscorides eā describit figura. Scribitur haec in multis Germaniae locis ad uictigal, Pharmacopole Rubeam tinctorum uocant, Germani Ruten. li autem uehementer errant, qui Anchusē, id est, Buglossē asperē siue rubētis radices pro Rubia accipiūt, quales noui multos.

LONCHITIS. Ca. CXXXVIII.

Lonchitis haec mihi adhuc incognita est. Hodie in Pharmacopolis habetur nusquam. Ruellius tamen nouisse uidetur. Cum uerō nesciam qualem ille herbam nigros Capetos Gallicē nocet, eidem assentiri non possum.

ALTERA LONCHITIS.

Altera Lonchitis sine dubio ea mihi uidetur esse, quae Germanis Groß Spicant appellatur. Mediam figuram inter Scolopendrium & Po-

lipodium habet. Scabrae sunt filiorum incisurae. Vn-
de eam asperam. Lonchitida cognominauerunt.

ALTHAEA. Ca. CXXXIX.

Althea sylvestris Malus genus est, in uliginosis & palustribus locis nascens. Plantatur à quibusdam etiam in hortis. Pharmacopole eam eodem & Bismalus nomine nowerunt. Latini Hibiscum olim dicebatur. Germani Eibisch/ Sammerbappein/ & Stockwurz appellant.

ALCEA. Caput CXL.

Et haec sylvestris Malus species est. Folia profundius Verbena modo incisa habet, florent uerō & semen ut Althea. Germani eam Sochleuchten & Sigmarowurz uocant. Nascentur plerūq; in pratis, quae fluij tumescere attingere possunt, et non procul ab horum ripis. Pharmacopole hanc herbam non habent.

CANNABIS SYLVESTRIS.

Caput CXLI.

Sylvestris Cannabis omnibus nota est. Nullum habet apud nos in Medicina usum.

CANNABIS SATIUA.

Satiua Cannabis à nullo non cognoscitur. Rarus & huius est in Medicina usus. Male huius folia Malo similia Verg. Marcellus interpretatus est. In Graeco enim textu Μελέξ, id est Fraxino, legitur.

ANAGYRIS. Ca. CXLII.

Anagyris, quae ob foetorem suum in prouerbiorū censu habetur, hodie non temere à quouis cognoscitur.

CEPAEA HERBA.

Caput CXLIII.

Khœcia quamuis ab hortis nomen habeat, tamen in arenosis littoribus, & maxime in hortis nascitur. Est autem eadem herba cum Portulaca, praeterquam quod Cepaea sponte in asperis littoribus nascatur, cum Portulaca in hortis seratur. Apparet igitur permixtasse inuicem nomina sua has herbas. Germani Cepeam Wilde Borzel uocant.

ALISMA. Ca. CXLIII.

Alisma siue Damaseniū, hodie Herbarij corrupto uocabulo Alneam uocant. Germani wilden Wegerich. Hic autor unum tantum Damaseniū genus ponit. Plinius uerō duo. Nos autem plures eius differentias nouimus. Nullus est hodie in Pharmacopolis Damaseniū usus.

ONOBRYCHIS. Ca. CXLV.

Qualis Onobrychis sit herba, hodie omnino ignotum est.

A HYPERICVM. Ca. CXLVI.

TRes sunt reuera Hyperici species. Prima propriè & simpliciter Hypericum uocatur. Altera priuatim suo nomine Ascyron & Ascyroides nominatur. Tertia etiam peculiari nomine Androsæ non appellatur: quamuis etiam omnes tres species Androsæ appellatione ueniant, propterea quod digitis conficatur earum come & flores, sanguineo colore succum remittant. Prima igitur species, quæ priuatim Hypericum dicitur, nondum mihi cognita est. In nostris autem Pharmacopolis loco eius Ascyro utimur, quod altera est, ut antea indicauimus, Hyperici species. Demonstrauimus etiam malè ab aliquo Hyperici caput, syluestris Rutæ capiti commixtum esse, & quod Ruta syluestris differat à Perforata. Ruellium in tertio de natura stirpium libro ca. 74. scribit, Dioscoridem in Hyperico mentione floris digitorum attritu cruentati non meminisse. Concederem ego hoc (quoniam sunt quedam Dioscoridis exemplaria, quibus ea nota deest, quale etiam Verg. Marcellus habuit) nisi in probatis codicibus, ubi de Hyperico agitur, manifestè hæc uerba legeretur: *Ανδρῶς ἡ καλεῖται ὁ σταυρὸς τοῖς δακτύλοις ἐκμασθὲν ὁ δὲ ἵψος ἐκκρίνεται. ὁ δὲ ἵψος ἐκκρίνεται ἐκ τοῦ ἵψους. Quæ sic uerti possunt: Florem habet luteam, qui digitis attritus sanguineum succum excernit, unde & Androsæmon, id est, Humanus sanguis appellatur.*

B ASCYRON. Ca. CXLVII.

Aσχυρόν, quod aliqui Ascyroides uocant, secunda est Hyperici species, quam Pharmacopolis etiam simpliciter Hypericon & Perforatam, Germani Saxthaw & Sancti Johans Fraut appellant. Folia eius inter lucem & oculos nostros posita crebris punctis ceu Perforata uidentur. Unde etiam Perforatæ nomen inuenit. Hanc herbam Antiochus in suo simplicium examine Rutam syluestrem esse contendit, cuius sententiam antea consultauimus.

ANDROSÆMVM.

Caput CXLVIII.

Aνδρῶς αἰμαρ, quod *Διόνυσος* & *ἄλ* etiam uocant Græci, in nullo usu hodie habetur. Herba est rubente caule, cuius cortex ita striatur, ut quadrangulum reddat caulem. Ramulos & alas Ascyro

similes, folia tantum maiora & minores flores quàm Ascyron habet. Nascentur circa profuentes riuulos, & à Germanis Rot harrhaw appellatur.

CORIS. Caput CXLIX.

Coris à graui & cimicibus simili odore nominatur. Fruticulus dodrantalis est, folijs Ericæ similibus, profert etiam baccas iuniperi baccis similes, sed minores, quæ cum folijs attritæ medium inter iuniperum, Pinum, & Cimices odorem remittunt. Estq; hic minime ingratus. Germani Corin & Corin uer, quasi paruum & terrestrem Thedam appellant, quoniam odore etiam Thedam arborem imitatur. Dioscorides fructus siue baccas eius non deserpsit, quas tamen urinam & menses trahere dixit.

CHAMAEPITYS. Caput CL.

Chamæpityn Græci uocant herbam, Pini odorem aliquem habentem, cuius tres ponunt species, quæ olim omnes à Latinis Ailaga & Ibiga dicebantur. Hodie uerò quid reuera Chamæpitys sit, non omnibus est notum: quamuis à parente meo, & quibusdam alijs scriptis sit proditum. Quidam Pharmacopolis Chamæpeuzen, à Germanis Zentheyde appellatam, Chamæpityn uocant. Quidam eius loco primam Syderitis speciem, quam Germani Teißtraut appellant, ostendunt. Et hæc herba etiam à Venetis nobis hic transmittitur, cum tamen ubiq; apud nos in montibus nascatur. Sunt etiam qui ueram Chamæpityn uocent. Alij quoq; alias herbas eo nomine indicant, sed omnes illi errant. Nam uera Chamæpitys est herba illa, quæ à Pharmacopolis sua dicitur, quod à patre meo, Musæ & Ruellio satis ostensum est, & nos etiam approbamus, quoniam omnes notæ adamusim descriptioni conueniunt. Doctiores autem & peritiores Pharmacopolis non inuitis pedibus in eam sententiam eunt. Continuares uerò sic contra nos argumentantur: Si ista est Chamæpityos (nam ita hodie Chamæpitys à Pharmacopolis appellatur) ostendatur alia ista. Non intelligentes suam propriam & à Chamæpity diuersam genus non habere. Sed his suum relinquendum est ingenium, donec aliquando sponte ueritatem agnoscant.

FINIS LIBRI III.

IN LIBRVM IIII.

VETONICA. Caput I.



VETONICA, Pharmacopolis Betonica, Germanis Bethonien uocatur. Nota est omnibus herba. Sequitur in quibusdam exemplaribus aliud Betonicæ caput, uerum

illud non est Dioscoridis, quod superstitiosa uerba indicant, quibus totum caput constat. Neq; etiam in antiquis Scriptoribus legitur. Negandum tamen minime est, aliud quoq; Vetonicæ genus esse, quod Aegina Pulegij similitudine describit. Cuius Galenus etiam lib. 4. de sanitate tuenda meminit, atq; eam Saxifraga

A Sarxifagon uocari: de qua in proprio loco dicturi sumus.

BRITANNICA. Cap. II.

Certum est copiosè nasci in Germania Britannicam, cum olim uires eius Phrysijs etiam cognite fuerint, qui eam Romanis contra Stomacacem demonstrarunt. Quo uerò nomine iam appellatur, non constat, nisi quis Bistortam, seu herbam paralytios eam esse dixerit: quorum neutrum adhuc neque affirmo, neque nego.

LYSIMACHIA. Cap. III.

Lysimachiam Leoniceus Corneolam esse putat, qua tinctores uiridem colorem inficiunt. Huic subscribitur Ruellius lib. 3. cap. 78. Quamvis post aliam herbam Lysimachion esse putet, quam Galli Pellibossam uocant. Ego autem nullo modo illis assentiri possum, qui Corneolam Lysimachion esse putant. Quoniam Corneola est frutescens herba, quæ à Germanis Gilbefrant appellatur, in editis neque aquosis nascentis, neque gustu magnopere astringens.

Hanc Corneolam Georgius Agricola, Medicinæ doctor, secum ex Italia attulit, sibi à Leoniceo pro Lysimachia demonstratam, sed plures notæ non cõueniunt. Vera tamen Lysimachia in aquosis nascitur, et à Germanis Weidenrich appellatur. Ruellius eodem quo antea de Lysimachia eum scribere loco dixi, putat Lytri uocabulum corruptum esse à Luteo. Nam ut Vitruius est autor, qui non possunt Chrysocolla propter raritatem uti, herba Lutea appellata, coruleum inficiunt. Verum nequaquam ibi Vitruius per Luteum Lysimachia intelligit (quod Lytron etiam appellatur) sed sui generis herbam, quæ Grecis Isatis, Germanis Weide / Latinis Lutea, siue Glastrum appellatur.

SANGVINALIS, MASCULA.
Caput IIII.

Polygonon mas, Latinis sanguinalis mascula, et Proserpinaca, Pharmacopolis Lingua passerina, siue Corrigola, Germanis Wegedutt et Denugraß uocatur.

SANGVINALIS, FOEMINA.

Polygonon θήλυ, quæ Romanis Sanguinalis foemina, Germanis Schaffenhew appellatur, masculæ omnino dissimilis est. Habet enim idem cum Hippuri genus, specie tantum differt. Nascentur in stagnantibus et lacustribus pratis, caulibus geniculatis, in se farctis, et folijs Hippuri (ide est, Rosagel) similis, equi mirum in modum eius pabulo delectantur. Huic etiam similis alia est, sed asperior, quam Germani Schabtraß appellant, quod ea sculptores in polendis ligneis operibus uti soleant.

POLYGONATVM. Ca. V.

Polygonatum sine dubio ea est herba, quam Phar

macopole Sigillum Salomonis, Germani Weiss wurtz et Gelentwurtz appellant. Vtraque gens ab articulata radice illi nomen indidit. Vulgares Germanici Herbarij hanc herbam cum Distanno et Helboro albo confundunt, detestabili, et digno ut confutetur errore.

CLEMATIS. Ca. VI.

Clematis hæc Peruinca species est, quæ astringendi uires habet. Est enim alia quoque Peruinca, quæ alium ducit: de qua hoc loco non agitur. Germani hanc Clematida Wilden Singrün uocant.

ALTERA CLEMATIS.

Aliam hanc Clematida, ut Galenus refert, Dioscorides in fine 4. libri descripsit. Nunc uerò in principio Libri quarti utraq; describitur, sed male. Prior enim in principio humilibus astringentibus herbis, cum Britannicæ, Lysimachicæ, et utriusque sanguinali, propter uirium similitudinem, coniunxit. Hanc uerò quoniam alium semen eius duceret, in 4. libri fine, ubi de purgantibus agitur, descripsit. Est autem Clematis hæc duplicis differentie. Una enim grandis frutex est, proceras arbores scandens, et singulis annis incrementum sumens, quoniam caudex et uiticulus illi aliarum arborum modo durant. Altera uerò per omnia huic similis est, breuior tamen (quamuis et hæc interdum ispedum longitudine adoleat) et autumnus caules siue uiticulos amittit. Nascentur hæc in pratis circa arbutus, quod fluminum inundationes peruenire queunt. Illa uerò in montibus arbores et uinearum sepes adscendit. Vtraque Germanis Rebling uocatur. Arborecens tamen maioris, et herbacea minoris cognomen habet. Saxones etiam Wilde Weinranken nominant, quod sarmentis uti temerulentur.

POLEMONIA. Ca. VII.

Polemonia quo nomine id uocetur, nulli cognitum est. Ruellius tamen Polemoniam eam esse credit, quam Gallica rura Boscij aluiā uocant quod nomen cum Germanis commune habent Galli. Nos enim sic eam herbam uocamus, quod Saluie similitudinem aliquam habeat, et in dumosis locis nascatur, quæ nos Busche appellamus. Vulgo apud nos Buschsalbey herba hæc uocatur. Sed Ruellius eam uel ad historiam torquet. Neque folia enim, neque radix conueniunt, quas ille conuenire dicit, contra oculis perspectam experientiam et testimonium.

PETRAEV M SYMPHYTVM.

Cap. VIII.

Συμφύτον πετρώδες, Latini petram Con solidam uocant, Germani Steingunsel. Nascentur petrosis et in petris. In Pharmacopolijs autem hoc tempore non habetur, præsertim in Germania, quamvis in petrosis locis nascatur, quales sunt Aschburgi, duobus à Brunswico miliaribus.

ALTERVM SYMPHYTVM.

Alterum

A Lterum Symphytum sine dubio est aspera il-
la in uliginosis locis nascentis herba, quam
Pharmacopole maiorem Consolidam, Germani uero
Beynwelle / Schmerwurz / Schwarzwurz /
et Walwurz uocant, quae nomina Musa ex patris
mei Botanologico desumpsit, et eorum Etymologi-
am misere corrupit, uir Germanicae linguae omnino
ignarus.

HOLOSTHEVM. Ca. IX.

Olostheum mollissima dicitur esse herba, qua
propter ex aduerso sic appellata est. Quo no-
mine iam dicatur, ignotum est. Ruellius eam à Gallis
Denticulum canis appellari scribit. Cum uero idem
autor alibi gramen, alibi Coronopum dente canis es-
se dicat, parum sibi ipsi constat. Propterea illius opi-
nioni aspiculari non possum.

STOEBE. Ca. X.

Stoebe quo nomine iam appelletur, nondum co-
peri. Sunt tamen aliqui qui eam Scabiosam esse
credant. Cum uero ab hoc autore nulla eius descri-
ptio ponatur, nihil affirmo.

CLYMENVM. Ca. XI.

Qualis Clymenon herba sit, nondum scio. Ruellius
eam cognouisse uidetur.

PERICLYMENVM.

Caput XII.

Periclymenon omnium doctorum consensu frut-
tex est arbuscula scandens, quem Itali et Phar-
macopole Matris syluam, Germani Geyßblat / id
est, Caprifolium appellant. Porro cauendum est ne
diuersas res confundamus. Nam quidam Itali et no-
strates etiam Pharmacopole, pedali altitudine herbam
quandam folijs oblongis per interualla quinis ple-
runtque in uno geniculo stellae modo dispositis, simili-
ter Matris syluam uocant. Ea Germanis Wald-
meyer dicitur, et est Aparine sylvestris quaedam
species.

TRIBVLVS. Cap. XIII.

Tribuli duplex est genus. Terrestre unum, et
aquaticum alterum. Terrestrem in Germania
nasci nondum uidi. Aridum tamen à Georgio Agrico-
la ex Italia allatum conspexi, habetque eam figuram,
quam Dioscorides illi tribuit. Vehementer errant qui
Tribulos in Georg. Verglij uulgares Car duos, id
est, Disteln interpretantur. Nihil enim commune
cum his habent. Aquaticus uero Tribulus sine con-
trouersia est, quae nos Wasserbüß / Stachelbüß /
et Spitzbüß / appellamus, cuius miram in germi-
nando proprietatem obseruauimus. Nascentur in li-
mosis et stagnantibus fluuijs, ut apud nos est inferi-
or Milde pars circa Dieben. Elster in Misnia, Al-
bis, et alij quidam.

SARXIPHAGON, SIVE

Saxifraga.

Credunt nonnulli non esse hoc caput Diosco-
ridis, eo solo argumento persuasi, quod Lati-
na uox, Saxifraga, in principio capitis loco Graeci
nominis legatur, quam Graeci in Sarxiphagon cor-
ruperunt, ut sit in alterius linguae uocabulis non in-
tellectis. Nullius autem est id argumentum ualoris.
Nam ipsi Graeci Latina quaedam uocabula in suam
linguam receperunt, quales sunt ἀγρύγις, id est, Axo-
ungia, et haec Saxifraga, et alia quaedam. Porro
hoc Sarxiphagon est quod Galenus Cestron etiam di-
ci testatur, quodque Aegnetia Pulegio simile esse dicit,
sed minus. In Cestri, id est, Betonicae capite, Diosco-
rides cum Epithymo comparat. Ego uero suspicor non
legendum esse Epithymum, quoniam nulla est inter
Pulegium et Epithymum similitudo. Praeterea in
quibusdam Graecis exemplaribus non habetur hoc
uocabulum. Quare Thymum pro Epithymo legenda
um esse non sine ratione conijcio, quoniam magna
est affinitas inter paruum Pulegium et Thymum.
Nascitur apud nos herba quaedam in asperis locis,
mediam figuram inter Serpyllum, Thymum et Pu-
legium habens, quae apud nos Pharmacopole pro Sa-
lio utuntur. Haec an Saxifraga sit animaduertam. Er-
rat Ruellius, quod hanc Saxifragam esse putat Sa-
liam nitam. Nam Salvia uita idem est cum Adiantho
et Capillo Veneris, de quo scorsim, ferè in fine hu-
ius libri ager Dioscorides. Porro mira est hodie in
appellandis herbis inconstantia. Quicquid enim san-
guinem sistit, Sanguinariam uocant: et quicquid cal-
culosis medetur, Saxifragam, nimis late patente si-
gnificatione et uocabulo.

LIMONIUM. Caput XIII.

Limonium nomen inuenit, quod in palustribus
pratibus nascatur: pediculos ex una radice emi-
tit tres uel quatuor, doctantali longitudine, et in sin-
gulis ternis sunt Betulae similia folia, quae fit, ut decem
aut pluribus folijs à Dioscoride describatur. Flores
habet candidos, quorum nullam mentionem Dioscori-
des facit, Germani hanc herbam Wisenmangolt /
et Hibertlee appellant. Nullus est eius in Pharma-
copolijs usus. Sunt et alia duo sylvestris Betulae gene-
ra, quae ab Italis et Pharmacopolis Pirulae, à Ger-
manis Waldtmangolt / id est, sylvestres Betulae, et
Wintergrün appellantur, quorum Dioscorides non
meminit.

LEPORINVS PES, HERBA.

Caput XV.

Haec qualis sit, uel quo nomine iam uoce-
tur, uulgo incognitum est, quamuis ubique in agris na-
scatur, estque Trifolij species, quae Germani Dazzen-
Flee uocant.

MEDIUM. Cap. XVI.

Medion.

Medion ut minus cognoscamus, diuersa eius apud autores descriptiones faciunt. Plinius enim Iridi satiuæ folia eius comparat, Dioscorides uero Seridi. Sunt etiā Græci Dioscoridis exempla, in quibus Iridi, manifestè pro Seride, legitur. Quare uidendum est, et rationibus et coniecturis artificiosis scrutandū, utrum Iridi, uel Seridi, legendum sit.

EPIMEDIUM. Ca. XVII.

Epimedium suo nomine similiter ut Medion hodie incognitum est. Sed nunc aliud habet nomen, nempe Trimas, à tribus foliorum partibus. Vnde etiam Græcis Trias uocatur.

GLADIOLVS. Ca. XVIII.

Non temerè cognoscitur hodie uerus Gladiolus. Veteres omnes herbas, quæ Gladio simili habent folia, Gladiolos cognominabant, quales sunt Acorus, Sparganeum, Xyris, Iris, &c. Quos hodie nos quoque imitamur, sed maiori quàm par erat incertitia. Est enim sui generis herba, quæ Gladiolus Latinis, et Græcis *Ἐριφύλλος*, et uulgè *eripollus* appellatur. Eam apud Theophrastum Gæza interdum pugonem, interdum ensem, interdum etiam Gladiolum interpretatus est. Quinetiam Ciperum sui generis luncum, Gladiolum uertit, sed male. Verus autem Gladiolus in pinguibus et humentibus locis nascitur, quæ fluminum inundationes obtegeret possunt. Caulem habet insigni lenore, ut Theophrastus ait. Propterea Ruellius contra Theophrastum et ipsam experientiam, scabrum caulem illi tribuit. In summo caule cœu umbellam habet, purpureis et ab inuicem distantibus floribus plenam. Hoc enim sibi uult in Græco Dioscoridis textu *στυδὸν*. Germani hunc Gladiolum *Schwertel* appellant. Videndum tamen est, ne aliam herbam pro hac aliquis intelligat. Nam Germani quoque, ut Græci et Latini, Gladioli nomen ad Iridis et Acori species transferunt.

SPARGANIVM. Ca. XIX.

Sparganium semen suum in pilulis fert: nascitur humentibus locis, et Germanis *Degentvaut* uocatur. Nullus est huius, quemadmodum et ueri Gladioli, in nostris regionibus usus.

XYRIS. Caput XX.

Xyris sine dubio est illa Iridis species, quæ ab Italis *Spacula* cetida nominatur.

ANCHUSA. Caput XXI.

Anchusa prima species, quæ *Onoclea* dicitur, non temerè apud nos prouenit. Herba est ex syluestris Buglossæ genere, cuius radix usque ad interiorem medullam siue neruum rubenti turget succo. Affertur radix eius ex alijs regionibus ad mo-

riam Germaniæ urbes, ubi eam *Alkannam* impro-prie uocant *Pharmacopole*. Nam Arabes *Ligustica* *Alkannam* appellant, ut in primo libro diximus.

ALTERA ANCHUSA.

Nullus adhuc ex recentioribus scriptis certè aliquid de Anchusa prodidit, præter patrem meum, qui suo studio inuenit. Anchusam alteram hanc esse in sabulosis nascentem, rubente radice, Buglossam. Nihil enim est quod descriptioni repugnet. Germani eam *Wilde Ochsenzungen* uocant. Radicis superficies per messim sanguineo succo manat. Male hæc à quibusdam *Cynoglossa* dicitur.

LYCOPSIS. Ca. XXII.

Lycopsis à florum figura dicta est, qui (scilicet flores) hiantes sicut, patulas luporum fauces imitantur. Altera Anchusa similis est, longorem tantum et asperiorē caulem habens, Germani *Scharpf Ochsenzungen* appellant. Nascitur in sabulosis campis, nonnunquam etiā in muris et circa arces in montibus fitas. Male et hæc ab aliquibus *Cynoglossa* appellatur.

ECHIVM. Caput XXIII.

Echion absque controuersia est illa syluestris Buglossa, quam hodie *Pharmacopole simpliciter* Buglossam uocant, Germani *Ochsenzungen*. Leonæus uir aliqui doctissimus, et qui præsertim commissos in plantis errores corrigere conatus est, non satis certus et sufficientibus rationibus, hunc Buglossum Cyrion sine Crystione esse putat, quem secutus etiam est Ruellius, propterea diligentius illos hæc herbam considerasse optare.

Ne autem aliquem turbet ista autorum controuersia, illa adscripsi. Porro cum iam dixi, in nostram uulgo uocatam Buglossam, non esse ueram Buglossam, sed Echion, necesse est in eius locum ueram Buglossam substituere, ne in calumniarum caulationes incidam. Hoc autem in suum locum differeamus. Est et alterum Echion præ dicto minus, nigrioribus in purpura floribus. Nascitur hoc in pinguibus aruis. Nicander quoque duas Echij species cognouisse uidetur.

OCIMASTRUM.

Cap. XXIII.

Οκυμαστὸς Ruellius lacum albam esse putat, ubique in agris nascentem herbam: quam uerè autem, non, um uideo: Quandoquidem nos, quas tamen Ruellius conuenire dicit, descriptionem non respondeant.

ERINVS. Ca. XXV.

Erinus hæc herba appellata est, quod caprifici modo lacteum liquorem remittat. Hodie autem incognita est: quamuis Ruellius eam cognouisse uideatur.

GRA.

GRAMEN. Caput XXVI.

Argemone, siue Gramen, quod Germani Gras
appellant, hoc loco non quoduis foenum si-
gnificat, sed eam herbam, quae ubiq; in cultis nasci-
tur, geniculatis & dulcibus per terram serpens radi-
cibus ceu viticulis; folijs arundini similibus, sed multo
minoribus. Hanc Germani singulari etiam uocabulo,
Quackel / Quackgass / & Gras à iumentis appel-
lant, quae ea herba delectantur. Quack enim Saxoni-
ca lingua utentibus populis iumenta significat. Qua
propter hoc uocabulo Germani & Graeci itup interpre-
tantur. Nam sic etiam Gramen à Graecis dicitur. Par-
nassium uero Gramen nobis incognitum est, quoniam
in Parnaso monte gignitur.

SYDERITIS. Ca. XXVII.

Prima Syderitis à Germanis Seyßtrant ap-
pellatur. Omnes enim notae conueniunt descri-
ptioni. Hanc herbam quidam Chamaepityn appellant,
sed falso, ut in fine tertij Libri demonstrauimus. Ru-
cellius herbam iudaicam, siue Tetrabit Syderitida pri-
mam esse putat: quam uero ipse iudaicam herbam
intelligat, non scio. Nam illi qui autores huius nomi-
nis sunt, sibiipsis non constant, quam herbam Tetra-
bit, siue iudaicam appellant.

Alteram Syderitida & tertiam, quae Heracles
uocatur, ignorare me ingenue fateor. Ruellius tamē
utranq; cognouisse sibi uidetur.

ACHILLEIA. Ca. XXVIII.

Achilleia qualis sit, hodie omnino ignoratur.
Ruellius tamen hoc ἀχιλλεῖον Millefolium
esse dicit. Intelligit autem Millefolium uulgare siue
terrestre: sed magno errore. Nam nostrum Millefo-
lium est Stratiotes Millefolia, siue terrestris, apud
ueteres autores. His autem error in grauiorem illū
errorem coniecit, ubi Stratioten terrestrem indica-
re conatur: de quare suo loco dicemus. Reuera au-
tem Achilleia est terrestri Millefolio cognata plan-
ta, quam Germani Seldtgaube uocant. Copiosissi-
mē nascitur in pinguibus & quiescentibus aruis.

RVBVS. Caput XXIX.

Rubus sunt etiā qui ρυβός / Caſop appellant: quā
uis ρυβός / Caſo in primo inter arbores de-
scribitur, siq; diuersus ab hoc Rubo. Hec igitur no-
minum permutatio in causa est, quod diuersus ρυ-
βός / Caſo descriptiones apud autores legamus. Ru-
bus uero, de quo hic agitur, triplicem differentiam
habet. Quidam enim frutices & arbuta ascendit,
Quidam etiam paruis omnino est, & in opacis mon-
tibus gignitur, raro cubitum excedente longitudine,
fructum post Solstitium maturum ostendens, spinis
horret caulis eius, quem singularem plerumq; erigit.
Tertius humi in aruis & alibi repit in terra, aculeo-
sos ramos siue uticulos spargens, hanc ρυβός / Caſo

τὸν Theophrastus uocat, & à Theodoro Gazano C
ineptē Humirubus interpretatur. Omnes haec species
à nobis Ruben & Reagen appellantur. Fructus
uero eius, qui mora Rubi sunt, Bramber et Bran-
ber appellantur. Male quidam mora bucci probati,
id est Rubi, pronunciant.

RVBVS IDAEVS.

Caput XXX.

Rubus hic in Ida, Troas monte, non tantum
gignitur, unde nomen illi Graeci indiderunt:
Nascitur apud nos etiam in montibus & syluis, siue
admiculis per se uirgēs recta ascendentes sub-
stans, tenuibus & exilibus spinis, quamuis frequen-
tissimus etiam sine spinis, omnino glabris inuenia-
tur uirgēs. Folia à tergo candidiora habens, quam su-
pradictus. Fructus quoq; Solstitio maturare inci-
pit, qui rufus & leniter hirsutus est. Germani hunc
Rubū priuatiū Simper / & Mora eius Simpern
uocant, quae gustu iucundiora quam prioris Rubi fru-
ctus percipiuntur. Ruellius sine dubio cognouit hunc
idem Rubū, atq; à Gallis Framboſiam appellari.
Idem Ruellius fraga idaei rubi speciem quandam es-
se putat, nec male, si non idaeus rubus frutex, & fra-
garia exilis herbula esset, quae tota folijs, floribus &
fructibus constat: neq; enim statu dignos caules, neq;
ramos aliarum herbarum modo habet.

HELXINE. Ca. XXXI.

Duae sunt herbae Helxine appellatae. Una Cys-
sampelus Graecis, Latinis Conuulululus uoca-
tur, Altera uero Parietaria Latinis dicitur. Vergilio
autem Marcellus male Cysſampeli Helxines ca-
put ē Dioscoride quasi adulterium reiecit, Nihil o-
minus tamen nomina eius in Helxines (quae Parietar-
ia est) capite relinquens, ut siue Cittampelon, Cys-
sampelon, Melampelon, & Cysantheumon. Helxine
igitur, quae Cysſampelos uocatur, à Germanis Wina-
den / Wede winden / & Saunwinden appella-
tur, cuius flores haecenus Ligustrum interpretati
sunt apud Verg. magno errore, ut in primo libro in-
dicauimus. Nascitur etiam in segetibus Helxine, gra-
cilibus & oblongis folijs, flore praedicti floribus simi-
li, sed secundum proportionem minore. Vtraq; lacte-
um liquorem confracta remittit, haec Bornwinden
Germanis appellatur. Huic Helxine Elatine similis
est, propterea Serapio statim post Conuulululum Ela-
tinen (Dioscoridem citans) describit. Idem tamen
Serapio Cysſampelon Asculi, Elatine uero à Athini
corruptis ab Helxine & Elatine nominibus, appella-
lat. Altera uero Helxine, quae Parietaria, Perdia-
tium & Muratium dicitur, in parietibus & muris
sub stillicidijs nascitur, unde à Germanis Trauſſo
Traut uocatur. Huc similis est Alsine, cuius caput
in secundum librum ante Auriculam muris ab ali-
quo transpositum est. Nam hoc loco omnes quatuor
illae herbae describi debent, scilicet Helxine duplex,

A id est, *Cysampelos* & *Parietaria*, illisq; similes *Elatine* & *Alfine*. Hunc enim ordinem ipse Dioscorides in describendis his herbis seruauit. In multis hodie Pharmacopolijs *Alfine* (id est, *Tag vñ nacht*) *Parietariam* uocant, sed magno errore. Nam *Parietaria* tantum in silicidijs circa muros & parietes nascitur, *Alfine* uero ò in syluis, plurimum à parietibus distante natali, à quo utraq; nomen suum inuenit. Cum autem hoc loco de *Alfine* mihi sermo sit, nequaquam omittere possum, magno errore apud Plinium *Helxine* appellatione *Carduum* quendam describi. Verba Plinij ex lib. 21. cap. 16. hæc sunt: *Helxine* rara usque est, neq; in omnibus terris: est radice foliis, ex qua media ueluti malum extuberat, contextu sua fronde. Huius uertex summus lachrymam continet iucundi saporis, *Acanthiden* *Mastichen* appellatam. Hæc autem de uerbo ad uerbum ex Theophrasti libro 6. cap. 4. de plantarum historia desumpsit Plinius. Theophrastus uero hoc loco non *Helxine* habet, sed *egivv*, quæ *carduus* pinea à Theodoro interpretatur. Plinium secutus est Hermolaus Barbarus, qui eadem in Corollario huius cap. scribit. Hunc autem errorem facile in librarios & scriptores reiecit rei aliquis Collutius, nisi ipse Plin. lib. 22. cap. 17. ubi Dioscoridis *Helxinem*, id est, *Parietariam*, siue *Perditium* describit, scriberet, se, qualis uera esset *Helxine*, in prioribus dixisse, hoc est, ubi *Helxinen* pro *ixine* apud Theophrastum legit, ut supra demonstrauit. Grauem hunc errorem nullus adhuc in Plinio animaduertit, quamuis toties emendatus, & reprehensus sit. Sed satis esset, si quicquid errores corrigeret, qui post uitam Plinij librorum incuria irreperunt. Nam omnes ipsius auctoris errores corrigere, onus esset ualde impar unius uiri humeris.

ELATINE. Ca. XXXII.

Elatine, ut iam diximus, *Helxine* *Cysampelo* similis est, florem habet ualde exilem, & triquetrum semen lacteum liquorem non remittit, quæ sola nota à *Cysampelo* distinguí potest. Nascitur in aruis & cultis locis, Germanis *Edwinden* appellatur. Hodie nullus illius est in Medicina usus.

EUPATORIUM. Ca. XXXIII.

Eupatorii nomine non omnes Pharmacopole eandem herbam ostendunt. Ut autem breuiter dicam: Nullus uerum *Eupatorium* cognouit, præter eos qui hodie *Agrimoniam* uocatam herbam *Eupatorium* uocant. Nam reuera *Eupatorium* est ea quæ nunc falsò appellatur *Agrimoniam*; qui error Dioscoridis etiam ætate fuit. Propterea illius auctores à Dioscoride in hoc cap. iure reprehenduntur. Sed tanta fuit hæcenus barbaries, ut nullus eam reprehensionem animaduertit. Dudum de hac re scripserunt Leoniceus, patens meus, & alij plures, quibus etiã ipse Ruellius subscribit. Germani *Odermentig* & *Leberfletten* *Eupatorium* uocant.

QUINQUEFOLIUM.

Cap. XXXIII.

Quinquefolium Græci *πεντάφυλλον*, Germani *Sünfflat* & *Sünffingerkraut* appellant. Serpit per terram multis & longis uiticulis, ex geniculis singulis radices in terram demittentibus. Est etiam sine dubio *Pentaphylli* species, quæ *Tormentilla* appellatur: quod ex foliorum & florum figura, & totius herbe sapore, temperamento & uiribus iudicare quibus potest. Quapropter illi minime sunt accusandi, qui *Tormentillam* *πεντάφυλλον* esse scripserunt. Hi autem qui omnino nos uero *Pentaphyllo* carere scriptis prodiderunt, nullo modo probandi sunt. Vbiq; enim in Pharmacopolijs uerum habetur *πεντάφυλλον*.

PHOENIX. Ca. XXXV.

Phoenix hæc herba à punice coloris semine dicta fuit. Est autem frumentacea & spicata plantata, in aruis & recenter illitis luto maceris nascens, & Germanis *Meuse Farn* / siue *Meuse gersten* appellatur.

IDAEA RADIX.

Cap. XXXVI.

Idaea radix qualis sit, hodie omnino ignoratur. Nomen inuenit ab Ida monte, in quo fortè copiose nascitur. Quapropter non credo ubiq; eam apud nos provenire.

RHODIA RADIX.

Caput XXXVII.

Ex Macedonia olim *Rhodia* radix in Græciam ferebatur, propterea radicem tantum descripsit Dioscorides: filia uero, caules, & alias eius partes quales sint, nullus unquam scriptor prodidit. Radicis tamen tam certè à Dioscoride afferuntur notæ, ut facillimè deprehendi possit, si modò aliquis in eam incidat. Ego cum præterito anno apud circensianum Herbarium radicem quandam uiderem omnes notas habere, quas Dioscorides *Rhodie* tribuit, statim iudicavi eam *Rhodium* siue *Rhodiadaram* dicem esse, simulq; nomen ab eo querens, quod *Rosaria* erat. Cum autem audirem ipsum quoq; nomen conuenire, nihil dubitabam. Emptam itaq; radicem terrore mandavi, quæ proxima ætate caules, folia, flores, & semina maiori *Crassulæ* familia protulit. Eandem radicem cum in Italia uidisset Georgius Agricola Medicus, harum rerum studiosissimus sectator, statim ipse quoq; iudicauerat eam *Rhodium* esse, cuius partem apud illi uidimus, estq; omnino cum nostra hæc eadem. Idem Agricola *Portulacæ* siue *Crassulæ* folia *Rhodium* radicem habere in Italia obseruauit, qualia etiam in nostra domum ab illo reuersi inuenimus. Cum igitur diuersorum hominum iudicia in eadem re conueniant, respondentibus etiã omnibus descriptioni notis, nihil est, quod aliquis dubitet, Ro-

A sariam esse Rhodiam radicem, quam Germani Rosenhurg appellat. Nascentur copiose in Alpibus circa Saltzburgum. Porro illud constanter dicere austinum, Galenum hanc radicem non cognovisse, quoniam eam calidam in secundo, siue in principio tertij esse scribit. Quod temperamentum ex uiribus, quas Dioscorides illi tribuit, collegit. Verum cum ipse quoque Rose similiter ut Rhodia radix, capitis doloribus medetur, nec tamen calide sint, falsa est hæc ratiocinatio. Galenus autem Rhodiam radicem tantum digerendo capitis dolores pellere credidit, cum tamen id partim propter repercutiendum, partim etiam propter aliquam partium tenuitatem faciat. Constat enim ex contrariis qualitatibus, humida ac calida, scilicet terrea et frigida, quemadmodum ipse etiam Rose, quod ij qui plantarum odoribus nates, et saporibus linguam excruciant, facile percipere possunt. Nam odore, sapore, et colore omnino rosas imitatur Rhodia radix.

EQVISETVM. Ca. XXXVIII.

Hippuris, Cauda equina, siue Equisetum, à Germanis Rassenkraut / Rosangel / Schaffschänke, et Taubenroß / id est, Columbina colus, appellatur, quoniam præludum quoddam ante germinationem colo in torulos tornata simile, et cum pès inuolutum, primo uere emittit. Longiora folia et teneriorem habet caulem, quam Polygonon scemina, nec in aquis, ut illud, promouit. Facile igitur ab inuicem discerni possunt.

EQVISETVM ALTERVM.

Alterum Equisetum priori simile est, breuioribus tantum folijs. Quapropter non existimo hoc genere ab illa differre, quoniam primam etiam Hippurim multum mutari secundum diuersos natales obseruauimus.

TRAGIVM. Cap. XL.

Si (ut Dioscorides scribit) sola Creta Tragum gignit, nulla nobis spes est, quod in nostris regionibus inueniatur.

ALIVD TRAGIVM.

Aliud Tragum quo iam nomine appelletur, uel an apud nos promoueat, nondum compertum est.

TRAGVM, HERBA.

Caput XLI.

De Trago hac parens meus in Botanologico suo differuit, qui primus eam in lucem resum restituit, Germani Hünnerber / siue Hünnertraben uocant, quidam etiam Bagentrenblin: Sed hoc nomen latius patet. Itali Pegnellam dicunt, quod oblongi eius acini, quos pro folijs habet, Pineis nucleis similes sint. Nascentur maritimis litoribus flu-

minibus imminentibus apricis petris, et in muris, aliquando etiam in tegulis. Antonius Musa errat longe, quod Italorum Pegnellam Aizoon minus dicat esse. Sunt enim tam similes inuicem herbe, ut non facile à quouis discerni possint, minus Aizoon et Tragus. Propterea utriusque differentias ponere non erit inutile. Dioscorides Aizoon minori ἐν δὲ χαλῶ γὰρ tribuit. Significat autem hoc loco χαλῶ γὰρ non simpliciter uiridem, sed luteum et modice ad uiridem inclinatam colorem. Theophrastus etiam per χαλῶ γὰρ simpliciter luteū intelligit li. 7. de hist. plantarum in fine capi. 13. Vbi Anthemi, id est, Chamameli flores, foris candidos, intus uero χαλῶ γὰρ esse scribit. Eo loco Gaza male uiridem, interpretatus est. Nam omnes uidemus, Chamameli flores in medio non uiridem, sed luteum colorem habere. Eripse Dioscorides medium floris Anthemidis ad aurum colorem inclinare scribit, qui plurimum à uiridi differt. Quapropter cum Aizoon minus ἐν δὲ χαλῶ γὰρ, id est, luteos flores habeat, quos sepius etiam nos in ea herba uidimus, nullo modo Pegnella minus Aizoon esse poterit. Habet enim Pegnella, id est, Tragus, non luteos, sed candidissimos flores, quos in omnibus locis producit. Hinc est quod nullos flores in Trago describit Dioscorides.

IVNCVS. Ca. XLII.

Σκοῖνος Græcis in genere omnis Iuncus dicitur. Germanis Dingen et Gempren. Habet autem multas species Iuncus. Est enim mollis acumine quidam, qui ubique apud nos in aquis nascitur, et priuatum à Græcis ὀξὺς λέγεται, id est, leuis siue lenis Iuncus appellatur. Qui uero à mariiinis nascitur locis, acuto et ad uulnus infesto est acumine, ὀξὺς ὀξὺς uocatus. Grandis uero Iuncus in lacubus et stagnis nascens, quæ Græcis ὀλὸξ ὀξὺς. Germanis Rosbingen / siue Pferdesbingen, Latinis Mariscus nominatur. Est et quartus Iuncus Euripici nomine, quamuis quedam exemplaria Dioscoridis Aethiopicum eum appellent. Sed ut meam opinionem dicam, nullus est hoc nomine apud omnes alios autores Iuncus. Quapropter necesse est hunc loco subesse mendam, et neq; Aethiopicus, neq; Euripicus legendum. Nam Galenus, qui Iuncorum species et uires ex Dioscoride collegit, nullam facit Euripici siue Aethiopici Iunci mentionem. Et quod hic de Euripico legitur, ille de Holoschoeno scribit. Serapio etiam qui de uerbo ad uerbum Dioscoridis caput de Iunco interpretatur, nullum Aethiopicum siue Euripicum Iuncum habet, sed similiter ut Galenus de tertio Iunco, id est, Holoschoeno eadem scribit, quæ nunc in exemplaribus Dioscoridis Euripico siue Aethiopico tribuuntur. Quapropter audacter ex Dioscoride hæc due dictiones rejiciende sunt, Aethiopicus siue Euripicus, et in locum ὀλὸξ ὀξὺς substituenda.

LICHEN.

A LICHEN, HERBA.
Caput XLIII.

Lichenen Græci hanc herbam appellant, quod amore Lichenis, id est, impetiginis in humidis et umbrosis petris serperet. Serapio eam Hærez Al sacher appellat, interpres uero Epaticam reddidit. Vulgo enim Epatica herba uocatur, quam Lichen ueteres dixerunt. Sed præter hanc innumeras alias habens Epaticas, qui uulgaribus & à nullis autoribus traditis nominibus delectantur. Lichen autem (ut ad rem nostram redeamus) herba est in humidis & umbrosis petris, nonnunquam etiam in gelidum putcorum lapidibus serpens, quam quidam Epaticam, Germani Steinflechten & Mäsflechten appellant, neque caulem, neque flores, neque semen habet, quamuis interdum breuissimos quosdam pediculos, parua ceu acetabula ferentia protrudat. Sed hæc neque flores, neque caules, neque semina propriè dici possunt.

PARONYCHIA. Cap. XLIII.

Paronychia quo nomine iam appelletur, non quis dixerit.

CHRYSOCOME. Ca. XLV.

Similiter etià ignoramus, quid Chrysocome sit, cui nomen aurei coloris corymbi indiderunt. Sa racenica tamen Mentha, quam recentiores Græci Costum herbam, Germani uero Marten minge appellant, sine dubio est Chrysocome cognata. Habet enim in summis caulibus aurei splendoris corymbos, & veratro nigro similes radices. Estque herba tota cum radicibus admodum odorata.

CHRYSOGONVM. Ca. XLVI.

Chrysogonon ab aurei coloris semine nomen suum inuenit. Quo uero nomine hodie uocetur, et an apud nos proueniat, omnibus adhuc ignotum est.

HELIOCHRYSUM.
Cap. XLVII.

Heliocryson apud Theophrastum Aureliam interpretatur Theodorus Gaza. Est autem herba que in Pharmacopolijs Stichados citrinum, & Germanis Reinblüm / Steinblüm / Winterblüm / & Jüngling uocatur. Malè in hoc capite aquosus conuallibus interpretatus est Verg. Marcel. Nā in Græcis codicibus *ἡλιόχρυσον* & *ῥομαίος* legitur: quibus uocabulis significantur torrentibus & imbribus abrupta loca, que aliàs sicca sunt, præterquam cum per ea imbrium torrentes delabuntur. Huiusmodi enim locis in aspero sabulo Heliocrysum nascitur, & nunquam in aquosis uallibus. Nam aspero, arenoso & sicco solo gaudet. Apud Gal. & Aegnetam per Amaranthum Heliocryson est intelligendum. Nam huius etiam flores, quemadmodum purpurei Amaranthi, non marcescunt, ut nomen indicat.

si quis autem illorum autorum edita de Amarantho Dioscoridis Heliocryso conferat, omnino eandem herbam esse pronunciare cogetur. Purpurea uero Amaranthus nullam facit Medicinam, propterea ab hoc autore non descripta est. Ruellius minime uerum Heliocryson indicat, qui lib. 3. cap. 24. Stechados citrinum ueram Stechada esse dixit, magno ipsum errore. Nam Stechas uera longe alia est herba, quam quæ Sticados citrinum uocatur.

CHRYSANTHEMV M.
Caput XLVIII.

De Chrysanthemo in Bupthhalmo differimus, ubi eam à Germanis Goldtblämen appellari indicauimus.

AGERATVM. Ca. XLIX.

Ageraton quo nomine iam appelletur, & an in nostris etiam regionibus nascatur, nulli cognitum est.

VERBENACA RECTA.
Caput L.

Verbenaca hæc recta dicitur, quod rectis surgat caulibus. Germani hanc Samentamp appellant. Nascitur aquosis locis.

VERBENACA SVPINA.
Cap. LI.

Hæc autè Verbenaca resupinatos erigit caules, & ubique adhuc in Pharmacopolijs Verbenaca, & à Germanis Eisenkraut / siue Eisenhart appellatur. Columbe utraq; Verbenace delectantur, unde illi *ἡ ἑλισβε* uocem nomen Græci indiderunt, qui eam *ἑλισβε* *ἑλισβε* etiam, id est, Sacram herbam uocant. Sunt hodie aliqui qui luteis & paruis floribus herbam quandam Verbenacam feminam uocant, sed eam Irionem esse secundo lib. docuimus: nihil enim cum Verbenaca commune habet.

ASTRAGALVS. Cap. LII.

Astragalus herba à radicum, cum talis, similitudine appellata est, hodie autem quid sit, ignorant omnes. Ruellius tamen cognoscere uisus est sibi, cui cum ratione est adhibenda fides. Nascitur ubique editis fruticosisque locis. Germanis Knollens Kraut uocatur, quibusdam Chustianwurms.

HYACINTHVS. Ca. LIII.

Quantum ex poetis & alijs Reirustice scriptoribus intelligere possumus, non unius tantum herbe nomen Hyacinthus fuit. Nam Irin quoque Hyacinthum aliqui nominarunt, & poetæ lilio similem Hyacinthum esse dicunt, colore tamen differre, quoniam Lilio insit argenteus candor, Hyacintho uero purpureus color. Porro Hyacinthus quem Medici intelligunt, parua herba describitur, multis & purpureis in coma gibbosa constitutis floribus. Hunc licet hodie omnino ignoremus, spero tamen

A me, quid reuera sit, non ita post longum tempus assecuturum. Nasceitur in Comitatu Mansfeldensi iuxta montem Petri coptose, & Germanis Bieunling vocatur.

PAPAVER ERRATICVM.

Caput LIII.

MΥΡΩΡ ποῖος, Latinis Papauer alis, & Papa uer erraticum. Pharmacopolis Papauer rubrum, Germanis Wilder mahn/ Selot mahn/ Bozmahn/ Bozmosen. Klapper rosen / & Altschen dicitur. Notum omnibus erraticum Papauer est, nascitur in arvis & segetibus. Sciendum est in hoc cap. improvidè comparari huius Rheadidis Papaueris folia Origani & Thymi folijs, Non posset dissimilis esse horum proportio. Habet enim Rheadidis Eruce siue Cichorii modo incisæ folia, à qua similitudine longissimè recedunt Thymi & Origani folia. Abundant igitur & ab alijs malè adiecta sunt uocabula ista. Vehementer errant, qui hoc Papauer cornutum Papauer & Memythen, id est, Glaucion esse putant. Est enim quilibet illarum ab alijs diuersa, & proprii generis herba.

SATIUM PAPAVER.

Caput LV.

MΥΡΩΡ ἡσίοϛ, id est, satium Papauer, quod Germani Mähm/ siue Mägen uocant, duo prima diuisione genera habet. Thylacite ab oblongo & utriculis simile capite nominatur, habet hoc candidum semen, quod hodie Papauer album dicitur. Alterum uerò nigrum semen in lato sessili & doliole simili capite, unde etiam à Græcis Psithi nominatum est, uulgo hoc nigrum Papauer à Pharmacopolis nuncupatur. Ex nigro hoc Papauere lacteus liquor leniter incisus uasculis colligitur, quem Opium in omnibus adhuc Pharmacopolijs nominant. Exprimitur etiam ex tuis folijs & uasculis succus, & exsiccat. Eum priuatim Græci Μυκώρειον uocant, sed utribus multo est liquore imbecillior, propter incoactam & aqueam substantiam, eandem ob causam facilius putrescit & teredines sentit. Quidam interpretes cum apud Græcos autores Opon, siue Opium legunt, succum Papaueris interpretantur: sed magno errore Nam Μυκώρειον succus est Papaueris, Opus uerò siue Opium, est liquor eiusdem.

PAPAVER CORNUTVM.

Caput LVI.

MΥΡΩΡ πετρίτης, Latinis Corniculare, siue Cornutum papauer, Germanis Horn mahn appellatur. Non habetur hoc in nostris Pharmacopolijs. A quibusdam tamen in hortis seritur. Si aliquam habet longam Fœnugreci silique equalem. In Dioscoridis exemplaribus malè legitur μυρωρ

de μανγός, id est, fructum breuem, ut Vergilius Marcellus interpretatus est. Cum uerò eundem fructum cornu modo inflexum, & Fœnugreci silique similem esse dicat, nequaquam μανγός sed μανγός legendum est, quod ipsius fructus oculis subiecta forma manifestè indicat. Serapio quoque, ubi hoc Papauer de uerbo ad uerbum ex Dioscoride descripsit, dicit, illud habere semen minutum in subtilibus & longis uagnis. Errant qui cornutum Papauer esse putant in segete nascentis Papauer, quod antea Rheada nominauimus. Differt etiam ab hoc Papauere cornuto Memythe, id est, Glaucion, ut prius aliquoties indicauimus.

PAPAVER SPVMEVM.

Caput LVII.

MΥΡΩΡ ἀπὸ πόντου, quod quidam etiam Heraculeum, siue Heracilion uocant, ignota omnibus nunc est herba, neque ipse Plinius eam cognouit. Nam libro 20. cap. 19. de hoc Papauere sic scribit: Alterum è folijs tribus genus Heracilion uocatur, ab alijs Aphron, folijs (si procul intuearis) speciem passerum representantibus, radice in summa terræ cute, semine spumoso, ex hoc linea splendorem trahunt æstate. Hæc autem de uerbo ad uerbum ex Theophrasti de Hist. plant. libro 9. cap. 13. desumpsit Plinius. Sed nequaquam Theophrasti mentem intellexit. Nam hic Papaueris huius folia Struthi siue Struthij herbe folijs comparauit, quæ lanaria radice etiam appellatur, quod scilicet radice eius lana & linteæ candorem acquirant. De Struthio hoc in secundo libro differimus. Commisit itaque hoc loco Plinius duplicem errorem, utrumque satis magnum. Primus est, quod pro herba Struthio passerem animal interpretatus sit. Alter uerò, quod dixerit, Papauere linea candorem trahere. Cum igitur Struthos passerem etiam significet, facilius esset prior error, nisi ipse Theophrastus aperte indicaret, se non passerem, sed herbam Struthi appellatione intelligere. Dicit enim Heracilion Papauer folijs consistare Struthi, quo splendore in linteis tribuant. Candorem autem linteis non passere, sed herba lanaria, quæ Struthos siue Struthion Græcè dicitur, tribuit. Potuisset etiam ex hoc colligere Plinius, Theophrastum herbam & non auem intelligere, cum sic de Papauere Herculeo scribat: Constat folio Struthi. Quibus uerbis aperte indicatur, Struthion folia habere, quod plantis & non animalibus proprium esse omnes nouerunt. Ne autem alicui incredibile uideretur, herbe huius folia passeris specie habere, Theophrasti uerbis hanc parentthesin adiecit Plinius: Si procul intuearis.

HYPECOVM. Ca. LVIII.

ΜΥΡΩΡ quo iam nomine appellatur, nullus adhuc

A adhuc scriptis prodidit, neq; aliquis ex doctis nouit. Propterea ubi quoz; ueniam dari non est iniquum, quod ipsum non noverim.

APOLLINARIS. Ca. LIX.

Y *Ορνυμ*. Latinis Altercum, Apollinaris, Symphoniaca, & Hyoscyamus, Germanis *Miljenica* uocatur. Tres habet differentias. Est enim purpureo flore & nigro semine quædam. Altera florem luteum & semen subflauum habet: utraq; apud nos non nascitur, & quoniam uenenata sine, nihil refert quod ijs careamus. Tertia omnium est innocentissima, que flore consistat albo, sed in medio purpureo, & semine candido. Nascitur hæc apud nos ubiq; in rudertibus, siccis, & circa oppida paucisq;.

PSYLLIVM, SIVE PVLICARIS. Caput LX.

Y *Ψυλλο* & Pulicaris dicta hæc herba est, quod semen eius colore & quantitate pulicibus simile sit. Notum hoc est eodem nomine omnibus Pharmacopolis. Herba ipsa sponte apud nos etiam & copiosissime nascitur, præsertim luteri boci, & uicinis locis.

SOLANVM QVOD EDENDO EST. Cap. LXI.

B *Στρυχον* & *κνιτιος*. Latinis Solanum & Cacubulum, Pharmacopolis Solatrum, Germanis *Wachtelshatten* uocatur. Multa sunt Solani genera, que deinceps enarrabimus:

Hoc loco Dioscorides uulgare Solanum intelligit, quod nos simpliciter *Wachtelshatten* & Pharmacopole Solatrum appellant. Sciebatur olim cibi gratia. Nos uero illud in cibo uitamus. Theodorus Gaza omnes Solani species Vesicarias apud Theophrastum interpretatur, sed malè. Nam Vesicaria speciale nomen est, & uni tantum Solani speciei proprium, que fructus uescicis similes fert, unde & nomen inuenit.

VESICARIA.

A *Λυγισκος*, quod *φυσελιδ* & etiam hic auctor & Aëtius uocat, Arabibus & Pharmacopolis corrupto ab Halicacabo nomine *Alkekengi* dicitur, Germanis uero *Juden Fressen* / *Blasen* / *Blasen Fressen* / & *Echylluten*. Nascitur circa uineas sponte, in quibusdam etiam locis in hortis feritur: fructum habet in rubenti & leniter turbato folliculo cœu uescicæ, croceum, & Ceraso magnitudine æqualem.

SOMNIFICVM SOLANVM.

Caput LXII.

Σ *Τρυχον* & *ενοβλιον* hodie ignoramus, id tamen certum est, Amarum dulcem, id est, *Telenger* & *lieber* / huius ualde cognatæ esse. Folij e-

nim florum forma, fructu & uiribus (quas in me ipso expertus sum) Solanum refert.

SOLANVM FVRIOSVM.

Caput LXIII.

Σ *Τρυχον* & *ενοβλιον* in Aegypto copiose nascitur, unde ad nos fructus eius afferuntur, quos Pharmacopole Cuculos de Levante, id est, Solanum orientale uocant. Nam Cuculus idem est quod Cacubulus siue Solanum, Levante uero Itali orientem à leuando uocant. Antequam autem ad nos perferatur hi Cuculi, omnino excicantur interiores nuclei, & succosa caro que corticem ambit. Semel satis recentes uidimus. Pisces quamprimum eos deglutierint, uertigine corripiuntur, & supra aquas innatant, ita ut facillime manibus apprehendi possint.

DORYCNIVM. Ca. LXIII.

N villus ex ueteribus tum Græcis tum Latinis, hanc herbam descripsit, præter Dioscoridē, qui historiam eius ex Cratæa desumpsit. Plinius & alij quidam crediderunt, Dorycnium idem esse cum Solano furioso, quod falsum esse Nicander, Dioscorides, & plures alij testantur. Reuera autem sui generis herba est Dorycnium, de quo meam opinionem paucis præferam: scribitur à Venetis monachis, & à paucis in Germania Medicis herba, quam Grana cordis & Halicacabum alterum uocant, ab Halicacabi fructus similitudine. Habet hæc herba omnes notas & uires, quas Nicander & Dioscorides Dorycnio tribuunt, sola tamen folia non conueniunt, que Dioscorides oleæ folijs similia esse dixit. Sed hoc me nihil mouet, Desumpta ex Cratæa est historia, potuitq; corrumpi locus iste, ubi de folijs agitur. Respondent candidi flores, folliculi, unde etiam Halicacabus à ueteribus & nostris appellatur. Conueniunt etiam adamussim in folliculis contenta, rotunda, dura, leuia & colore uaria semina. Conuenit etiam eorum numerus, & commanducata lacteum habent colorem & saporem, quas notas Dorycnio Nicander tribuit. Quinetiam somnificæ sunt eius semina, nec sine periculo uitæ intra corpus sumuntur. Quapropter cum omnes aliæ notæ conueniant, uerisimile est in foliorum comparatione mendam esse. Seuius hæc herbam uidimus & gustauimus. Propterea non ex aliorum relatione ista de Dorycnio scripsimus. Grana eius comesta suauiorē somnum quam Opium afferunt: Sed cauendus est magnus illorum numerus.

MANDRAGORÄ. Ca. LXV.

Non sine causa turbabitur, qui Theophrasti & Dioscoridis de Mandragora uerba considerabit. Dioscorides enim Mandragoræ primi fructus sorbi magnitudine, & luteo colore esse dixit, quamuis Marcellus malè uittellis onorum interpretatus sit, rarus & uis legi oportere, que uox onæ, non onorum uittellos significat. Probati codices *oues*, id

A est, sorbis, habent, ubi Serapio Mespilum interpreta-
tus est, sed male. Hoc autem peccatum potius inter-
pretati, quam Serapioni adscripsim. Alterius uero
male, siue fructus, duplo maiora, et croceo colore
defunxit, utriusque etiam caulem negat. Sed Theophras-
tus Mandragoræ caulem esse manifestè indicat, de
histo. plant. lib. 6. cap. 2. Vbi fructus eiusdem niger
et acino uivæ similis describitur. Sed male præ-
terea racemosus reddidit Gaza. Nam præterea præpos-
itæ acinum significat, unde derivatur γαρδαδus, quo
uocabulo acino uivæ simile quiddam Græci intelli-
gunt. Ruellius non racemosum, sed ovum legi oportere
apud Theophrastum censet, sed magno errore.
Non enim corruptus est iste apud Theophrastum lo-
cus. Cum uero contraria omnino sit Mandragoræ hi-
storia apud Theophrastum et Dioscoridem, facile
temerarius quidam alterutrum auctoritatem mentis esse
se pronuntiare: quod ne aliquis faciat, moneo et
suadeo. Nam utriusque satis exquisitè et optime Man-
dragoræ historiam excutus est, (quod fortasse Pa-
radoxon alicui in debetur.) Sed illud nunc demonstra-
re incipiam: Dioscorides tres Mandragoræ species
enumerat, Theophrastus autem unum tantum, Dio-
scorides autem marem et feminam Mandragoræ,
id est, priores duas species, quas solas uiderat, descri-
psit ea forma, qua adhuc in Italia cognoscuntur.
Quoniam et ego fructus et semina uidi, plantam et e-
nata folia historiæ conuenire animaduerti. Hos duos
B Mandragoras Theophrastus non cognouit, neque ali-
quam eorum mentionem facit. Tertiam uero Man-
dragoræ speciem, que Morion priuatum dicitur, Dio-
scorides non uidit, ut ex uerbis illius aperte colligi-
mus, et hæc est quam Theophrastus describit Man-
dragoræ: grandem habet radicem, caulem procerum,
folia Solani et Mandragoræ prioris foliorum mediâ
habent figuram, flores profert nigros, et post hos ni-
gros fructus grandi uivæ acino æquales (id est, wie
ein grosser Weinber) qui uinosum succum gustu-
tus emittit. Vidimus eam plantam in Hesiæ umbro-
sis et antiquis syluis iuxta speluncas nasci, Hesiæ
Dollærant dicitur, quo nomine Græcorum Morion
interpretantur, Alij etiam Schlaffber eam uocant,
quoniam soporem fructus eius faciunt. Porro nullum
tam stupidum esse existimo, qui credat in humanam
formam sculptas illas radices, quas Agyrtha osten-
tans, Mandragoram esse, Veri Mandragoræ radicis
cortex in Pharmacopolijs suo genuino nomine habe-
tur.

ACONITVM PARDALIANCHES.
Cap. LXVI.

Pardalianches Aconitum, quo pantheras uenato-
res necant, hodie nulli cognoscitur. Si tamen
huius historiæ cōferamus herbam, quam nos ab uno
fractu, quem solum fert, Einber uocamus, uiresque
consideremus, manifestè uidebimus eam hoc Aconi-
tum esse, quod Theophrastus alibi Teliphonon, alibi

Μυόφωπον, alibi etiam Scorpionem uocat, quoniam
radicem habet graminis modo geniculatam, et scor-
pionis caudæ similem.

ALTERVM ACONITVM, ID EST,
Lycostonon, siue Cynostonon.

Aconitum quod Lycostonon et Cynostonon
dicitur, quoniam lupos et canes interimat,
tres habet differentias: quarum una, que est effica-
cissima, à Pharmacopolijs habetur, et ab his radi-
x Aconiti dicitur. Germani uero Græcum nomen Ly-
costonon interpretantur. Nam Wolfswurz à no-
bis appellatur, quod uenatores Lupos et Vulpes
eius radice necent.

CICUTA. Ca. LXVII.

Kueidj Latini Cicuta, Germani Wüsterich
et Wütscherling uocant. Nō cognoscitur
ab omnibus Cicuta. Nam aliam herbam miramē uene-
natam hoc nomine habent Pharmacopoliæ, cuius se-
men longum et gracile existit, ideoque creditur apud
nos non esse uenenata Cicuta. In causa est, quod ue-
ram Cicutam non nouerunt, que in nostris etiā ter-
ris præfens est uenenum: quod manifestissimis ex-
emplis probari potest. Non enim rarò contingit pueros
radice et semine eius, quod Aniso æquale est, uesci
et intermori. Habet Cicuta foetidissimum odorem,
quo solo statim abominabile eius uirus percipitur.
Sunt autem plures eius species.

TAXVS, ARBOR:
Caput LXVIII.

Taxus arbor, que à Græcis Ζυλάξ appella-
tur, uenenum est. Ideoque oportet, ut diligen-
ter animaduertamus, quam rem intelligant scripto-
res, cum Smilacem apud eos legimus. Nam præter
hanc arborem due sunt adhuc plantæ, que Smilaces
appelluntur. Una lenis siue satiuâ dicitur Smilax, id
est, Dolichus. Altera aspera est Smilax, siue Hedera
Cylissâ. Est autem Taxus arbor sine dubio ea, quam
nos ein Eiben uocamus, è cuius ligno adhuc arcus
et scorpiones fiunt, quos optimas ex Taxo fieri au-
tores tradunt. Hi autem maxime errant, qui Eiben
Ebenum esse credunt, sola nominis similitudine de-
cepti. Noluit in primo libro inter arbores describe-
re Taxum Dioscorides, ne cognata facultate prædi-
tæ res distraberentur. Cum igitur Taxus uenenum
sit, non immeritò hoc loco inter uenenas plantas
recensetur.

APOCYNVM. Ca. LXIX.

Apocynon qualis sit herba, hodie omnino igno-
ramus. Cognominatur hæc etiam Cyno-
crambe, quoniam canes interimat. Porro alia est et-
iam que proprio nomine Cynocrambe uocatur, ut
suo loco ostendemus. Quapropter uidentum est, ne
diuersæ naturæ res confundamus.

NERIVM

NERIVM. Ca. LXX.

Nerion quod aliqui Rhododaphnen & Rhododendron, a rose simili flore uocant, arbor est quibusdam temporibus uenenata, e cuius & Aconiti floribus in Ponto uenenatum mel apes colligunt. Arboscula hac in nostris regionibus non nascitur, in Italia a quibusdam in hortis ostentationis causa plantatur, & nos ipsius semina seuius: fructum habet longum, intus ceu carduorum pappi refertum, qui in quibusdam Dioscoridis exemplaribus male Hyacinthi pappi similes esse leguntur. Cum autem Hyacinthus nullo omnino pappo habeat, legendum est Acanthi, id est, Spinae siue Cardui alicuius, ut probati codices & ipsa experientia testatur. Monendi etiam Medicine studiosi sunt, apud Aeginetium in compositione Eisdre male seorsim legi Flores Nerij & Rosarum Rhododaphnes, Nam eadem arbor Nerion & Rhododaphne est. Rose itaque Rhododaphnes nihil aliud sunt, quam flores Nerij. Videtur itaque flos Nerij interpretatio esse Rosarum Rhododaphne: ad marginem signata, quae postea ab aliquo in dolo in ipsum uerborum contextum posita est. Porro ipse Galenus & Dioscorides diuersas Nerion uires ascribunt. Ille enim Nerion homini quoque uenenum esse dicit: Hic uero homini contra uenena remedium facere. Possent autem hi auctores conciliari hoc modo si intra corpus sumatur Nerion uenenum esse, Si uero foris imponatur, contra uenenatorum morsum Medicinam facere. Sed sic rei ueritas habet. Nam probata exemplaria addunt, & ὅτι οὐκ ἐν τῇ γαστρὶ καὶ ἐν τοῖς μέλεσιν, id est, cum uino pota, uidelicet flores & filia. Sic etiam in Plinio manifeste legitur, qui proculdubio hoc ex Dioscoride transcripsit. Quinetiam in Eisdre antidotum, cuius praecipuus usus est contra uenenata animalia, Nerij flores recipiuntur, ceu medicamentum contra uenena efficax. Id tamen uerum est, florem eius insuam facere, sed non semper. Accidit enim hoc quibusdam locis, & quibusdam temporibus.

FVNGI. Caput LXXI.

Fungorum multiplex est differentia. Quidam enim edendo sunt, quidam uero intra corpus sumpti strangulant. Germani omnes generali uocabulo Schwämme uocant. Qui autem edendo sunt, suis etiam distinguuntur generibus. Sunt enim quidam Piperis sapore, & lacteo liquore manant, hos Germani piffelzwämme uocant. Sunt & Boleti, quos Boletus eadem nostra gens appellat, uenenati Fungi. Multa habent genera, sed omnia poggenswämme, id est, Bufonium cathedra siue selle Saxonicus dicuntur. Sub Betulis arboribus in candido & rufo colore uariis fiuntur Fungi, quos Stiegenchwämme, id est, Muscarios fungos uocamus, quoniam muscas lacte intriti occidunt. Pharmacopole etiam in suis Officinis Fungos habent, quos Boletos & Fungos ceruinos uo-

cant. Ferunt eos in syluis ex semine ceruorum nasci, & et propterea Venerem stimulare, sed falsum hoc est. Inueni enim hos Ceruinos fungos in praeputiis montium syluis, quod ne Dame & Rupicapra quidem peruenire possent, ne dum cerui. Nec uerisimile est eos uenerem stimulare, cum frigidus, putulosus, cradum, & malignum succum in humano corpore egguam. Quae enim Venerem accendere debent, contrarias facultates & qualitates habere necesse est.

COLCHICVM. Ca. LXXII.

Colchicon copiose in Colchide nascitur, unde etiam nomen inuenit. Estque in illis regionibus uenenata herba. Quod uero apud nos prouenit, amarius est, quo sapore ueneni aliqua pars diluitur, nec tamen omnino innoxium redditur. Homines enim quos eo purgauerimus, seuisima incurrit accidentia. Pharmacopole hanc herbam Hermodactylum, Germani Herbsblumen, Wiscusaffraan, et Zeittosen appellant. Quidam huius florem Narcissum esse crediderunt, sed reuera Narcissus purpureum ab hac herba differt. Colchicum aliqui etiam Ephemerum appellant, quod eadem die qua sumatur, hominem occidat.

EPHEMERVM. Ca. LXXIII.

Ephemerum hoc solo nomine Colchico simile est: uiribus enim & forma multum ab illo differt. Alio nomine etiam iris agrestis uocatur. Hodie autem ignotum est.

PALVSTRIS LENS.

Cap. LXXVI.

Φακος ὁ ὡς τὰς ἰσχυρὰς, id est, Lens in lacustribus locis genita. Differt haec a lente legumine. Nam a quibus stagnantibus innatet ceu muscus, munus & compressis folijs constat. Figuram Lentis semina representant. Unde & nomen inuenit. Germanis eadem significatione Wasserlinsen uocatur.

SEDVM MAIVS.

Cap. LXXVII.

Aλζων ὁ μικρὰ Latini Semperuium, siue Vitalem maiorem, Pharmacopole Barbam Iouis, Germani groß Saußwurty, groß Donnerkraut, groß Immergrün, & Saußlauch appellant. Plinius Gramen & Alizon diuersas naturas plantas confudit, lib. 24. cap. ult. errore manifesto. Plinium secuti sunt Hermolaus Barbarus & Ruellius, qui ferè de uerbo ad uerbum illius errorem exscripserunt. Miror autem uehementer hos doctissimos aliquos uiros, istum insignem Plinij errorem non obseruasse.

ALIZON MINVS.

Semperuium minor non est Italis uocata Pegnola, ut antea in Trago demonstrauimus.

A Habet autem alterū Aizoon duas species. Prior Germanice Flein-Hauswurcz / Flein-Donnerkraut / & Flein-Immergrün uocatur. Oblonga, pinguis, & acuminata habet folia, caulem gracilem altitudine dodrātalem, in summo luteos flores, paululum ad uiridem colorem inclinatos, ferentem. Flores huic tribuit Verg. Marcellus Interpres colore pallidos: in Græco uerò $\chi\lambda\omega\pi\alpha$ legitur, quæ uox etiam luteum colorem significat, ut antea quoque dictum est. Serapio uerò eiusque interpretes curinum interpretati sunt, & hoc optime quidem. Recentiores minus Aizoon Vermicularem uocāt, estque frigida herba, ut maius Aizoon, pro qua nostri aliam similem herbulam, sed contrario temperamento, accipiunt.

Alterā minoris Aizoi species incertam habet apud hunc autorem historiam. Corruptum enim uerbum contextus est, quod quilibet in hoc studio exercitatus facillime uidere potest. Plinius uerò optime eā describit, & uidentur omnia eius uerba, quæ facit de tribus Aizoi generibus, ex hoc autore desumpta esse.

Eius autoris uerba ex libro 25. cap. 13. hæc sunt: Quod minus est in muris parietibusque nascitur, et tegulis, fruticosum à radice & sursum usque ad cacumen, folijs angustis, mucronatis, succosis, palmo alto caule, radix inutilis. His uerbis egregie describit primam minoris Aizoi speciem, cui deinde alterum minus Aizoon comparat, dicens: Huic similis est quam Græci Andrachnen agriam uocant, Itali ille-

B ccebram, pusillis, lationibus folijs, breuiore cacumine. Quibus uerbis euidenter indicat eam herbulam, quā Germani Erdpfeffer / Steinpfeffer / & Maurpfeffer appellant. Hæc sola ex omnibus Aizoi generibus calidum habet temperamentum. Propterea eā magno errore pro Vermiculari accipimus. Distinxi mus itaque ab Aizoi speciebus Tragum, & omnes tres Aizoi differentias indicauimus, & scio me in hac re non errare.

ACETABVLVM. Ca. LXXVIII.

Primam uero $\tau\upsilon\lambda\alpha\sigma\upsilon\upsilon\alpha$, quam Cimbation, Scitallion, Acetabulum & Umbilicum Veneris uocant, in nostris regionibus nondum nasci uidimus. Quidam tamen hoc nomine herbam quandam rotundo folio, cui in medio est pediculus, indicant, quam ego probe noui. Nascitur in humentibus & putridis arenosis locis: sed plurimum ab Acetabuli descriptio ne differt, radicem enim habet tenuissimam, Acetabulum uerò oliuæ similem, et grandem. Quapropter qui herbis ignotis ex hoc autore nomina uidere uolunt, ut omnes descriptionum notas considerent necesse est.

ALTERVM ACETABVLVM.

Alterum Acetabulum sine dubio mihi esse uidetur pinguis illa herba, quam recentiores Crassulam maiorem. Germani Setteheine & Donnerbonen appellant. Crassa & carnosa habet folia,

ut Aizoon maius, quæ hyeme uind cum caule exare-sunt.

VRTICA. Cap. LXXIX.

A $\kappa\alpha\lambda\gamma\phi\upsilon$, siue $\kappa\upsilon\delta\phi$, Germanis Nessel appellatur. Nota omnibus herba est. Plures eius inueniuntur species, quam ueteres descripserunt. Semen eius in Pharmacopolijs seruatur.

GALIOPSIS. Ca. LXXX.

Alorum figura nomen hæc herba inuenit, qui hiantibus mustele faucibus similes sunt. Nota omnibus est, Germani eam Hienstaug, & Todt-nesseln / siue Tawbe-nesseln appellant. Videndum tamen est ne quis eā cum Balote, id est, Marubio nigro, simili herba, confundat. Quod ne fiat, foliorum creber intutus faciet. Galioipsis enim longiora & acuminata Vrtice modo folia habet. Balote uerò rotundiora. Inueniuntur etiam Galioipsis species alie, candido, luteo & uario flore. Nam Dioscorides unam tantum speciem descripsit, quæ purpurascens habet flores.

GALION. Ca. LXXXI.

Galion hoc à coagulando lacte nomen inuenit. Duplicis est differentie. Vna enim candidum, altera luteum florem habet: utriusque apazines sunt folia. Flores quamuis parui sunt, multitudine tamen herbam ex longinquo conspicuam reddunt. Germani Raynaisen & Labkraut appellant. Recentiores quidam Aspergulam. Sed latè patet hoc nomen, neque in aliquo probato autore legitur.

SENECIO. Ca. LXXXII.

Epyragos & Senecio hæc herba dicitur, quod flores eius citò in ipsa iuuentute canescant. Magnus hodie in hac herba error committitur, ne dicam maximus. Senecionem refrigerandi uim habet. Hodie uerò Senecionem alij Carduum benedictum, alij Nasturtium aquaticum uocant, herbas in tertio gradu calidas. Verum autem Erigeron siue Senecion, ubique cultis & incultis circa oppida, & in muris nascitur. Itali eam Petrellam, Germani Waldgretse & Creuzkraut appellant. Sunt & huius plures species.

TALICTRVM. Ca. LXXXIII.

Talictron non est Argentina siue Argentilla, ut Ruellius opinatur, neque hoc ille certò affirmat. Verum autem Talictrum est ea herba, quā Germani Seytleblat appellant, quæ rustici in Saxonia maxima curam uulnera, sine aliquo adiutore Medico, nascitur in campestribus & in pratis, non ita humentibus. Sunt autem tres ipsius species, quæ suis differentiis distinguui possunt.

MVSCVS MARINVS. Caput LXXXIII.

Bp. 309

A *Βρύση θαλάσσιον*, Muscus marinus, Plinio La-
thuca simulibus constat folijs, ijsq; rugosis &
contractis, sine caule ab ima radice excurrentibus. Sed
malè ista de Marino musco scribit. Intelligit enim
eam herbam, quam antea Lichena esse ostendi. Mu-
scus uerò marinus multis capillamentis tenuior est,
quàm ut Latucae folijs constare possit. Mihi sine du-
bio Marinus muscus esse uidetur Muscus ille sal-
sus, quem Pharmacopole hodie Corallium herbam,
sive Corallinam appellant. Idem etiam Antonius
Musa iudicat. Afferitur ex maritimis locis, unà cum
adherentibus marinis testis. Est alia etiam herba
nomine Carolina, sive Carlina, cuius in Chameleone
mentionem fecimus.

MARINVS PHYCVS, SIVE ALGA.
Caput LXXXV.

Nobis in maritimis locis habitantibus, omni-
no inco- gita est marina Alga.

POTAMOGETON.
Cap. LXXXVI.

Potamogeton bellè nonisse se credit Vergilius
Marcellus. Interim tamen ait, nomen inuenisse
auiculatorum fluminum, prope quæ nascitur. Quæ
uerba indicant, cum nullo modo herbam hanc cogno-
uisse. Nam Potamogeton in ipsis aquis nascitur, &
tantum folia pauca extra aquas eminentia ostendit.
Quæ uerò iacra sit Potamogeton, nondum con-
stat. Nunc ego herbam Bete folio, sed longiore, quæ
speciatum florem extra aquam erigit. Ipsa uerò lon-
gis uiculis in aqua spargitur, & gustu uehemen-
ter astringit. Nascitur stagnantibus & limosis flu-
uiorum partibus, & in aqua repletis urbium fossis.
Est & alia huic omnino similis, sed rotundior fo-
lia. Quamuis autem omnes huius herbe nota Pot-
amogetoni conueniant, nullam certam tamen senten-
tiam de ea ferre ausim.

AQUATICVS STRATIOTES.
Caput LXXXVII.

Si in Aegypto & Nili inundatione tantum hic
Stratiotes nascitur, ut Plinius scribit, cum in
nostris regionibus querere superuacuum esset labor.
Cum uerò Dioscorides illum indefinitè aquis inma-
rare & sine radice uiuere scribat, soli Plinio non
credo. Quis enim omnium regionum fluuios & pa-
ludes uidit, ut certò affirmare ausit, nusquam nisi in
Aegypto nasci hunc Stratioten? Hodie uerò quid sit
ignoramus. Nomen inuenit, quòd mulieres uulnerati
se hoc curarent. Sed malè cum illis ageretur, si ex
Aegypto Nilo cum toties petere deberet, quoties uul-
nerarentur. Propterea etiam in nostris quoq; fluuijs
inueniri non despero. Inmat enim stagnantium un-
darum superficie ubiq; herba quadam pinguis
folijs, nec nullam è terra habet assurgentem radi-

cem, fibras tamen in aquam spargit, ut lentes aquati-
ce, per quas nutritur. Folium tamen Aizoi folijs si-
mile non est, sed Asuri. Propterea sepe suspicatus
sum, anme Azari pro Aizoi legendum sit. Non pa-
rum certa est Aizoi foliorum comparatio, cum due
potiores species Aizoi sint diuersæ figuræ folia ha-
bentes, nec adiecta sit distinctio, cuius nam Aizoi fo-
lijs Stratiotis huius folia similia essent. Habet au-
tem hæc herba, quæ apud nos prouenit, refrigeran-
di & astringendi uim, ut ipse Stratiotes.

MILLEFOLIA STRATIOTES.
Cap. LXXXVIII.

Xυλίστρον, & ὀσπυλίστρον, id est, Mil-
lefolius Stratiotes, sine dubio est illa herba, quæ
hodie ubiq; Millesfolium uocatur, à Germanis Gars-
ben & Kelschen. Hanc herbam Ruellius antea A-
chilleam esse credidit, sed magno errore. Propterea
nunc etiam non minus in indicando Stratiote terre-
stri siue Millesfolio errat. Nam ferulaceam quandam
herbam, & Dauci speciem Millesfolium Stratiotenef-
se dicit, quæ Daucus asinus, Anethum sylvestre,
& Cuminum syluaticum à quibusdam appellatur.
Quamuis autem Stratiotes hic Millesfolius umbellæ
similes corymbos habeat, minime tamen ex ferula-
cearum siue umbelliferarum genere est. Porro hæc
herba, quam Ruellius Stratioten Millesfolium esse fal-
sò dicit, à Theophrasto Passinaca Patrensis uoca-
tur, nigram habet radicem, sapore & odore Passi-
nace.

VERBASCVM.
Cap. LXXXIX.

Φλόμα, id est, Verbascum multis habet spe-
cies, quas Germani omnes generali uocabulo
Bäntgs Feitzen / Selders Feitzen / et Wullenen aut
appellant. Pharmacopole uerò corrupto nomina
Tapsumbatatum, Barbassum siue Barbatum di-
cunt. Est etiam ferulacea planta Tapsia, ut suo loco
audiemus, sed à Verbascis diuersa.

Porro coronarium Verbascum Græcis Lychni-
tis & Ἀγυράδις nominatur: quoniam ramulis illi-
us & conuolutis folijs pro funiculis siue conuolutis
linteolis in lucernis quidam utuntur. Scribitur hoc
in hortis, folijs constat oblongis & hirsutis, floribus
purpureis rose simpliciter similibus: quamuis etiam
candido colore inueniantur, hos Germani Campe-
losen, Arian rosen / Sammet rosen / & Da-
masten rosen appellant.

AETHIOPIS. Ca. XC.

Aethiopis quæ sit herba, nulli hodie ex doctis co-
gnitum est, quoniam in peregrino & alio quàm na-
stro orbe nascitur.

ARCTION. Ca. XCI.

Arction

A Arcion quo nomine iam appellatur, non constat, quamvis Ruellius hoc cognovisse videatur.

ARCION. Ca. XCII.

Aρκιον, siue αρκωνίς, Latinus Personatium & Lappa grandis, Pharmacopolis Bardana, Germanis Buzenketten & Rosketten vocatur. Confundunt quidam Arcion cum Arcio, ut Brunfelsius & Ruellius, magno tamen errore. Sunt enim diversae herbae, sed facile hoc Librariorum & Chalcographorum incuria accidere potest. Brunfelsius vehementer errat, quod Vngulam caballinam Arcion siue Personatium esse dixerit.

PETASITES. Ca. XCIII.

Pετασίτης à petaso, id est, galero nomen habet. Grande enim illi est folium, quod caput humanum à solis aestu, nice galeri defendere potest impositum. Mediam habet haec herba inter Personatium & Bechion figuram, folia tamen huic rotundiora quam Personatiae sunt. Primo uere spicam longam purpurascens floribus plenam protrudit, qui lappularum aliquam habent similitudinem, sed reuera lappae non sunt. Germani Petasiten heublen vocant. Nascitur uliginosis & pinguibus locis.

EPIPACTIS. Ca. XCIII.

Epipactis quae sit herba, hodie omnino ignoratur, nec facile erit eam invenire, quoniam nullus ex veteribus, ut in re nota sit, totam eius historiam posuit.

CAPNOS, ID EST, FUMARIA.

Caput XCV.

Kαρνός Latinis Fumaria & Fumus terrae, Germanis Erdtrauch / Tunnentraut / & Danbentropff dicitur. Sunt etiam qui Wilderaut & appellam, sed male. Capnos haec, quam Dioscorides describit, ubique in Pharmacopolijs Fumi terrae appellatione habetur. Nascitur in agris. Est & alia Capni species, cuius Plinius & Aetius meminerunt. Vocatur haec Capnos siue Capnium phragmites, quod in dumosis sepibus nascatur, & Capnos Chelidonia, quod Hirundinum aduentu erumpat. Cauliculo eius, ubi à terra erumpit, gallinaceorum calcariis simile quiddam adiacet, à quo etiam Romanis pedes gallinacei dicta sunt haec herba, ut apud Plinium legitur. Haec Capni species proculdubio est ea herba, quam Germani Soltauerg & Hanenspoorn appellant, quam ubique per Germaniam Aristolochiam rotundam vocant, sed magno errore, ut in tertio libro diximus. Habent enim huius herbae folia Ruta & Fumi terrae foliorum mediam similitudinem. Aristolochiae uero omnes hederaceo constant folio.

SATIVA LOTVS.

Caput XCVI.

Greci Loti appellatione eas herbas indicant,

quas ipsi alio nomine τριφύλλου, & Latini Trifolium lia uocant, Germani Blee. Has omnes Arabes Andagoga appellatione comprehendunt. Loti species omnes sponte nascuntur, sola sativa excepta, quae in hortis scriitur. Propterea quamvis haec nullam habeat apud autores descriptionem, cum sola in hortis seratur, ex omnibus alijs loti generibus, facile erit eam cognoscere. Est itaque haec sine dubio Trifolium illud sativum, quod Germani Gartentlee / aliqui etiam ab autore, & Tardes, id est, Nardum vocant. Spirat enim iucundum odorem siccata. Flores habet in capitulis ferè coeruleis, quibus in iisdem capitulis semina succrescunt. Foenugraeci seminibus similia, sed multo minora, in leniter aculeatis utriculis inclusa. Quoties igitur apud Arabes simpliciter Andagogam scriptum inuenerimus, haec herba accipienda est. Nam hodie ex Trifolij vulgaris genere sine odore herbula hirsuta, nullas vires praeter astringendi habent, et ubique in agris nascentem, Andagogam vocant, sed magno errore.

SYLVESTRIS LOTVS.

Cap. XCVII.

Sylvestris Lotus hoc nomine nulli hodie cognita est, propterea nihil adhuc certi de ea pronunciare audent.

MILLEFOLIUM. Ca. C.

Mυρίοφυλλον, quod Latini Millefolium uocant, plurimum differt ab ubique uocato Millefolio, quod antea Stratioten Millefolium esse indicamus. Nam Stratiotes asperis & siccis locis nascitur, hoc uero Millefolium palustribus. Porro Germani hanc herbam Wasserfenchel / & Wassertanen appellant, quoniam folia eius Foeniculo similia sunt, & tota herba nuper nata abietem figuram imitatur.

MYRRHIS. Ca. CI.

Mυρρίς umbellifera est herba, Cicuta ualde similis. Nascitur iuxta arbuta, & Germanis Buschmützen uocatur. Sunt etiam qui Belberfennen appellant. Sed hoc nomine eam indicare non satis tutum est. Nam & Cicuta palustris etiam Germanis Belber uocatur. Et non raro accidit, pueros nominum uicinitate deceptos, hanc pro illa tibi gratia tempore famis erueri, & comesta mori. Cuius rei aliquot exempla uidi.

MYAGRVM. Ca. CII.

Mυαγρος hoc nomine ignota hodie est. Ruellius tamen eam cognovisse uidetur, sed sibi ipsi non constat. Nam lib. 3. cap. 26. semen eius Foenugraeco comparat, & bene. In quibusdam tamen Dioscoridis exemplaribus non τριφύλλου, id est, Foenugraeco, sed τριχύλλου, id est, ceruici, magno errore comparat. Quam enim figuram Foenugraeci semen cum collo siue ceruice habet? Ruellius uero in lib. 2. cap. 30. ubi

A 30. ubi quid sit *Μόχαρρο* indicat, & deinceps notas eius descriptioni confert etiam, dicit semen eius in colliſſicem exporrigi. Quo loco manifestè uideamus, quomodo cogat etiam falsam notam descriptioni respondere.

OENAGRA. Ca. CIII.

Οἰναργος, sive *οἰνόδ' ηγος*, uel *οἰναργος*, ut quædam exemplaria habent, hodie ignota est planta.

CIRSIVM. Cap. CIIII.

Cirſion, quod aliqui transpositis literis Crifſion uocant, nequaquam est uulgo uocata Buglossa, ut Leoniceus & Ruellius ferunt, salus tamen doctissimorum uirorum autoritate. Certum enim est ueram Buglossam esse Boragnem. Cirſion uero quoniam Buglossa sive Boragne grandius est, grande etiam Buglossum appellabatur. Vulgaris autem Buglossa, sive Hircina barba uel lingua, Boragne multo minor existit. Ergo nequaquam Cirſion esse potest. Antea etiam uulgarem Buglossam Echion esse indicauimus. Sed ueram Cirſium grandis est herba, latis & multo longioribus quam Borago folijs, proceriore etiam caule. Seritur a quibusdam apud nos in hortis, et maior sive Italicum Buglossum uocatur.

ASTER ATTICVS.

Cap. CV.

Astera Atticum Arabum interpretes, & Pandectarum autor Mathæus Syluaticus, cum Bryago confundunt, sed sædo errore. Sunt enim diuersissimi generis herbe. Ruellius quoque Astera Atticum non rectè indicat, quamuis non sum, sed aliorum de hac herba opinionem ponit. Ego autem scio me ueram Astera Atticum in montibus circa Ienam inuenisse. Non enim melius historie conuenire possit, tam exquisitè respondens descriptioni omnes eius herbe partes. Nascentur in petrosis montibus, ut quædam etiam Dioscoridis exemplaria indicant. In quibusdam etiam exemplaribus de floribus eius legitur *ἀνθος πέρφ' υ' πορ' ἢ μύλινο*, id est, flore purpureum aut luteum, sed falsò. Non enim in quibusdā locis purpureos, & in quibusdam luteos habet. Sed utrunque colorem simul idem flores ostendunt. Quapropter *πέρφ' υ' πορ' ἢ μύλινο*, id est, purpureum & luteum legendum est. Hoc enim alia exemplaria & ipsa floris figura testantur. Media namque floris pars luteum habet colorem, circa quam parua & purpurea foliola, ut in Chamæmeli floribus uidemus, disposita sunt, quo fit ut purpureo & luteo simul colore Asteris flos describatur.

ISOPYRVM. HERBA.

Caput CVI.

Quæ sit Isopyron herba, hodie nulli incognitum est, neque aliquis adhuc ex recetioribus eam inuenit.

VIOLA NIGRA. Ca. CVII.

Iop & *Ἰοπ* Romani Violam purpuream uocant, Germani Violam sive Veieln. Nota omnibus hæc herba est, quæ primo uere ubique in hortis & uerbis emicat, coliculo gracili, & ualde odorato flore. Herba eius in Pharmacopolijs Violaria uocatur.

CACALIA. Ca. CVIII.

Cacalia non est agreste Carui, ut quidam apud Ruellium opinantur. Hodie enim omnino incognita est.

BUNIVM. Ca. CIX.

Bunium nulli hodie hoc nomine notum est. In secundo libro sermo de Buni de etiam habebatur, quæ plurimum ab hoc Bunio differt.

PSEUDOBUNIVM.

Pseudobunium in Creta nasci Dioscorides scriptum reliquit. Quapropter nescio an apud nos etiam nascatur. Hodie uero quid sit, omnes ignorant.

HEDERA TERRESTRIS.

Caput CX.

Terrestis hedera, quam Græci *χαμαίκενος* uocant, non est herba illa, quæ Germani Grundelrebe dicitur: de qua re parè meus in Botanologico suo differuit.

CHAMAEPEUCE. Ca. CXI.

Quædam exemplaria pro *χαμαίκενος* *χαμαίκελος* habent, sed malè. Nam Chamæpeuce diuersa est ab hac herba, et eadem cum Echio, id est, Tusilagini Correctiores uero radices et Plinius Chamæpeuce habent, id est, pumila picea. Est enim paruum frutem Chamæpeuce, folijs urentibus, & piceæ similibus, odore admodum graui, & Germanis *Seiwannen* / *Sichtannen* / & *Seitheyde* appellatur. Quidam hunc fruticem etiam Chamæpitryn uocant, sed malè: ut suo loco indicauimus.

BUGLOSSVM. Ca. CXII.

Verum Buglossum, quod ueteres *Μελίτι* intelligunt, sine dubio est omnibus nota Borago. Nam Apuleius dicit Corragnem à Luciano appellari Buglosson, B, litera in C mutata. Folia Buglossi ueteres dixerunt animi uoluptates & letitiam facere, si uino iniiciantur. Idem nos Boraginis floribus tribuimus.

CYNOGLOSSA. Ca. CXIII.

In hisce regionibus malè asseram Anchusam illam quam I. ycopſin esse diximus, Cynoglosson uocant. Veram autem Cynoglossam omnes alie Germanie gentes *Zundszunge*, id est, Carinam linguam uocant: quam etiam Pharmacopolia habent. Dioscorides ei caulem negat, & nos etiam sine caule eam nasci ubique uidemus, quibusdam tamē temporibus eadem caule, purpureos flores, et post hos

mutat

A minutas lappas producit, quas Plinius etiam illi tribuit. Ergo imprudenter Ruellius scribit, non esse Cynoglosson quod in Officinis habeatur, quoniam caules & lappas ferat. Multis enim nunc annis obseruimus Cynoglossam interdum sine caule nasci, ut Dioscorides eam depingat, reuera tamen caule fert. Duplex inuenitur Cynoglossa, maior & minor. Hec Dioscoridi non fuit cognita, & folijs, caulibus, floribus & lappulis maiori similis est, sed minora haec omnia habet. Quinetiam natales & odoris uires cum illa communia habet.

PHYTEUMA. Ca. CXIII.

Phyteuma hodie omnino incognita est herba, neque opus ea magnoperè habemus, si amatorijs tantum ueneficijs est utilis.

LEONTOPODIVM.

Caput CXV.

Leontopodium similiter ut Phyteuma incognita nobis est, nec alias habet in Medicina uires, quam quod amatorijs ueneficijs utilis sit. Quaedam tamen exemplaria eam corpori foris impositam abscessus discutere addunt.

HIPPOGLOTTON.

Caput CXVI.

Quedam exemplaria Hippoglosson habet, sed malè. Nam nomen suum ab Hippoglot tide inuenit. Habet enim, ut Plinius etiam ait, parua foliola lingularum forma ex folijs exeuntia. Propterea Vergilius Marcellus malè Hippoglosson legi censet, qui nequaquam etiam uerè Hippoglosson in suo Commentario indicat. Nescio enim quam spicatam lanuginem introducere conatur, cum tamen nullus unquam auctor alicuius lanuginis uel spicae in hac herba mentionem faciat. Mihi profectò hoc Hippoglosson, siue Hippoglossidion, siue Hippoglotton eadem esse uidetur cum Lauro Alexandrina. Verumque enim Hippoglossum ab hoc autore & alijs omnibus uocatur, utriusque Rusci folio describitur. In Lauro Alexandrina tamen paruorum foliorum ex folijs nascentium non meminit: è contra etiam in huius Hippoglossi historia, folijs aduati fructus mentionem non facit. Sed hoc meam opinionem magis confirmat. Quod enim utriusque descriptioni deest, id etiam ex utriusque descriptione sarciri potest. Quo fiet, ut unam tantum herbam Hippoglosson & Alexandrinam Laurum esse cognoscamus. Nam habemus in Pharmacopolijs herbam Vuulariae nomine, è cuius folijs alia minora nascuntur folia, quae omnia Rusci modo aculeata sunt, sed molliora. In medijs uerò folijs iuxta parua foliola rubentem fert fructum, Ciceris magnitudine. Hec itaque Vuularia Hippoglossi & Alexandrinae Lauri descriptioni optimè conuenit. Ruellius hoc loco laudandus est, quod Hippoglosson Bonifaciam, siue Paganam linguam ab Italis uocari scribit. Est enim Bo-

nifacia eadè herba, quae Pharmacopolis Vuularia, & Germanis Sepff lintant / Zungenblat / & Berblat appellatur. Nec me mouet, quod Galenus & Aegneta diuersis locis de Hippoglosso & Alexandrina Lauro agant. Aegneta enim ex Galeno, Galenus ex Dioscoride earum uires transcripsit. At certò scio, Galenum Hippoglossi nomine ab Alexandrina Lauro diuersam herbam non cognouisse. Potuit itaque haec una herba ab alio Hippoglossum, ab alio uerò autore daphne Alexandrina appellari. Nam Theophrastus Alexandrinae Lauri tantum meminit, proculdubio sub hac etiam Hippoglosson intelligens, cuius alibi nusquam mentionem facit. Unde Dioscorides etiam, & qui Dioscoridem secuti sunt scriptores, occasionem uasati sunt credendi Hippoglossum ab Alexandrina Lauro differre. Talis quoque error ipsi Dioscoridi in Phyllo & Mercuriali accidit. Similes etiam innumeros in Plinio inuenias. Alexandrina laurus etiam idea dicitur, quod si aliquis ignorauerit, & nomen illud solum apud autorem aliquem inuenierit, statim opinabitur, eam sui generis esse herbam, sed falsò. Constat etiam certissimis uulgi experimentis, Vuulariae radicem etiam sic eam bubones in peste maturare. Hinc est quod malaciticam uim Hippoglossi radici auctores tribuant. Quinetiam Vuularia difficulter patientes epota adiuvat, menses cit, & calculos pellit, quae licet omnia uulgi experimenta sint, tamen easdem etiam facultates Lauro Alexandrinae auctores adscribunt. Cum igitur Vuularia utriusque descriptioni respondeat, & utriusque etiam attributis uiribus polleat, ac Alexandrina laurus & Hippoglosson etiam eandem historiam & idem nomen habeant, sine dubio Vuularia eadè est cum Alexandrina lauro, & Alexandrina laurus eadem cum Hippoglosso. Possemus hoc loco plura argumenta afferre, si non breuitatis causa illud omitteteremus.

ANTIRRHINVM.

Caput CXVII.

Antirrhinon, siue Anarrhinum, quod alio nomine Cynocephalea & Bucranion appellatur, fructum fert canino siue utulino capiti similem, tam exquisita similitudine, ut etià os & nares in coapparent, quae in maturitate aperiuntur, ut per eas maturum semen excidere possit. Nasceitur ubique in agris & hortis. Germanicum eius nomen est Braunenhaupt, Hecsis etiam Orant uocatur. Quod uocabulū pluribus herbis tribuitur, quae à ueneficijs hominem tueri superstitiosè creduntur. Idem etiam de Antirrhino ueteres tradiderunt.

CATANANCE. Ca. CXVIII.

Catanances duae sunt species. Cum uerò utriusque ad amatoria tantum usus sit, nihil refert eam non cognosce. Mirum in modum autem errat Ruellius, quod Bisortam alteram Catanancen esse credit.

A credit. Atq; in hac sola herba uidere possumus. quomodo ad descriptiones torqueat plantarum partes. Catanance enim folia figura & colore oleæ folijs similia describuntur. At oleæ folia minimi hominis digui longitudinem & latitudinem non habent. Bistortæ uero folia dimidij ferè pedis latitudinem habent, & sesquipede etiam longiora sunt. quæ nullam cum oleagineis folijs proportionem habent. Cetera taceo.

TRIPOLIUM. Ca. CXIX.

Tripolium (si Arabibus, & ex his in simplicibus exercitatisimo Serapioni credimus,) nihil aliud est quàm Turbith Arabicè dicta herba, cuius radices in Pharmacopolijs habentur. Serapio in sui Turbith descriptione, totum Dioscoridis caput de Tripolio recenset. Dioscorides certè Tripolij radicem per alium aquam & urinam pellere scribit, quas uires omnes Medici Turbith habere nouerunt. Illi uerò uehementer errant, qui Pityusam Turbith esse dicunt. Nam Arabes scorjum etiam à Turbith Pityusam describunt.

ADIANTUM. Cap. CXX.

Dvplex est Adianti genus, candidum & nigrum. Vtrumq; tamen Polytrichon, Callitrichon & Capillus Veneris uocatur. Recentiores inexcusabili errore Searleam Callitrichon uocant, quæ diuersissima est herba ab Adianto. Hunc errorem Ruellius quoq; animaduertit, qui Searleam saluam & tranfmarinam appellat. Est autem Adiantum ex Filicum genere ferè minima. Dioscorides nigrum tantummodo describit, quo diu caruimus, nunc uerò copiosè affertur, & à Pharmacopolijs Capillus Veneris uocatur. Habet hoc nigros, splendentes & extreme gracilitatis coliculos. Male autem in eius historia legitur: quòd dicitur quòd dicitur, quæ uerba ab aliquo adiecta sunt. Nam antea eius folia diligenter descripsit, cum ait: quòd dicitur exi uocatur dicitur quòd. Imposititia & adulterina igitur sunt ista uocabula. Folia Filici similia. Nam ipse etiam Serapio ea non habet, quamuis totam Adianti historiam ex Dioscoride transcripserit. Candidum aliud Adiantum dicitur, quòd respectu nigri candidiores habeat coliculos, qui alias reuera in uiridi pallent. Hoc à Germanis Waurrauten & Felsfarlin dicitur, quoniam omni animalia in humidis muris, iuxta illius cespites agunt.

TRICHOMANES. Ca. CXXI.

Et Trichomanes quoq; à capillo similibus coliculis nomen inuenit. In Pharmacopolijs Polytrichon uocatur, quia hoc omnium Adianti specierum cognomen potius sit. Germanicum eius nomen est Steinfarlin & Steinfeder. Sunt etiam qui Saxifragam illud uocant, sed nimis latè patet hoc uocabulum.

XANTHIUM. Cap. CXXII.

Xanthion inde nomen habet, quòd flauos faciat capillos. Nasceitur ubiq; in iisdem in quibus Dioscorides ait locis, & Germanis Weilerstein & Jgellerten appellatur.

AEGILOPS. Ca. CXXIII.

Facile quidem est dictu, Aegilopem sterilem esse Auenam, & Hordeum necare, seu eam indurere non est cuiusuis.

BROMVS.

Bromus quoq; sterilis Auenæ species est. Cum autem eius generis plures in aruis reperiantur herbe, non facile indicari potest.

GLAUX. Ca. CXXIII.

Glaux non tantum in maritimis locis nascitur. Nam apud nos etiam in siccis apricis montibus & abruptis uis inuenitur.

POLYGALA. Ca. CXXV.

Ab effectu nomen suum hæc herba inuenit. Lactis enim generandi facultatem possidet. Germanis Wild de Süßwurz appellatur.

OSYRIS. Ca. CXXVI.

Osyris sine dubio est ea herba, quam nunc Lianariam recentiores uocant, Germani uerò Broctenflachs & Sauntraut. De qua re etiam parens meus in suo Botanologico scripsit.

SMILAX ASPERA.

Caput CXXVII.

Asperam Smilacem, quam Theophrastus etiam Cylissam hedera uocat, in Germania non nasci puto, quoniam ex Cilicia in Græciam translata sit. Et nunc in Italiæ quibusdam locis in hortis ostentationis causa colitur. Florem habet odoratum, cuius Ouid. meminit, cum ait: Et Crocon in paruos uersum cum Smilace flores. Ramulos & folia eius uidi, quæ Georgius Agricola (cuius antea meminimus) ex Italia attulit.

LENIS SMILAX.

Caput CXXVIII.

Lenis Smilax eadem est cum satia, quæ Dolychus etiam appellatur: quod palam fiet, si quis alios autores de Smilace legat, qui eandem herbam lenem & satiam esse indicant, & duo tantum Smilacis genera esse dicunt, scilicet asperum, & lenem, quod in hortis nascitur. Ad hæc si utriusq; descriptio & uires in hoc autore considerentur, quilibet indicabit eandem esse herbam, lenem & horientem Smilacem. Propterea ipse Dioscorides errauit, quòd crediderit lenem Smilacem proprium genus à satia habere. Dioscoridem in hac re secutus est Galenus, qui ait, lenem Smilacem asperæ similes uires obtinere, quod falsum est. Nam Lenis Smilax terrestri con-

A stat substantia, ut omnia ferè legumina: propterea etiam grauius & tumultuosa facit insomnia. Asper uerò Smilax longè alio cõstat temperamento, quod ex gustu percipi potest. Saporem enim nihil commune cum leni Smilace habet. Cum autem plantarum temperamenta & facultates (ipso Galeno teste) ex sapore iudicentur, necesse etiam est, asperam Smilacem nihil in uiribus cum leni Smilace commune habere, ut Dioscorides etiam indicat, qui Smilacem lenem tumultuosa insomnia facere dicit, Asperam uerò contra letalia uenena antidotum esse. Cum igitur tam breuiter Galenus lenis Smilacis uires perstringat, & minimè uerum temperamentum illi assignet, facillè colligitur, ipsum nesciuisse quid lenis Smilax esset.

RUSCUS. Ca. CXXXIX

Mϋρῖν ἄργεα, siue ὀξύμυρῖν, Latinis Ruscus appellatur. In Germania eam nasci nondum uidi, uel ab alijs nasci audiui. Propterea nulum eius Germanicum nomen expiscari potui. Quiddam cum mihi locum in Germania describeret, ubi copiosè Ruscus nasceretur, eò ut uiderem uiuam plantam profectus sum. Ruscum minimè inueni, sed aliam herbam graminis folijs ijsq; mollissimis, quorum figura non posset magis à Rusci folijs differre, radices tamen Rusco similes, quod ad figuram attinet, habentem, quarum in plurimis Pharmacopolijs pro Rusco usus est, & Rusci radices appellantur, sed magno errore. Nam uerum Ruscum uidi aridum ex Italia allatum, dura & aculeata folia habentem: quam ob causam Vergilius quoq; horridum eum appellat.

Huius Oxymyrsine fructus plurimum differunt à Cubebis aromaticis granis, quos duos fructus Serapio eosdem esse credidit: quem errorem iam dudum deprehendit & scriptis mandauit, doctissimus uir Nicolaus Leoniceus, cuius inuentum alij etiam sibi adscripserunt.

LAURVS ALEXANDRINA. Cap. CXXX.

DE LAURO Alexandrina, siue Idea, in Hippoglossò satis dictum est. Serapio huius quoq; in LAURI capite meminit, Hippoglossi uerò nusquàm, proculdubio intelligens Hippoglosson à LAURO Alexandrina nihil differre. Porro quod ad capitis huius emendationem faciat, etià prosequamur. Omnia exemplaria folia LAURI Alexandrina, Rusci folijs comparant, quedam tamen minora esse indicant. Rusci autem folia multò minora sunt, quàm Vularia. Ergo dicit aliquis, Vulariam LAURUM Alexandrinam non esse, cuius uenia dico, locum in Dioscoride corruptum esse, nec minora sed maiora legi debere, quod Plinius & Serapio clavis uerbis ostendunt. Hic enim de uerbo ad uerbum eius historiam

ex Dioscoride transscripsi. Testantur idem correctiora exemplaria, in quibus manifestè Μεζοβα, id est, maiora leguntur. Huius autem erroris causa & origo est, uocabulorum contrariam significationem habentium similitudo. Μεζο enim minus, & ὀξύ uerò maius significat. Facilis itaq; & lubricus est ex alterutro in alterutrum lapsus. Pallitur Ruellius in indicanda hac herba. Non enim cognouit eam cū Hippoglossò eandem esse.

DAPHNOIDES. Cap. CXXXI.

Δαφνοειδὲς recentiores Laureolam uocant, quæ in nostris Pharmacopolijs nō habetur, nec ego quæ sit compertum habeo.

CHAMAEDAPHNE. Cap. CXXXII.

Chamaedaphne, ut à Dioscoride describitur, non multum ab Alexandrina LAURO differt. Hodie non cognoscitur, si alia & diuersa est ab Alexandrina LAURO.

VERATRVM ALBUM. Caput CXXXIII.

Eαλίβοπος λευκός, id est, Album ueratrum, siue albus Helleborus, Germanis weißer Hellschwurtz uocatur, ubiq; in Pharmacopolijs habetur. Vulgares Herbarij confundunt Dictamnem, Helleborum album, & Sigillum Salomonis, id est, Polygonum, ut antea etiam dictum fuit. Albus Helleborus copiosè in Germania Alpibus iuxta Heluetios nasci dicitur.

VERATRVM NIGRVM. Cap. CXXXIII.

Eαλίβοπος μέλας, id est, nigrum Veratrum, apud nos in hortis plantatur: quamuis quibusdam in locis sponte proueniat. Nasceitur ad Herciniam solum Sesamoidis genus, cuius radices Radicarij Agrythæ Pharmacopolijs pro Helleboro hodie uendunt. Sunt enim illi similes, sed multò inefficaciores, quoniam non tam uehementer ut illæ purgant. Hinc est quòd aliqui temerè pronunciant, nos uerò Helleboro carere. Porro Hellebori huius flores à Dioscoride in candido purpurascetes, & figuram cemosi describuntur, quod ex minori Sesamoide huc adscriptum est. Aliqui enim hunc Helleborum cum Sesamoide confundunt. Sed uerus niger Helleborus uiridem in pallido florem habet, & minimè racemosum, Germanicè schwarz Hellschwurtz & Christwurtz appellatur. Folia habet Platano, siue Aceris similia, profundius tamen & usq; ad pediculum per ambitum secta, & quælibet eius diuisura seu partem undiq; ferræ modo asperis incisuris horrent. Quæ uerò ab Agrythib; pro Helleboro immenditur, Nigellæ constat folijs.

SESA-

A SESAMOIDES MAIVS.

Caput CXXXV.

Sesamoides dicitur, quod Sesamo simile semen habeat. Hoc in Anticyra nasci dicitur. Vires quas Dioscorides huic adscripsit, Plinius Sesamo assignavit, malè Sesamum pro Sesamoides, in hoc autore legens. Plinium secutus est Ruellius, Sed miror hunc tam crassum errorem adco non animaduertisse, ut etiam ipse in eum inciderit.

SESAMOIDES MINVS.

Minus Sesamoides filijs priori dissimile existit. Ab huius historia non multum abluat ea herba, quam Agyrthe Pharmacopolis pro Helleboro nigro vendunt. Vires enim easdem habet, nec radicem descriptioni distinet, quæ tenues, graciles & nigri Hellebori radicibus similes sunt. Germanis hæc herba Klein Thustwurcz appellatur.

CUCUMER AGRESTIS, ET ELATERIVM. Ca. CXXXVI.

Sicus & πικρος, Latinis Cucumis agrestis, siue anguinus, & à recentioribus Aspinus appellatur. In Germaniæ quibusdam locis ad Medicinæ usum feritur, & ab holitoribus Pompen vocatur, propterea quod semen & humorem ei aculeatur, quemadmodum machine quædam aquam, quas nos Pompen appellamus. Elaterion uero est exiccatus & in pastillos conformatus fructuum succus. Dissident autem in eius electione grauissimi auctores, Aegnetæ, Dioscorides, & alij. Ego autem Aegnetæ sententiam magis laudauerim, qui illud probat, quod ad uiridē colorem inclinat, Dioscorides uero candidum. Sed impossibile est uiridem per se succum, cum exiccatur, candidum fieri. Quod uero ex radicibus fit Elaterion, candidum colorem acquirit. Nam ipse succus etiam lacteus est. Sunt & alia quædam in hoc capite absurda, ubi Elaterij conficiendi modus traditur. Sed huius instituti non est, omnes errores discutere.

PEDICVLARIS HERBA.

Caput CXXXVII.

Staphis agria, siue Phthyræstemon, Latinis Pedicularis herba, & Pharmacopolis adhuc Staphis agria vocatur. In Germania eam nondum nasci uidi.

THAPSIA. Ca. CXXXVIII.

Thapsia à Thapso insula, in qua primum inuenta est, appellatur: raro afferuntur ad nos radices eius, interdum tamen pro Turbith adhibentur. Est autem ferulacea & Fœniculo similis planta. Nicander Trinacriam Thapsiam probat, in Sicilia enim efficacissima nasci creditur.

GENISTA. Cap. CXXXIX.

Sparton Latini Genistam, Germani Gûnster uocant. Copiosissime nascitur in Hesiæ monti-

bus, ubi etiam arborescit. Semina eius in Pharmacopolis habentur. Est autem duplicis differentie. Quædam in fines torquetur, ex qua etiam corbes uuis passis & ficibus seruandis texuntur. Altera non tam lentas habet uirgulas, ut simile quiddam ex ijs fieri possit.

SILLYBUM. Ca. CXL.

Sillybum quid sit, nemo adhuc compertum habet. Serapio illud Hachb Alkandec uocat.

GLANS VNGVENTARIA.

Cap. CXXI.

Balanos μυγεύκη, ab Arabibus granū Ben appellatur. Sunt etiam radices Ben uocate, sed ab Vnguentaria glanc diuerse. Videndum igitur est, ne res eas confundamus, ut quidam faciunt. Afferitur rursus ad nos ex Aegyptio fructus hic. Theophrastus eum simpliciter etiam Βόλακον uocat, nulla adiecta differentie nota, Martialis quoque in Apoph. Mirabolanum, cum ait:

Quod neq; Vergilius, neq; Carmine dixit Homerus, Hoc ex unguento constat, & ex Balano.

NARCISVS. Cap. CXLII.

Narcissi plura sunt genera. Ex his purpurei serò florere seruntur. Candidi uero Narcissi (de quibus Dioscorides scribit) genus est, flos illi quem Germani Narzissen blumen, & Josephus stabe appellant. Nascitur Lipsie in syluis. Et sponte in hortis & sepibus in Hesiæ. Hodie nullus est huius in Medicina, usus.

HIPPOPHAES, HERBA.

Caput CXLIII.

Hippophaes quid sit, hodie omnino ignoramus. Herba autem est ex aculeatarum genere.

HIPPOPHAESTVM.

Cap. CXLIII.

Hippophaes non quoque nulli hodie hoc nomine cognitum est.

RICINVS. Ca. CXLV.

Roton siue Cici, Latinis Ricinus dicitur, quos etiam semen habeat Ricino insecto simile. Est autem Ricinus animal paruum, quod ouium, canum et boum seminibus ac cuti adheret, exitu carens, propterea eo usque sugendo se implet, donec rumpatur. Germanis eum Secke appellatur. Porro ipsam plantam Pharmacopole Cataputiam maiorem, Arabes Kerua, & Germani Wundelbaum, & Römisch en Hanff appellant. Seritur à quibusdam ostentationis causa in hortis. Platano & Aceri similibus folijs, sed maioribus. Agyrthe eū Thixschepan hanff uocant: quod nomen uulgus etiam retinet.

TITHYMALI. Cap. CXLVI.

Tithymalum Latini Lactariam herbam appellant. Est autem omnibus illius speciebus lacteus

A liquor, qui ex abrupta herba emanat. Cum uerò plures sint herbae præter Tithymalos, quæ lacteum habent liquorem, necesse est earum differentias ponere, ne aliquis error committatur, qui in his herbis committi possunt maximi. Sunt enim quædam lacteum liquorem habentes frigide, quædam etiam in summo caliditatis gradu constitutæ. Constituamus igitur tres illarum differentias. Prima Tithymalorum esto, Aletra Intybaccorum, Tertia uerò adscribamus eas plantas, quæ neque ex Tithymali neque ex Intybaccorum genere sunt. Quomodo autem ille ab inuicem dignosci possint, nunc ostendemus. Tithymalus quamuis in multis species diuidatur, omnes tamen oblongæ & nullis incisuris diuiso folio constant. Intybaccæ uerò herbae omnes circumosæ & inciso per ambitum constanti folio. Tithymalorum maxima pars umbellæ habet. Quibus uerò hæc non sunt, illæ loco earum in medio duorum foliorum singulos flores & fructus ferunt. Intybaccæ uerò in singulis pediculis singulos habent flores, ex minimis foliolis compositos, colore luteos, sola Condrilla minore & Cichorio excepto, quæ interdum coerules, interdum candidos flores produunt. Intybaccorum omnium flores in lanuginem uocatam pappos resoluuntur. Tithymalorum uerò minime, qui omnes fructus habent tribus loculentis distinctis, & in his singulis singulos nucleos. Intybaccorum semina cum pappis leniter per auram auolant. Tithymali cum impetu et crepitu suum semen eiiciuntur. Intybaccorum lactescens liquor amaro gustu statim in lingua percipitur, Tithymalorum liquor à bubuli lactis sapore non multum recedit, dum primò gustatur, deinde paulatim totum os & fauces accendit, & Coccoguidij modo urit, & foris cuti impositus exulcerat, quod Intybaccorum liquor minime facit, propter temperamenti frigiditatem. Hæ igitur herbae quas tam ab Intybaccis suis notis distincti, omnes Tithymali appellatione ueniunt, estque hoc generale eorum nomen. Intybaccæ uerò herbae sunt omnes Lactucæ species, utraq; Condrilla, utrunq; Hieracium, Intybum satium & agreste, quod Cichorton uocant, & quæcumque his similes sunt, & lacteoliquore manant. Tertia uerò lactiarum plantarum differentia ad neutrum genus illorum referri potest, neque simul unum proprium reuera genus habet, ut Tithymali & Intybaccæ. Non enim sibiipsis, ut illa, similes sunt. At huiusmodi pauca inueniuntur, ut Ficus, Erinosa herba, Scammonia, Cossimipolus utraq; & tenella minoris Clematidis germina, quæ singula proprium habent genus, nec omnes sub eodem genere contineri possunt, ut Tithymali & Intybaccæ.

Tithymalorum autem, quas Latini priuatim Lactarias herbas uocant, plures sunt species, sed nobis non perinde cognitæ: quamuis nos non pauciores etiam cognitæ habeamus. Sed hæc quas nos habemus, partim à ueteribus non descriptæ sunt, & contra

nos non habemus aliquot, quæ apud illos descriptæ sunt.

Prima itaque Lactaria herba, quæ Characias, id est, Vallaris appellatur, & mas existimatur, nulli hodie hoc uocabulo cognita est. Secunda, femina est, & Caryites Myrsinitesque appellatur, fructus ferens ceu nuces, & hæc uulgo non cognoscitur. Quædam tamen Nucem uomicam Pharmacopolis dictam fructum, corneæ soliditate, in hac Lactaria nasci credunt. Tertia paralius est, in maritimis nascentis, quam nemo adhuc ex recentioribus indicauit. Quarta Helioscopius dicitur, quod comam suam cum sole circumagat. Hæc proculdubio mihi esse uidetur, quæ à Germanis Hundemilch uocatur. Cyparissias quinta in ordine recensetur, ad quam refertur etiam Pitusa, quæ specie tantum ab hac differt. Miror autem cur Cyparissias appelletur, cum tamen Dioscorides eam nuper nata pinu similem esse, & inde nomen accepisse dicat. Unde necessarii sequitur, eam Pituse nomē habere. Nam Pitus pinus est, cui nuper è femine enata similis esse Cyparissias dicitur. Cyparissius uerò Cupressus est. Eadem igitur genere est Cyparissias & Pitusa. Porro due sunt Pituse, minor & maior, propterea etiam post septem hos Tithymalos priuatim describuntur. Sine dubio autem Cyparissias & minor Pitusa, eadem herba mihi uidetur, quam Arabes Scobram, Pharmacopola uerò & recentiores Medici Esulam minorem, & Germani Wolfsmilch appellant. Sextum locum Dendroides habet, arboris modo ramosa & fruticosa, hæc mihi esse uidetur sine controversia, quam Germani Steynmilch uocant. Nascitur in petris. Septima est Platiphyllus, à latitudine foliorum dicta, quam non facile hodie aliquis demonstrauerit.

PITYVSA. Ca. CXLVII.

Pitusa, ut antea dictum fuit, duplicem habet differentiam. Minor genere à Cyparissia nihil differt. Maior uerò in pinguibus & uliginosis nascitur locis, recentioribus Esula maior, & Germanis Teufelomilch appellatur.

LATHYRIS. Ca. CXLVIII.

Adversus quoque ex Tithymalorum genere est, forma & fruticosa ramulis insignis. Recentiores et Pharmacopola eam priuatim etiam Tithymalum uocant, & Cataputiam minorem, quoniam fructus & semina maiori Cataputia, id est, Ricino similia habeat. Germanice Springköner, Springsamen & Suchsmilch uocatur.

PEPLVS. HERBA. Cap. CXLIX.

Peplus parua est herba, ex Tithymali genere, ubique in hortis & uicinis nascentis, Germanice Fley Hundemilch dicitur.

PEPLIS.

A PEPLIS. Caput CL.

Peplis genere Pepla cognata est, sed quo nomine iam appelletur, nulli cognitum esse puto.

CHAMAESYCE. Ca. CLI.

Chamaesyc dicitur hæc herba, quod sicut modo lacteo liquore abundet. Hodie uero incognita est.

SCAMMONIA. Ca. CLII.

Scammonia herba est nostro Cysampelo, id est, Conuoluulo similis, lacteo liquore etiam similiter plena, maiore tamen radice. Hinc est quod Cysampelus tenuis Scammonia uocatur, quoniam multo tenuiorem radicem quam Scammonia habeat. Comparantur apud Dioscoridem Scammonia folia Helxines folijs, quo loco Helxine non Parietariam, sed Cysampelum, id est, Conuoluulum significat. Colligitur ex Scammonie radice liquor, qui exiccatus ad nos perferitur, et similiter ut plantis, ex qua fit, Scammonia uel Scammonium uocatur.

CHAMELAEA. Ca. CLIII.

Chamelaea est planta oleæ folijs, unde et nomen inuenit, quæ ab Arabibus et Pharmacopolis Mezereon appellatur. Huic similis est Thymelaea, id est, frutex in quo coccongidium nascitur. Confundunt hodie diuersas has plantas. Nam Thymelæam quoque Mezereon, et Coccongidium grana Mezereon uocant, quantumvis admonuerit Dioscorides Coccongidium non esse Chamelææ, id est Mezereij, sed Thymelææ semen.

THYMELAEA. Ca. CLIII.

Thymelaea frutex est, quem Germani Sebast/ et Bellerbalis appellant, ex quo colligitur granum gnidium, quod composito nomine etiam coccongidium appellatur. Nascitur pinguibus montanis et opacis locis.

SAMBUCVS. Ca. CLV.

Aκτις Latinis Sambucus, Germanis Holunder/ et Althern appellatur. Nota omnibus Sambucus est, flores candidos, et nigras baccas in latis umbellis ferens. Inuenitur etiam aliud Sambuci genus prædicto minus, floribus et baccis non in umbella, sed racemo constitutis. Bacca rubentem habet colorem. Hoc à ueteribus non est descriptum. Nascitur pinguibus montanis locis.

EBVLVS.

XΑΙΛΑΝΤΙΣ, id est, parus Sambucus, herba est. Autumno enim caules illi omnino perierunt, ut raras habet quadrangulas, Sambuci modo inanes, folia, flores, umbellas et baccas Sambuco similes et æquales, quamuis bacca non nigrum habeant, sed rufum colorem. Germani eam Aetich appellant.

PICNOCOMVM. Ca. CLVI.

Picnocomon quid sit omnino ignoramus. Brunfelsius in tertio Tomo nequaquam ueram huius imaginem pingi curauit. Male Vergilius Marcellus semen eius porro simile interpretatus est. Correctiones enim codices præcipiunt, id est, Marrubij habent, non picnoms. Necessè enim est hanc herbam Marrubij semen habere, si oximo similes flores fert: quod si opus esset demonstrare, possemus ex plantarum constitutione, sumptis rationibus et argumentis.

APIOS. Caput CLVII.

Aπιο, quam igitur etiam uocant, herba hæc dicitur, quod pyro similem radicem habeat. Quidam etiam Raphanum syluestrem appellant. Videndum tamen est ne cum agrosti xaphano, id est, Armoracia confundatur. Quedam exemplaria radicem eius Asphodeli radicem similem faciunt, quædam Spondyli, sed facilius est ex altero in alterum lapsus. Hæc uero exemplaria quæ radicem huius herbe Asphodeli radicem comparant, deprauata sunt, sicut et Theophrasti, siue Dioscoridis fuerint. Asphodelus enim multas oblongas glandibus similes radices habet, ut Peonia fecimus, quibus nulla est cum pyro similitudo. Spondylium uero rotundam habet, et pyro conformem radicem. Ruellius se ueram hanc Ischiadam uenisse putat, sed fallitur: quod ex diuersis facultatibus colligere possumus. Nam Ischiadis siue Apij huius una tantum radix intra corpus sumpta, utrinque, id est, per aluum et uomitum purgat, cuius liquor sesquiboli pondere, id est, scrup. s. et gra. v. idem præstat. Alius uero herbe radice (quæ Ruell. Hisechia esse putat) sanis tempore pauperes in Gallia uesunt, quod uidisse se Ruellius testatur. Cum uero Apij radix una tantum tam uelociter purget, et corpus inaniat, minime cibis et alimentum esse potest, neque aliquis ea sine periculo uitæ uescatur. Illa autem cuius Ruellius meminit, alimentum est, Ergo minime Hisebias appellanda erit. Fateri autem omnes cogimur, nos hanc herbam ignorare.

COLOCYNTHIS. Ca. CLVIII.

Colocynthis diminutiuum est à Colocyntha, id est, Cucurbita. Est autem Colocynthis Cucurbitæ syluestris genus, quam Pharmacopole Cucurbitam deserti, et Coloquintidam uocant.

EPITHYMVM. Ca. CLIX.

Epithymum, quo nos hodie utimur, uerum Epithymum esse negat Antonius Musa, infirmus ad modum argumentis natus, nos uero in utraque partem prolixè disputare possumus, si cum aduersarijs res nobis esset. Cum uero hæc amicis scribamus, satis sit eos nouisse, uerum Epithymum in Pharmacopolijs haberi, et reuera nihil aliud esse quam Cuscutam in Thymo nascentem. Adnascitur etiam Thymbræ Cuscuta, quæ Epithymbræ appellatur Cuscuta enim aliarum herbarum accidens est, et quarum cam-

Alibus non aliter quam uiscum ex arboribus erumpit, quod nos diligenter obseruauimus. Propterea bene legitur apud Plinium, Epithymum sine radicibus nasci. Nam proprias radices minime in terram agit, sed herbarum abundantia succo uinit & nutritur.

ALYPVM. Ca. CLX.

Alypum herbam qui cognosceret, nullum adhuc uidere uel audire mihi licuit.

EMPETRVM. Ca. CLXI.

Empetron hoc an idem sit cum Sarxiphago superius descripto, uel diuersum, non facile aliquis indicabit. Vt cumq; fuerit, nulla iam hac nomine extat herba.

VITIS SYLVESTRIS.

Cap. CLXII.

Aliquam plantam hanc cum Vite similitudinem habet. Ideoq; hoc nomen inuenit, improprie tamen. Non enim idem genus cum Vite satina habet, ut satina cultura tantum ab hac distinguatur, sed suum genus a Vite diuersum habet. Germanis hanc sylvestris Vitis *Speckreben* appellatur, & flores eius *Specklilien* / *Perichlymeno* ualde similis est. Videndum ergo erit, ne cum eo confundatur.

VITIS ALBA.

Cap. CLXIII.

Aμυγδαλός, uiticulas, folia, & capreolos satinae Viti similia habet, & candidam radicem, propterea albae Vitis nomen inuenit. Herba est sepes ascendens, quam Pharmacopola Bryoniam, Germani *Jaunreben* / *Gichtreben* / *Gichtwurz* / *Sundtreben* / & *Stuckwurz* appellant. Baccas fert rubentes.

VITIS NIGRA.

Cap. CLXIII.

Αμυγδαλός μελαερα in quibusdam similis est Albe uiti. Radicem tamen nigram habet. Hec eodem nomine iam appellatur. Habet autem nigras baccas.

FILIX. Caput CLXV.

Filix siue *ἄντρος* hanc mascula appellatur, folia ab una radice multa emittit, magnarum autem alis similia, unde etiam nomen acquisiuit. Caulem nunquam producit, Germanice *Saren*, siue *Saren* *Fraut* uocatur, propterea quod latos uentris lumbicos expellat, quos *Saren* Germani nominant.

THELYPTERIS.

Θηλυπτερίς femina est Filix, proceris constat caulibus, et folijs pluribus, mascula Filice latioribus & breuioribus. Germani hanc *Rosfarn* appellant.

POLYPODIUM. Ca. CLXVI.

Ex Filicum etiam genere est Polypodium, quod Latini Filiculam, siue Filicularem, & Germa-

ni *Engelsaß* / & *Schiffarn* appellant. Pharmacopolis Polypodij nomen cognatum est. Sunt etiam Germani qui Polypodium *Steinfarn* appellant, quoniam plerumq; in muscosis petris nascitur. Hoc tamen nomen differt a *Steinfarn*, id est, *Trichomane*.

DRYOPTERIS. Ca. CLXVII.

Δρυόπτερις *Phthelipteri* di similis est, multo tamen minor. Nascitur in uetustarum quercuum muscosis partibus. Germanis, quoniam parua sit Filix, *Erdfaren* / *Windfaren* / *Daumfaren* / et *Schfaren* appellatur. Vulnerarias habet uires, rusticis non incognitas. Querenda est in antiquis et umbrosis syluis, in quibus aniose *Quercus* fuerunt. In piccis & abiegnis syluis minime prouenit.

CNICVS. Ca. CLXVIII.

Cnicus Pharmacopole & recentiores Medici *Carthamum* appellant. Germani *Distelsaffran* / siue *Seldtsaffran*. Theophrastus de Historia plant. lib. 6. cap. 4. tria genera Cnici siue Cnici describit. Vnum satinum, quod *Carthamum* appellari iam diximus. Et duo sylvestria. Ex his primum est quod a Dioscoride *Atractylis* libro tertio uocatur. Alterum uero sylvestre Cnicum, Dioscorides & alij *Græci* *Acanthij* nomine indicant. Propterea minime errat Ruellius, quod alterum sylvestre Cnicum, *Carduum* benedictum appellari scribit, quod nos *Acanthum* esse in tertio libro diximus. Porro Cnici flores a Dioscoride *Croco* comparantur, quo loco non ipsius *Croci* flores, sed in medio flore nascentia rubro colore stamina, quae *Crocus* appellantur, intelligenda sunt. Nam Dioscorides non dicit, quod Cnici flores *Croci* floribus similes sint, sed simpliciter *Croco*. Quilibet autem nouit *Crocum* non ipsum florem, sed floris stamina, ut iam diximus, significare. Igitur nullum turbare uel in dubitationem rapere potest florum Cnici cum *Croco* comparatio.

MERCVRIALIS. Ca. CLXIX.

Αυρόζωσις Latinis *Mercurialis*, Germanis *Bingelkraut* appellatur. Duplex illius genus sexu distinguitur. Masculula appellatur, quae bina semper, & testiculorum figura iuncta semina habet. Feminarum cernosos flores & semina producit. Repetantur hoc loco quae superius de Phyllo herba dicta sunt, ubi indicauimus Phyllon proprium genus, & a Mercuriali hac diuersum non habere, sed idem esse Phyllon & Mercurialem Dioscoridis cum Theophrasti *Arrhenogono*, & *Thyligono*. Pharmacopolis haec herba Latino nomine cognata est.

CANINA BRASSICA.

Caput CLXX.

Kυνική, siue *Cynocrambe*, sine dubio est *Mercurialis* masculula sylvestris: quod ipse Dioscorides etiam indicat. Herba est Mercuriali masculula similis, semina uero quam *Mercurialis* maiora habet.

A bet. Foemina in hoc genere non inuenitur. Nascitur in syluis, & Germanice *Wils Dingel* frant appellatur. Ruellius in hac herba indicanda errauit.

HELIOTROPIUM MAIUS.

Cap. CLXXI.

Hελιοτρόπιον μέγα, id est, Heliotropium maius, qualis sit herba, & quomodo iam uocetur, ignoro cum omnibus, solus Ruellius eam sibi cognouisse uidetur, qui herbam Canceri appellari scribit: ubi diligenter animaduertendum est, Ruellium loqui aliam herbam intelligere quam Millegranum, quae apud nos herba Canceri uocatur. Nam haec tam exigua habet foliola, ut uix confici possint, & in arenosis arcibus nascitur. Quam uero Ruellius sic uocat, pingui solo prouenit, & Oxini folia habet, ut ille scribit. Vulgo creditur Heliotropium esse ea herba, quae a Germanis *Wegwart* appellatur, sed falsum. Nam *Wegwart* Cichorium est, id est, Intybum agreste, cuius Dioscorides 2. libromeminit. Hoc autem loco Heliotropium scorpium ab illo describitur. Erroris causam protulit Plinius, qui caeruleum florem Heliotropio tribuit, qualem Cichorium habet, quem etiam

cum sole circumagat. Quod uis igitur multae sint herbae, quae solis cursum sequantur, una tamen est, quae proprie Heliotropium dicitur, estque duplex, maior & minor. De illa iam egimus, haec uero iam sequatur.

HELIOTROPIUM MINUS.

Hελιοτρόπιον ὀλίγον, quae sit, hodie omnino ignoramus. Neque aliquis adhuc eam scriptis ex recentioribus indicauit.

SCORPIOIDES.


Scorpionides hoc plurimum differt ab herba, quam Theophrastus Scorpionem appellat. Nam Scorpionides hoc semina habet, & scorpionum caudis similia. Scorpio uero apud Theophrastum radice Scorpionis caudae simili describitur. Theophrastus autem Scorpionis appellatione primum Acontium inuenit, quod alius Telyphonon & Pardalanchon appellatur. Porro Scorpionides quae sit herba, hodie ignoramus.

FINIS LIBRI IIII.

IN LIBRVM V.

VINIFERA VITIS.

Caput I.



VITA omnibus est quae in uineis colitur Vitis, Germanice *Weinstock* appellatur. Plurimas habet haec diuersis regionibus differentias.

LABRVSCA.

Aμύγδαλον, Latine Labrusca, Germanice *Wilder Weinstock* appellatur, eadem est cum praedicta Vite, praeterquam quod non colatur. Sola igitur hac nota ab illa differt. Nascitur apud nos circa uineas, & in uinearum sepibus.

VVA. Cap. II.

Σταφύλη, Latine Vva, Germanice *Weinstaub* uocatur. Intelligitur autem hac appellatione totus in Vite racemus multis acinis constans. Ipse acinus Vuae a Graecis *πάξις*, a Germanis *ein Weinbeere* appellatur. Passa uero Vuae a Graecis *πάσις*, & a Germanis *ein Weinbeere* appellatur. Cuius in Pharrnacopolis tres sunt differentiae. Omnium maxime sunt, quas hodie Cybebas appellant, anteriori pollicis articulo magnitudine fere aequales, Arabibus Vuae Cibus dictae. Secunda differentia continentur uulgares, quas simpliciter Vuas passas uocamus. Tertia uero omnium minime, nullo minus nucleo. Afferuntur haec non in racemis, sed ab his decerpit, & in grandes massas compactae. Pharmacopole tamen Corinthiacas

sive minores Passulas uocant, Germanice *Klein Rosin*.

LABRVSCAE FLOS.

Caput III.

Oλίανθον, syluestris Vitis, quam Labrusca uocant, flos est. Habetur eodem nomine herba etiam, quae in 3. lib. descripta est. Verg. Mar. Interpres in huius capituli Commentario scribit, se non meminisse, quod in aliquo loco apud Dioscoridem eo nomine herba legerit, cum tamen illius caput interpretatus sit, & adiectis etiam Scholijs illustrauerit.

OMPHACIVM. Ca. IIII.

Ομφάκιον immatura Vuae, quae *ὀμφάξ* Graece dicitur, succus est: ab Italis nunc Agresta appellatus.

VINVM. Ca. V.

Notum est omnibus Vinum, cuius natura uariis diuersis locis genitarum temperamentum sequitur.

LORA.

Λορέλας, sine *πότημος*, Latinis Lora, Germanis *Laur* uocatur. Fit ex pressis uuis, assusa aqua, & iterum calcatis.

VINVM MELITITES.

Οίνος μελιτικός ex austero melle & melle conficitur. Hodie uero non conficitur, nescio.

MVL SVM. Cap. VII.

Οινόμυλον, id est, Mulsum, ex ueteri austero uino & melle conficitur, apud nos non praeparatur.

A AQUA MVLSA. Ca. VIII.

Mελιγαζον Latini Aquam mulsam, Germani Honigschrauff uocant. Differt Melicraton ab Hydromele, quod Melicraton ex melle & aqua simpliciter fiat, estq; subitanea & temporanea confectio. Hydromeli uero similiter ex aqua & melle conficitur, sed preparatur ut seruari & actus statim ferre possit. Cuiusmodi est quod in Germania Medr appellatur, quo praeter Germanos etiam alij Septentrionales populi pro uino & ceruisia utuntur.

AQUA. Caput IX.

Nota est omnibus Aqua. Cuius qualitas secundum loca in quibus scaturit, uel per quae fluit, uariatur.

MARINA AQUA.

Nota omnibus ad mare habitantibus Marina aqua existit, pro qua nos in mediterraneis habitantes salinarum muriam, uel ex aqua & sale confectam aquam, accipere oportet.

THALASSOMELI. Ca. X.

Purgationum causa conficiebatur olim Θαλασσομέλι, nunc nusquam, quod ego sciam, conficitur.

ACETVM. Caput XI.

Oξος Latine Acetum, Germanice Essig appellatur. Quoties Acetum apud Medicos scriptum inuenimus, semper uini Acetum intelligere oportet, & nequaquam ceruisiae. Est autem Acetum uinum uel ceruisia uetustate corruptum, & in acidiliquoris saporem conuersum. Saxones qui Brunswicensem Saxoniam incolunt, ex industria etiam Acetum, quemadmodum ceruisiam coquunt, quod non fit ceruisia, sed statim mustum illud decoctum, refrigeratum in Acetum transfit, quo illis finitime gentes ferè omnes pro Aceto in cibis utuntur.

ACETVM MVLSVM.

Caput XII.

Οξόμελι Pharmacopole adhuc conficiunt, Oximel simplex uocantes.

OXHALME. Cap. XIII.

Οξάλμυ ex aceto & muria conficiebatur, iam uero nullus restat eius usus.

THYMOXALME. Ca. XIII.

Θυμοξάλμυ etiam Dioscoridis etate non amplius conficiebatur, eius tamen preparandi rationem Dioscorides tradit.

ACETVM SCYLLITICVM.

Caput XV.

Acetum Scylliticum adhuc in Pharmacopolijs conficitur, & Acetum Squilliticum uocatur. Quid autem Scylla sit, in secundo libro dictum est.

VINVM SCYLLITICVM.

Caput XVI.

Scylliticum uinum nusquam in Germania conficitur.

MARINA AQUA CONCINNATA uina. Caput XVII.

Non conficiuntur apud nos eiusmodi uina.

VINVM EX COTONEIS MALIS confectum. Caput XVIII.

Duplex est apud Dioscoridem huius confectio, sed altera tantum apud nos fit.

MELOMELI.

Μηλόμελι ex malo Cotoneo & melle conficitur. Rarus hodie est illius usus.

HYDROMALVM. Ca. XIX.

Υδρομέλι nusquam in Germania preparatur, neq; alibi confici existimo.

OMPHACOMELITES.

Caput XX.

Ομφακόμελι ex acerba uis succo & melle conficitur. Sed huius non ita frequens est in Germania confectio.

VINVM EX PYRIS CONFECTVM. Caput XXI.

Conficitur hoc quemadmodum Cydonite, sed rarus est eius usus in Medicina. Hic est medicus ex Pyris syluestribus succum exprimitur, qui uis saporem habet, sed ob frigidius temperamentum, et humiditatis inconcoctae abundantiam statim acescit, indeq; mustum ebibitur.

VINVM E LABRVSCAE FLORIBUS confectum. Cap. XXII.

Huius conficiendi rationem Dioscorides docet, sed nusquam apud nos conficitur.

VINVM EX PVNICIS.

Caput XXIII.

Ex Punicis malis exprimitur hoc uinum. Seruatur in Pharmacopolijs, & uinum Granatorum appellatur.

ROSACEVM VINVM.

Cap. XXIII.

Rosaceum uinum in Germania nusquam iudi preparari, Acetum uero Rosaceum ubiq; fit.

VINVM EX MYRTI BACCIS confectum. Ca. XXV.

Ex contusis & expressis Myrti baccis conficitur Myrtite uinum. In nostris uero regionibus nusquam preparatur.

VINVM MYRTEVM.

Cap. XXVI.

Vinum cui contusa Myrti baccae & ramuli cum folijs iniiciuntur, Graecis Μυρτινός, Latinis Myrteum appellatur.

LENT

A LENTISCINVM ET TEREBIN-
thinum unum. Ca. XXVII.

Lentiscum & Terebinthum arborem, nusquam in Germania habemus. Ideoq; hoc unum apud nos non confici potest.

PALMEVM VINVM.

Caput XXVIII.

Ex vulgaribus palmulis conficiebatur hoc unum. Nos illud nunc non preparamus. Arabibus Nabith vocatur.

FICATVM VINVM.

Cap. XXIX.

In Cypro olim ex Ficubus conficiebatur, eo quo Dioscorides docet modo, hoc unum.

VINVM RESINATVM.

Caput XXX.

Resina in frigidis regionibus uino adijcitur, ne accescat.

PINEIS NVCLEIS CONDITVM
unum. Caput XXXI.

Non preparamus hoc apud nos, nisi quis ex in diuina & Medicina causa conficiat.

CEDRINVM VINVM.

Cap. XXXII.

Cedrus arbor apud nos non prouenit. Quapropter illius baccis unum condire non possumus.

VINVM PICATVM.

Cap. XXXIII.

Picatum unum nusquam adhuc confici uidi.

VINVM ABSINTHITE.

Cap. XXXIIII.

Ex Absinthio ubiq; conficitur Vinum & Ceruicia, quod nulli incognitum esse existimo.

VINVM HYSSOPITE.

Cap. XXXV.

Hyssopo etiam unum, quemadmodum Absinthio, conficitur, & in multis Germaniæ locis conficitur.

MVLTI ALIIS PLANTIS CON-
dita uina. Cap. XXXVI.

Plantæ quibus sequentia uina conduntur, omnes antea descriptæ sunt. ipsa uero uina nondum conficiuntur.

VINVM AROMATITE.

Cap. XXXVII.

Conficitur hodie multiplex Aromatite unum, presertim in maritima Germania & Saxonia, quæ Claretum, & Lautertrancæ appellant. Sed secundum Dioscoridis descriptionem non conficiuntur.

PLVRIBVS DIVERSIS QVE ODO
ramentis condita uina. Ca. XXXVIII.

Sequentia uina apud nos non preparantur, solo Nectarite excepto, quod ex inule etiam, Nectarion appellatur, radicibus conficitur. Vbiq; uulgo Nektarwein uocatur.

PLVRIBVS HERBIS CONDITA
uina. Ca. XXXIX.

Herbe quibus sequentia uina conduntur, antea explicate sunt. Satis igitur sit nouisse, nullam ex illis apud nos confici præter saluiacum. Conficitur tamen in quibusdam locis etiam ex Dauco, quem syluestrem Pastinacam in 3. lib. nominamus. Ithæ in Thuringia ex Polio etiam unum præparant, cuius Dioscorides nullam facit mentionem. Sequitur etiam unum ex salis flore confectum. Quod uero sit salis flos, ipse Dioscorides hoc eodè lib. scribit in Metallicis medicamentis, quæ nunc sequuntur.

DE METALLICIS
MEDICAMENTIS.**CADMIA. Caput XL.**

Multe sunt Cadmiæ species, nos tantum duas in Pharmacopolijs habemus. Vnam ex fossilium genere, Alteram factitiā. Nam Germani Galmei, & Pharmacopoli Lapidem calamina-rem. Hanc uero Thutiam appellant, quæ omnium efficacissima est. Thutia autem Arabica est dictio, quæ metallicum Spodium & Pompholyga indicat Sera-
pio. Posteriores uero Botryites Cadmiæ minorem sic appellant, sed male. Est autem Botryites Cadmiæ minor, ex accenso & liquefacto erofolapide fuligo quædam sursum in caminos euolans, & ferreis hastis undiq; eminentibus tuberculis cæuæ adhaerens. Cadmiæ uocabulum recentiores in Cmaiam & Chniam corruerunt. Reliquum autem Cadmiæ genus in multas diuiditur species, à Galeno & Dioscoride descriptas, quarum maximus olim erat in Chirurga usus. Verum hæc omnes hodie ubiq; incognite sunt, quamuis in nostris metallicis fornacibus, maxime Goslarie, omnes species gignantur. Diuiditur autem omnis Cadmia in Natuam & factitiā. Natua duplex est. Vna cuius Galenus meminit, quæ in Cypro montibus & torrentibus inuenitur, Galeni ætate omnibus alijs à quibusdam Medicis prælata, cuius magna copia in Vuestphalia montibus & torrentibus reperitur. Aspectus æneus, et mixtis ueluti cubis constans, foris spadiceo, intus autem æreo aut argenteo colore. Altera lapis est ponderosus, scaber & uersicolor, quem antea Lapidem Calaminarem appellauimus.

Factitia autem Cadmia in plures species conciditur. Prima Botryitis dicitur, quod grandis racem inftar, à fornacum lateribus pendat. Hæc rursum duplex est. Vna qualem iam demonstrauimus, sponte & casu inter liquefaciendum genita. Altera

minore

A minor est, et ferris hastis ex industria fornacibus insertis, undiq; tuberosa, et racemosa facie adherens. Secunda Cadmie species Placodes appellatur, quod ueluti latus crustis compacta sit, quæ et ipsa duplicem habet differentiam. Una crassioribus constat crustis, altera multo tenuioribus, et sibi ipsi inuicem superiacentibus compacta est, quarum commissuræ candidantes aut pallide lineæ cingulorum modo intersecant, quæ ob causam Zonitis nominatur. Tertia uero Ostracitis dicitur, quæ testaceâ et terrestrem habet substantiâ, cōcretionem tenuis, et colore plerūq; nigricans, in ima fornace nascens, cum ceteræ in medijs fornacibus gignantur. Omnes prædictæ Cadmiæ duræ et pōderosæ sunt. Quarta aut puluerulenta leuissimaq; est, Pompholyx, id est, Bullæ, substantia et pondere similima, colore ut plurimum ex candido in æreum aut cæruleum modicè degenerans. Inuenitur et subsicca, quæ prædictæ plurimum bonitate cedit, Caputis uero uocatur, quod fuliginis et sumi modo leuis sit. Gignitur hæc non ut reliquæ in ipsis fornacibus, sed in earum ore, quo flammæ eluctantur.

SPODIUM ET POMPHOLYX.

Caput XLI.

Magno errore Spodium in Pharmacopolijs uocatur Ebur uelut, siue Canna, id est, arūdo combusta. Est enim hoc Arabum commentum. Adferibunt huic suo Spodio maximas in confortando epate uires, sed quas neq; ratione neq; aliqua experientia illi inesse cognoscere possumus. Verum tamen Spodium nihil aliud est, quàm extinctæ metallorum fauillæ, quæ propter pondus rursum decidunt, et circa fornacem cuiusq; pauimentum colliguntur. Hoc hodie in Pharmacopolijs Nihiligrisum, et à Germanis Grauwicht appellatur. Pompholyx uero teneberrimis et leuissimis fauillis constat, quæ summis fornacum caminis adherent, atq; in magnum corpus accrescunt, sed principio cum sit, in aqua surgentibus bullis similis est, unde etiam nomen inuenit. Pharmacopole eam Nihilialbum, Germani Weissnicht appellant. Probatur apud nos quæ Norimbergæ conficitur. Antispodia ueteribus dicebantur arborum quarundam frondes et chartæ exustæ, quibus utebantur pro Spodio, cum huius non esset copia. Tale etiam est Arabum Spodium. Nullum tamen Spodium, siue Antispodium intra corpus sumitur. Quapropter nemo credat Arabum Spodium eas uires in confortando epate habere, quas illi adscripserunt.

CREMATVM AES.

Caput XLII.

Inualuit hodie consuetudo, ut cuiusuis metalli rudem adhuc materiam, quam Germani Metallici Erz nunc, æris uocabulo significent. Quidam etiam hoc omnium metallorum generale nomen esse existimant, sed falsò. Nam nullus unquam autor, siue

Græcus, siue Latinus, qui de metallis scripsit, hoc testatus est, sed omnes æris appellatione, quod Græcis χαλκός dicitur, peculiare metallum significans, quod Germani Kupffer / et Latini recentiores Cuprum appellant, cuius laminæ uruntur, et in Pharmacopolijs Aes ustum uocantur.

FLOS AERIS. Ca. XLIII.

XΑΛΚΩ ανθος, id est, Aeris flos, plurimum differt à re metallica, cōposito nomine χαλκωνος appellata. Est autem propriè Flos æris, tenuissima æris liquefacti substantia, quæ ex repentina frigide aque affusione in milij magnitudine colore purpureo ceu grana densatur et exspuitur. Nul- lum hodie in Medicina usum habet, quoniam ferè omnia metalla ignota hæcenus fuerunt. Errant aliqui ex recentioribus, qui æruginem, id est, Spangrün / sorem esse æris existimant.

SQUAMA AERIS.

Caput XLIII.

Αεωίς χαλκός, id est, Squama æris, est æris superficialis, quæ malleorū ictu in squamas resoluitur. Duplex eius genus est, crassa, et firmè modo tenuis. Crassa Kupferschlag Germanis dicitur. Subtilior uero Kupferbraun / siue Besselbraun. Tenuiorem Plinius etiam Stomoma appellat, quod ex summa lanugine excuciat. Porro Stomomatis squama, de qua hoc loco Dioscorides agit, à tenui illa plurimum differt. Nam tenuis squama ex ere sit. Stomomatis uero Squama ex optimo ferro, quod ueteres Stomoma appellabant, quoniam cultellorum et gladiorum acies (quas ora etiam appellat sacra scriptura) ex illo fierent. Stomoma ferrum hodie etiā Chalybs, et Germanice Stahel uocatur. Vergilius Marcellus errat, quod Stomomatis squamam, æris squamam uocat. Nam ipse Dioscorides aliter scribit.

AERVGQ. Ca. XLV.

Ioy Græci æruginem uocant, quoniam florida sit æris rubigo, quæ priuatim in ære arugo, ut in ferro ferrugo, uocatur. Pharmacopolijs uiride æris, Germanis Kupffergrün / Spangrün / et Grünspon appellatur. Qui barbaris et improprijs uocabulis delectantur, æruginem Prasion uiride uocant, ut simpliciter Prasion appellatam herbam ab ea distinguant, sed ridicula hæc est distinctio. Sunt autem duo potiora æruginis genera. Vnum idy Eusōp, à Græco uerbo εἶω, quod rado significat, dicitur. Hoc ex industria et arte præparatur, et laminis æris raditur, unde nomen inuenit. Derasum in massas formatur, et hæc est quæ ubiq; habetur ærugo. Alterius eius genus sponte in erarijs metallis siue fodinis gignitur, et interdum in uermiculorum formam con- crescit, quapropter idos σκωλός nominatum est. Hoc autem hodie in nullo usu Medicis est. Inuenitur

tamen

A tamen non rerd in nostris erarijs seditis.

FERRVGO. Cap. XLVI.

Idē αὐτῶν, Latinis Rubigo ferri, siue ferrugo, Germanis Eisen rost appellatur. Nota omnibus res est.

RECREMENTVM FERRI.

Omnium metallorum recrementū Greci οὐρογῆ, Germani Schlacken appellant. Hoc uero capite de ferri tantum recremento agit Dioscorides, quod nos Eisen schlacken appellamus. Quidam ex recentioribus ferri squamam improprie etiā οὐρογῆ uocant, ex qua pilulas præparant, à calore resolutio uentriculo salutare.

PLVMBVM ELOTVM.

Cap. XLVII.

Plumbū Grecis μόλυβδος, Germanis Blei uocatur. Duo habet genera Plumbum. Vnum nigrum, Alterum candidū dicitur. Illud est quod hodie simpliciter Plumbum, & à nobis Blei appellatur. Hoc uero iam stannum tantum Latini, & Sin Germani nominant. Porro elotum plumbum ex nigro fit, estq; nihil aliud quam ipsum Plumbum, cum liquore aliquo in crassiusculam substantiam detritū, quod siccatum in puluerem transit. Malignis & talidus uiceribus curandis utilissimum.

CREMATVM, SIVE VSTVM

Plumbum. Cap. XLVIII.

Plumbum usq; in cinerem crematum hoc loco intelligit Dioscorides. Rarus hodie eius est usus.

RECREMENTVM PLVMBI.

Plumbi οὐρογῆ, siue recrementum, Germani Bleischlacken appellant.

PLVMBARIVS LAPIS.

Αἰδο μολυβδεδῆς lapis est metallicus, colore plumbi, ex quo etiam Plumbum excoquitur. Germani Metallici illum Glantz appellant, Plinius etiam galenam. Estq; pariter argenti & plumbi ferax uena.

STIBIVM. Caput XLIX.

Stibium Greci στίβη & στίβη, Pharmacopole Antimonium, Germani Spießglasß appellant, quod Plinius etiam alabastrum & Larbasum uocari scribit. Est autem scissile metallum, colore plumbi, cum prunis iniicitur, sulphuris modo liquefit, & foetidum odorem remittit. Si diutius cremetur, tandem in plumbum transit.

PLVMBAGO. Ca. L.

Plumbagnem Greci μόλυβοειδὲς uocant, cuius duplex est genus. Fit enim quædam cum plumbo aurum, siue argentum purgatur. Estq; horum metallorum fex, quæ ablata massa in fundo catini reperiuntur. Hec Germanicè Test appellatur, Aliter

sofalis est, colore predictæ non dissimilis, quæ plumbiferæ uena est: nonnunquam etiam argenti. Eam Germani Bleischweyß uocant. Plinius utranq; hæc plumbagnem galenam etiam uocat. Vtebantur ueteres in emplastris Molybdæna. Iam uero à Metallistis tantum cognoscitur.

ARGENTI RECREMENTVM.

Cap. LI.

Argenti recrementum priuatim Greci ΕΑΥΡΟΜΑ, Germani Silberschlacken uocant.

SPVMA ARGENTI.

Caput LII.

Argenti spuma Grecis Αἰδράρυμα, Pharmacopolis Lithargyrium, Germanis Silberschaum, & Gledt uocatur. Duplex eius generis colore distinguitur. Quoddam enim aurco est colore, idēq; Grecis χρυσοίτις, Pharmacopolis Lithargyrium auri, Germanis Goldgledt dicitur. Alterum colore argenteum candorem imitatur, quod Grecis ἀργυροίτις, Pharmacopolis Lithargyrium argenti, Germanis Silberglede nominatur. Est autem Lithargyrium plumbum nigrum, quod purgationis causa argento additur, cum argenti sordibus in spumam concretum.

CERVSSA. Ca. LIII.

Yμυδιον Greci, Cerussa Latini, Bleiweiß Germani uocant. Et hæc plumbum est aceti acerrimi halitu in candidum pollinem resolutum. Hæc si uratur, donec rufum contrahat colore, colorem facit, qui Sandix appellatur. Quem Vergilius intelligit, cum ait:

Sponte sua Sandix pascentes uestiet agnos.

Quo loco aliqui Sandicem herbam esse interpretati sunt, quæ lanæ inficiat: sed malè, quamuis ipse Plinius etiam crediderit Vergilium herbam intellexisse: quod tamen ex uerbis illius nullo modo colligi potest.

CHRYSOCOLLA. Ca. LIII.

Chrysocolle Germanis Schiefergrün appellatur, quæ olim pictores & aurifabri utebantur. Illi, quoniam iucundum haberet colorem: hi uero ut aurum ferruminarent, unde etiam nomen inuenit. Hædie nullum habet in Medicina usum.

ARMENIVS LAPIS.

Caput LV.

Armenium, siue Armenius lapis, eruginosum habet substantiam, idē erugini quoq; secundum proportionem in utribus respondet. Paucissimi Pharmacopole hunc lapidem habent, quidam tamen eundem Smaragdī nomine ostendunt, sed magno errore.

COERVLEVS. Ca. LVI.

Kavos, siue Cæruleum, Arabibus Lapī lazuli, Germanis Lazurstein uocatur.

Duplex

A Duplex illius genus est. Vnum in aurifodinis inuenitur, uenis eius per lapidum commissuras in diuersas partes tendentibus. Alterum in maritimis quibusdam littoribus gignitur, crasso sabulo simile. Est etiam scititium, quo pictores tantum utuntur. In Pharmacopolis ex coeruleo pilule sumuntur, quas de Lapide lazuli cognominant.

INDICVM. Ca. LVII.

Male lapidis appellatio Indico preponitur, nequaquam enim lapis est, sed color in purpurea coeruleus, propterea Dioscorides cum coeruleo coniungit. Est autem duplicis differentie. Vna in India arundinibus adnascitur, ut scribit Dioscorides. Altera insectium, siue *Βατρίλιν* appellatur, que apud nos a timetoribus ex Isatide herba preparatur, cuius florida spuma est, unde a Germanis *Weydtblüm* et Indich appellatur.

OCHRA. Ca. LVIII.

Ochra lutei coloris terra est, quam Germani *Ochergel* uocant, Cuius tres sunt differentie. Quoties Ochra colore plantarum flores a Dioscoride describuntur, non pallidus color tantum, sed luteus etiam intelligendus est.

CINNABARIS. Ca. LIX.

Cinnabaris sine dubio est gummi siue exiccatus ille rubeus succus, qui in Pharmacopolis sanguis Draconis appellatur. Plinius ex Elephanto et Dracone pugna elisum et commixtum sanguinem esse credit, Verum falsum, et mercatorum fabulis deceptus. Nostra etate inuentum est, proceræ cuiusdam arboris in Aphrica genitæ gummi, siue lachrymæ esse. Fallitur Anto. Musa, dum putat nostrum Draconis sanguinem diuersum esse ab eo, qui a Serapione describitur, quoniam Serapio Sideritis esse succum scribat. Quia in re errauit Serapio, Propterea non sequitur, quod sint res diuersæ.

MINIVM.

Minium, cuius hoc capite meminit Dioscorides, uena est, ex qua Argentum uiuum conficitur, et alio uocabulo etiam *Αργυρον*, a colore uocatur, Germanis *Berginob* et *Queck silber* etiam nominatur. Quod hodie ubique Minium a Pharmacopolis, et Germanis *Wenge* dicitur, minime uerum est Minium, sed sandicis species, neque unquam ex eo Argentum uiuum fieri potest, quod Minio proprium est.

ARGENTVM VIVVM.

Caput LX.

Argentum uiuum, siue Vena eius in marmore, siue per se inueniatur, idem est. Plinius Hydrargyron ab Argento uiuo distinguit, sed male. Germanis *Queck silber*, Pharmacopolis *Chimistis Mercurius* appellatur.

RVBRICA SINOPICA.

Caput LXI.

Mila et *Σινωπικη* in Cappadocia olim effodiebatur, nunc uero in nullis Pharmacopolis habetur.

FABRILIS RVBRICA.

Caput LXII.

Fabrilis rubrica est rufa gleba, quam hodie Bolum appellamus. Huic etiam cognata est lapidosa ista terra, quam nos *Βδελ* siue *Βδελστεν* uocamus.

LEMNIA TERRA.

Caput LXIII.

Rarisime hodie Lemnia terra affertur. Mirum enim in modum adulteratur. Olim hæc Lemnia spheargis id est, Sigillam appellabatur. Nunc uero Terra sigillate appellatione in Pharmacopolis habetur, sed que minime uera sit.

ATRAMENTVM SVTORIVM.

Caput LXIII.

Atramentum sutorium Greci *Χαλκαντιον* Pharmacopole Vitriolum, Germani *Rupf* feruasser appellane, nullas habet differentias. Quoddam in stiris destillando concreuit, unde *αλκτις σαλακτιον* et *αρχαντιον* appellatur. Quoddam in glebas concreuit, quod *πικρον* id est, gelatum uocatur. Tertium coquitur donec refrigeratum gelatur, hoc *επιδον* nominatur, et ubique habetur. Colore etiam distinguitur Chalcanthum. Est enim coeruleum, uiride, et candidum. Posterioris Dioscorides non meminit. Mirum in modum errat Antonius Musa, quod scribit Vitriolum Romanum nunc appellatum, ueterum Mysi esse. Olim coria sutores Chalcantho tingebant, unde apud Latinos nomen inuenit.

CHALCITIS. Ca. LXV.

Quantum ex Galeno colligere possumus, duplex est Chalcitis. Vna que in fodinis creta inuenitur. Altera que ex Chalcitho fit. Viraq; hodie ignota est, quamuis in nostris ararijs fodinis reperiatur. Galenus cum scribit Chalcanthum etiam in Chalcitida paulatim mutari, incepta foris a superficie mutatione, non intelligit in superficie cuiusuis Chalcanthi colore in candidam seu pallidam substantiam resolutam materiam, ut Musa falso putat. Quapropter idem Musa immerito reprehendit Galenum, qui ipse metallicas fodinas inspicit, et diligenter Chalcanthi in Chalcitida mutationem obseruauit, Musæ uero nulla omnino in metallicis fides habenda est, cum in sacros errores incidat, ut potest homo qui nullas unquam metallorum fodinas inspicit. Nihilominus tamen ipsum Galenum et Georgium Agricolum, metallicarum rerum diligentissimos scrutatores, inscitie arguere non erubescit. Sed impune nequaquam hoc fecerit. Quandoquidem pro-

A pedem teneris suis pennis luet, ubi Georgius Agricola suas de rebus metallicis lucubrationes addidit.

PSORICVM.

Verrucosorum compositio est, ex metallicis quibusdam medicamentis, contra scabiem, facta, unde et nomen inuenit.

MISY. Caput LXVII.

Misy non minus quam Chalcanthum, congelatus est humor, qui per commissuras Pyritidis, id est, erarij lapidis, fluxit: Ibidem aliquandiu contentus in duram, sed interim friabilem, substantiam concreuit. Est autem Misy gleba, substantia, sapore et uiribus Chalcantho similis aspectu, atque in friando arenose nature, colore aureo, stellarum et scintillarum ignis modo splendens. Fuit hoc medicamentum olim Galeni etate in frequenti usu, à quo tempore usque ad nostram etatem omnino incognitum fuit, nec adhuc à quoquam cognoscitur, uno atque altero excepto. Antonius Musa in suo de Simplicibus examine scribit, Vitriolum uulgo appellatum in Pharmacopolijs Romanum, uerum esse Misy, magno, scilicet et pudendo errore. Siquidem Vitriolum Romanum uiridissimum habet colorem, Misy aureum: nec est illa in aspectu notis, quæ conueniat. Non animaduertit tenerarius ille homo, Vitriolum Romanum illam esse Chalcantis speciem, quæ Pecton uocatur, uiridi aut ceruleo colore, et sponte in sodinis concresecens, unde nomen inuenit. Huiusmodi sanè homines Herculi mihi similes esse uidentur, Lerne hydrae capita amputanti. Nam cum unum errorem tollere nituntur, quod tamen in cassum conantur, multo plures et periculosiores subitunt, eosque stabiliunt. Habetur enim scriptis eorum non parua fides. Verum autem Misy in maxima copia inueni Goslarie, cum in metallicas fodinas ibidem descendissem, omnino ea facie, colore, substantia et facultate, quibus à Dioscoride, Galeno et Plinio describitur. Cuius magnam quantitatem mecum huc Vitenbergam attuli, sperans posse fieri, ut rusus in usum recipiatur.

ATRAMENTVM METALLICVM. Caput LXVII.

Melanterie uelay Pharmacopole adhuc Atramentum nigrum, siue griseum, Germani Atramentum apellauit.

SORY. Caput LXVIII.

Sory Melanterie cognata res esset, nisi rufum magis colorem haberet. Pharmacopole Sory ostendens sub Atramenti rubri nomine, Germani rot Atramentum uocant. Sciendum est Chalcanthum, Chalcitida, Misy, Melanteriam, et Sory, omnia ex una materia constare, nempe gelato humore, qui per lapides et in se habentes, fluxit et destillauit,

sed differre, secundum admixtam illi terre diuersitatem, quo fit ut omnia illa in aqua cocta Chalcanthum remittant.

DIPHRYGES. Ca. LXIX.

Triplex est Diphryges genus. Primum luto simile quiddam est, et in cuniculis è terra eructatur, quod Dioscorides in sola Cypro gigni testatur. Sed hoc certò affirmare difficilimum est, cum tam spaciosum terrarum orbis, multa habeat loca omnium metallicorum medicamentorum feracia, quibus olim Cyprus nobilitata fuit. Inter quæ Germania iamdiu principatum obtinet. Ipsam nationem Diphryges non minus quam Cyprus gignens. Eructatur namque Goslarie è terra in cuniculis colore luteo, substantia lentum glutinosumque, figuram cretæ modo tanto impetu, sed paulatim expulit, ut lapillos etiam prodicens sursum attollat: natura et facultatibus Misy respondet. Secundum fax æris est, quemadmodum Molybdæna auri et argenti. Tertium ex Pyrite lapide uisio preparatur. Omnium tamen optimum est secundum, quod Germani Offenbruch uocant, hodie nullum habet in Medicina usum. Pandeclarus uehementer errat, quod Diphryga et lapidem Phrygiæ eandem rem esse scribit. Confundit enim hæc duo.

AURIPIGMENTVM.

Caput LXX.

Auripigmentum Græci Αφρωνίον uocant, Germani Auripigment, siue Opement. Chimistæ et Pharmacopole Arsenicon ab Auripigmento hodie distinguunt. Nam Arsenici appellatio ne facta quædam ex metallicis quibusdam uenena indicant. Est autem apud Græcos et Latinos duplex Auripigmenti genus. Vnum in glebas concretum et lapidosum. Alterum in laminas, fissile et purum. Hæc uerò optimum est.

SANDARACHA. Ca. LXXI.

Sandaracha eandem habet cum Auripigmento materiam, et in iisdem fodinis, et in iisdem glebis inueniuntur. Differentia est quod summeo colore, ut Cinnabaris metallica, fulgeat, propterea ab Arabibus Auripigmentum rubrum uocatur. Hodie in Pharmacopolijs gummi linniperi Sandaracha uocatur, maximo errore, et qui ab Arabum interpretibus originem duxerit. Antonius Musa, Georgius Agricola in Sandaracha reprehendit immeritò, quoniam ipsius Agricola uerba de Sandaracha nullo modo intellexit.

ALVMEN. Ca. LXXII.

Alumen Græcis Στρωγγία, Germanis Alumen uocatur. Multa olim eius erant differentia. Nos uerò illud habemus, quod Græci Πολύτιδος, id est, glebosum, atque hoc factitium. Nam ex natius glebosus scissile Alumen gignitur, quod slos uelut illius est, uiribus efficacissimum omnium. Antonius

A Musa turpiter errat, quod scribit Alumen scissile esse illud, quod hodie Alumen plumosum, siue de pluma uocatur. Nam omne Alumen in aqua resoluitur, & in igne exurit. Plumosum uero in aqua nunquam dissoluitur, neque in igne mutatur, etiam si pluribus diebus cremaretur. Alumen scissile omnium efficacissimum totum os astringit, Alumen uero plumosum nihil omnino præter quod exiccat. Quid uero Alumen de pluma sit, statim indicabitur, ubi ad lapides peruenientum erit.

SVLPHVR. Ca. LXXXIII.

Graci Sulphur, Germani Schwefel appellant. Vium Sulphur appellatur Græcis *θεογον*, quoniam ignem nondum expertum est. Taceat omne fossile Sulphur, quod nondum liquefactum & in frustula fissum est.

PVMEX. Ca. LXXXIII.

Pvmex lapis omnibus est notus, quem Græci *κίονες*, Germani Simba appellant. Est autem lapis in ardentibus montibus natus, qualis in Melio, Lypara, Sicilia, & alijs quibusdam locis sunt, & quibus insulis & montibus mari expostitis, nonnunquam in mare præcipitantur, cui postea innatant propter substantiæ raritatem, quod uidentes nautæ & mercatores, spumam maris esse pumicem credunt, sed falsò.

SAL. Caput LXXXV.

Salis genera plurima sunt. Prima tamen diuisio hæc in duo genera diuiditur. Quidam enim fossilis est, & quidam factitijs. Ex fossili olim maximè probabatur ad Medicinam Hammoniacus, pro quo alius factitijs eiusdem nominis irrepit, aurifabris & cæterijs fabris quàm Medicis utilior.

Nunc uero fossili primam bonitatis notam habet, qui lucem transmittit, & in cubos dum frangitur se diuidit, quem gemma salern Pharmacopole uocant.

SALIS SPVMA, AVT LANVGO.

Alòs *αλς*, id est, Salis spuma, qua hodie omnino in nostris Pharmacopolijs caremus, quamuis etiam in nostri maris cauitibus gignatur, ut in Suecia, Dania, & Noriunega.

MVRIA. Ca. LXXXVI.

Alme, id est, Muria duplex est, Natua & factitia. Natua ex salinarum fontibus hauritur. Factitia eo modo preparatur, quo Columella docet. *Germani Muriam factitiam Salglaeten. Rati nam uero Sahl appellant.*

SALIS FLOS. Ca. LXXXVII.

Alòs *αλς* & in Aegypto Nili gignitur, & in alijs quibusdam locis. Quapropter nobis ignotus est.

NITRYM. Ca. LXXXVIII.

Nitri multe sunt differentie. Ex quibus etiam est quod hodie Salpetra appellatur. Hoc substantiæ tenuitate omne aliud Nitrum antecellit, differtque à ueterum, id est, uero nitro, quod salis modo candentibus testis prunisq; impositum, primum paucas bullas emit, quibus cessantibus ipsum nitrum remanet, nec ab ipso igne accendi aut consumi potest, sed salis modo totum igni resistit. Nostrum uero nitrum, quod ex nitro & terre diluto coquitur, contra ignem ocyssimè flammam concipit, totumq; in aërem resoluitur. Hinc colligimus ualde esse tenuis partium. Nam gustatum quoque cum maxima tenuitate pungit, atque copiosam ex alto saluam prouocat. Errant igitur, qui nitrum frigidum esse pronunciant.

SPVMA NITRI.

Dupliciter huius medicamenti nomen profertur. Aut enim duobus separatim uocabulis *Αφρόνιτρον* nominatur, aut ex utroque composito nomine *αφρόνιτρον*. Hinc Martialis in Apophoreti utrunque illi nomen hoc disticho tribuit:

Rusticus es, nescis quid Græco nomine dicas,

Spuma uocor Nitri, dicor & Aphronitrum.

Gignitur autem duobus modis. Primum per se in cauitibus cauernosis, nullo iuxta nascente nitro. Secundo autem, in ueri nitri, quale in Aegypto habetur, aceruis superficiem in spumam substantiam resolutis eius glebis, quod ad nos omnino non adfertur, neque apud nos hactenus inuentum est. Primum uero in petris & antiquis muris ex nitroso tenuiq; humore illis concepto gignitur, habetq; hoc duas ab inuicem diuersas species. Quod enim in petris nascitur, substantiam habet magis terrestrem, ideoque in testa prunis impositum, donec ipsa testa exciderit, primum bullas agit, quibus attolli desinentibus, id quod aqueum in eo erat, consumptum esse cognoscimus, quo consumpto quod terrestre est, salis & ueri nitri modo remanet. Hinc dicit Dioscorides, paulò post principium, quod utrunque tam nitrum quàm spuma nitri, salis modo torreatur, uel cremetur. Porro Aphronitrum in antiquis muris nascens, iam dicto aspectu simile est, colore candidissimum, substantia uero multo tenuiore, quàm in petris natum constat. Ideoque factitij nostratis nitri instar prunis impositum, facillimè flammam concipit, totumq; in flammam, fumum & aërem resoluitur: capelle uehementer huius linetum delectantur.

Notasse autem oportet, omne nitrum quod accendi potest, non esse illud nitrum quod ueteres describunt: *Eulor uero totum nitrum quàm Aphronitrum non ubiq; terrarum idem est. Alii enim rubens, alibi ad purpuram inclinans. At Aphronitrum quod ibi cauernosis cauitibus adnascitur, partim cinereo, partim candidissimo cõfiscitur colore, atque hoc triticea simile aspectu simile est, ut etiam Galenus scribit.*

Quod

A Quod autem antiquis muris efflorescit, nunquā alio
quā candido confexi colore.

FABEX. Cap. LXXIX.

Fecis appellatione hoc loco Vini & Acti facē
intelligit Dioscorides. Est autem Fex horum liquo-
rum sedimentum, quod Germani Sefen appellant.

CALX. Ca. LXXX.

Alexos Græcè inextincta Calx appellatur,
Germanicè Ungeleschrex Balck. Crema-
tur et Calx ex marinis buccinis, ut in maritima Ger-
mania ora, ubi omnia ædificia, tam publica quā
privata, huiusmodi calee extruuntur. In mediterrā-
neis locis ex albo lapide et marmoris genere quodā
siliore paratur.

GYPSVM. Cap. LXXXI.

Gypsum in multa genera diuiditur. Quoddam
in longos & rectos pectines funditur, quoddā
uero in laminas, quod idem est cum Aphoselino, siue
speculari lapide. Quoddam etiam in glebas magnas
concreuit. Omnia hæc genera Germani Gips uo-
cant.

**SARMENTORVM VITIVM CI-
NIS. Cap. LXXXII.**

Sarmenta uitis omnibus nota sunt, ex quibus Ci-
nis litiuæ causa uritur: quamuis ipse etiā Cinis per
se Medicinam faciat.

B HALCYONIVM. Ca. LXXXIII.

Alxuonij marine sive speciei est, propterea
in Pharmacopolijs spuma maris uocatur, cuius
quinq; habentur differentie.

ADARCES. Ca. LXXXIII.

Adxegæ quoq; spumosum quiddam est, quod
Itali Pallam marinam uocant.

SPONGIAE. Ca. LXXXV.

Sponge omnibus note sunt, quibus mense & a-
lia quedam exterguntur, Germanicè Schwemme
uocantur: quo nomine etiam Fungi continentur.

CORALLIVM. Ca. LXXXVI.

Corallium lapideus frutex est in mari natus, cu-
ius tres species triplici colore distinguuntur.
Est enim nigrum, candidū & rufum. Omnes Germa-
nicè Corallen appellantur. Vulgatius est rufum, &
preciosius candidum. Nigrum rarō inuenitur, et pri-
uatim & vltro adēs uocatur.

**PHRYGIVS LAPIS.
Caput LXXXVII.**

Quod sit lapis Phrygius ab omnibus in-
cognitum est, quāuis in omnibus firē Phar-
macopolijs habeatur sub lapide Lyncis nomine. At
cum duo sine lapides Lyncis appellatione uenientes,

necesse est ut indicem, uter horum Phrygius sit. Pri-
mus itaq; instar digiti oblongus atq; teres est, & in
mucronem definit. Alter uero aspectu terræ glebam
imitatur, medianq; inter lapidem & terram sub-
stantiam habet: colore est pallidus aut subsuscus, can-
didisq; maculis & lineis ueluti situm contraxisset, di-
stingatur. Posteriores hunc Phrygium lapidem ef-
se censemus. Autor Pandectarum atq; Serapio Di-
phryges & Phrygium lapidem confuderunt, eandē
rem esse falsō existimantes.

**LAPIS ASSIVS.
Ca. LXXXVIII.**

Asius lapis in Assi Troadis promontorio inueni-
tur, unde nomen inuenit. Hodie uerō ignotus est.

**PYRITES LAPIS.
Cap. LXXXIX.**

Pyrites lapis Arabibus Marchasta, Germanis
Ais uocatur, cuius multe sunt species, metallicæ
rei peritis cognite.

HAEMATITES. Cap. XC.

Hæmatites lapis nomen suum in Pharmaco-
polijs retinet, & Germanicè Blåtskem ap-
pellatur, cuius multe species à Plinio enumerantur,
quæ omnes in Hercinæ Saxonie montibus gignuntur,
una tantum excepta.

SCHISTVS. Cap. XCI.

Schistos scissilis est lapis, subacta & uiribus Hæ-
matiti similis, colore tamen magis pallido, & uiri-
bus secundum proportionem debilioribus ab illo di-
gnoſcitur.

GAGATES. Ca. XCII.

Gagates & Thracius lapis substantia & uiri-
bus ualde similes sunt. Vtraq; enim ex bitu-
minosa materia constat. Distinguuntur inuicem for-
mæ diuersitate. Gagates enim crustaceus est. Thra-
cius uero sibi ipsi undiq; æqualis. Porro & lapidis Gaga-
te species est, qui copiose in Germaniæ montibus in-
uenitur, & quo fabri ararij & ferrarij pro carbo-
nibus utuntur, quod ex substantia, odore, uiribus &
forma demonstrari potest. Germanicè hi lapides
Steynfolen appellantur. Hoc Gagatæ genus
Theophrastus & vdgætes γαδίας uocat.

**THRACIVS LAPIS.
Caput XCIII.**

Thracius lapis idem est cum succino nigro, quod
nos Schwarz Augsteyn appellamus.

MAGNES LAPIS.

Magnes lapis in multis Germaniæ locis inue-
nitur, propterea omnibus notus est, Germa-
nicè Magneth, & Eisenbrant uocatur. Najcis

Atur in Misne montibus, & in Hercinia Saxonia, prope Harzburgum, militare Germanicum à Goslaria distantem arcem, & ab eius loci incolis Segelssteyn appellatur, quod nauta eorum autur.

vnser Stawen Eiß/ & Erdtglas appellam. An dicitur in laminas, ex quibus olim fenestra fiebant, quales adhuc in uetustis templis & edificijs uidemus.

ARABICVS, GALACTITES, MELITES, MAROCHIVS, ALABASTRITES, & THYITES, LAPIDES.

Arabicus, Galactites, Melites, Marochius, Alabastrites, & Thyites, hodie omnino incogniti sunt lapides: quamvis ad Thyiten etiam referri possit lapis, qui Stolpe nascitur, duritie sua etiam ferrum durissimum respuens. Ex hoc olim mortaria fiebant, unde & nomen inuenit. Porro Galactites Hildenshemij gignitur, ipsam formam, substantiam & uiribus, quas illi Dioscorides tribuit. Arabicus quoque quamvis non cognoscatur, Hildenshemij in montibus inuenitur, partim candidissimo, partim maculoso eborei similis. Vtutus exasperatur, idcirco optimum dentificium existit.

IYDAICVS LAPIS.

Iudaicus, qui etiam Palamites, Phoenicites, Tholcolites & Eurius appellatur, adhuc in Pharmacopolis Iudaici nomine habetur. Plinius ex eo lapide quatuor fecit lapides, nominum diuersitate deceptus. Est autem insigni & mirabili forma lapis, in quo solo naturæ artificium cognosci potest.

AMIAIVS LAPIS.

Amiantus lapis sine dubio est scissilis ille & friabilis lapis, quem Pharmacopole Alumen plumosum uocant, qui tam habet naturam, ut igne nunquam consumatur, etiamsi aliquot diebus cremetur. Multe eius differentie sunt. Inuenitur interdum flexilis, ut fila & tela ex eo fieri possint. Agrythæ pilos Salamandræ esse dicunt, sed falsum. Est enim lapis qui ex montibus effoditur. Plinius Indici cuiusdam lini meminit, quod igne consumi non possit: sed mercatorum fabulis deceptus. Nam idem est cum Amianto linum illud. Germanicè hic lapis Federweiß/ Steinschach/ Steindacht/ vñ das Ewig liecht appellatur. Est & aliud Amiantum, quod in laminas finditur, ut lapis specularis, sed huius nullam facit mentionem Dioscorides.

SAPPHIRVS.

Sapphirus gemma est omnibus nota, cuius plures sunt species, uulgo Saphir uocatur.

MEMPHITES.

Memphites circa Memphim urbem Aegypti inuenitur. Hodie uerò omnino incognitus est.

SELENITES.

Selenites qui alio nomine Aphroclinus uocatur, eadem est cum speculari lapide, quem Germani

IASPIS.

Iaspis multas habet species, quæ colore distinguuntur, hodie tantum notus est qui ad rufum colorem inclinat, lena pluribus alijs locis in Germania nascens.

ACTITES.

Actites non in aquilarum nidis gignitur, sed in montibus & saxorum commissuris inuenitur. Germanicè Adler's stein uocatur.

OPHITES.

Ophites multas habet differentias. Qui uerò cinereo est colore, & maculis distinctus, in Germania etiam inuenitur, & uulgo Schlangenstein appellatur, è quo cochlearia & pocula fiunt, quæ contra uenena uim habere creduntur. Diui Benonis monumentum quatuor columnis ex Ophite factis sustentabatur. Misne in arcis templo, quod hoc anno destructum est.

Porro Ophites, cui grauitatem Dioscorides tribuit, hodie omnino non cognoscitur, dubiumque est utrum ea uox Sapp'is, id est, grauis, ad pondus an ad odoris grauitatem referenda sit. Porro Hildenshemij marmor planum ceditur, maculis atque etiam squamis serpentinis similibus confans, odore cum teritur graui usum cornu, simulque putrida oua referentis, qui etiam eo odore aliquam saluberrimum fontem sub huius marmoris petra largus undis fecaturientem inficit. Nam ieiuno stomacho haustus, ructus cit odorem & saporem ipsius lapidis referentes. Porro hoc marmor sine dubio est Ophitis species. Hinc colligitur, grauitatem non ad pondus, sed ad odorem referendam esse, cum alijs ferè omnes lapides ponderosissimi sint.

SPONGIARVM LAPIDES.

In Spongijs testacei inueniuntur lapides, qui in Pharmacopolis adhuc habentur.

LITHOCOLLA.

Lithocolle gluten est, quo lapides & lapides fractos conglutinant. Germanicè Steinleim uocatur, cuius plures sunt confectiones.

OSTRACITES.

Ostracites Hildenshemij nascitur substantia & asperitate testas lateresque imitatur, atque percussus eorum modo resonat, concretionem planam est, sibi ipsi crebris et uolueribus interpositus.

AM YRIS

A SMYRIS LAPIS.

Smyris duritia Adamanti proximus est, ideoq; Gemmarij utroq; gemmas poliuunt. Vitrum etia eo finditur. Germanice Schymigel / siue Schmyril uocatur.

ARENA LITTORALIS.

Hoc loco intelligenda est Harena, que in maris littoribus inuenitur.

COS NAXIA.

Naxie cotes in Cypro olim inueniebantur, nobis pro eis alias accipere licet, que simile habeant temperamentum.

GEODES LAPIS.

Geodes lapis Aëtites cognatus est. Quemadmodum enim Aëtites lapidem, ita Geodes terram in se complectitur, propterea à Græcis γεωδης, et à Germanis Erdfstein uocatur. Gignitur in Misnia non procul à Dresda, et in Saxonia prope Hildenshemiam urbem.

TERRA. Caput XCIII.

Etria, Samia, lapis in Samia terra repertus, Chia et Selenusia terre hodie omnino non asferuntur. Cimolia uero Creta etiam appellatur, cuius duplex genus colore distinguitur. Est enim pura purasceus altera, et candida altera, hanc Cretam Latini, et Germani Breiden / siue Enit appellant. Afferitur ex Anglia.

MARINAE TESTAE.

In maritimis locis et littoribus ex salis aspersione, terra et calculis testacea corpora concresciunt, que Dioscorides hoc loco intelligit.

TERRA EX FORNACIBVS.

Fornacum terra omnibus nota est, quam Germani Ofen leyden / siue Backofen leyden

uocant. Non tamen intelligenda est terra, siue lutum ex quo fornaces fiunt, sed ea que iam in fornacibus longo tempore exusta est.

MELIA TERRA.

Ex Molo insula olim terra hac in alias terras ferebatur. Nunc illi cognata quedam alia ex Tripoli Aphrice affertur, temperamento, uiribus et substantia Meliam referens, qua Barbitonfores in extergendis peluibutuntur. Ipsa tamen Hildesheimij inuenitur, ea substantia, colore, strepitu, et abstergendij ui, quibus hic describitur. Plinius candidæ etiam meminit, que Melini nomine et ipsa ibidem reperitur.

AMPELITIS TERRA.

Ampelitis, siue Pharmacitis terra, Bituminosam habet substantiam, et gagatis modo crassacea est, et in assulas finditur. Scipillis talis apud nos etiam cum fossilibus carbonibus (quos gagatis speciem esse dixi) ex montibus eruitur Zuicaue in Misnie finibus, et Aquisgrani in inferiori Germania à fabris lignarijs Schwarze Kreide, id est, Ni gra creta appellatur.

FULIGO. Caput XCV.

Fuligo Græcis, Fuligo dicitur, Schimise Germanis. In primo libro de Fuligne dictum est, que ex pinguibus rectus conficitur. Hoc uero loco eam Fulignem intelligit Dioscorides, que in vitarijs Officinis ex siccis lignis flamma resolutis gignitur. Inuenitur etiam pinguis, lenta, et in negras massas pici similes concreta Fuligo, maximè in rusticis edibus, trabibus supra focum adherens, que ex humidis lignis fit, et Germanis Rûß appellatur, acrimonia prædictam superans.

ATRAMENTVM LIBRARIVM.
Caput XCVI.

Omnibus notum est quo scribimus Atramentum. Hodie tamen alia ratione fit, quam qua Dioscorides docet.

Finis Annotationum Valerij Cordi in
Dioscoridem.

534 EVRICII CORDI
EVRICII CORDI SIMESVSII, IVDICIUM DE HERBIS ET SIMPLICIBVS MEDICINAE: AC EORVM, QVAE APVD MEDICOS CONTROUERTANTUR, DECISIO & explicatio.

A.
Acaria uera non est agrestium Prunellorum succus, sed nascentis in Aegyptia cuiusdā spine fructus.
Acanthus, Branca uisina Romana, hodie ab Italis dicitur.
Aconitum alterum, id est, Lycostonon, Wolffs Kraut.
Acorus non est Gladiolus ille nostras, luteis Lilijs: Acutella, Dioscoridis est Ononis, Germanicē Sawhechel/ & Stallkraut.
Adianton, nō est muraria Rutha, Germanicē Mauerreuten.
Aegyplos non est dicta Aquileia herba, sed fortē Aueua, quam Virgilius sterile cognominat. Festucago à Gaza uertitur.
Agrimonia hodie dicta, uerum est antiquorum Eupatorium.
Aiuga, id est, Chamepitys, quae hodie sua moschata dicitur, corrupto scilicet ab ibiga (quod item ab abiga est corruptum) nomine.
Alcea fortē, quae Germanicē Sochleuchten / & Sigmarakraut nominatur.
Alciadium fortē syluestris Buglossa: habet enim semen quasi uiperinum caput.
Alibium, id est, Inguinalis & stellaria Buboniumq.
Alpine duplex, maior quae Caprifolium & Materfolia: Minor, quae altera Auricula muris dicitur.
Alyssa, quod uulgares Herbarij Alineam corrupte uocant, Aquatica plantago est, alia tamen à Barba syluana.
Amaranthos duplex, purpurei scilicet et aurei floris: haec Stechas citrina hodie dicta, illa Flos amaris.
Amaracus in Galeni simplicibus eadem Matricariae, Meter/ Mütterkraut. Sic & Sampsychon cognominatur.
Ambubcia, agreste Cichorium, Wegwart/ Wegweise/ & Hindelweiff.
Amianton, uide Salamandra.
Amomum, Hierichuntis rosa, quae ut sacrum spectaculum in natali Christi nocte, quasi tunc aperitur, haec in Templis ostensa est.
Ampeloprasen, uineale Porrum, Wild lauch.
Androsaces, fortē quae hodie Cuscuta dicitur.
Androsomon, ultima Hyperici species propriē dicitur.
Angelica apud Dioscoridem Smyrnion.
Anzyrrhinon, herba quae aliās iam Quant dicitur. Et fortē eadem Cynocephalee.
Aparine Germanicē Alebkraut.

Apios, herba quae et Raphanus agrestis, rotunda ra dice.
Apium palustre, fortē Giersea, uel Angelica species.
Arbutum, id est, Vne do, quo etiam nomine Epimelis, id est, Sitanium, Mesfilum dicitur.
Argallicum apud Aurelium Symphytum est, id est, Walwurz.
Aristolochia rotunda, non est quae Germanicē Holowurz appellatur, quod historia minime respondeat.
Armeniaca mala Germanicē Amarellen.
Aron omnibus eodem uulgo nomine cognita, cui Serpentaria in uiribus similis: non habet, ut Plinius tradit, magnam radicem.
Asa non est, ut hodie Medici putant, Laser seu Laserpitium, sed alius uteribus fortē ignotus succus.
Asclepias falsō à quibusdam ea herba, quam uulgo Gündelweib dicunt, creditur.
Ascyron, est secūda species Hyperici, Perforata, quā uulgo Kunrat/ Barthaw/ & Onserfrawen beifiro nominant.
Aspalathos, arbor ignota, quam Arabes Darfisehaban, seu Darfisehan uocant.
Aspergula Germanicē Rodegeenge.
Asphodelo carent Germani Sepstarij.
Asplenon, id est, Scolopendria, non tamen Cernua lingua, sed quae Arabicē Ceterach, et Germanicē Steinfarn uocatur.
Aster Atticus, est Inguinalis, quam male apud Serapionem pro Eryngo accipiunt, nomine decepti Herbarij.
Aueua Graecē Aegyplos à Plinio dicitur.
Auricula muris, quae Graecis, idem significante nomine, Myosotis dicitur, non est Pilosella, quam Germanicē Meusfobz uocamus.

B.
Barocus fortē Galioipsis, Daube nessel/ Binsaugen.
Bechion, Tusilago Latine, Farfarella, & Vngula equina terrestis, Germanicē Heselohiff/ Biantlatrich.
Behen, ignota antiquis Graecie radix.
Berwurz, fortē Daucus Creticus.
Ben apud Arabes idem Mirabolano, quam Dioscorides Myrsicam cognominat.
Berberi fructus spina, quae Graecis Oxycantha, id est, Acida spina dicitur. Germanicē Surich/ Erbsel.
Betlersleuse, fortē Graecorum Xanthium.
Bitoria, quae & Bistorta, nō est, ut creditur, Serpen

IVDICIVM DE HERBIS.

larid, nō plus ad Britannicam accedit.
Blattaria, species est Verbasci, non ita hirsutis, sed
uiridioribus folijs.
Blitum Germanicè Benet: Et est hec uox à Lati
na uoce benedicta corrupta, Alia tamen est à Be
nedicta illa, quæ Cariophyllata dicitur.
Brancaursina, Romana herba est Topiaria, quæ A
canthus Græcè uocatur, Et Pedèratis: de qua
Virgilius in Bucolicis.
Brasica uulgarè olus, Germanicè Röl.
Brasica marina, quæ à Medicis hodie Soldanella uo
catur.
Britannica credi posset fortè eadem Bisfortæ, quam
falsò Serpentariam dicunt.
Bubonium, id est, Alibium, inguinalis, Aster Atticus,
Stellaria.
Bucranion à Galcno dicta, Antyrrhinos est.
Buglossæ hodie plures uocantur, uix tamen uera hic
cognoscitur, quā Leoniceus Cirfion putat, Syl
uestris fortè Echion, id est, Alcibiadion est.
Bulbus agrestis, Græcè Colchicon, Germa. Herbs
blümen.
Buphthalmus nō est eadem cum Chrysanthemo, sed
quæ uulgo Rütill/id est, Vaccinium anethum di
citur, aliàs Cotula non fœtida.

C.
Acalia eadem Cancano, Et nō diuersa, ut Ae
gnetæ putant.
Calamus odoratus, fortè non hic habetur, Et qui sic
hodie dicitur, fortè Acorus est.
Capfæ, est quæ Zinziberina Et Piperina dicitur, et
fortè inter Nasturtij genera referenda.
Capitium hodie dictum olus, Germanicè Caputz
Brasica genus est, quod Cumanum Plinius uo
cat, Sesile, folio Et capite paululum, non tamen
ubiq, similiter provenit.
Cardiaca, fortè Melissophyllo adnumerada, uel Mar
rubij species.
Cardus panis, Eryngij species creditur.
Carlophylli flores antiquis ignoti.
Cataputia minor, Germanicè Lathyrus: maior Cici
siue Croton, Arabicè Cherua seu Kerua.
Catanance nō est altera species Tormentillæ, seu Bi
forte.
Celtica naradus, non est illa Lauendula, quod quidam
uolunt.
Centaurium maius est, quod Rha ponticum hodie pu
tant. Ita uerum Rha ponticum hic non habetur.
Centum capita etiam Arabicè, fortè Bubonium seu
Aster Atticus dicitur. Vnde error, quod Aster As
ticus in Serapione pro Eryngo credatur.
Centunculus, uulgaris herba, qua contra Tormina ue
nula utuntur, hinc Rodefrant/ uel Rhüro
fecut/ id est, Torminalis, Græcè Gnaphalium:
quamvis Plinius difficilem eius historiam faciât.
Ceruinæ lingua, non est Scolopendria, sed ea herba,

quam Dioscor. Phyllitida dicit: quamvis Leoniceus
Ceruinam linguam Hemionitida putet.
Ceterach, uide Scolopendria.
Chamedrys, nō alia est à Chamerope, ut putauit Ae
gnetæ, nec à Gamandrea, ut uulgares ostendunt
Herbarij: Herba notissima, quæ Germanicè Los
ge uel Gamanderlin uocatur.
Chameleones non sunt, ut quidā putant, duo isti Car
dui, quorum alter Wydistel/ alter Mariendi
stel uocatur.
Chamecissus, non uidetur esse, quæ uulgo Gundela
rebon dicitur.
Chamæcyparissus non est Cupressina, sed quæ Ger
manicè Cypressenfrant dicitur. Coronaria est
herba.
Chamepitys, id est, Aiuza, Abiga, Ibiga. Vnde Ilica,
Et dehinc paulatim ius ab odore moschata dicta.
In quo errant uulgares Herbarij.
Cheiri non sunt frigide, nec inter Murarias uiolas
computari debent.
Chelidonium minus, uulgaris herba, in humidis locis
in Maio tantum conficitur. Hinc Germanicè
Meyfrant. Saxones Scorbodstfrant/ Hicro
nymus Seigwarzenfrant appellat.
Chrysanthemon male ab Hermolao Barbaro Buph
thalmus creditur, est ea herba, quæ Germanicè
Tobans blümen/ Et Pfefferdeng dicitur.
Cicerbita, id est, Sonchus Græcè, Germanicè Hasen
ßl/ quidam Et Taraxacon putant.
Cichorium, Intybum syluestre, Wegweiß/ Zindts
leuff.
Cici, uide Kerua.
Cicutæ semine male hodie Medici pro Ruthæ sylas
tris semine utuntur: quamvis à Leoniceo erro
ris admonentur.
Cirfion Græcè, quasi Varitaria creditur à Leonice
no esse, quæ Buglossa hodie.
Cissampelus, altera species Helxines, quæ Latine Cō
uoluulus, Et Germa. Saunglocken dicuntur.
Citrago, dubitatur an ea herba sit, quam aliàs Me
lissophyllon, Et iam ubiq, Melissa creditur. Quo
niam Apes ea non delectantur.
Colchicon, Bulbus agrestis, Germanicè Herbsblü
men/ nō est Narcissus, ut Brunfelsius putat, nec
fortè Hermodactylus, licet id Serapio credat.
Columbinus pes, herba Rupertiana, species graminis
herbæ, Germanicè Schartenfrant. Alia species
Acus muschata dicitur, quæ maximo errore pro
Amomo creditur.
Conuoluulus Saunglocken/ Græcè Cissampelus, Et
Helxine altera.
Conyza nō est, ut Brunfelsij Tomi pingunt, quæ Ger
manicè Fldhefrant dicitur, nec Thymra, ut
putat Iacobus Manlius.
Cordumeni, Cardamomum, Et Carui agreste.
Cornus, arbor, cuius fructus Dirias uocant.

Coronopus non est hodie dicta Pes coruinus.

Corrigiola, Proserpinaca.

Cirenaicus succus, id est, Laser.

Crifson non est Senecio, ut totum ferme Medicorum uulgus credit, sed altera Sisymbrij species, quae Cardamine, id est, Nasturtiaria dicitur.

Croton, uide Kerua.

Cucumis agrestis, unde Elaterium, de quo autores uariant quod optimum sit.

Cunila forte quae hodie Scrypyllum sylvestre creditur, altera scilicet Thymrae species.

Cupressina, non est Chamaecyparissus, sed Chamaepitys.

Cuscuta, forte est Dioscoride Androsaces.

D.

Damasonium, id est, Alysma, aquatica Planta go: non tamen quae Barba syluana dicitur.

Darsifaban Arabum, Dioscoride est Aspalathus, et non Sylvestris punica.

Darsifaban, id est, Aspalathos. Manardus Sandali speciem putat.

Daucus Creticus, forte Berwurz, quae hodie Meum creditur.

Delphinion dubitatur an sit Sene, ut quidam putant.

Didamno uera caremus.

Draunculus quae Dracontia et Serpentaria et Colubrina, non est Bistorta, sed Aro similis.

E.

Eberwurz, id est, Cardus panis, Eryngij species.

Echion, id est, Alcibiadii, sylvestris Buglossa forte.

Elaterium quod optimum et pessimum sit, autores uariant.

Endiua corruptum ab Intybo est, nomen multarum Herbaru, quae omnes Seridis appellatione a Graecis comprehenduntur.

Epimelis Mespilij species, Vnedo, teste Galeno, etiam Latine dicta.

Equisetum forte pro altera Sanguinali posset intelligi, cum creditum hodie Equisetum historiae non undiquaque respondeat.

Erigeron non est Carduus benedictus, sed herba uulgaris, quae Germanice Creuzwurz dicitur, Latine Senecio, quo nomine male Crifsonem Medici uocant.

Erinos eadem Echino, ex quibus tamen Aegmetas duas facit herbas.

Eryca, uulgaris frutex est, qui Zeyde Germanice uocatur.

Eryngij species non facile nec temere ab omnibus cognoscuntur, nec ubique inueniuntur.

Euphraga male picta est in Brunfelsio, alia enim est quam illa apparet.

Eupatorium antiquorum est ea, quae hodie Agrimonia et inuersa Lappa dicitur.

F.

Faba nostras quid sit, multis argumentis dubitatur.

Faba inuersa, Solarium somnificum creditur.

Flos amoris, alterum Amaranthum, purpureo scilicet flore.

Flos autumnalis, Colchicon, Bulbus agrestis.

Fraxinus male a Pandectario uertitur, cum Vlmus eo capite intelligi debeat.

Frugem, quae Rocten dicitur, non recte nominamus.

G.

Galiopsis forte Barocum, quae Germanice Binsaugen dicitur, eadem forte Vertica facta.

Galion herba uulgaris, minor quam Aparine.

Gladiolus Dioscoridis in Germania non temere nascitur, et non est aquatica illa herba, quae hic Schwertlen appellatur, sed in aruis inuenitur.

Gnaphalium, Latine Centiculus, Germanice Roda Erant, uel Rhut Erant, uulgaris in hortis et alijs laboratis locis herba, Albinus etiam dicta.

Gorgilon, quae alias Tordylon, et Hordylon, Carui agreste, et a quibusdam Cordumeni dicitur, quae tamen nomine Cardamomum ab Arabibus uocatur.

Gossipium, hodie cum Arabibus Coton dicunt et Boubacem, uulgo Baumwoll.

Gramen Graecis Agrostis aliud est a Polygonio, quod tamen etiam Gramen dicitur a Latinis.

Gummi Arabicum, Serapio Acacie succum putat, cum Graeci id non affirmant. Imo apparet Gummi Arabicum forte idem esse cum Tragacantha, quantum ad uires attinet.

H.

Halicacabus species Solani, quae Arabicè Alheheng, Germanice Doberellen / Juedentessen uocatur.

Heliochrysos a Galeno Amaranthus dicitur, licet Aegmetas duas has herbas putet. Estque illa, quae hodie Stiebas citrina, et Germanice Reimblamé / et Mitterkraut uocatur. Male quidam hanc inter Absynthij genera referunt.

Helxine, Parietaria, Vitrage, Vrecolaris est, non tamen ea herba, quae luteis et similibus purpureis floribus insignis, Tag und nacht dicitur.

Hemionitis a Leoniceo Ceruina lingua creditur, cum tamen Ceruina lingua Phyllitis sit, et non Scolopendria.

Herba Flaura, id est, Planta leonis, Graeci Oxypurphyllon, uel simpliciter Triphyllon, hoc est, Trifolium acutum, uel simpliciter Trifolium dicitur. Non est uulgare illud pratense, ut haecenus erratum est, Trifolium.

Herba Tunici a Magno Mediolanensi Polemonion Dioscoridis dicitur. Sunt tamen qui dictos Cariphyllas flores putent.

Herbst

Berbo **Stilmen** Colchicon, Bulbus agrestis, non est Narcissus.

Hermodactylus, forte alia est Colchico, licet in Serapione hoc caput, Surgen scilicet, Hermodactylum in lemma habeat.

Rawhechel uel **Stallkraut**, id est, Ononis, Acutella, Resa bouis, Remora aratri.

Hieracium duplex, Soncho similis herba, quae à quibusdam **Hesentöl** et **Gensdöstel** putatur, quas tamen ego Sonchos seu Cicerbitas puto.

Hippice herba famem sitimque sedare dicitur.

Hippocelinon, grande Apium, species Angelicae, uel **Gierfca maior**.

Hippuris, id est, Equina cauda, seu **Equisetum**, quasi ignorari uidetur.

Hordylon, uide **Tordylon**.

Hyacinthus non est, ut poëta fabulantur, Regum nomine inscriptus flos, sed quod Latinis **Vacciniū** dicitur: **Vaccinium** uero non est **Heydelber**.

Hydropiper forte eadem, quae **Persicaria mordax**, quae non habet maculas, à Plinio **Piperitis** et **Silignastrum** dicta. Dubitatur an **Piper aque**, et **Piper caninum** idem sint: certe **Aucenna** separauit.

Hypericon propriè dictum non est **Perforata**, seu herba Ioannis, seu **Fuga demonis**, licet et haec **Hypericon** cognominatur, cum proprio nomine **Ascyros** uocetur.

Hysopus nostras non congruit descriptioni apud **Dioscoridem**, ut uidere est in capite **Origani**, et alibi. Nam in proprio capite non describitur.

L.

Lidicus succus pro **asa** accipi dicubi uidetur. **Inguinalis**, id est, **Aster Atticus**, **Bubonium**, **Albiū**, **stellaria**, **Sternkraut**.

Intybum, commune est nomen omnium **Herbarum**, quae Graecè **Seridas** appellatione comprehenduntur. Id uocabulum paulatim in **Endiuam** deprauatum est.

Iua corruptum est ab **Ibica** (quod ab **Ibica**, et **idia** ipsum ab **Abiga** deductum est) nomen, et est **Chamaepitys**: cognominatur hodie **moschata**, à bono scilicet odore. Sic nescientes quidam **Medici** **Chamaepity** nomen: pro qua tamen hodie uarias alias herbas non rectè accipiunt.

K.

Kerua seu **Cherua**, apud **Serapionem**, quae **Cataputia** et **Pentadactylus** dicitur, Graecè **Cici** et **Croton**, Germanicè **Wunderbaum**. Hinc oleum **Cicinum**, et de **Kerua**.

L.

Lacerta alia bestiola est in Italia, quam quae hic sic uocatur, quae forte **Seps** est.

Lanium, id est, **Vrtica** mortua cum albis floribus, forte **Galiopsis** species.

Lascer, **Mumia Arabica** uideri possit.

Latacen herbam qui habet, omnium rerum copia abundare creditur.

Lathyrus, **Cataputia minor**, Germanicè **Springewurtz**, Saxonice **Creuceboum**.

Latua corruptè legitur apud **Pandectarium**, quasi alia à proxima sit, eadem enim ei est.

Lauandula non est, ut quidam putant, **Nardus Celtica**.

Laurus Alexandrina, id est, **Vularia**, **Bislingua**, Germanicè **Sauchblat**.

Letur etiam ex **Lathyride** corrupta uox est apud **Pandectarium**, et eadem ei res est.

Lepidion, idem **Scitaragi** apud **Serapionem**.

Libanotis quidam **Rosmarinus** est, sed non quae hodie sic dicitur. Altera **Libanotis**, coronaria scilicet, est nostras **Rosmarinus**, cuius species est **Lauandula**.

Lichitis **Verbasci** species, quae et **Thryallis Graecè**, Germanicè uero **Campulosen** seu **Martien** rosen uocatur.

Ligustrum nō significat **Conuoluulū**, id est, **Sanguis** / ut litteratores putant, sed frutex qui **Rheumweiden** et **Mundtholz** dicitur, Graecè **Cypros**: quamuis **Leoniceus** **Cypron** similem **Ligustro** fruticem dicat.

Limonium forte ea est, quam hodie **Pirolam** Latini, Germani uero **Waldtmangolt** et **Wintersgrün** uocant.

Linaria eadem est **Vrinalis**, quā tamen uulgares **Hebarij** ab ea disungunt. Eadem quoque est **Ostria**, apud **Dioscoridem** **Brotenflachs**.

Lin genus apud **Plinium**, unde inextinguibilis telafit, forte **Amianton** est, lapis unde huiusmodi filaducuntur.

Lysimachion, herba quae Germanicè **Weyderich** id est, **Salicaria** dicitur, credi possit, si acer cinis fumus muscas necaret.

Lolium, ignotum forte nostratibus, non enim est quod uulgo **Dorth** appellant.

Lonchitis altera, similis **Scolopendriae**, ex cuius figura, quae **Polypodio** similis, apparet **Scolopendriam** non esse **Ceruina** linguam.

Lunariam **Fabam inuersam**, id est, **Somnificum** solum quidam dicunt.

Lycostonon, id est, alterum **Aconitum**, **Wolfskraut**.

M.

Maiorana eadem **Sampsycho** ab omnibus dicitur, Germanicè **Mayeran**. Cognominatur etiam **Amaracus**: quo nomine tamen **Mari-caria** dicitur à **Galeno**.

Malua hortulana hic non ubique nascitur, sed rara in su et quasi ignota est, Romana **Malua** dicitur. **Römische Bappeln**.

Mandragoras nō est radix illa, quae humana effigie

formata, ab Agyrthis non citra dolum magno
uenditur.

Maron ignota hodie herba, Origano ferè congener.

Marrubium dicit Nicanor etiam Melissophyllon
seu Meliphylon.

Mater silua, id est, Periclymenon Græcorum, La-
tine Caprifolium, Germanicè Lienenblumen/
Speckliien.

Melilotus uera ignoratur apud Sepiasarios nostros.

Melissophyllon, Apiastrum est. Sed an eadè sit, quæ
hic pro Melissa & Citragine ostenditur & cre-
ditur, dubitari potest: cum Apes ea nihil oblectè-
tur, ei etiam florenti non infideant.

Mentha non est frigida, nec absunt humanam geni-
turam, ut Aristoteles falsò tradidit.

Millefolium, non est herba illa, quam hodie sic appel-
lamus in Germania.

Milium solis, id est, Lithospermon, Germa. Steins-
same/Methyrs.

Mirabolanus apud Dioscoridem alia est ab hodie uo-
catis Mirabolanis, quæ inter palmulas fortè refer-
ri possunt.

Mumie capite Serapio Pissaspthalon describit ex
Dioscoride.

Myros & Myagros, malè ab Aegneta pro diuer-
sis herbis creduntur, cum eadem res sit.

Myrica, non est frutex quæ uulgo Heyde dicitur,
sed eadem Tamarici, quam hodie Tamariscum
dicunt. Eryca uerò Heyde uocatur.

N.

Narcissus non est autumnalis ille flos, ut Brun-
silius putat.

Nenufar, id est, Nymphaea, non habet Cicorea foliū,
ut Apuleius tradit.

Necras & Poterion idem est, quamuis Aegneta di-
uersas herbas crediderit.

Nigella non est herba, quæ Germanicè Raden di-
citur, sed schwarz Kümich/ uel schwarz
Coriander Nigella est.

Nymphaea Nenufar hodie dicitur, Germanicè See-
blume/Wassermahn/Saxonice Seefenken.

O.

Oenagra Græcis à uino dicta herba, quod eius
odore homines exhilaret, & quasi gaudio
inebriet.

Oenanthe, creditur à Brunselsio Philipendula, sed hi-
storia non per omnia respondet. Hanc herbam di-
cit Vergilius Marcellus senusquam apud Diosco-
ridem legisse, cum tamen eius caput interpreta-
tus etiam scholijs suis ornauit. Est & Oenanthe
Labruscæ flos.

Ononis, quæ Latine Acutella, Recta bouis, & Re-
mora aratri, Germanicè Sawhechel / & ab ea
quibus Stalltraut dicitur.

Ophthalmica, id est, Eufragia, seu Ocularia, Arabicè
Adbil, Germanicè Augentroß, Wegelenchtré.

Non ueram Icona habet in Brunselsianis Tomis.
Osiris respondet dictæ hodie Linarie, quæ eadè Vri-
nalis est, Germanicè Wildslachs/ Rotten-
slachs.

P.

PAEderotes Græcis alter Acanthus, Latine iam
Branca uersina Romana.

Pæonia duplex est, mascula et femina, altera Men-
wewurzel/ altera Peonien. Vana est quorum-
dam opinio, Pioniam & Peoniam diuersas pos-
tantium.

Paliurus non est arbor illa, quam Germani Holsch
uocant, si semen suū in siliquis fert, ut Theophras-
tus ait.

Papauer erraticum, Germanicè Wild mohn/ Alap-
perrosen/ Rohtosen/ in segetibus nascitur.

Parietaria etiam Parthenon cognominatur, & Hel-
xine Græcis, Latine etiam Vittraria: sed Vittra-
go & Vrecolaris dicta, non est herba quæ à lucis
& simul purpureis floribus Tag vnd nacht ap-
pellatur.

Parthenon, commune multis herbis est nomen, quo
hic Amaracus, id est, Matricaria significatur.

Pentaphyllon non est quam hodie sic uocant, imò ea-
dem Tormentille, Germanicè Durdwurzt/
Bläuwurt/ Saxonice Heydeckern.

Perfoliata ueteribus fortè ignota, German. Durd-
wacht, non sua effigie apud Brunselsiū picta est.
Persica & Persæa, diuersa sunt diuersarum arborū
mala.

Persicaria mordax caret lituris, & est Piper aqua-
ticū, Piperitis & Siliquastrum. Dioscorides Hy-
dropiper uocat. Maximo errore pro Græcorum
Conysa, id est, Pulicari accipitur.

Pes coruinus hodie dicta, & Pes cornicis ueterū, di-
uersæ herbe sunt.

Petalitis idem significat Græcis, quod Phyllitis, &
est reuera Ceruina lingua, quam hodie malè Sco-
lopendriam putant.

Philipendula creditur à Brunselsio Oenanthe herba
Dioscoridis, sed foliorum historia non respondet.

Phu nostrum, id est, Valeriana, non respondet histo-
rie Phu apud Dioscoridem, imò alia quædam ma-
gis, quæ Theriacaria, Thertschkraut in Hes-
sia nominatur.

Phyllitis, reuera est Ceruina lingua. Alia à Scolopend-
ria.

Piperitis dicta est in Persicaria, cui eadem est.

Pirola recentiorum, fortè Limonium Dioscoridis est.
Pisum non est quod uulgo Erbes dicitur.

Pityusa non uidetur Tripolium esse.

Planta Leonis & Trifolium uerum, de quo Medici
intelligunt, aliter herba Flaura, seu Maura dicta.

Platanus fortè peregrina est Germanicæ arbor,
quod si uerum est, tunc alia ab ea est, quæ Thozm
uulgo dicitur.

Polium

Pollum malè Tinearia, quæ Stæchas citrina, id est, Heliochrysus est, à quibusdā creditur, nisi ipsum Pollum etiam Tinearia herba sit.

Polygonatum, est quæ hodie Sigillum Salomonis seu Marie dicitur, Germanicè Weiswurtz.

Polygonion esse putat eam, quæ Germanicè Wedeggras, & Wedeggrit uocatur.

Poterion & Neuras eadem est herba, diuersas tamen Aegnetæ credidit.

Pulegium nostras pro hortulano Serpyllo credi possit.

Pulegium sylvestre, Wilde poley.

Pulicaria conyzæ, pro qua malè Persicariam supra dictam accipiunt.

Pyrgis dicitur etiam Phyllitis, id est, Lingua ceruina, quod ad radices turrium etiam nasci soleat. Malè admiscet Pandectarius huic Asplen historiam.

Q Vinquefolium, Grecorum Pentaphyllum, Compositum Wildwurtz, & non ea quam hodie Medici Vinquefolium uocant.

R Ha barbarum ponit Arabes, ubi antiqui Rha ponticum habent: recentior & fortè alia à Rha pontico res est, de qua tamen expectantur Leonici & Manhar diputationes.

Raphanus sylvestris, etiam Apios Grecorum dicitur.

Rhaponticum uerum hic non habetur, sed quæ pro eo uenditur radix, Centaurium maius est.

Remora aratri iam dicta, est Rosta bouis, Remora aratri, Ononis Dioscoridis, Germanicè Sawheschel, Stallbraut.

Rheas Papauer, Rorrosen, Klapperrosen.

Rorippen Saxonice dicta herba, aliàs Accipitrina.

Rosmarinus, quam Dioscorides & ueteres Medici intelligunt, longè alia ab ea herba, quam nos Germani sic uocamus. Est tamen eadem herba prior cognominis, & Rosmarinus coronaria.

Rubus caninus, Hagendorn, Hagenbutten.

Rubus simpliciter, quem Græci Batum uocant, Brambet.

Rumex, herba quam uulgo Lapatium, doctiores uero Lapathon uocant.

Ruscus, est quem medicorum tabernæ hodie Bruscū uocant.

Ruthe sylvestris semen accipiendum est, ubi hodie Cicutæ semen accipiunt, periculoso errore.

S Alamantra non continuò nec semper in igne uiuit, sed aliquantulum in eo durare potest, nec est adeò ignotum animans: Imò illud quod Germanicè ein Olm uel Melch appellatur. Et falsum est ex eius pilis, quos nullos habet, inextinguibilem telam fieri. Nam huiusmodi materia est, uel

ex Amiantho, uel ex quodam apud Plinium lino genere, si non & id Amiantho lapidi idem fuerit.

Saluia maior, seu sylvestris, apud Theophrastum Spacelos.

Salvia nita, fortè muraria Rutha.

Sambucus Græcis rectè dicta, Germanicè Bollund, in quo frutice Hieronymus Brunf. errauit, & lasminos flores Leucoia putans, cum ea miscuit, deceptus nominum uicinitate. Nam lasminæ Violæ Leucoijs similes, Arabicè Zambac uel Zambach dicuntur.

Sanguinalis fœmine historia, uidetur putato Equifeto etiam conuenire.

Sanguinalis, id est, Polygonion, Wedeggrit, Wedeggras.

Sanicula fortè ignota ueteribus, & à recentioribus inuenta uulneraria herba, Germanicè Sanctel. Hanc falsè putauit Collutius, contra Leoniceum, Pentaphyllum esse.

Sanct Peters kraut / si intelligitur quæ aliàs Tag vnd nacht uocatur, tunc erratur in hoc quod Parietaria sit.

Satureia, Cunila hortulana, nota herba, Germanicè Saturey.

Scarlea ignota fortè ueteribus herba.

Scincus, id est, Crocodilus terrestris, quem Stincum uocant. Non est aquatica Lacerta, ut Sepalsarij putant.

Scolopendria non est Lingua ceruina, quod tamen omnes ferè Medici putant, sed ea herba quæ olim Latinis Calcisraga, & iam Arabicè in tabernis Ceterach, Germanicè Steinsarn / Spicant. Non omnes tamen Sepalsarij ueterum Ceterach habent.

Scordion, id est, Allium sylvestre, fortè ea quæ Ramp Germanicè dicitur. Nascitur in saxosis montibus, odore Allij fortissimo. In hoc errant Sepalsarij, uel Scorodoprasum, uel Ampeloprasum accipientes.

Scorodoprasum, Porrum alliatum, Wildlauch.

Scrophularia à Brunfelsio Galioffis creditur: quam uerè autem, dubitatur.

Secacul seu Sacacul, aliud ab Eryngo esse uidetur.

Seitaragi quid sit, uariant auctores, Lepidion tamen creditur.

Sene fortè ueteribus ignota, quamuis Delphinion apud Dioscoridem credatur: quod tamen caput in antiquissimis codicibus non legitur, neq; apud Galenum neq; Aegnetam inuenitur.

Senecio non est Cresson, quæ aliàs in Sysymbrij capite Cardamine dicitur: sed ea quæ uulgo Creutzwurtz uocatur, uulgaris & contempta herba.

Serpentaria, quæ hodie sic dicitur, omnino non est Dracontia (quod nomen in Draganteam corruptum est) apud Dioscoridem, sed altera species Tormentillæ, Distorta scilicet.

Serpyllum

Serpillum hortenfe non facillè hic noscitur.
Sideritis non est *Verbena*, licet sic cognominetur.
Sigillum Salomonis, id est, *Polygonatum*.
Siliquastrum Plinij idem *Hydropiperi* *Dioscoridis*,
Perficariam mordacem illam esse credibile est.
Sium, id est, *Lauer*, fortè *Wasserpungen* / *Saxonice* *Lemmitze*.
Solanum furiosum dubitatur an sit herba, quæ *Toll*
fraut dicitur, cuius grana *Schlaßber* uocant.
Soldanella hodie uocata, est *Brassica marina* apud
Dioscoridem.
Sorba non sunt *sylvestria* illa mala, quæ Germanicè
Holzäpfel dicimus, sed aliud genus.
Sparganium *Dioscoridis* non est *Tormentilla*, ut cre-
 didit *Alexander Benedictus*.
Spartaniam herbam in ore ferentes famem et sitim
 sentire negantur.
Spacellus apud *Theophrastum* *Salvia magna*, seu a-
 grestis.
Spinacia non est *Blitum*, ut quidam putant, sed à re-
 centioribus inuenta fortè herba.
Stallfraut, id est, *Ononis*, *Recta bouis*, *Remora*
aratri, *Sarwechel*.
Stellio non est *bestiola*, quæ Germanicè *Olm* / seu
Molch dicitur, nam hæc est *Salamandra*; *Stel-*
lio uerò similis *lacertis*, sed ab *italis Tarantula*
 dicta *bestia*.
Stoechas citrina hodie dicta, est *Amaranthum Gale-*
ni, *Dioscoridis* uerò *Heliochrysos*, *Hyacinthi-*
men / *Wottenfraut* / *Aurelia* à *Gaza* uertitur.
 Male à quibusdam inter *Abfinthij* genera refer-
 tur.
Stratiotes herba illa, quæ hodie ubiq; hic *Millefoliū*
 dicitur, quod quidem cognomen est, sed uerū *Mil-*
lefolium alia est herba. *Stratiotes* autem *Germani-*
cè *Garbe* / *Schaffgarbe* / *Schafferripp* / *Saxo-*
nice *Relife*.
Superbiam interpretatur herba, cum aliud non sit
 nomen, quam *Germani* *Bochmāt* dicunt, conge-
 ner fortè alteri *Aconito*, id est, *Lycostono*.
Symphyton maius, *Solidago maior*, *Walwurz* /
Schmerwurz / *Schwarzwurz* / *grosse*
Reynwel.

T.

Tig vnd nacht non est *Parietaria*.
Tamarix frutex ille, qui et *Tamariscus* ho-
 die dicitur, Græcè *Myrica*: quo nomine non uerè
 fruticem *Reyde* uocant.
Tarantula, id est, *Stellio*, qui falsò apud nos *Olm* /
 et *Molch* dicitur, cum *Salamandra* sit. Est et
 aliud genus *Tarantule*.
Theriacaria, uulgo hic *Thetad's* / magis respon-
 det historie *Pbu* quam *Valeriana*.
Thryallis *Verbasci* species, quam Germanicè *Cam-*
pelosen / et *Warren rosen* dicimus.
Thymra propriè *Cumila rustica*, quæ fortè eadem

quæ hodie *sylvestre Serpillum* dicitur, Germanicè
Cunel / *Quenel* / *Quendel* / corrupto scilicet à
Cumila nomine. Tamen et *Satureia* sic uo-
 catur, sed *hortulana*.

Tilia *Dioscoridis*, non est arbor quam nos *Tiliam*
 uocamus. Et dubitatur an eadem sit, quæ *Ligu-*
strum creditur, tam simili historia pingitur. Est
 et apud *Theophrastum* *Tilia*, cuius materia fa-
 brica expetitur, et ex cortice fines torquentur,
 quæ magis *Tiliæ* nostrati accedit, si non eadem
 est.

Tinearia à plerisque dicta, citrina *Stoechas*.

Tordylon, quod et *Hordylon gorgylone*, id est,
Carui agrestis.

Terminalis, id est, *Centunculus*, *Albinus*, *Rodes*
fraut / *Rhretfraut* / Græcè *Onopaliū*.

Tragus apud *Dioscoridem*, fortè quam *muliercula*
Sünerber uocant.

Tribulus marinus, seu *Aquaticus*, uulgo *Wassere-*
nuss: terrestris ferè ignoratur. *Trichomanes* al-
 tera species *Capilli Veneris*, *Widdertodt*.

Trifolium quando scribunt *Medici*, non intelligunt
 illud uulgare ac pratense, longè enim alia ac ra-
 rior inuētū est herba, quæ aliàs hodie *Planta Leo-*
nis, herba *Flaura* uel *Maura* dicitur, cuius re-
 centis odor *Rutham*, consistentis bitumen olet.

Turbith fortè antiquis Græcis non cognita herba,
 quam quidam *Pityusum*, *Serapio Tripolion* *Dio-*
scoridis credidit, eam fortè neutra, sed alia quo-
 dam sit.

Tussilago, id est, *Farfarella*, Græcorum *Bechion*, nō
 est, ut *Iacobus Manlius* tradit, *Vingula caballina*
aquatica. Nam hæc *Nymphaea* est: *Tussilago* ue-
 rò Germanicè *Häfflattich* / *Wandellattich* /
Welschhaff.

Typha, *Dioscoride* herba palustris, quæ Germanicè
Warrenfolben dicitur.

V.

Vaccinia non sunt *Reydelber* / ut *litteratores*
 apud *Virgilium* interpretantur, sed *Vas-*
cinium *Hyacinthibus* est.

Veratrum album male in uulgaribus *Herbarijs* pin-
 gitur, cum ea effigies magis *Polygonato* conue-
 niat.

Veratrum nigrum dubitatur an *Chistwurz* sit,
 quod tamen omnes uolunt *Herbarij*.

Vermicularis si est, quæ hic apud nos *Waurpse-*
fer dicitur, ut uolunt, non est frigida herba, ut ta-
 men de *Vermiculari* traditur.

Vernilagnes, id est, *Chameleones* herba. In quibus
 utrisq; turpiter erratur.

Verucaria, *Scorpiuron*, *Heliotropium*, non est, ut ho-
 die creditur, *Calendula*. Dubitatur item quæ ea-
 dem *Calendula* sit.

Vetonica duplex. Altera quæ et *Cestron* dicitur, u-
 biq; uulgaris et nota. Altera non item.

Viola

Viole que Græcis Leucoia, non bene cum nigris seu murarijs uiolis miscentur, quasi easdem qualitates & facultates habeant. Nam illæ calidæ, hæ uerò frigidae sunt.

Viticella eadem Bryonia, contra uulgares Herbarios, qui eas separant.

Vitraria, seu Vitrago, id est, Parietaria.

Vnedo, id est, Arbutum, quâuis & Epimelida, id est, Setanum mespilum, Galenus sic à Latinis uocari testetur.

Vngula asinina, id est, Tussilago, Farfarella, & Eseta hüss, De qua in Tussilagene.

Vrcolaris eadem Parietaria creditur.

Vrinalis, id est, Linaria, contra uulgares herbarios, qui has quasi duas disiungunt: Græcè Osis dicitur.

Vulcaria, bislingua herba est, quam Græci Larum Alexandrinam uocant, Germanicè Sauchblat.

Waldmeyster, herbula que malè pro Caprifolio apud Brunfelsium pingitur, cum Caprifolium lon-

gè alia herba, imò quasi frutex sit, hodie Lienenblâmen/Specillien dictus.

Walwurz/Symphyton maius, Solidago maior.

Wasserdoß, quædam herba que pro Eupatorio non rectè accipitur, cum uerum Eupatorium Agrimonia iam dicta herba sit.

Wasserpungen, uel quod idè est, Bachpungen/Sium uocatur, & Lauer.

Wundelbaum/Cataputia maior, Cici, Croton, Racinus, Kerua.

X.

X Anthion, fortè ex minoribus lappis herba illa (Berlesleuse dicimus) echinatum adeoq; retinacem fructum fert.

Z.

Z Inziberina, Ingwerskraut/ quam Arnoldus etiam Taphiam (Capsiam fortè legere debet) uocari dicit. De qua dubitatur, an Scitarrag eadem uel congener sit.

FINIS.

HERBARVM NOMENCLATVRÆ VARIARVM GENTIVM, DIO-

SCORIDI ADSRIPTÆ, SECVNDVM LIT-
tarum ordinem expositæ.

CONRAD. GESNERVS TIGVRINVS
Lectori S.



CCVRRVNT aliquando apud quosdam Medicinæ scriptores, Herbarum nomina inusitata, quorum multa intelligi posse in spem adducebar, si quis Dioscoridi adscripta variarum gentium nomina per alphabeti ordinem cum interpretatione distribueret. Itaq; laborem illum mihi ipsi imposui, ut tibi candide Lector, quicquid in eo posset emolumenti cōtingere, communicarem. Certus quidem maximam partem huius nominum sylvarum apud autores non extare: si quæ tamen uel pauca hinc disceres olim, labori te meo gratiam habiturum mihi pollicitus. Nam & in sterquilinio gemmas repertas contemptui habere non oportet. Exempli gratia: Ρολυΰν & à Scribonio Largo ad Epilepsiam & crapulam commendatur, eam ex hoc Elencho plantaginem esse deprehendes. Vale.

A.

A Biblalon, Hemerocalles.
Abiblalon Aphris, Lilium.

Abioton, Cicuta.

Abinthium, Abrotonum.

Abinthiomenon, Abrotonum.

Abinthium Ponticum Romanis,
Abrotonum.

Abutonon, Abrotonum.

Acaron, Ruscus.

Acalyphe, Vrtica.

Acantha, Acanthium.

Acantha Romanis, Chrysanthemum.

Acanthis, Spina Arabica.

Acapnon, Sampuchum.

Acatalis, Iuniperus parua.

Acatera, Iuniperus magna.

Acaulon, Phyllitis.

Accyseton, Alyssum.

Acheosim Aphris, Tragion alterum.

Achamenin, Polium.

Achillion, Millefolium.

Achnepytos, Chamelea, & Thymelea.

Acidoton, Poterion.

Acontion, Capparis.

Acopon, Anagyris.

Acron syluaticum, Achillea.

Acrospelon, Bromos.

Aste agria, Ebulus.

Aste, Sambucus.

Actine, Bunium.

Acula Romanis, Scandix.

Acytonion, Lychnis coronaria.

Acyron, Alisma.

Adamas, Hyoscyamus.

Adamenon, Hyoscyamus.

Adseton, Alyssum.

Adianon etiam Trichomanes signis
ficat.

Adice, Vrtica.

Adipos, Glycyrrhiza.

Adocetos, Paronychia.

Adorium Syris, Gingdium.

Aegrecon, Gramen.

Aegina, Periclymenum.

Aegitis, Anagallis purpurea.

Aegoceron, Foenum graecum.

Aegonychon, Lithospermon.

Aegynos, Cicuta.

Acluris sanguis Magis, Stratitotes a-
quaticus.

Aclurigosos Magis, Buglossus.

Aconon, Sedum maius.

Aeritis, Anagallis purpurea.

Aetonychon, Leontopodium.

Aetopi Aeg. Galeopsis.

Aetora Phoenicos Magis, Abroto-
num.

Aethides, Sampsuchum.

Aegyllon, herba ex qua Ammonia
cum fit Thymiana.

Aegonayon, Cicuta.

Aegaphotis, Peonia.

Aegacupon, Anagyris.

Aegon Aeg. Inrybum sylvestre.

Aegonon, Clymenum.

Aegonon, Ruscus.

Aegreste intubum Romanis, Ly-
chnus sylvestris.

Aegria, Anemone.

Aegria, Helxine.

Aegria phacos, Lens palustris.

Aegriocummar, Spina alba.

Agrion, Peucedanum.

Agrionphyllon, Peucedanum.

Agrionclinum, Hippofelinum.

Agrostis, Vitis alba.

Agrostis, Gramen.

Aegynos, Agnos.

Aichryson, Sedum maius.

Aithales, Sedum maius.

Aiuga Latinis, Chamaepitys.

Aizoon sylvestre, Portulaca syl-
vestre.

Aizoon, Sedum.

Alba spina. Vide Spina alba.

Alba spina Romanis, Rhamnus.

Albinum, Gnaphalium.

Albucium Latinis, Halimus.

Albucium Latinis, Halimus.

Albucium Roma. Hastula Regia.

Album Helleborum, Sesamoides ma-
gnum.

Alcea, Alisma.

Alcibiadum Romanis, Echium.

Alcibiadion, Anchusa.

Alcibiadion, Echium.

Allo Aegypt. Solanum hortense.

Alexandrina, Chamaedaphne.

Alexandrina cucurbita, Colocyn-
this.

Alimon, Aron.

Alates, Mandragoras.

Alochorodon, Capparis, que et
Ophioscorodon.

Alfine, Auricula muris.

Althiocon, Althaea.

Althaea, Ocimastrum.

Aluolum Gall. Pulcgum.

Amaracus, Sampsuchum.

Amaranthis, Ocimastrum.

Amarantos, Centaurium minus.

Amarantos, Chrysocome.

Amaurosis, Cicuta.

Amazitis, Gramen.

Ambrosion, Sedum maius.

Ambuxum Roma. Clematis altera.
Lasyphyllion, Gramen.

Amelxine, Helxine.

Ametros, Rubus.

Amictomienon, Agnos.

Ammonos, Coronopus.

Amorgine, Helxine.

Ampelos Chironios, Vitis nigra.

Ampelocarpus uel potius Amphalo-
carpos, Aparine.

Ampetoron, Gnaphalium.

Amphibion, Aloë.

Amyros, Atractylis.

Anabasion, Hippuris.

Anabasis, Hippuris.

Anastorion, Gladiolus.

Anastorios, Artemisia.

Anagallis aquatilis, Lauer.

Anagyron, Anagyris.

Anangelos, Ruscus.

Anaphalin, Gnaphalium.

Anaphyton, Veratrum album.

Anarrhinon, Hippoglossum.

Anasphoron, Filix.

Anatamenon, Helxine.

Anatolicon, Smilax aspera.

Anatolicon, Clymenum.

Anaxiton, Gnaphalium.

Ancetum Rom. Cucumer sylvestris.

Anchinopa, Phoenix.

Ancon glycy, Abrotonum.

Androsomon, Hypericon siue syl-
vestris Ruta.

Aneciaton Romanis, Anagallis.

Anemone, Leontopetalum.

Anemosporon, Bunium.

Anepsa, Veratrum album.

Anasfex Dacis, Onobrychis.

Aniceton, Smilax aspera.

Anicetum, Anethum.

Annon, Linum.

Annonis Aeg. Oreoselinon.

Ansanaph Paenis, Buglossus.

Anthema Pythagore, Malua.

Anthemis, Anthyllis, et Partheni-
um.

Anthemis, Argemoe.

Anthemis, Chamaemelon.

Anthenor Pythagore, Halimur.

Anthyllion, Auricula muris.

Anthyllon, Anthyllis.

Anthropomorphos Pythagore, Ma-
dragoras.

Antimimon, Ocimastrum.

Anticantharos, Hemerocalles.

Antimion, uel Antimimon, Mandra-
goras.

Antirrhinon, Hippoglossum.

Antithesion, Xanthium.

Anubias, Conyza magna.

Anaphi Aeg. Gramen.

Anydron, Solanum furiosum.

Anydros, Narcissus.

Apanthropos, Staphis agria.

Apap Aegyptis, Helxine.

Aparia Hispanis, Gramen.

Aparina, Xanthium.

Aparine, personata.

Apemphi Aegy. Cicuta.

Apemum Aegy. Mandragoras.

Aphedron, Marrubium.

Aphedron Magis, Atractylis.

Aphopho Aeg. Mercurialis.

Apho Aeg. Scordion.

Aphrodisia choros, Acorus.

Aphros, Cicuta.

Aphrodes mecon, Peplus.

Aphthitis semen, Buphthalmus.

Apiastrum Lat. Melissophyllon.

Apium rusticum, Artemisia.

Apium rusticum Rom. Eleoselinon.

Apium Romanis, Fumaria.

Apium sylvestre, Ranunculus.

Apium, sylvestris Raphanus.

Apium Roma. Ballote.

Apocathemenes sanguis Magis, Ly-
chnis coronaria.

Apocathemenes taurus Magis, Ly-
chnis sylvestris.

Apolo

Aſonth Aeg. *Plantago*.
Aſontiri Aeg. *Halinus*.
Aſphaltum *Polygonum*.
Aſphen *Halinus*.
Aſſibo Oſſiani, *Cyclaminus*.
Aſſhodelus Græcis, *Albicum*.
Aſſphon Aeg. *Ballore*.
Aſſidion *Auracſylis*.
Aſſidion *Alyſſum*.
Aſſlenos *Hedera*.
Aſtaphis *Staphis agria*.
Aſterion *Aſter Atticus*.
Aſterion *Cannabis*.
Aſterion *Sphondylium*.
Aſtericoſus *Aſter Atticus*.
Aſterope Aeg. *Marrubium*.
Aſteriphen *Aphris* *Chamaemelon*.
Aſtriſmunum *Aphris* *Solanum hor*
tenſe.
Aſtrion *Coronopus*.
Aſumes *Aphris* *Mercurialis*.
Aſameslabon *Croceraambe*.
Aſuric *Pennis* *Eruca*.
Aſyntrophos *Rubus*.
Atadim *Aphris* *Rhamnus*.
Atbanaton *Lychnis coronaria*.
Atthon Aeg. *Phoenix*.
Atierberziam *Aphris* *Marrubium*.
Atijron *Pennis* *Plantago*.
Atirſite *Pennis* *Coronop*.
Atiraſſylis *Pythagore* *Anemone*.
Atiraphaxis Græcis, *Atriplex*.
Atocius *Lychnus ſylueſtris*.
Atomos *Veratrum album*.
Atomos *Hyoſcyamus*.
Aton *Bunum*.
Aturion *Aſplenum*.
Antbion *Chelidonium magnum*.
Aucna *Bromos* *aut Aegilops*.
Augon *Jatis ſativa*.
Augon *Ocimaſtrum*.
Auguſtia *Leucoion*.
Aura *Centaurium minus*.
Aura *crocodili* Oſſiani *Lilium*.
Aurenrimbeſor *Aegyptijs* *Buglo*
ſus.
Autogenes *Narciſſus*.
Autogenes Oſſiani *Colocynthis*.
Axina maior *Periclymenum*.

B.

B *Abathy* Oſſiani *Cicut.*
Babibyrion *Aegyptijs* *Paſti*
naca.
Bacchor *Aſarum Gallis*.
Baden *Pennis* *Thaſſi*.
Balis *Cucumis ſylueſtr*.

[illegible]

Bryon thalassion, Muscus marinus.
 Buhalion, Cucumis sylvestris.
 Bubonion, Aster Atticus.
 Bubophthalmos, Sedum maius.
 Bubula lingua, Baglossus.
 Bucephalos, Tribulus.
 Buccinus minor Romanis, Delphinion.
 Buccron, Foenumgræcum.
 Bucranion, Vitis nigra.
 Buglossus magna, Cirsium.
 Bunejath Aphris, Anchusa.
 Bulbos hæmáticos, Hemerocallis.
 Bulbus morbitarius Romanis, Narcissus.
 Bulbus Romanis, Hemerocallis.
 Bumion, Verbenaca.
 Burchumath Aphris, Chrysocome.
C.
 Cabellation, Cynoglossum.
 Cacabum Poenis, Solanum somniferum.
 Caciatrix Rom. Coronopus.
 Cacos, Xyris.
 Cacubulum, Solanum hortense.
 Calabotis Magis, Cepa.
 Calabrina, Lonchitis altera.
 Calamintha sylvestris, Scordion.
 Calamintha, Mentha.
 Calummaris Romanis, Tripolium.
 Callesin, Verbenaca altera.
 Callia, Anthemis.
 Callias, Solanum somniferum.
 Callipetalon, Quingfolium.
 Callitrichon, Adiantum.
 Calycanthemon, Clymenum, & Periclymenon.
 Camarus, Delphinium.
 Cammaros, Mandragoras.
 Camelopodion, Marrubium.
 Campestris flos, Anthyllis, & Parthenium.
 Campsanenia, Rosmarinus.
 Canina brassica Romanis, Apocynum.
 Caninum malum Romanis, Mandragoras.
 Canis aut Canina lingua, Cynoglossum.
 Cannabion, Cannabis.
 Canocersca, Helxine.
 Canopicon, Pityusa.
 Cantharinum, Ballote.
 Caper sylvaticus, Artemisia.

Capillaris Rom. Trichomanes.
 Capillus terræ, Adiantum.
 Capitulum Martis Romanis, Eryngium.
 Capnites, Fumaria.
 Capnogorgon, Fumaria.
 Capnos, Fumaria.
 Capnos in hordeis, Fumaria.
 Cappacorania Romanis, Buphthalmus.
 Capra licen Magis, Malua.
 Capria, Capparis.
 Capsella, Thlaspi.
 Carcineithron, Polygonum.
 Cardamon Græcis, Nasturtium.
 Cardaminaca, Nasturtium.
 Cardamomon, Geranium alterum.
 Carduus ramparius, Spina alba.
 Carduus Veneris, Dipsacus.
 Carduus uariatus Romanis, Chameleo albus.
 Carduus niger Latinis, Chameleo niger.
 Carophylla Dacis, Catanance.
 Carota, Pastinaca.
 Carpathon, Periclymenon.
 Carpos, Foenumgræcum.
 Caryon, Eryngium.
 Casialam, Hyssopus.
 Casta Rom. Pæonia.
 Castor, Crocum.
 Catanchusa, Anchusa.
 Catangelos, Ruscus.
 Cataphysis, Psyllion.
 Catapxyxis, Cicuta.
 Catharsis, Struthium.
 Catechomenion, Cicuta.
 Catheron, Iris.
 Caucum, Caulis.
 Caulis Iouis, Sedum maius.
 Calisacer, Halimus.
 Cauta Hetruscis, Parthenium.
 Cedus, Epithymum.
 Cedrostin, Vitis alba.
 Cemeleg, Nigrum ueratrum.
 Cemos, Hedera.
 Cemos, Leontopodion, & Catanance.
 Centonalis sylvestris Ruta, que & Hypericon.
 Centum capita Hispan. Eryngium.
 Centunculus, Gnaphalon.
 Cephalotos, Calamintha.
 Ceraitis, Foenumgræcum.
 Ceranion, Anemone.
 Cerascome, Pastinaca.

Cerascomion, Oenanthe.
 Ceraunia, Sedum maius.
 Cerceraphron Dacis, Anagallis purpurea.
 Cerdon, Struthium.
 Cereæ Aeg. Asarum.
 Ceria Cuspidata Rom. Sedum maius.
 Cerualis spina Roma. Rhamnus.
 Cerui ocellus Roma. Elaphobos.
 Cestron, Lonchitis.
 Cestron uel potius Cnestron, Thymelea.
 Ceti Aeg. Conyza magna.
 Cibus Saturni Magis, Hippuris.
 Cicerbita aspera, Sonchus asper.
 Cicchorium, Sonchus asper.
 Cicotria, Geranium alterum.
 Cinnamonalis Roma. Adiantum.
 Cinnamonalis Ro. Verbenaca altera.
 Cine, Ruscus.
 Cinnabaris, Rubia.
 Ciofmin, Salvia.
 Cissanthemon, Cyclaminus.
 Cissanthemon, Helxine.
 Cissaros, Hedera.
 Cission, Asclepias.
 Cissophyllon, Asclepias.
 Cissophyllon, Cyclaminus.
 Cissos acarpus, Chamaecissus.
 Citharos, Hedera.
 Citocodium Rom. Chamelea.
 Citrago Lat. Melissophyllon.
 Citampelos, Helxine.
 Calcanthemon, Chrysanthemon.
 Chalcanthion, Chrysanthemon.
 Chalcedonion, Stibi.
 Chalcitis, Chrysanthemon.
 Chalcoeri, Fumaria.
 Challirrython Magis, Struthium.
 Chamaeste Græc. Ebulus.
 Chamebalanus agria, Apios.
 Chamebalanus, sylvestris Raphanus.
 Chamedaphne, Daphnoides.
 Chamedrys, Scordion.
 Chamegeron, Tusilago.
 Chamelea sui generis herba, item Thymelea.
 Chameleon, Dipsacus.
 Chameleuce, Tusilago.
 Chameleucos, Verbenaca altera.
 Chameleuce, Chamaecissus.
 Chameleon, Anthemis, & Parthenium.
 Chamemyrte, Ruscus.
 Chameption, Erysimon.

Chame-

- Chamaepitys, sylvestris Ruta, quæ & Hypericon.*
Chamaepitys, Onobrychis.
Chamaepitys, Ruscus.
Chamaeryton, Struthium.
Chamaesyce, Astragalus, & Papaver fatium.
Chascanon, Xanthium.
Chedra, Hippuris altera.
Chelidonium, Vitis alba.
Chelidonium micron, Fumaria.
Chelidonium, Anagallis purpurea.
Chelonion, Cyclaminus.
Chemia Aeg. Elaphobos.
Chene, Ruscus.
Chenon Aeg. Atractylis.
Cherda Aphris, Eryngium.
Cheredranon, Hippuris.
Chida, Eryngium.
Chilophyllon, Achillea.
Chilophyllon, Polygonum.
Chimerine, Sedum minus.
Chir, Dipsacus.
Chironos ampelos, Vitis nigra.
Chironia, Centaurium magnum.
Chloria, Eryngium.
Chlouion, Eryngium.
Chocortem Aeg. Malva.
Cheradoletion, Xanthium.
Cholopeon, Abrotonum.
Chorodanon, Sphondylium.
Charos aphrodias, id est, Acorus.
Chrysanthemon, Chrysocome.
Chrysanthemon, Artemisia.
Churseten Aph. Chrysanthemum.
Chrysis, Mercurialis.
Chrysis, Chrysocome.
Chrysis, Sedum maius.
Chrysiceptron, Chamæleo albus.
Chrysipthermon, Sedum maius.
Chrysocalis, Parthenium.
Chrysoscarpos, Hedera.
Chrysospermon, Chrysogonum.
Chrysalion, Psyllion.
Chudua Aphris, lincus marinus.
Chuffit Aphris, Anemone.
Chulum Aph. Polygonum.
Churma Aphris, Ruta hortensis.
Churma semmacod Aph. sylvestris Ruta, quæ & Hypericon.
Clema, Pityusa.
Clema, Polygonum.
Clemation, Medium.
Clematis, Periclymenum.
Cleonia, Helenium.
Cleonicon, Clinopodium.
Clibodion, Helixine, Nicander Cybotin uocat.
Clinopodium, aut potius Clinopodium, Polycnemum.
Clymenion, Clymenum.
Clymenon, Periclymenum.
Cnecon, Sampsuchum.
Cneoron, Thymelea.
Cnicion, Trifolium.
Cnicos sylvestris, Atractylis.
Cnicus agria, Anemone.
Cnide, Vrtica.
Cnidos coccus, Chamæleo niger.
Cniphe, Vrtica altera.
Cnopodium, Polygonum.
Cnus Aeg. Carduus.
Cnyx Aeg. Fumaria.
Coccus Gnidius, Chamælea.
Cete, Cicuta.
Colocasion Cyprijs, Aron.
Colocyntha agros, Colocynthis.
Colocyntha Alexandrina, Colocynthis.
Colomestrum, Aconitum alterum.
Colophonia uel Colophonium Romanis, Scammonia.
Columba Roma. Lithospermon.
Colus Iouis, Polycnemum.
Colus Iouis, Verbenaca altera.
Colus rustica Ro. Atractylis.
Cometes, Tithymallus.
Comidijus Siculis, Psyllion.
Concordialis Rom. Argemone.
Conile, Myrrhis.
Conion, Cicuta.
Consecratrix, Iris.
Cor lupi, Capparis.
Cor lupi Magis, Limonium.
Corchoron, Anagallis.
Corion, Onobrychis.
Corion enygron, Adiantum.
Corion, Fumaria.
Corni malum, Capparis.
Cornutum Papauer, Leontopetalô.
Cornulaca Rom. Tragion alterum.
Coron, sylvestris Ruta, quæ & Hypericon.
Corona Gallis, Argemone.
Corona terre, Chamæcissus.
Corona Veneris, Sisymbrium.
Coronion, Sesamoides paruum.
Corydalion, Fumaria.
Corydalion sylvestre, Fumaria.
Corymbetbra, Hedera.
Corymbion, Lychnis coronaria.
Cotiatâ Dacis, Gramen.
Cotyledon, Umbilicus Veneris.
Cræpula, Acanthium.
Crambion, Pityusa.
Cratæa, Chelidonium magnum.
Crethmon Aeg. Erysimon.
Cretica, Dictamnus.
Creidion, Cicuta.
Crinanthemon, Hemerocalles.
Crinanthemon, Lilium.
Crinon agrion, Hemerocalles.
Crinon basilicon, Lilium.
Crinon, Capparis.
Criothicum, herba, ex qua Ammoniacum fit Thymiana.
Crista gallinacea Ro. Verbenaca.
Crobysos, Sedum minus.
Crobysion Aeg. Eryngion.
Crocodition, Dipsacus.
Crocodili aura Osthani, Lilium.
Crocodili sanguis, Leontopodium.
Crocomerion, Leontopodium.
Crommyon Græcis, Cepa.
Cronion, Delphinium.
Cronon Magis, Conyza tertia.
Crotophthoon, Leontopodium.
Croston, Leontopodium.
Crotion, Catanace.
Croton, Ricinus.
Crustana Dacis, Chelidonium magnum.
Chrysanthemon, Sedum maius.
Chrysocoma, Anthemis.
Cucurbita syluatica Roma. Colocynthis.
Cuminum leporis, Limonium.
Cuminum regum, Anethum.
Cupressus sylvestris, Juniperus magna.
Curtis, Verbenaca altera.
Cusimezar Pœnis, Cucumis sylvestris.
Cuspid ceria Ro. Sedum maius.
Cyamos leucos, Aconitum alterum.
Cybelion, Viola purpurea.
Cybellion, Medium.
Cycolis Dacis, Solanum somniferum.
Cyranion, Nigrum Veratrum.
Cymbalion, Umbilicus Veneris.
Cynanchon, Apocynum, idem Cynanche.
Cynanchites, Abrotonum.
Cynarica, Apocynum.
Cynocardamon, Nasturtium.
Cynoccephalon, Psyllion.
Cynoccephali genitura, aut Capilli Magis, Anethum.

Cynochalum, Polygonum.
 Cynostonon, Apocynum.
 Cynoglosson, Plantago.
 Cynomazon, Chamaeleo niger.
 Cynomarion, Orobanche.
 Cynomorphos, Crocum.
 Cynomaron, Apocynum.
 Cynomysia, Psyllion.
 Cynobatos, Rubus.
 Cynobatos, Capparis.
 Cynobatos, Smilax aspera.
 Cynoxylon, Chamaeleo niger.
 Cynozematis, Conyza magna.
 Cynumphricem Aegyptijs, sefeli
 Aethiopicum.
 Cyperis, Dracunculus.
 Cyprum Lat. Chamaepitys.
 Cyßion, Hederæ.

D.

Dacylion, Scammonium.
 Dacina Dacis, Limonium.
 Dæmon bonus Magis, Peucedanum.
 Damasonion, Halimum.
 Damuamete, Catanance.
 Damnamene, Leontopodium.
 Danae, Laurus Alexandrina.
 Danais, Conyza magna.
 Daphnos, Laurus Alexandrina.
 Daphne Aegy. Leontopodium.
 Daphnites, Chamaedaphne.
 Dapnoides, Clematis.
 Dardanis, Cicuta.
 Dareuion, Lauer.
 Dasmophon, Thlaspi.
 Daspis, Chrysogonum.
 Dasyclonon, Filix.
 Dasydion, Viola purpurea.
 Datisca, Catanance.
 Deliarium, Conyza magna.
 Delphinias, Delphinium.
 Demetrias, Verbenaca altera.
 Demos, Catanance.
 Dendronarctu, Sambucus.
 Diachysis, Delphinium.
 Diachyton, Delphinium.
 Diadema Osyridis Magis, Halimum.
 Diadema Zoroastri, Malua.
 Diamonon Zoroast. Mandragoras.
 Diaxylon Syris, Aspalathus.
 Dialion, Heliotropium.
 Dichromos, Verbenaca altera.
 Dielia Dacis, Hyoscyamus.
 Dinofinos, Conyza magna.
 Diosyamos, Hyoscyamus.

Dionysia, Hederæ.
 Dionysias, Androsæmon.
 Dionysias, Catanance.
 Diospogon, Chrysocome.
 Diosporos, Lithospermum.
 Dircton, Solanum somniferum.
 Diubiambrion, Hyoscyamus.
 Dochela Dacus, Chamaepitys.
 Dolia, Cicuta.
 Donacitis, Spina alba.
 Dorcidion, Dictamnus.
 Dorictoris, Leontopetalum.
 Doris, Leonotpetalum, & Psch-
 danchusa.
 Dorycnion, Pyrethrum.
 Dorycnion, Solanum somniferum.
 Dorysatum Aeg. Gingidium.
 Dracanon, Rubia.
 Dracontia, Acon.
 Dubath Aphris, Chrysocome.
 Ducone Gall. Ebulus.
 Dulcisradix Roma. Glycyrrhiza.
 Dyn Dacis, Vrtica.
 Dyticon, Smilax aspera.
 Dyticon, Clymenum.

E.

Ebenitis, Polium.
 Ebenotrichon, Adiantum.
 Ebulus Rom. Græcis Chamaeste.
 Echeonymon, Polycnemum.
 Echinion, Hippophaës.
 Echion, Ocimastrum.
 Echlotoripa Aeg. Blitum.
 Eclomon, Nigrum ucratum.
 Egne, Isatis sativa.
 Elaphicon, Elaphoboscon.
 Elaphine, Nigrum ucratum.
 Elaphion, Ocimastrum.
 Elaphoboscon, Allium.
 Elaphoboscon, Salvia.
 Elaphoscorodon, Apocynum.
 Elaterion, Cucumis sylvestris.
 Eldia, Dictamnus.
 Eleoselinon Græcis, Apium p alu-
 stre.
 Elitis, Helxine.
 Elystephanos, halimus.
 Embactron, Dictamnus.
 Embrosi Aeg. Lactuca sativa.
 Emmanes, Hyoscyamus.
 Empetron, Saxiphagon.
 Enemios, Anemone.
 Enoron, Solanum furiosum.
 Enotron, Quingfolium.
 Entaticon, Satyrium alterum.
 Entimon agrion, Hieracium parvum.
 Malim Entibon: nam & Rom.
 Intybum sylvestre uocant.
 Enula campana, Helenium.
 Enygron corion, Adiantum.
 Epapitis, Smilax aspera.
 Epaphon Aeg. Medium.
 Epber Aeg. Chamaeleo albus.
 Ephemeron, Dictamnus.
 Ephesia, Artemisia.
 Ephthoschin, Chamaeleo albus.
 Ephydron, Hippuris.
 Epier Aeg. Adiantum.
 Epigitis, Clematis altera.
 Epipetron, Lens palustris.
 Epithymis, Calamintha.
 Epnubum Aeg. Ruta hortensis.
 Epuitis, Periclymenum.
 Equinalis Roma. Hippuris.
 Equina salix, Hippuris altera.
 Equi salix, Hippuris.
 Equisetum, Hippuris.
 Equition, Hippuris altera.
 Eranthemon, Anthemis.
 Eranthemis, Anthyllis.
 Erechthites, Senecio.
 Erigenon, Verbenaca altera.
 Erigeron, Senecio.
 Erineos, Epimedium.
 Erxoe Aeg. Bunium.
 Erynere, Eryngium.
 Erymon, Halimum.
 Eryngæ, Eryngium.
 Eryngium, Raphanus, & Aloë.
 Erysiocetrum, Spina alba.
 Erysiocetron Pythago. Verbenaca
 altera.
 Erythra, Melissophyllon.
 Eschasmene, Onobrychis.
 Ethenchis Aeg. Potamogeton.
 Ethericem Aegyptijs, Eruca.
 Ethusa, Cicuta.
 Etijcelta Aeg. Sedum paruum.
 Euboica, Ebulus.
 Eupatorion, Marrubium.
 Eupetalon, Daphnoides.
 Eurechnemon Magis, Plantago.
 Eusine, Helxine.
 Eusteralis, Sisymbrium.
 Euzomos, Eruca.
 Exupera, Verbenaca.

F.

Fabium Romanis, Chelidonium magnum.
 Fabulum Hetrusc. Hyoscyamus.
 Fabulum marinum Romanis, Pap-
 her corniculatum.

Tatalis

- F**atalis, aut melius Fontinalis Latinis, Potamogeton.
Febri sanguis Magis, Ricinus.
Febri fuga, Conyza magna.
Febri fuga Latinis, Centaurium minus.
Fel terra Romanis, Centaurium magnum. Ego malim referre ad parvum.
Ferula sylvestris, Thapsia.
Ferulago, Thapsia.
Festuca, Acglops.
Fetulin Roma. Viola purpurea.
Ficus terre, Astragalus.
Fidicula, Opteron.
Filicula, Polypodium.
Filicula herba Roma, Catanance.
Filis fanaria, Filix.
Flammula, Leonopodium.
Flos campestris, Argemone.
Fluviatilis stratiotes, qui alias aquaticus.
Fontinalis Lati, Potamogeton.
Foriculum erraticum Lat. Hippomarathrum.
Fumaria, Capnos.
Fusus agrestis Romanis, Atractylus.
- G.**
- G**alation, Galion.
 Galeobdolon, Galeopsis.
 Galephos, Galeopsis.
 Galisopsis, Pulegium.
 Gallinacea cristata Roma. Verbenaca.
 Gallertion, Galion.
 Gallitron, Liliun.
 Garganon, Tragion alterum.
 Garuleum Hetrus, Chrysanthemon.
 Gatale, Astragalus.
 Gathuon Aphris, Sonchus asper.
 Geboscon, Allium.
 Gelasion, Gnaphalion.
 Geminalis Lat. Horminum.
 Genicularis Romanis, Lychnis coronaria.
 Genialis, Xiphion.
 Genitura Herulis Magis, Ruscus.
 Genitura Hori, Marrubium.
 Genitura Herois Magis, Polygonum.
 Genitura Titani Magis, Sideritis.
 Geranogeron, Geranium.
 Geranopodion, Lychnis coronaria.
 Gis, Hippuris.
 Gladiola, Iris.
- Gladiola Roma, Xiphion.
 Gladiolus, Xiphion, & Xyris.
 Glandula, Astragalus.
 Glatum Roma, Isatis sativa.
 Glaucia, Chelidonium magnum.
 Glichon, Pulegium.
 Gluta Roma, Isatis sativa.
 Glyceraton, Glycyrrhiza.
 Glycyphyton, Glycyrrhiza.
 Glycys ancon, Abrotonum.
 Gnomusifon Latinis, Muscus marinus.
 Gnotera, Ballote.
 Gnothurim, Ballote.
 Gobios, Tithymallus.
 Goed Aphris, Coriandrum.
 Golgojum, Rapum.
 Gongylis, Rapum sativum.
 Gonogonas, Mandragoras.
 Gonoleta Dacis, Lithospermum.
 Gorgnion, Eryngium.
 Gorgonion, Lithospermum.
 Gramen, Agrostis.
 Grielon, Hippocelinon.
 Gruiza Lat. Geranium alterum.
 Grynus, Cucumis sylvestris.
 Gyrenia Boeotis, Ruscus.
 Gynecion, Stibi.
 Gynon, Hippuris altera.
- H.**
- H**acmaideos, Agnos.
 Hamagogos, Pæonia.
 Hamaticos bulbus, Hemerocalles.
 Hamionos Magis, Mandragoras.
 Hemoos Aeg, Rubus.
 Hemorrha Magis, Bupthalmus.
 Hemostarin, Nerium.
 Halicacabos, Anagallis.
 Haplophyllon, Alyssum.
 Harmala Syris, Ruta hortensis.
 Hecigonon isidis, Sampsuchum.
 Hedemias, Conyza magna.
 Hedera pluviatica Latine, Chamæcissus.
 Hederatis Romanis, Sylvestris Ruscus & Hypricon.
 Helbunon, Dillamnus.
 Helide, Smilax aspera.
 Heliophyton, Smilax aspera.
 Heliosacte, Ebulus.
 Heliotropion, & Heliopon, Heliotropium.
 Helustrum herba ex qua Ammoniacum fit Thymiana.
 Heliophyes, Clymenum.
 Helleborites, Centaurium minus.
- Helleborofemata, Limonium.
 Helleborus albus, Sesamoides magnum.
 Helonia, Hyacinthus.
 Hemerocatalacton, Hemerocalles.
 Hemeros, Sambucus.
 Hepatitis, Clymenum.
 Hepatitis, Eupatorium.
 Hepatorium, Eupatorium.
 Hepthon, Atramenti sutorij genus alterum.
 Heptapleuron, Plantago.
 Heraclea, Helxine.
 Heracleon, Achillea.
 Heraclia, Lithospermum.
 Heractia, Polygonum.
 Heraction, Abrotonum.
 Heraction, Chamaelea.
 Herba Filicula Roma, Catanance.
 Herba Regia, Artemisia.
 Herba Rutinalis Roma, Sphondylium.
 Herba Sanguinalis, Verbenaca.
 Herba Scanaria Roma, Scandex.
 Herbieaton Aphris, Capparis.
 Herbulum Lat. Erigeron.
 Hercules alphiata Magis, Erysimon.
 Hercules genitura Magis, Ruscus.
 Hercules sanguis, Crocum Magis et Centaurium magnum et minus.
 Hercules sanguis, Veratrum album.
 Hermion, Eryngium.
 Herminion, Aloe.
 Hermodactylos, Quingfolium.
 Hermubium Magis, Filix.
 Herois genitura Magis, Polygonum.
 Herpacantha, Acanthium.
 Herpize, Elaphoboscon.
 Hieracium, Dracunculus.
 Hieracopodion, Lychnis sylvestris.
 Hierobotane, Verbenaca.
 Hierobrymas Magis, Geranium alterum.
 Hieromyrton, Ruscus.
 Hipparifon, Verbenaca altera.
 Hippion, Hippophaës.
 Hippoglotton, Laurus Alexandrina.
 Hippomanes, Apocynum.
 Hippomanes, Capparis.
 Hippophanes, Hippophaës.
 Hippophyes, Hippophaës.
 Hippuris, Equisetum.
 Hires, Gnaphalion.
 Holochrysos, Sedum maius.

Holoceros in **Heraclea Pontica**, **Chamaepitys**.

Hominis sanguis **Magis**, **Artemisia**.

Homocnemon, **Glycyrrhiza**.

Homonoca, **Argemone**.

Hori genitura, **Marrubium**.

Hormia **Dactis**, **Horminum**.

Hyacinthus, **Delphinium**.

Hyenopolygon, **Ocimum**.

Hydragogon, **Chamaedaphne**.

Hydrastina, **Cannabis sylvestris**.

Hydroses, **Erinus**.

Hydroselinum, **Eleoselinon**.

Hyophthalmos, **Aster Atticus**.

Hypericon, **Onobrychis**.

Hypnoticon, **Hyoscyamus**.

Hypoglosson, **Laurus Alexandrina**.

Hypopapion, **Thapsia**.

Hylobrium, **Marum**.

I.

Iaron, **Dracunculus**.

Ibasacem **Aeg. Staphis agria**.

Iberis, **Nasturtium**.

Ibidis sanguis, **Rubus**.

Ibidis penna, **Quinquefolium**.

Ibidis unguis **Magis**, **Quinquefolium**.

Icco, **migdonon**, **Lens palustris**.

Ichrei agnus **Magis**, **Sampfuchum**.

Ichthyotheron, **Cyclaminus**.

Iconan **Lucanis**, **Rhododendron**.

Iconis rosa, **Lilium**.

Idea batos, **Helenium**.

Idea, **Laurus Alexandrina**.

Idei dactyli, **Paeonia**.

Ideus philomus, **Helenium**.

Idiophyton, **Leontopodium**.

Iebal **Aphris**, **Gramen**.

Iescen **Aphris**, **Geranium**.

Illecebra, **Aizoon sylvestre**.

Illyrica, **Iris**.

Inananoentaria **Roman.** **Hyoscyamus**.

Inguinalis, **Aster Atticus**.

Inturis **Roma.** **Capparis**.

Intybum sylvestre **Romanis**, **Hieracium paruum**.

Intybum **Rom.** **Conyza magna**.

Involucrum **Rom.** **Epithymum**.

Iocinalis, **Onobrychis**.

Iocri **Aeg.** **Hemerocalles**.

Ion **sylvestre**, **Viola purpurea**.

Ionis **Athenis**, **Chamaepitys**.

Ionites, **Capparis**, quæ & **Inturis**.

Iouis barba **Roma.** **Chrysocome**.

Iouis colus, **Verbenaca altera**.

Iouis colus, **Polycnemum**.

Iouis caulis, **Sedum maius**.

Irane, **muscus marinus**.

Iris agrestis, **Xyris**.

Iris agria, **Xyris**.

Isa, **Nigrum ucratrum**.

Isaron, **Dracunculus**.

Ischas, **sylvestris** **Raphanus**.

Ischias, **Leucacantha**.

Ischias, **Apios**.

Ischys, **Conyza magna**.

Istionis sanguis **Magis**, **Ballote**.

Itiandendron, **Hippuris**.

Itasis **Aegyptijs**, **Fecumgræcum**.

Ithyterion, **Hedera**.

Iumbarum **Gall.** **Limonium**.

Iunci radix, **Iuncus**, **Cyperus**.

Iuncus marinus **Roma.** **Oxychoe-**

nos.

Iunonis lachryma **Magis**, **Verbana-**

naca.

Iupicellus, **Iuniperus parua**.

Ixia, **Chamaeleobus**, & **niger**.

L.

Labatholabat **Aphris**, **Auricula muris**.

Labatholabat **Poenis**, **Alfine**.

Labonia, **Marrubium**.

Labeo urtica **Lati.** **Galeopsis**.

Labrum Veneris, **Dipsacus**.

Lactago, **Chamaedaphne**.

Lacula, **Filix**.

Lagnum **Gall.** **Veratrum album**.

Lampas, **Lychnis sylvestris**.

Lampuca **Roman.** **Hieracium ma-**

gnum.

Lanaria herba, **Struthium**.

Laparon uolutum **Romanis**, **Hel-**

xime.

Lapathum sylvestre, **Phyllitis**.

Lappa **Lati.** **Personata**.

Lappa **Latinis**, **Xanthium**.

Lappago **Roma.** **Hippophaës**.

Larbason, **Stibi**.

Later, **Hyssopus**.

Lauacrum Veneris, **Dipsacus**.

Lauer, **Sium**.

Lauothen **Aphris**, **Vitis nigra**.

Laurcola **Roma.** **Chamaedaphne**.

Lax **Dactis**, **Illecebra**.

Leapetes, **Sedum maius**.

Lecciticum, **Agnos**.

Leia, **Artemisia**.

Lenen **Aegyptijs**, **Helenium**.

Leo, **Orobancha**.

Leoninum semen **Roma.** **Leontopetalum**.

Leontica, **Glycyrrhiza**.

Leontion, **Leontopetalum**.

Leontocharon, **Folium**.

Leontopodium, **Leontopetalum**.

Leucacantha, **Rhamnus**.

Leucanthos, **Oenanthe**.

Leucanthemon, **Anthyllis**, & **Par-**

thenium.

Leuceoron, **Leontopetalum**.

Leuce, **Androsaces**.

Leucoion **sylvestre**, **Moly**.

Libanum, **Buglossus**.

Libanotis, **Conyza tertia**.

Liburnia, **Argemone**.

Libyestalon, **Glycyrrhiza**.

Libyon, **sylvestris** **lotus**.

Libyus **Aegyptijs**, **Iuniperus par-**

ua.

Licophryx, **Artemisia**.

Lion capre **Magis**, **Malua**.

Lilium sylvestre, **Hemerocalles**.

Lilium marinum, **Hemerocalles**.

Limnæstion, **Centaurium magnum**

& **paruum**.

Limnæstion, **Centaurium magnum**.

Lingua canis aut **canina** **Roma.** **Cy-**

noglossum.

Lingua ceruina **Romanis**, **Filix fo-**

mina.

Lingua bubula, **Buglossus**.

Linocalamis, **Linum**.

Linen agrion, **Linum**.

Linoxostis, **Apios**.

Linoxostis, **Mercurialis** & **Cyn-**

crambe.

Lirion, **Narcissus**.

Lupa, **Ricinus**.

Lupi cor, **Capparis**.

Lycanthemon, **Smilax aspera**.

Lychnis agria, **Leontopetalon**.

Lychnis agria, **Hippoglossum**, &

Antirrhinum.

Lycos, **Orobancha**.

Lycoscytalion, **Sesamoides ma-**

gnum.

Lygos, **Agnos**.

Lygos, **Thapsia**.

Lythre **Aeg.** **Smilax aspera**.

Lyme, **Elaphoboscon**.

Lobos, **Thapsia**.

Lonchitis, **Asplenium**.

Lonchoton, **Atramenti sutorij**

nus alterum.

Lotus magnus, **Cytisus**.

M.
Macbe, Mentha.
 Macheronion, Xiphion.
 Macia Rom. Anagallis purpurea.
 Memoc Aphris, illecebra.
 Magnum, Ballote.
 Matorana Latinis, Sampsuchum.
 Maius uolucrum Romanis, Eupatorium.
 Malium Roman. Anthemis.
 Maloion, Lychnis coronaria.
 Malum caninum Roma. Mandragoras.
 Malum terrestre, Mandragoras.
 Mamolaria, Acanthium.
 Mantia Dacis, Rubus.
 Manualis, Iuncus marinus.
 Maratin, Hippomarathrum.
 Marathrum agrion, Hippomarathrum.
 Marica radix Romanis, Iris.
 Marmarites, Fumaria.
 Maro, Centaurium magnum.
 Martis capitulum Romanis, Eryngium.
 Marrubium nigrum, Ballote.
 Martis sanguis Magis, est Asarum.
 Masysipos Hetrusc. Anagallis purpurea.
 Mater Sylue Roma. Hedera.
 Meccum Aeg. Anagallis.
 Mecon aphrodes, Ecplius.
 Mecon, Papauer.
 Mecon agrios, Gith.
 Meconion, Anemone.
 Medata, Ballote.
 Medica, Helenium.
 Medica, Medium.
 Medusa, Lonchitis.
 Melabathrum, Parthenium.
 Melampelos, Helixine.
 Melampphyllon, Acanthium.
 Melampodion, Veratrum nigrum.
 Melanorrhizon, Veratrum nigrum.
 Melion aqueum, Satyrion alterum.
 Meliphyllon, Melissophyllon.
 Melitæon, Melissophyllon.
 Melanthemon, Anthemis.
 Melanthion, Gith.
 Meleta, Dipsacus.
 Melophyllon, Millefolium.
 Melosmos, Polium.
 Melothron, Vitis alba.
 Mendruta Mysijs, Limonium.
 Menion, Peonia.
 Mercurij basis Magis, Halimium.
 Mergo, Clymenon.

Mercurij genitura, Bupthalmus.
 Mercurij sanguis, Verbenaca.
 Mercurij semen, Anethum.
 Mergua Roma. Smilax aspera.
 Meris, Tripolion.
 Merismorion Gallis, Melissophyllon.
 Merseon Aeg. Ambrosia.
 Mertryx, Geranium alterum.
 Meruopyum Aeg. Serpyllum.
 Methrion, Chamadaphne.
 Menda Syris, Limonium.
 Miaspho Magis, Cyclaminus.
 Milax, Clymenon.
 Militaris, Achillea.
 Militaris, Conyza magna.
 Millefolium, Achillea.
 Millefolium, Parthenium.
 Minerva sanguis Magis, Chamapitys.
 Minercium Roma. Leontopodium.
 Minon, Mandragoras.
 Mintha, Mentha.
 Mintha, Ruscus.
 Mion, Hippomarathrum.
 Misopathos, Ocimastrum.
 Mithridanion, uel Mithridation, Scordion.
 Mnesitheum, Bupthalmus.
 Mnesitheum, Iuniperus parua: item magna.
 Mochmatin Aeg. illecebra.
 Mohob Aegyptijs, Chelidonium magnum.
 Molortculus Veneris, Satyrion alterum.
 Moly, Eryngium.
 Monoclonos, Artemisia.
 Monogmion, Peonia.
 Mora baticana, Fructus rubi.
 Mosula Dacis, Calamintha.
 Multiradix, Centaurium minus.
 Muraria, Viola purpurea.
 Muris auricula Roma. Alfine.
 Muris unguis, Polygonum.
 Muris urina Magis, Malua.
 Mustela sanguis Magis, Asplenium.
 Mustela sanguis, Verbenaca.
 Musteros, Conyza magna.
 Myacantha, Corrua.
 Myacantha, Ruscus.
 Mydusa, Anchusa.
 Myites, Thlaspi.
 Myopteron, Thlaspi.
 Myitis, Caulis.
 Myon, Corrua.

Myortochon, Alfine.
 Myortochon, Auricula muris.
 Myortosplenon, Alfine.
 Myracanthion, Eryngium.
 Myriomorphon, Achillea.
 Myrrha, Myrrhis.
 Myrrhis, Geranium alterum.
 Myrsine, Periclymenum.
 Myrtopetalon, Polygonum.
 Myrtosplenon, Auricula muris.
 Myuros Armenijs, Sampsuchum.

N.
Nanti Aeg. Papauer erraticum, item satium quoque.
 Napium Romanis, Lampisana.
 Nar, Iris Aegyptijs.
 Narat Aphris, Bupthalmus.
 Narce, Centaurium magnum.
 Nardus rustica, Asarum.
 Narthecion, Asphodoclos.
 Nautica radix, Acorus Romanis.
 Nectaron, Helenium.
 Nemesion, Ocimastrum.
 Nepeta, Mentha.
 Neriadion, Delphinium.
 Nerion, Rhododendrum.
 Nesyris, Spondylion.
 Neumatium, Leontopodium.
 Neurax, Paronychia.
 Neuroides, Limonium.
 Nigra, Anemone.
 Nigrum Marrubium, Ballote.
 Nigrum Papauer Romanis, Gith.
 Nigrum uirtutum Romanis, Limonium.
 Nochelion, Ballote.
 Nonaria, Astragalus.
 Nonea, Anchusa.
 Nophryn, Ballote.
 Nophthan, Ballote.
 Nofprajon, Ballote.
 Nostellum, Ballote.
 Nothera, Ballote.
 Notianosemin, Ballote.
 Notion, Cucumis syluester.
 Notion, Sedum maius.
 Nycteritis Magis, Anagallis.
 Nymphaa pteris, Cnicus, sed rectius Filix femina.

O.
Oblamenia Romanis, Vitis nigra.
 Ocellus cerui Romanis, Elaphoboscon.
 Ochi Aeg. Atriplex.

- Oclion Aegy. Coriandrum.
 Ocimastrum Latinus, Acinos.
 Ocimoides, Chamaleo niger.
 Ocimoides, Clinopodium.
 Ocimoides, Erinus.
 Ocneron, Ruscus.
 Oculi pythons Magis, Stoechas.
 Oenanthe, Spondylium.
 Oeno Aegy. Struthium.
 Oenone, Argemone.
 Oleago, Chamelaea.
 Oleastellus, Chamelaea.
 Oligochloron, Capparis.
 Oligron, Apocynum.
 Olma Dacis, Ebulus.
 Olocyron Chamaepityn uocant qui
 Pontum incolunt.
 Olophyton, capparis.
 Omphalocarpus, Aparine.
 Onoslin, Apocynum.
 Onobrochilon, Onobrychis.
 Onocardion, Disfacus.
 Ononus, Onosma.
 Onophyllon, Anchusa.
 Onyx, Astragalus.
 Opaca Roma. Onobrychis.
 Opertritos, Iris.
 Ophigenton, Elaphobos.
 Ophiostonon, Elaphobos.
 Ophioscorodon, Apocynum.
 Ophioscorodon, Capparis.
 Ophiostaphylos, Vitis alba.
 Opsago, Solanum somniferum.
 Opteron, Fidicula.
 Orcitunica Roma. Anemone.
 Orestion, Helenion.
 Orestium, Helenium.
 Oriachloe, Eryngium.
 Origanis, Nearum.
 Origanum, Chrysogonum.
 Origanum, Eryngium.
 Origanum, Geranium alterum.
 Orizelon, Chamaepitys.
 Ornios, Anemone.
 Orobelion, Peonia.
 Orobax, Peonia.
 Orphitecoten Aegypt. Quinqueso-
 lium.
 Orthogyion, Solanum furiosum.
 Osmada, Onosma.
 Osmion, Medium.
 Ostiale, Phenix.
 Osiris Magis, Spondylium.
 Osyris diadema Magis, Halimum.
 Othonion, Chelidonium magnum.
 Oxyphyllon, Geranium alterum.
 Oxypternos, Oxychoenus.
 Oxychoenos, luncus acutus.
 Oxytonon, Papauer erraticum &
 satium quoq.
 Oxytriphylon, Trifolium.
 Oxyui Aegy. Clymenum.
 P.
PAEONIA, Chelidonium magnum.
 Peonion, Peonia.
 Pæden, Peonia.
 Pogonaton, Tusilago.
 Palladium, Leontopodium.
 Panphanes Aeg. Sedum maius.
 Panacia, Centaurium magnum.
 Pancarpus, Chamaleo niger.
 Pancranos, Thapsia.
 Pancration, Stoechas.
 Pandios radix, Chelidonium ma-
 gnum.
 Panion, Conyza tertia.
 Panthiceratos, Peonia.
 Papauer cornutum, Leontopetalon.
 Papauer nigrum Roma. Gith.
 Papauer spumosum, Chamaesyce.
 Papauer sylvestre, quod & corni-
 culatum.
 Papaueris Roma. Papauer erra-
 ticum.
 Paradacri Magis, Bannium.
 Paralion, Papauer corniculatum.
 Paralion, Pityusa.
 Paralyfis, Cicuta, & Apocynum.
 Paralyfis, Delphinium.
 Pardale, Leontopetalon.
 Pardalianches, Apocynum.
 Parme terra, Anemone.
 Parmiron Pythagora, Sideritis.
 Paronychia Magis, Sedum maius.
 Parthenion, Helxine.
 Passarina, Leucaton.
 Patabelclon Roman. Leontopeta-
 lon.
 Pecton, Atramenti sutorij genus al-
 terum.
 Pedalium, Polygonum.
 Pedicularia herba Roman. Staphis-
 agria.
 Pedion, Eleoselinon.
 Peenthadmecon, Glycyrrhiza.
 Peganon, Tusilago.
 Pegrina, Vitis nigra.
 Pelecinos, Hippophaes.
 Pelonitis, Geranium.
 Pempedula Gall. Quingfolium.
 Pempthemphtham Aegy. Verbenac-
 ca altera.
 Pempsepte Aeg. Verbenaca.
 Penna ibidis, Quingfolium.
 Pentaceonon, Quingfolium.
 Pentadactylos, Quingfolium.
 Pentadryon, Solanum furiosum.
 Pentapetes, Quingfolium.
 Pentaphylon, Quingfolium.
 Pentatomos, Quingfolium.
 Penthoron, Capparis.
 Peplion, Daphnoides.
 Pergalia, Argemone.
 Periclymenon, Clymenum.
 Peristemon, Fumaria.
 Perpenfa Lati. Asarum.
 Persephonion, Verbenaca altera.
 Persephonion, Rhamnus.
 Persica, Helenium.
 Persicum sinapi Romanis, Capparis.
 Persis, Hederæ.
 Personata Lati. Arcion.
 Perxo, Mentha.
 Pes gallinaceus Rom. Caucahis.
 Pes gallinaceus, Thlaspi.
 Pes pulli Roma. Caucahis.
 Pesalem Aegy. Hyssopus.
 Petrea, Capparis.
 Petraeon, Corruia.
 Petrina, Tusilago.
 Petrophyes, Sedum primum, quod
 secundum: & minus, quod ter-
 tium.
 Petroselinon sylvestre, Oreoseli-
 non.
 Peucedanon, Cucumis sylvestris.
 Phaeton, Salvia.
 Phædra, Hippuris.
 Phagnon, Salvia.
 Phalangon, Spondylium.
 Phaleon, Apocynum.
 Pharpharia, Tusilago.
 Phasganon, Aspalathus.
 Phasganon, Xanthium.
 Phasganon, Xiphion.
 Pheminalis, Verbascum.
 Pheria, Verbenaca.
 Pherombron, sylvestris Cucumis.
 Pherphra Aeg. Hippuris.
 Pherthrum erithimonthu, Mentha.
 Pherumbrum Zoroastri, Lactuca
 sylvestris.
 Pherusa, Carduus.
 Phauxaspidon, Polium.
 Phieri Romanus, Centaurium ma-
 gnum.
 Philachon Aeg. Clematis altera.
 Philan-

Philanthropos, Aparina.
Phileterion, Clematis.
Phileterion, Ocimastrum.
Philomedium, Chelidonium magnū.
Philtrodote, Asplenium.
Philtrodote, Verbenaca.
Phubophthethela Dacis, Adiantum.
Phlomos, Helenion.
Phlomos idcus, Helenium.
Phlomos & Phlomos, Verbascum.
Phloutis, Onofma.
Phoenicopetron, Phoenix.
Phragmosa, Conyza magna.
Phricin cyonium Aegyptijs, Sefeli Aethiopicum.
Phryga, Asplenium.
Phrygis, Asplenium.
Phrymon, Poterion.
Phrymon, Paronychia.
Phthution, Staphis agria.
Phthurostemon, Staphis agria.
Phlasis, Faonia.
Phycos, Conyza magna.
Phyllis, Phyllitis.
Phyllon, Leucacantha.
Phyllophares, Marrubium.
Phyllostaphylos, Capparis.
Phytobasila, Leontopodium.
Phyton, Cynoglossum.
Pieras, Androsaces.
Pieraficya, Colocynthis.
Pieris Graecis, Intybus sylvestris.
Pigna toxarin, Veratrum album.
Pinala, Trichomanes.
Pinus triuia Romanis, Astragalus.
Piper agreste, Agnos.
Piper aqueum Gallis, Acorus.
Pissia, Conyza magna.
Pukion, Tusilago.
Puyforysis, Chamepitys.
Plectronia, Centaurium magnum.
Podotis sanguis, Scordilon.
Poetica, Hedera.
Poligida, Anethum.
Polion Veneris Magis, Periclymenum.
Polion, Serpyllum.
Polion montanum, Polium.
Polyapodynos, Cicuta.
Polycarpos, Polygonum.
Polyconos, Artemisia.
Polygonaton, Polycnemot.
Polygonatum, Polygonum.
Polygonaton, Leucacantha.
Polygonoides, Clematis.

Polyides, Veratrum album.
Polyidos, Crommyon.
Polyides, Raphanus.
Polyides, Staphis agria.
Polyneuron, Plantago.
Polyonymon, Helxine.
Polyphura, Leucoion.
Polyphyllon, Medium.
Polyrhizon, Filix, & Polypodium.
Polyrrhizon, Nigrum ueratrum.
Polyrrhizon, Epimedium.
Pona Gallis, Artemisia.
Pontica, Glycyrrhiza.
Ponticum absinthium Roma, Abrotoum.
Porphyranthès, Hemerocalles.
Porphyrantes, Hyacinthus.
Porphyrus, Anchusa.
Porphyrus, Ocimastrum.
Portulaca sylvestris, Aizocon sylvestre.
Potamogton, Tripolium.
Potamogton, Limonium.
Potera, Capparis.
Præsepium Romanis, Atractylis.
Praffion, Marrubium.
Priadel Dacis, Vitis nigra.
Priapion, Viola purpurea.
Priapicon, Satyrion alterum.
Probatæa, Ocimastrum.
Probaton, Plantago.
Procampylon, Abrotoum.
Procheton, Tusilago.
Prodioma Dacis, Nigrum ueratrum.
Propedula Dacis, Quingfolium.
Profopis & Profopion, Personata.
Protion, Nigrum ueratrum.
Protagonos, Sedum maius.
Pseudopates, Staphis agria.
Pseudoselinum, Quingfolium.
Psyche, Tripolium.
Psychuacos, Helxine.
Psylleris, Psyllion.
Psilothron, Vitis alba.
Pterion, Cnicus.
Pteris, Filix, & Polypodium.
Pterion, Trichomanes.
Pteris nymphaea, Cnicus, sed potius Filix femina.
Pteris, Pterion, & Pterineon, Filix.
Pulcaris herba Romanis, Psyllion.
Pulmonia Latinis, Geranium alcerum.
Pulpum Dacis, Anethum.
Pustulago, Tusilago.
Pyracantha, Carduus.

Pyrinon, Pyrethrum.
Pyrites arnos, Pyrethrum.
Pyrites Magis, Pyrethrum.
Pyrothron, Pyrethrum.
Pyroton, Pyrethrum.
Pyros achme, Chamelea, & Thymalea.
Pythonion, Hyoscyamus.
Pythomisculus Magis, Stoechas.

R.
Radia Hetruscis, Smilax aspera.
Radicula, Struthium.
Radix sylvestris Lat. Apios.
Radix sylvestris Romanis, sylvestris Raphanus.
Rapionion, Limonium.
Rapum, Artemisia.
Rapum terra, Cyclaminus.
Rega herba, Artemisia.
Rhabdion, Halimium.
Rhœas papauer, id est, Erraticum.
Rhæpion, Leontopetalum.
Rhapontica Magis, Hyoscyamus.
Rhatibis Dacis, aster Atticus.
Rhichion, Tusilago.
Rhodus, Rhodia radix.
Rhododendron, Nerion.
Rhododaphne Parnis, Nerion, quod & Rhododendron.
Rhœuel rhus stachyos, Phoenix.
Rhœuel rhus, Phoenix.
Rhyt montana, Ruta montana.
Ricinus, Croton.
Ripla, Blitum.
Rosa iconis, Lilium.
Rustica Roma, Brassica sylvestris.
Rutinalis herba Romanis, Sphondylion.

S.
Saathan Aeg. Tusilago.
Salia Dacis, Tragion alterum.
Saluaris Roma, Pyrethrum.
Salix equi Roma, Hippuris.
Salix equina, Hippuris altera.
Salix marina uel Amerina Romanis, Agnos.
Salyca, Anchusa.
Samothrace, Chamedaphne.
Sampsoth Aeg. Hippomarathrum.
Sampsuchum, Amaracus.
Sanguinalis, Gramen.
Sanguinaria, Coronopus.
Sanguinaria, Polygonum.
Sanguis eluri Magis, Stratiotes aquaticus.

Sanguis

- Sanguis apocathemenes Magis, Lychnis coronaria.
 Sanguis asini Aeg. Filix.
 Sanguis crocodili, Leontopodium.
 Sanguis febris Magis, Ricinus.
 Sanguis Herculis, Veratrum album.
 Sanguis hominis Magis, Artemisia.
 Sanguis ibidis, Rubus.
 Sanguis Isonis Magis, Ballote.
 Sanguis Mercurij, Verbenaca.
 Sanguis Minerue Magis, Chamepitys.
 Sanguis mustele Magis, Asplenium.
 Sanguis mustele, Verbenaca.
 Sanguis podotis, Scordium.
 Sanguis oculi Magis, Anagallis purpurea.
 Sanguis tauri.
 Sanguis Titani Magis, Laetluca sylvestris.
 Sanguis Titani, Rubus.
 Sanguis Titani Magis, Sideritis.
 Sanulum Aeg. Scammonia.
 Santonicum Lat. Scrophium.
 Sapana Gallis, Anagallis purpurea.
 Saphtho Aeg. Hyscyamus.
 Saraca, Nigrum veratrum.
 Sarcocolla, Argemone altera.
 Sarxiphagon, Saxifraga.
 Sarxiphragon, Sarxiphagon.
 Sasa Syris, Lilium.
 Sataria, uel Stataria Roma. Peucedanum.
 Saturni cibus Magis, Hippuris.
 Satyri testicalus, Satyrion alterum.
 Satyriscos, Satyrion alterum.
 Sauritis, Anagallis purpurea.
 Saxifraga Roma. Sarxiphagon.
 Scambonia radix, Scammonia.
 Scammonion, Thapsia.
 Scanaria herba Roma. Scandix.
 Scandulacium Roma. Thlaspi.
 Sceptum, Lychnis coronaria.
 Schinos aromaticos, Lauer.
 Schinostrophon, Cannabis.
 Schenosis, Iuncus.
 Schenostrophon, Hippuris.
 Sciara Dacis, Dipsacus.
 Scimphen Aegyptijs, Rhododendron.
 Scimos, Ruscus.
 Sciolebia Rom. Stoechas.
 Scotiem Gall. Sambucus.
 Scolopendron sui generis herba, & Polypodium.
 Scolymos, Cynoglossum.
 Scopa regia Ro. Bunium.
 Scopion, Cucumis sylvestris.
 Scorbion, Scordium.
 Scorodon Graecis, Allium.
 Scorpionstons, Heliotropium.
 Scorpionis urina, Sideritis.
 Scorpis, Tragion alterum.
 Scorpuros, Ocimastrum.
 Scorpuros, uel Scorpis urina, Heliotropium maius & minus.
 Scubulum Gallis, Solanum hortense.
 Scyllion, Limonium.
 Scytalion, Umbilicus Veneris.
 Sebam Dacis, Sambucus.
 Selenion, Peonia.
 Selenogonon, Peonia.
 Selephion Aeg. Vrtica.
 Selinitis, Chamæcissus.
 Selinorition, Rubus.
 Seimeon Aeg. Gnaphalon.
 Semen leonum Roma. Leontopetalon.
 Seimeon Aegyptijs, Lychnis coronaria.
 Semeth Aegypt. Nasturtium.
 Seminalis, Polygonum.
 Semmaced diurna Aphris, sylvestris Ruta, quæ & Hypericon.
 Semnon Magis, Agnos.
 Semperuium Romanis, Sedum minus.
 Semperuium minus, quod & sylvestre, & tertium.
 Sendionor Aeg. Sideritis.
 Semura Aeg. Lychnis sylvestris.
 Senecio Lat. Erigeron.
 Serpyllum, Artemisia.
 Sesamis, & Sesamites, Sesamoides magnum.
 Sesamon sylvestre, Ricinus.
 Sesamon sylvestre, Sesamoides paruum.
 Sesamon agrion, Heliotropium.
 Sefeli Aegy. Caulis.
 Sefeli Cyprion, Ricinus.
 Sefeneor Aegypt. Dipsacus.
 Sicciriam Aphris, Anethum.
 Sicelioticon, Psyllium.
 Sicham Aphr. Pastinaca.
 Sicupnoex Dacis, Eryngium.
 Sicya picra, Colocynthis.
 Sideritis, Helixine.
 Sideritis, Verbenaca altera.
 Sideritis Eboicis, Chamepitys.
 Silbaciun Roma. Psyllium.
 Silene, Cyclaminus.
 Sinapi persicum Romanis, Capparis.
 Sinapi persicum, Thlaspi.
 Sinapi sylvestre, Thlaspi.
 Siphon, Aeglops.
 Siphonion, Bromos.
 Siferton Magis, Eryngium.
 Sifimaca Aphris, Papauer corniculatum.
 Sistramear Gallis, Hippomarathrum.
 Sithilas Pœnis, Hieracium magnum.
 Sitopelos, Aeglops.
 Smyrnoides, Clematis.
 Sobel Aeg. Chamæleo niger.
 Sober Aegy. Tragion alterum.
 Solastrum Rom. Anthyllis.
 Soldago Romanis, Symphyton alterum.
 Soleastrum, Sideritis.
 Solis seculum Romanis, Parthenium.
 Solis supercilium, Oxychænos.
 Soma Aegyptijs, Absinthium, Scrophium.
 Somphias Aegyptijs, Veratrum album.
 Sonchites, Hieracium magnum & paruum.
 Sopho Aeg. Sampsuchum.
 Sophobi Aegy. Rubia.
 Soranthin, Anthyllis.
 Sosandron, Delphinium.
 Sozusa, Artemisia.
 Sparganon, Ocimastrum.
 Sphagnos, Sefeli.
 Sphondylis, Spondylium.
 Splineion, Cynoglossum.
 Spina alba Romanis, Leucacantha.
 Spina alba Romanis, Rhamnus.
 Spina cerualis Roma. Rhamnus.
 Spina mollis Rom. Cirsium.
 Sphagnon, Aspalathus.
 Spina regia uel alba Romanis, & cantha leuce.
 Splenion, Periclymenum.
 Spongos, Rhododendron.
 Spumolium papauer, Chamæsyce.
 Stachyites, Potamogeton.
 Stachyites, Tripodium.
 Stachyos rhus uel rhus, Phoenix.
 Stemphin, Polygonum.

Stephane.

- Stephane, Chamaedaphne.*
Stephane, Calamintha.
Stergethron, Sedum maius.
Stergethron, Umbilicus Veneris.
Stefion, Staphis agria.
Silago, uel potius Silago, Coronopus.
Stipa Roma, Stoebe.
Stochis, Umbilicus Veneris.
Stratiotice, Millefolium.
Stratioticon, Achillea.
Strychnos, Solanum.
Strychnos manicos, Solanum furiosum, item corniculatum.
Strumus Romanis, Solanum hortense.
Strebocamelus, Struthium.
Styphonia, Stoechas.
Succinum Hetrusc, Asarum.
Sucotachos, Helxine.
Subites Gallis, Hedera.
Suitempium Aeg, Tblasti.
Sum Aeg, Agnos.
Supercilium folis, Oxychoenos.
Supercilium terre, Adiantum.
Supercilium Veneris, Achillea, & Millefolium.
Suphlo Aeg, Stoechas.
Syce, Peplus.
Sylithra, Glycyrrhiza.
Sylue mater Rom, Hedera.
Syluaticum acron, Achillea.
Syluaticus caper, Artemisia.
Syluestre Lapathum, Phyllitis.
Syluestris calamintha, Scordion.
Syluestris radix Lat, Apios.
Symphephon Aeg, Lilium.
Symphyton, Glycyrrhiza.
Symphyton, Helenium.
Syncliope, Stoechas.
Syncrisis, Cucumis syluester.
Syris Pœnis, Struthium.
Sylthana Aeg, Ricinus.
- T.**
Tanachion, Conyza magna.
Tantalitis, Lithospermum.
Taurion, Lychnis coronaria.
Tauri sanguis Magis, Marrubium.
Tauroceros, Tribulus.
Taurus apocathomenes Magis, Lychnis syluestris.
Telephion, Portulaca syluestris.
Teline, Cytisus.
Temele, Melissophyllon.
Terminis, Cannabis syluestris.
Terminalium Lat, Helenium.
- Terra capillus, Adiantum.*
Terra corona, Chamaecissus.
Terra supercilium, Adiantum.
Terra parine, Anemone.
Terra Tintinabulum, Limonium.
Tertana, Artemisia.
Tessculata, Cynocrambe.
Tetradix Atticis, Erice, Autore Plinio.
Teuthalis, Polygonum.
Teuthron, Polium.
Teuthron, Rubia.
Tbalastia, Androsaces.
Tbalastion, Papauer corniculatum.
Tballia, Capparis.
Abamath Aphris, Parthenium.
Thaumasos, Iris.
Thelpide, Iris.
Thelyphthorion, Abrotonum.
Thelyteris, Thapsia.
Thelythamnum, Abrotonum.
Theobroton, Sedum minus.
Theodonion, Pœonia.
Tephin Aeg, Polygonum.
Thespo, Banium.
Thermos, Lupinum.
Thermatis, Ocimastrum.
Thesam Osthunes uocat Asarum.
Thesce Aeg, Callaminus.
Thonan Gallis, Chelidonium magnum.
Thorpathisade Pœnis, Apios.
Therybethron, Leontopetalon.
Thesarca Hispanis, Plantago.
Thrambe Pythagore, Sampsuchum.
Thridacis, Mandragoras.
Thridax Græcis, Lactuca.
Thryas, Epimedium.
Thymarnolion Magis, Hippomarathrum.
Thymbra Zoroastri, Colocynthis.
Thymiatitis, Quingfolium.
Thymus Lat, Calamintha.
Thyr sine Cyprijs, Orobanche.
Thyr sion, Catanance.
Thyr sion, Calamintha.
Thyr sion, Ocimastrum.
Tialon, Lilium.
Tibus Aegyptijs, Stratiotes Aquaticus.
Timoros, Cicutia.
Tintinabulum terre, Limonium.
Tiphonion Zoroast, Hyoscyamus.
Tiricta Aphris, Gingidium.
Tis Aeg, Mentha.
- Titani genitura, uel Sanguis Magis, Sideritis.*
Titani sanguis, Rubus.
Titani sanguis Magis, Lactuca syluestris.
Tium, Astragalus.
Tobion, Stoebe.
Topiaria, Acanthium.
Thorpat Aphris, Raphanus.
Toxitesia, Artemisia.
Tragoceros, Anemone, & Aloë.
Tragonaton, Lychnis syluestris.
Tribolion, Lotus urbana.
Trica, Geranium.
Trichomanes, Adiantum.
Trichomanes, Capparis.
Tridactylos, Agnos.
Trifolium odoratum Romanis, Medium.
Trifolium maius Romanis, Cytisus.
Trigonon, Medium.
Trigomon, Verbena.
Trimachion, Hippuris.
Trimphalites Zoroastri, Cyclaminus.
Tripedilon, Marrubium.
Triphyllon, Staphis agria.
Triphyllon, Medium.
Tripyllon, Sampsuchum.
Triphyllon, Lotus syluestris, & Cytisus.
Tripodion, Lotus urbana.
Trisago palustris, uel Trixago palustris, Scordion.
Trixalis, Verbenaca.
Trixin, Ricinus.
Tucin, Fumaria.
Tutularis, Gnaphalio.
Tulbella Dacis, Centaurium minus.
Tunica ori Romanis, Anemone.
Turcon Aegyptijs, Periclymenum.
Tutrasra Dacis, Colocynthis.
Tzaanachi Osthani, Buglossus.
Thymon, Aron.
- V.**
Vaccinium Romanis, Hyacinthus.
Valentia Romanis, Artemisia.
Vargugum Aphris, Psyllon.
Vchinasstrum, Geranium.
Vdedonin Aphr, Sideritis.
Venerca Romanis, Acorus.
Venerca, Lonchitis.

Venerca,

Venerca, Sifymbrium.	Vmbilicus terræ, Cyclaminus.	Xleo Magis, Pythagoræ, & O-
Veneris carduus, Dipsacus.	Vmbilicus terræ, Vmbilicus Vene-	sthan, Hyoscyamus.
Veneris coronæ, Sifymbrium.	ris.	Xcrantes, Mandragoras.
Veneris hortus, Vmbilicus Vene-	Vnscera Romanis, Centaurium ma-	Xylotos, Quinq. folium.
ris.	gnum.	Xylopetalon, Quinq. folium.
Veneris labrum, Dipsacus.	Vnguis ibidis Magis, Quinq. fo-	Xyphion, Gladiolus.
Veneris lauterum, Dipsacus.	lium.	Xyris, Iris agrestis.
Veneris Polion Magis, Periclyme-	Vnguis muris, Polygonum.	
nam.	Vniola, Gramen.	Z.
Veneris supercilium, Achillea, &	Vnre, Veratrum album.	
Millesfolium.	Volucrum Lat. Clymenum.	Z Alia, Chamedaphne.
Verbascum Lat. Phlomos.	Volucrum maius, Clymenum, & Pe-	Zarithea, Polygonum.
Vernulago Latinis, Chamelco ni-	riclymenum.	Zea, Rosmarinus.
ger.	Volucrum maius Roman. Eupato-	Zeliaurus, Anagallis.
Vertemnum Rom. Sideritis.	rium.	Zeraphoes Pœnis, Linum.
Vilium nigrum Romanis, Limon-	Volutum laparon Roma. Helxinè,	Zigar Aphris, Bunium.
nium.	Vrania, Iris.	Zomarition, Nigrum ueratrum.
Vindicta Rom. Epimedium.	Vrina muris Magis, Malua.	Zoonychon, Leontopodium.
Viola alba Lat. Leucoion.	Vrina scorpionis, Sideritis.	Zoophthalmos, Sedum maius.
Viola matronalis, Leucoion.	Vrtica labeo Lat. Galeopsis.	Zopyros, Clinopodium.
Viperalis Romanis, Lens palu-	Vstilago rustica Romanis, Didia-	Zuorinsipet Aphris, Imperius par-
stris.	mos.	ua.
Vitalis Roma. Sedum minus.	Vsubim Gallis, Chamedaphne.	Zuosse Dacis, Artemisia.
Vitæcaria, Ballote.		Zygis sylvestris, Serpyllum.
Vicinum, Hyacinthus.		
Vlophonon, Chamelconiger.		
Vsicana herba, Solanum somni-		
ferum.		

X.

X Antophanea Andree, Sides-

FINIS.

Fol. 80. Iuglandium pictura pro Pistacijs posita est,
quæ mox subsequenti folio habentur.

FRANCOPORTI, Apud Chr. Egenolphum
Hadamarium. Anno 1549.
Mense Aprili.



2. Timet. 4.



UTILIS EST.

PIETAS

AD OMNIA



